Multidimensão e territórios de risco

Autor(es): III Congresso Internacional, Guimarães, 2014; I Simpósio Ibero-Americano, Guimarães, 2014; VIII Encontro Nacional de Riscos, Guimarães, 2014; Lourenço, Luciano, ed. lit.

Publicado por: Imprensa da Universidade de Coimbra; RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

URL persistente: URI:<http://hdl.handle.net/10316.2/34789>

DOI: DOI:<http://dx.doi.org/10.14195/978-989-96253-3-4>

Accessed : 26-Apr-2023 10:48:46

A navegação consulta e descarregamento dos títulos inseridos nas Bibliotecas Digitais UC Digitalis, UC Pombalina e UC Impactum, pressupõem a aceitação plena e sem reservas dos Termos e Condições de Uso destas Bibliotecas Digitais, disponíveis em <https://digitalis.uc.pt/pt-pt/termos>.

Conforme exposto nos referidos Termos e Condições de Uso, o descarregamento de títulos de acesso restrito requer uma licença válida de autorização devendo o utilizador aceder ao(s) documento(s) a partir de um endereço de IP da instituição detentora da supramencionada licença.

Ao utilizador é apenas permitido o descarregamento para uso pessoal, pelo que o emprego do(s) título(s) descarregado(s) para outro fim, designadamente comercial, carece de autorização do respetivo autor ou editor da obra.

Na medida em que todas as obras da UC Digitalis se encontram protegidas pelo Código do Direito de Autor e Direitos Conexos e demais legislação aplicável, toda a cópia, parcial ou total, deste documento, nos casos em que é legalmente admitida, deverá conter ou fazer-se acompanhar por este aviso.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE RISCOS, PREVENÇÃO E SEGURANÇA

MULTIDIMENSÃO E TERRITÓRIOS DE RISCO

**III Congresso Internacional
I Simpósio Ibero-Americano
VIII Encontro Nacional de Riscos**

**Guimarães
2014**

MULTIDIMENSÃO E TERRITÓRIOS DE RISCO

**III Congresso Internacional
I Simpósio Ibero-Americano
VIII Encontro Nacional de Riscos**

**Guimarães
2014**

Ficha Técnica:

Título: Multidimensão e Territórios de Risco

Editor: RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Aeródromo da Lousã, Chã do Freixo
3200-395 VILARINHO LS

Em cooperação com a Imprensa da Universidade de Coimbra

Coordenador Editorial: Luciano Lourenço

Composição: Fernando Félix e Sandra Oliveira

ISBN: 978-989-96253-3-4

DOI: <http://dx.doi.org/10.14195/978-989-96253-3-4>

Paginação e Impressão: Simões & Linhares, Lda.

Novembro de 2014

SUMÁRIO

CAPITULO 1

TEORIA, MODELOS CONCEPTUAIS E COMUNICAÇÃO DO RISCO..... 15

DA COMUNICAÇÃO À CULTURA DE RISCO:

DESAFIOS PARA NOVAS ABORDAGENS.....17

Cintia Okamura ; Jacques Lolive

COMUNICAÇÃO DE RISCOS E JORNALISMO: CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTA RELAÇÃO

A PARTIR DAS MUDANÇAS DO CLIMA21

Eloisa Beling Loose

RISK COMMUNICATION AT UNIVERSITY CAMPUS..... 25

Angela Santos; Margarida Queirós

RISCO AMBIENTAL E VULNERABILIDADE: DISCUSSÃO CONCEITUAL A PARTIR DE TRABALHOS

DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS/BRASIL..... 29

Carla Juscélia de Oliveira Souza

LEVANTAMENTO DA CONCEPÇÃO DE RISCO AMBIENTAL

E ÁREAS DE RISCO NA ESCOLA BÁSICA EM SÃO JOÃO

DEL REI - BRASIL: RESULTADO PRELIMINAR 35

André Barbosa Ribeiro Ferreira ; Larissa Trindade Tarôco; Carla Juscélia de Oliveira Souza

EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E RISCOS SOCIOAMBIENTAIS: EXPERIÊNCIAS

EM ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA.....41

Carla Juscélia de Oliveira Souza

IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO DO RISCO EM DESTINOS TURÍSTICOS COM PERIGOSIDADE

NATURAL ELEVADA: O CASO DA ILHA DA MADEIRA 47

Daniel Márcio F. Neves; José Luís Zêzere

PERCEPÇÃO DE RISCO AOS EVENTOS ATMOSFÉRICOS

EM MAPUTO, MOÇAMBIQUE 53

Lucí Hidalgo Nunes

SEQUÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CONSTRUCCIÓN DE DISCURSOS

SOBRE RIESGOS HÍDRICOS EN ANDALUCÍA..... 57

Pilar Paneque; Jesús Vargas

CLASSIFICAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES ASSOCIADAS A ALUVIÕES NA REGIÃO DO FUNCHAL,

ILHA DA MADEIRA, COM RECURSO A CADEIAS DE MARKOV61

Ana Ramalheira; Maria Manuela Portela; António Betâmio de Almeida

EXPANSÃO URBANA, OCUPAÇÕES DE BAIXA RENDA E RISCOS AMBIENTAIS, NA CIDADE DE BOA

VISTA, RR/ BRASIL.67

Miguel Cerqueira dos Santos; Artur Rosa Filho

A HEMEROGRAFIA COMO MEIO DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE DESASTRES:

ESTUDO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO - BRASIL NO PERÍODO 2001-2013..... 73

Bruno Zucherato; Maria Isabel Castreghini de Freitas

A MÍDIA EM FOCO: EXEMPLOS DE DESINFORMAÇÃO CLIMÁTICA 77

Lucí Hidalgo Nunes; Cleusa Aparecida Gonçalves Pereiza Zamparoni

CAPITULO 2

GEOTECNOLOGIAS APLICADAS À ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS 81

POTENTIAL FOR THE APPLICATION OF A GRAVITY SENSING TECHNOLOGY FOR THE IMPROVEMENT OF THE ASSESSMENT OF SEISMIC HAZARDS	83
Arthur L.S. Valencio ; Charles H.-T. Wang	
O MAPA DE ESTADO AMBIENTAL EM ESCALA REGIONAL COMO SUBSÍDIO AO PLANEJAMENTO AMBIENTAL: O CASO DE TRÊS REGIÕES COSTEIRAS DO LITORAL BRASILEIRO	89
Raul Reis Amorim; Maria Crizalda Ferreira Santos	
UM MODELO ESPACIAL BASEADO EM MÉTODO DE CLASSIFICAÇÃO FUZZY, APLICADO AO MAPEAMENTO DE RISCO À EROSÃO.....	95
Marcos César Ferreira; Danilo Trovó Garófalo; Cassiano Messias; Marta Marujo Ferreira	
ASSESSMENT OF SAND DUNES MOVEMENTS RATE IN ATLANTIC SAHARA DESERT USING MULTI-TEMPORAL LANDSATIMAGERY AND GIS TECHNIQUE	101
Ali Aydda ; Ahmed Algouti	
VULNERABILIDADE URBANA A DESLIZAMENTOS DE TERRA EM SÃO PAULO.....	107
Letícia Palazzi Perez; José Rodolfo Scarati Martins; Magda Adelaide Lombardo	
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES MEDIANTE TECNOLOGÍA DE GEO-PROCESAMIENTO RASTER Y VECTORIAL.....	111
María Isabel Andrade; David Schomwandt; Nora Lucioni	
FIRE HAZARD AND SUSCEPTIBILITY TO DESERTIFICATION: A TERRITORIAL APPROACH IN NE PORTUGAL.....	117
Tomás de Figueiredo; Felícia Fonseca; Helena Pinheiro	
USO DE SENSORES REMOTOS COM DIFERENTES RESOLUÇÕES ESPECTRAIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DAS TERRAS DE ÁREAS COM RISCO À INUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ITALVA E CARDOSO MOREIRA, RIO DE JANEIRO, BRASIL.....	123
Claudio Henrique Reis; Raul Reis Amorim	
GEOTECNOLOGIAS APLICADAS AO MONITORAMENTO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NA REGIÃO DA REDEC-I 7 DO ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL.....	129
Evandro Antônio Cavarsan; Eymar Silva Sampaio Lopes; Lourenço Magnoni Júnior	
LA INTERACCIÓN ENTRE ATMÓSFERA INSALUBRE Y POBLACIÓN URBANA: UNA APROXIMACIÓN DESDE LA GEOVISUALIZACIÓN DIGITAL PARA EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS	135
María Jesús Vidal Domínguez,; Antonio Moreno Jiménez; Ana Mellado San Gabino; Rosa Cañada Torrecilla	
MAPEAMENTO DE SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS BRASILEIRAS, UTILIZANDO TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO	141
Taiana Evangelista dos Reis; Vivian Castilho da Costa; Marta Foeppeel Ribeiro	
CARTOGRAFIA MUNICIPAL DE RISCO COM RECURSO AO <i>MODEL BUILDER</i>	147
José Rocha	
SIMULAÇÃO DE CHEIA SEGUIDA DE INUNDAÇÃO NA CIDADE DE MIRANDELA	153
Maria Gouveia; Luciano Lourenço; Carmen Ferreira; Francisco Costa	
USO DE SENSORES REMOTOS COMO FERRAMENTA PARA MAPEAMENTO DE ÁREAS QUEIMADAS POR INCÊNDIOS FLORESTAIS. O EXEMPLO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL NO ANO DE 2013.....	159
Raphael Costa Cristovam da Rocha; Luciano Lourenço; Gil Rito Gonçalves	

UTILIZAÇÃO DA DETECÇÃO REMOTA NA CONSTRUÇÃO DE MAPAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DELIMITAÇÃO DE ÁREAS INCENDIADAS	165
Raphael Rocha; Bruno Martins; António Pedrosa	

CAPITULO 3

TERRITÓRIOS DE RISCOS

(PREVISÃO, PREVENÇÃO, CONSEQUÊNCIAS E REABILITAÇÃO)	171
---	-----

CAPITULO 3.1 RISCOS GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS 173

MODELAÇÃO E ANÁLISE DE PERDAS ASSOCIADAS AO RISCO SÍSMICO	175
Luis Sá ; Patrícia Pires; Paulo Henriques; Maria João Telhado	

IDENTIFICATION DES ZONES SOUMISES À LA DÉGRADATION DU SOL

DANS LE BASSIN VERSANT DE N'FIS (MAROC)	181
---	-----

Adama Amaya; Abdellah Algouti; Ahmed Algouti; Nadia El Aaggad

ÁREAS DE RISCO DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTAS NO BRASIL: UM ESTUDO SOBRE

AS FAVELAS EM CAMPOS DO JORDÃO-SP.....	187
--	-----

Artur Rosa Filho

DESAFIOS COLOCADOS À CARTOGRAFIA DAS ÁREAS DE SUSCEPTIBILIDADE DE RAVINAMENTO A PARTIR DE ESTUDOS NO CENTRO DE PORTUGAL.....

	191
--	-----

Bruno Manuel Martins; Luciano Fernandes Lourenço; Raphael Costa Cristovam da Rocha

O PAPEL DA VULNERABILIDADE SÍSMICA NA MITIGAÇÃO

DO RISCO SÍSMICO DE NÚCLEOS URBANOS ANTIGOS.....	199
--	-----

Romeu Vicente; Tiago M. Ferreira; Rui Maio

O PROCESSO DE OCUPAÇÃO, RISCOS E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DAS ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS: SUBSÍDIOS PARA SEU PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL

	205
--	-----

Fabiano dos Santos Nunes; Ednice de Oliveira Fontes; Ana Maria Souza Santos Moreau; Joandre Neres de Jesus

RISCOS ASSOCIADOS A PROCESSOS GEOMORFOLÓGICOS NA SERRA DO MAR PAULISTA

	211
--	-----

Marcelo da Silva Gigliotti ; Estéfano Seneme Gobbi ; Pedro Henrique de Mello Bacci

RISCOS E VULNERABILIDADES NA COMPARTIMENTAÇÃO GEOMORFOLÓGICA

DA SUB-BACIA DO RIO GAVIÃOZINHO, BAHIA, BRASIL	215
--	-----

Rafael Carvalho Santos

SUIVI DU RISQUE DE DÉGRADATION DES SOLS PAR TÉLÉDÉTECTION: APPLICATION

AU BASSIN VERSANT D'OUED FERGOUG DANS LES MONTS

DES BÉNI-CHOUGRANE EN ALGÉRIE	221
-------------------------------------	-----

Souidi Zahira ; Hamimed Abderrahmane; Donze Frédéric

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS SOCIALES DE RIESGO POR FENÓMENOS VOLCÁNICOS EN

COLOMBIA	227
----------------	-----

Yolanda Hernández Peña; Germán Vargas Cuervo

OS FLUXOS DE ESCOAMENTO SUB-SUPERFICIAIS E SUA RELAÇÃO COM OS PROCESSOS DE

VOÇORACAMENTO: UM PROCESSO DINÂMICO DE CAPTURAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS. .	231
--	-----

Kátia Gisele de Oliveira Pereira; António de Sousa Pedrosa

AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DOS PROCESSOS EROSIVOS NA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DE ÁGUA DE GATO - CONCELHO DE SÃO DOMINGOS, CABO VERDE	237
Fílipe Gomes Sanches; Ineida Romi Tavares Varela De Carvalho; António Vieira	
MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DA ÁREA URBANA DE ILHÉUS, BAHIA.....	243
Hogana Sibilla Soares Póvoas; Ednice de Oliveira Fontes; Ana Maria dos Santos Moreau	

CAPITULO 3.2 RISCOS CLIMÁTICOS E HIDROLÓGICOS249

IMPACTOS DE EVENTOS PLUVIAIS EXTREMOS NO ESTADO DO PARANÁ - BRASIL	251
Lindberg Nascimento Júnior; João Lima Sant'Anna Neto	
RISCOS ASSOCIADOS ÀS CHUVAS INTENSAS	
EM INDAIATUBA, SÃO PAULO, BRASIL	259
Marina Sória Castellano; Lucí Hidalgo Nunes	
INVESTIGATION OF THE TRENDS IN RAINFALL DATA	
IN SLOVAKIA, PORTUGAL AND LIBYA	265
Martina Zelenáková; Pavol Purcz; Maria Manuela Portela; Helena Hlavatá; Ibrahim Gargar	
AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE EVENTOS DE CHUVAS EXTREMAS	
NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB	269
Francisco de Assis Salviano de Sousa; Valmir Rocha ; Carmem Terezinha Becker	
EXTREME CLIMATIC PERIODS	
IN EASTERN SLOVAKIA LOWLANDS	275
Vlasta Ondrejka Harbuláková; Martina Zelenáková; Pavol Purcz; Maria Manuela Portela; Helena Hlavatá; Michaela Stračarová	
QUANDO NÃO SE APRENDE COM A CATÁSTROFE:	
A NEGLIGÊNCIA COM AS ESTRATÉGIAS DE RESILIÊNCIA URBANA	
NUMA CIDADE AFETADA POR DESASTRE NATURAL.....	281
Emerson de Oliveira Muniz; Franciele de Oliveira Pimentel	
MEDIDAS PREVENTIVAS NA GESTÃO INTEGRADA DO RISCO DE INUNDAÇÃO EM PORTUGAL:	
O PLANEAMENTO PARTICIPATIVO E O PAPEL DAS COMUNIDADES LOCAIS	287
Francisco da Silva Costa; Luciano Lourenço; Carmen Ferreira; Maria Gouveia	
NOVAS MEDIDAS ESTRUTURAIS PARA DIMINUIÇÃO DO RISCO	
HIDROLÓGICO NO FUNCHAL.....	291
A. Betâmio de Almeida; Sérgio Lopes	
AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO HIDROMORFOLÓGICA DE CANAIS COMO SUBSÍDIO	
À GESTÃO DO RISCO DE INUNDAÇÕES URBANAS: BACIA	
DOS RIOS GUAXINDIBA/ALCÂNTARA (RIO DE JANEIRO, BRASIL)	297
Fernando Souza Damasco; Sandra Baptista da Cunha	
FONTES DE ABASTECIMENTO POR ÁGUAS SUBTERRÂNEAS	
NO MUNICÍPIO DE BARRAS/PIAUÍ - BRASIL.....	303
Francisca Cardoso da Silva Lima	
ANALYSE DU RISQUE ALIMENTAIRE AU NIVEAU DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE	
DE LA VILLE D'ORAN DE L'OUEST ALGERIEN	309
Chafika Hebbar; Dounia Merzoug; Sid Ahmed Kerfouf; Zitouni Boutiba	
ANALYSIS OF FLOODS IN 2010 IN THE EASTERN SLOVAKIA.....	315
Martina Zelenáková; Maria Manuela Portela; Lenka Gaňová	

SUSCEPTIBILIDADE DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VEZ AO RISCO DE CHEIA.....	321
Maria Augusta Fernández Moreno ; Glória Gonçalves	
CARACTERIZAÇÃO E MEDIDAS MITIGADORAS DAS INUNDAÇÕES EM VILAMOURA, ALGARVE	327
Rui Lança; Vera Rocheta; Fernando Martins; Helena Fernandez; Celestina Pedras	
SISTEMAS DE AVISO METEOROLÓGICO - ESTUDO COMPARATIVO DE AVISOS EMITIDOS, CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS REGISTRADAS E REGISTO DE OCORRÊNCIAS	333
Ricardo Gomes; Válder Ferreira; Rafael Brites	
MARINE STORMS AND COASTAL RISK ALONG THE GULF OF BISCAY AREA: WINTER 2014	337
Domingo F. Rasilla; Carolina Garmendia; Juan Carlos García-Codron; Victoria Rivas	
DESIGUALDADE NO CAMPO E O RISCO CLIMÁTICO EM ÁREAS DE PRODUÇÃO DA SOJA NO SUL DO BRASIL	343
Vinicius Carmello; Miriam Rodrigues Silvestre; João Lima Sant'Anna Neto	
PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS: ESTUDO DE CASO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO INDAIÁ - UBATUBA - SP- BRASIL	349
Débora Olivato; Humberto Gallo Junior; Magda Adelaide Lombardo	
APLICAÇÃO DE TÉCNICA MULTIVARIADA À RAZÃO DE MISTURA DO AR EM MINAS GERAIS/BRASIL.....	353
Edicarlos Pereira de Sousa; Célia Campos Braga; Jonathan Castro Amanajás ; Milena Pereira Dantas	
PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA EN ESPAÑA Y VULNERABILIDAD FRENTE AL RIESGO DE SEQUÍA	359
Jesús Vargas Molina	
A DESERTIFICAÇÃO EM SERGIPE, COMO TERRITÓRIO DE RISCO PASSÍVEL DE REABILITAÇÃO	365
Alberlene Ribeiro de Oliveira; Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto	
LA RÉSILIENCE DES VILLES SAHÉLIENNES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE: ETUDE DU CAS DE LA VILLE DE NOUAKCHOTT (MAURITANIE)	371
Zeineddine NOUACEUR	
THE ROLE OF PHYSICAL ENVIRONMENT IN THE GENESIS AND AMPLIFICATION OF FLOODS IN NADOR (NORTHEAST MOROCCO)	377
Abdelkader Sbaï ; Jose Eduardo Rodríguez-Juan; Abderrahmane El Harradji	
APLICAÇÃO DO SISTEMA HIDRALERTA NA AVALIAÇÃO DO RISCO ASSOCIADO AO GALGAMENTO NO PORTO DA PRAIA DA VITÓRIA.....	385
C. Fortes, R. Reis, M.T. Reis, P. Poseiro, R. Capitão, L. Pinheiro, J. Craveiro; J. A. Santos; Silva, J.C. Ferreira, M. Martinho, A. Sabino, A. Rodrigues, P. Raposeiro, C. Silva; Simões, E.B. Azevedo, F. Vieira; M.C. Rodrigues	
DETERMINAÇÃO DE FREQUÊNCIAS DE EVENTOS EXTREMOS DE CHUVA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL.....	391
Célia Campos Braga ; Bernardo Barbosa da Silva; Francisco de Assis Salviano de Sousa; Milena Pereira Dantas	
ANÁLISE COMPARATIVA DO ALBEDO DA SUPERFÍCIE MEDIDO SOBRE A CULTURA DE BANANA E ESTIMADO ATRAVÉS DE IMAGENS MODIS/TERRA.....	399
Célia Campos Braga; Geissa Samira Lima Nascimento; Ramon Campos Braga; Bernardo Barbosa da Silva; Milena Pereira Dantas	
ANÁLISE DE MAPEAMENTOS DE ÁREAS DE RISCOS HIDROLÓGICOS EM CUIABÁ/MT/BRASIL....	405
Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni	
CARACTERIZAÇÃO DO TEMPORAL DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2013, PORTUGAL CONTINENTAL....	411
Cristian Camilo Fernández Lopera	

EXTREMO CLIMÁTICO NO BAIXO CURSO DO RIO AQUIDAUANA-MS-BRASIL: AMEAÇAS, VULNERABILIDADE E RISCOS SOCIOAMBIENTAIS.	417
Elvira Fátima de Lima Fernandes ; Vicentina Socorro da Anunciação ; Flávio Cabreira dos Santos	
APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA (AHP) NA AVALIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DE GALGAMENTO EM ZONAS PORTUÁRIAS - CASO DE PONTA DELGADA, AÇORES.....	421
Joana Rodrigues; Pedro Poseiro; Maria Teresa Reis; Conceição Juana Fortes; Francisco Taveira Pinto	
A SECA COMO FATOR DE RISCO AMBIENTAL NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO.....	427
Maria F.J.L. Ramalho; Antonio J. T. Guerra	
AVALIAÇÃO DO RISCO DE GALGAMENTOS E INUNDAÇÃO: INTEGRAÇÃO DE UM MÉTODO EXPEDITO DE INUNDAÇÃO NO SISTEMA HIDRALERTA.....	431
P. Poseiro, C. J. E. M. Fortes, M. T. Reis	
OCORRÊNCIA DE EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO EM CAMPINA GRANDE - PARAÍBA, BRASIL	437
Raimundo Mainar de Medeiros; Edicarlos Pereira de Sousa ; Manoel Francisco Gomes Filho	
 CAPITULO 3.3 RISCOS AMBIENTAIS E SAÚDE	 441
DETERMINAÇÃO DOS ÓTIMOS TÉRMICOS EM RELAÇÃO À MORTALIDADE ANUAL:	
ANÁLISE DE PORTO, COIMBRA E LISBOA	443
Jorge Marques; Sílvia Antunes; Baltazar Nunes; Susana das Neves Pereira da Silva; Liliana Antunes; Carlos Dias	
VARIAÇÃO TÉRMICA E A MORTALIDADE POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES NA CIDADE DE LIMEIRA/SP	449
Aline Pascoalino; Sandra Elisa Contri Pitton	
AMBIENTE TÉRMICO DE SALA DE AULA PODE CONDICIONAR O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E AVALIAÇÃO DE ALUNOS.....	453
Mário Talaia; Marta Silva	
AVALIAÇÃO DE RISCOS DE FADIGA E DE PRODUTIVIDADE EM AMBIENTE TÉRMICO FRIO: CASO DE UMA INDÚSTRIA DE PEIXE	459
Isabel Tavares; Mário Talaia; Leonor Teixeira	
HIDRELÉTRICAS E RISCOS A SAÚDE: O CASO DE NOVA PONTE EM MINAS GERAIS- BRASIL.....	465
Joana D'Arc Vieira Couto Astolphi; Vicente de Paulo da Silva	
ANÁLISE DE RISCO SOCIAL E TECNOLÓGICO EM GRÁFICA DE PEQUENO PORTE EM LONDRINA/PR/BRASIL	469
Camila Santos Doubek Lopes; Mirian Vizintin Fernandes Barros	
IMPACTO DE TEMPERATURAS EXTREMAS NA MORTALIDADE E MORBIDADE - UM ESTUDO NA ILHA DA MADEIRA	475
Ricardo Gomes; Rafael Brites	
RISCO DE AGUDIZAÇÃO DE DOENÇA RESPIRATÓRIA SUSCITADA POR FRENTE FRIA	479
Mário Talaia; Denise Pina	
LA CIUDAD COMO ESPACIO DE RIESGO AMBIENTAL: ESTIMACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y DE LA POBLACIÓN EXPUESTA EN METRÓPOLIS ESPAÑOLAS	483
Rosa Cañada Torrecilla; Antonio Moreno Jiménez; Pedro Martínez Suárez; María Jesús Vidal Domínguez	
VULNERABILIDADE AOS RISCOS SÓCIO AMBIENTAIS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - BRASIL.	489
Magda Adelaide Lombardo ; Bruna Luiza Pereira de Jesus; Amanda Lombardo Fruehauf	

ESTUDO DO CONFORTO TÉRMICO EM CONTEXTO INDUSTRIAL: CASO DE INDÚSTRIA VIDREIRA	495
Mariana Morgado; Mário Talaia; Leonor Teixeira	
MAPEAMENTO DA PROBABILIDADE DE CONTAMINAÇÃO EM ARSÉNIO NUMA ÁREA MINEIRA ABANDONADA (CENTRO DE PORTUGAL), USANDO A KRIGAGEM DA INDICATRIZ	501
Margarida Antunes; Teresa Albuquerque	
NITRATOS NOS SOLOS E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - PERSPETIVA SOBRE A ATUALIDADE, TENDÊNCIAS, IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE AMBIENTAL E ABORDAGENS DE REDUÇÃO DE RISCOS.....	507
Rui Araújo; Ana Meira Castro; António Fiúza	
SAÚDE E RISCO AMBIENTAL: O CASO DOS USUÁRIOS DE FOGÃO A LENHA NO ESTADO DO CEARÁ, REGIÃO NORDESTE DO BRASIL	513
Ricardo Luis Teles de Carvalho ; Adeildo Cabral da Silva; Magda Adelaide Lombardo	
MEDICINA DE CATÁSTROFE: DE FUKUSHIMA PARA O MUNDO.....	519
Rita Marques da Silva; Paulo Campos; Ana Mafalda Reis; Romero Bandeira	
CATÁSTROFE DE 20 DE FEVEREIRO DE 2010 NA ILHA DA MADEIRA. O IMPACTO NOS INTERVENTORES DE SAÚDE NO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO HOSPITAL DR. NÉLIO MENDONÇA.....	523
Isa Silva; Paulo Campos; Ana Mafalda Reis; Romero Bandeira	
ÁGUAS RESIDUAIS, LAMAS, COMPOSTO - SEUS EFEITOS NA SAÚDE HUMANA	527
Carla Caroça	
IMPACTES DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS EM ESCOMBREIRAS DE CARVÃO ABANDONADAS.....	531
Cármén Ferreira; Luciano Lourenço; Francisco Costa; Maria Gouveia	
AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS EPIDEMIOLÓGICOS NA POPULAÇÃO PORTUGUESA	537
Cristina. <i>S.Pereira</i> ; Carla G.Souares; J. V. Silva Pereira	
EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO UM INSTRUMENTO PARA A PERCEÇÃO DE RISCOS E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS BIOLÓGICOS EM VIAGENS PARA A PRÁTICA DESPORTIVA.....	543
Joilma Nogueira do Espírito Santo; Benedito Carlos Cordeiro; Alcinéa Rodrigues Athanázio	
ELETROMAGNETIC FIELDS AND ENVIROMENTAL NOISE: HUMAN HEALTH IMPACTS IN SERZEDELO, GUIMARÃES (PORTUGAL).....	547
Juliana Araújo Alves; Lígia Torres Silva; Paula Cristina Remoaldo	
CONFORTO TÉRMICO NA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES DE SAÚDE E SEGURANÇA: REVISÃO DA LITERATURA	553
Mariana Morgado; Leonor Teixeira; Mário talaia	
A FORMAÇÃO DE CIDADÃOS ATRAVÉS DO USO E INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS: RISCOS CONDICIONADOS PELA TEMPERATURA DO PONTO DE ORVALHO	559
Mário Talaia; Carla Vigário	

CAPITULO 3.4 RISCOS TECNOLÓGICOS E DESENVOLVIMENTO.....565

RISCOS TERRITORIAIS NA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS CANAVIEIROS.....	567
Eduardo Rozetti de Carvalho; Vicente de Paulo da Silva	
RISCOS TECNOLÓGICOS: MODELAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DE UM ACIDENTE NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CLORO	571
Henrique Costa; Manuel Trelles; António Gomes	

OS RISCOS CLIMÁTICOS E A MERCANTILIZAÇÃO DA NATUREZA NA ERA DO AQUECIMENTO GLOBAL - O PAPEL DA MÍDIA.....	575
Paulo Cesar Zangalli Junior; João Lima Sant'Anna Neto	
LIXO MARINHO DE ORIGEM INDUSTRIAL E AS SUAS ABORDAGENS DE RISCO	579
Plínio Martins Falcão	
ANÁLISE DA VULNERABILIDADE AOS ACIDENTES TECNOLÓGICOS NO ENTORNO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE PAULÍNIA, SÃO PAULO - SP.	583
Rafael Alexandre Ferreira Luiz; Adelaide Cássia Nardocci	
CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICAS E RISCOS SOCIAIS: O CASO DO RIO ARAGUARI - MG, BRASIL	589
Vicente de Paulo da Silva	
INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA DOS RISCOS TECNOLÓGICOS ORIUNDOS DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS NO BRASIL: UM OLHAR A PARTIR DAS PRÁTICAS PARTICIPATIVAS.....	595
Delaney Vidal Di Maio Junior; Marilsa de Sá Rodrigues Tadeucci; Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira	
GUIAS METODOLÓGICOS: ELABORAÇÃO DO FATOR AMBIENTAL ANÁLISE DE RISCOS EM ESTUDOS DE IMPACTE AMBIENTAL	601
Margarida Correia Marques; Cristina Sá; Sara Capela; Cristina Russo	
CONTROLE SOCIAL, GESTÃO SOCIAL E GOVERNANÇA LOCAL DOS RISCOS TECNOLÓGICOS A PARTIR DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ.....	607
Quésia Postigo Kamimura; Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira; Delaney Vidal Di Maio Junior	
CAPÍTULO 3.5 RISCOS SOCIAIS NO CONTEXTO DE CRISE GLOBAL	613
DESASTRES NO BRASIL: UMA ANÁLISE SOCIO-ESPACIAL DA VULNERABILIDADE INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA EVOLUÇÃO DA DECRETAÇÃO MUNICIPAL DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.....	615
Norma Valencio	
RISCOS SOCIAIS, CURRÍCULO DA EJA E POTENCIALIDADES DOS JOVENS DE PRAIA DO FORTE, BAHIA/BRASIL	621
Maria Gonçalves Conceição Santos ; Tula Ornellas Farias Santos; Márcia Regina Barbosa	
ENTRE A POEIRA E A LAMA: REPERCUSSÕES DOS DESASTRES NA VIDA COTIDIANA DE GRUPOS VULNERABILIZADOS.....	627
Norma Valencio	
POR ENTRE BRASAS E FUMAÇAS: UMA ABORDAGEM GEOGRÁFICA.....	633
Luciano Lourenço; Norma Valencio; Rosemeire Scopinho	
POR ENTRE BRASAS E FUMAÇAS: A IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM SOCIOLOGICA DA MEMÓRIA SOCIAL DE IDOSOS PARA A COMPREENSÃO DE DESASTRES RELACIONADOS AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS EM PORTUGAL	639
Norma Valencio; Rosemeire Aparecida Scopinho; Luciano Lourenço	
DIAGNÓSTICO DE RISCO DOS IMÓVEIS TOMBADOS EM BAURU/ SP/ BRASIL	645
Sérgio Ricardo Losnak; Camila Santos Doubek Lopes	
RISCOS SOCIAIS E AS MOTIVAÇÕES DOS TERRITÓRIOS INTENCIONALMENTE DE RISCO: PERCEPÇÕES SOBRE O RIO DE JANEIRO E O DISTRITO FEDERAL	651
Érica Ferrer	

POPULAÇÕES RURAIS E OS RISCOS FRENTE À EXPANSÃO DO TURISMO: VERTENTES SOCIOAMBIENTAIS E RESSIGNIFICAÇÕES DA RELAÇÃO ESPAÇO-NATUREZA.....	655
Germana Lima de Almeida; Lea Carvalho Rodrigues	
O IMPACTO SOCIAL DO BIOTERRORISMO	659
Gisélia Braga ; Paulo Campos ; Ana Mafalda Reis ; Romero Bandeira	
A TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO: RISCOS ÀS COMUNIDADES DIRETAMENTE ATINGIDAS EM CABROBÓ (PE)/BRASIL	663
André Tomé de ASSIS; Maria Aparecida dos Santos Tubaldini; Luciano Lourenço	
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E RISCOS NATURAIS: PROBLEMAS SOCIAIS RELACIONADOS À DESERTIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB	667
Braulio José Carvalho Luna; Rômulo Lima Silva de Góis; João Vitor Gobis Verges	
A POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA (PNMC-BRASIL) COMO FATOR DE AGRAVAMENTO DE RISCOS SOCIAIS EM ASSENTAMENTOS RURAIS DE REFORMA AGRÁRIA: O CASO DO PONTAL DO PARANAPANEMA-SP	673
João Vitor Gobis Verges; Braúlio José Carvalho Luna; Rômulo Lima Silva de Góis	
 CAPITULO 3.6 RISCOS DENDROCAUSTOLÓGICOS (INCÊNDIO FLORESTAL)	 677
 AGRICULTURA TRADICIONAL DE CORTE E QUEIMA NO BIOMA DE MATA ATLÂNTICA (RJ) - BRASIL	 679
Ana Valéria Freire Allemão Bertolino; Isabel Linhares Pereira Soares; Lúcio José Sobral Cunha	
RISCOS DENDROCAUSTOLÓGICOS: PREVISÃO, PREVENÇÃO E CONSEQUÊNCIAS NO ESTADO DE RORAIMA, AMAZÔNIA, BRASIL	685
Antônio Carlos Ribeiro Araújo Júnior	
ENXURRADAS VIOLENTAS APÓS INCÊNDIOS FLORESTAIS. O EXEMPLO DE PRAIAS E PISCINAS FLUVIAIS DA BACIA DO RIO ALVA (PORTUGAL)	691
Luciano Lourenço; Adélia Nunes; Joana Gonçalves	
LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO COMO FACTOR CONDICIONANTE EN LA CATÁSTROFE DE VALPARAÍSO CASO VALPARAÍSO, CHILE CENTRAL.....	697
Luis Correa Jiménez; Miguel Castillo Soto	
GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RIESGOS Y ACTUACIONES FRENTE A DESASTRES OCASIONADOS POR INCENDIOS DE INTERFAZ	703
Miguel Castillo S.	
TRAGEDIA DE UN INCENDIO ANUNCIADO: EL CASO DE VALPARAÍSO, CHILE CENTRAL	709
Miguel Castillo S.; Luis Correa J.	
MODIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES HIDRÁULICAS DOS SOLOS DA SERRA ALGARVIA DEVIDO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS.....	715
Rui Lança; Vera Rocheta; Fernando Martins; Helena Fernandez; Elisa Silva; Celestina Pedras	
ANÁLISE DE VULNERABILIDADE A INCÊNDIOS FLORESTAIS NA REGIÃO DO MINHO, PORTUGAL.....	721
António Bento-Gonçalves; António Vieira; Adélia Nunes ; Luciano Lourenço; Sandra Oliveira; Fernando Félix	

OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS NA INTERFACE URBANO-FLORESTAL	727
Emanuel Fidalgo	
TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO REGIONAL DOS GRANDES INCÊNDIOS FLORESTAIS (≥100 HA) EM PORTUGAL CONTINENTAL, NAS ÚLTIMAS TRÊS DÉCADAS	731
Flora Ferreira Leite; António Bento Gonçalves; Luciano Lourenço; Adélia Nunes; António Vieira	
MEDIDAS MITIGADORAS DE EMERGÊNCIA, PARA PROTEÇÃO E FERTILIZAÇÃO DOS SOLOS RECENTEMENTE ARDIDOS, APLICANDO RESÍDUOS TÊXTEIS BIODEGRADÁVEIS.....	737
José Salgado ; António Bento-Gonçalves ; António Vieira	
EL PAPEL DE LOS INCENDIOS EN LA CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE VEGETAL DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA Y PIRINEO ORIENTAL. PRIMEROS RESULTADOS DE UN ESTUDIO COMPARADO	741
Juan Carlos García Codron; Anna Badia; Maria Barrachina; Virginia Carracedo; Carmen Ceballos; Raquel Cunill; Concepción Diego; Ignacio García Amorena; Carolina Garmendia; David Molina; Jordi Nadal; Joan Nunes; Albert Pèlachs; Aaron Pérez; Ramon Pérez-Obiol; Leonor de la Puente Fernández; Domingo Rasilla; Joan Maria Roure; Joan Manuel Soriano; Maria Victoria Rivas; Iago Vázquez	
A ATIVIDADE CINEGÉTICA E OS INCÊNDIOS FLORESTAIS.....	747
Ricardo Manuel da Costa Rodrigues; António Bento-Gonçalves	
TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA EM SOLOS ARDIDOS E NÃO ARDIDOS, NA SERRA DA PENHA (GUIMARÃES)	751
Rúben Torres; José Rocha	

CAPITULO 4 APLICAÇÃO DO PLANEAMENTO/PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO À GESTÃO DE RISCOS 757

DESASTRES NATURAIS E GESTÃO DE RISCO NO BRASIL: CARACTERÍSTICAS E CONTRIBUTOS PARA O ORDENAMENTO TERRITORIAL	759
Aline Pascoalino; Lutiane Queiroz de Almeida	
INSERCIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO MANEIRO. ESTADO NUEVA ESPARTA.VENEZUELA	763
María Gabriela Camargo Mora; Beatriz Ávila Guerra	
A GESTÃO DOS RISCOS TECNOLÓGICOS COM EXTERNALIDADE NO ENTORNO: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP / BR	767
Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira ; Delanney Vidal Di Maio Junior; Luiz Antonio Perrone Ferreira de Brito	
MAPEAMENTO DE RISCOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE CARAGUATATUBA-SP.....	773
Estéfano Seneme Gobbi ; Francisco Sérgio Bernardes Ladeira ; Marcelo da Silva Gigliotti	
GRANDES PROJETOS DE INVESTIMENTOS HIDRELÉTRICOS (GPIH) E RISCOS TERRITORIAIS: O RIO ARAGUARI(MG)-BRASIL	779
Hudson Rodrigues Lima; Vicente de Paulo da Silva	
AVALIAÇÃO DO RISCO NO MUNICÍPIO DE BENGUELA, ANGOLA.....	785
Wladimir Borges Estevão; Alexandre Oliveira Tavares	
ORDENAMENTO TERRITORIAL E GESTÃO DE RISCOS NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO - BRASIL.....	791
Humberto Gallo Junior; Débora Olivato	

MAPEAMENTO DA FRAGILIDADE DO MEIO FÍSICO COM BASE EM ANÁLISE MULTICRITÉRIO EM SIG	797
Marta Foeppe Ribeiro; Vivian Castilho da Costa	
A FORMALIDADE E O RISCO: UMA RELAÇÃO TÊNUE ENTRE FORMAS DE OCUPAÇÃO EM SALVADOR - BAHIA, BRASIL	803
Plínio Martins Falcão	
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO FACE ÀS DINÂMICAS CLIMÁTICAS: COMPARAÇÕES ENTRE O PROJETO ORLA BRASILEIRO E O PROGRAMA BUYOUT ESTADUNIDENSE	809
Rômulo Lima Silva de Góis; João Vitor Gobis Verges; Braúlio Luna	
REABILITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE V. N. DE GAIA. UM PROJETO DE PROTEÇÃO CIVIL	813
Salvador Almeida	
CONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - AVALIAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM UMA BACIA HIDROGRÁFICA TRANSFRONTEIRIÇA IBÉRICA	819
Teresa Albuquerque; Margarida Antunes ; Fátima Seco	
DESENVOLVIMENTO DE UM WEBSIG SOBRE INVESTIGAÇÕES APLICADAS A INCÊNDIOS FLORESTAIS.....	825
Nuno Simões; Helena Fernandez; Fernando Martins	
A GESTÃO RISCO NO TERRITÓRIO, O CONTRIBUTO DOS PLANOS REGIONAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO.....	829
Teresa Cravo da Fonseca; Eduarda Marques da Costa; José Luís Zêzere	
AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS NO APOIO AO PLANEAMENTO E GESTÃO FLORESTAL: RECUPERAÇÃO DA ÁREA ARDIDA NO BALDIO DE MOIMENTA - CABECEIRAS DE BASTO	833
Ana Leite	
ANÁLISE DE SUSCEPTIBILIDADES E O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO À ESCALA MUNICIPAL - APLICAÇÃO AOS CONCELHOS DE ARRUDA DOS VINHOS E VILA FRANCA DE XIRA.....	839
Inês Bruno; Henrique Vicêncio	
ANÁLISE DE RISCOS AMBIENTAIS E A INSTALAÇÃO DE UMA ZONA EMPRESARIAL NO INTERIOR DE PORTUGAL	843
Margarida Correia Marques; Cristina Sá; Cristiana Rodrigues; Ana Margarida Mascarenhas	

CAPITULO 5 ANÁLISE E PREVENÇÃO DE RISCOS NAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA/PROTEÇÃO CIVIL849

A IMPORTÂNCIA E O CONTRIBUTO DAS UNIDADES LOCAIS DE PROTEÇÃO CIVIL PARA O PROCESSO DE PLANEAMENTO E GESTÃO DA EMERGÊNCIA. O CASO DE ESTUDO DO MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS (ILHA DA MADEIRA).	851
Ricardo Gomes; Uriel Abreu	
FENÓMENO ICEBERGUE: VÍTIMAS PSICOLÓGICAS DAS CATÁSTROFES NATURAIS (UM ESTUDO COM ADOLESCENTES NA RAM)	857
Cândida Jardim; Ricardo Gomes; Uriel Abreu	
PERCEÇÃO DE RISCO E CONFIANÇA INSTITUCIONAL ENTRE CRIANÇAS E JOVENS DO ENSINO BÁSICO NA RAM.....	863
Ricardo Gomes; Rafael Brites	

OS IMPACTOS PLUVIAIS E VEICULAÇÃO NO JORNAL O PANTANEIRO NA CIDADE DE AQUIDAUANA/MS/BRASIL	867
Flávio Cabreira dos Santos; Vicentina Socorro da Anunciação	
A PRODUÇÃO DESIGUAL DO ESPAÇO COMO GERADORA DE TEMPERATURAS EXTREMAS EM CIDADES MÉDIAS TROPICAIS: O EXEMPLO DE SÃO CARLOS/SP BRASIL.....	871
Camila Riboli Rampazzo; João Lima Sant'Anna Neto	
O TERRAMOTO NO HAITI (12 DE JANEIRO DE 2010). ANÁLISE NA PERSPETIVA DA MEDICINA DE CATÁSTROFE: DO IMPACTO À ATUALIDADE	877
Adriana Araújo; Paulo Campos; Ana Mafalda Reis; Romero Bandeira	
SEGURANÇA AMBIENTAL E TRILOGIA DE RISCOS: ESTUDO DE CASO EM JUIZ DE FORA, MG	881
Geraldo César Rocha	
PREVENÇÃO DE RISCOS COM A COMUNIDADE LOCAL NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO RIO AQUIDAUANA NA CIDADE DE AQUIDAUANA MS/BRASIL	887
Vicentina Socorro da Anunciação ; João Lima Sant `Anna Neto	
RESPONSABILIDADE DOS CIENTISTAS NA COMUNICAÇÃO DO RISCO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. O CASO DA SENTENÇA DE L'AQUILA	893
Antônio Betâmio de Almeida	
IMPORTÂNCIA DA MEDICINA LEGAL EM SITUAÇÃO DE CATÁSTROFE - A QUEDA DA PONTE HINTZE RIBEIRO	897
Sara Gandra; Paulo Campos; Ana Mafalda Reis; Romero Bandeira	
RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS NO CONCELHO DE MIRANDA DO CORVO	901
Cláudio Pereira; Alexandre Oliveira Tavares	
SATISFAÇÃO NO TRABALHO DOS BOMBEIROS: A INFLUÊNCIA DAS EMOÇÕES E DO COPING.....	907
Natália Vara; Sónia P. Gonçalves; Cristina Queirós	
RISCOS NATURAIS NA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA: ANÁLISE DOS RISCOS NATURAIS DE MAIOR INCIDÊNCIA	913
Tânia Abreu; Maria Roxo; Luís Neri	

CAPÍTULO 1

TEORIA, MODELOS CONCEPTUAIS E COMUNICAÇÃO DO RISCO

DA COMUNICAÇÃO À CULTURA DE RISCO: DESAFIOS PARA NOVAS ABORDAGENS

Cintia Okamura

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
cintiaokamura@hotmail.com ; cokamura@sp.gov.br

Jacques Lolive

Laboratório PACTE CNRS - França
jacques.lolive@ujf-grenoble.fr

***Os dois autores têm contribuição equivalente na elaboração do presente artigo**

RESUMO

O contexto urbano de São Paulo é caracterizado pela coexistência de atividades industriais, vias de comunicação saturadas, áreas contaminadas, áreas de moradia entre as quais muitas são ocupações irregulares. Como consequência, os habitantes são expostos a uma combinação inédita de riscos variados. A CETESB, agência governamental responsável pela regulação de riscos sanitários e ambientais, desenvolveu um forte potencial para o monitoramento, análise e regulamentações sobre o componente bio-físico de risco, porém, falta-lhe o conhecimento de seu componente antrópico para desenvolver ferramentas, métodos e leis melhor adaptados. Desta forma, apresentamos o projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido em São Paulo que propõe testar e construir metodologias pertinentes para analisar, revelar e valorizar a experiência da população exposta ao risco a fim de contribuir com o desenvolvimento de uma cultura de risco e produzir conhecimento complementar ao que já vem sendo produzido pelas instituições responsáveis pela gestão do risco, como a CETESB.

Palavras-chave: cultura de risco, experiência da população, participação, métodos qualitativos, gestão de riscos.

Introdução

Em geral, a comunicação envolvendo especialistas, poder público, população e a mídia é problemática devido à dificuldade de entendimento das questões técnicas pelo público em geral e, por outro lado, devido à dificuldade dos técnicos levarem em conta o universo material e cultural da população. Tal quadro resulta, muitas vezes, na adoção de concepções pré-concebidas e incertas, gerando conflito entre os atores envolvidos, principalmente nos casos que envolvem emergência e risco ambiental. Esse contexto mostra a necessidade de procedimentos e de instrumentos que contemplem a definição de estratégias de intervenção, de gestão da informação e de mobilização da população em diversas situações. Desta forma, o presente trabalho propõe apresentar a experiência que está sendo desenvolvida em São Paulo, cujo contexto urbano é caracterizado pela coexistência de diferentes tipos de riscos e cujas instituições responsáveis pela regulação de riscos sanitários e ambientais, como a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), se defrontam com novos desafios para apresentar de forma ponderada à sociedade situações ou contextos que a ameaçam. A CETESB desenvolveu um forte potencial para o monitoramento, análise e regulamentações sobre o componente bio-físico de risco, porém, falta-lhe o conhecimento de seu componente antrópico para desenvolver ferramentas, métodos e leis melhor adaptados. Desta forma, estamos desenvolvendo uma pesquisa que propõe testar e construir metodologias pertinentes para analisar, revelar e valorizar a experiência da população exposta ao risco a fim de contribuir com o desenvolvimento de uma cultura de risco e produzir conhecimento complementar ao que já vem sendo produzido pelas instituições responsáveis pela gestão do risco. Entendemos por

“cultura de risco” uma concepção ampla da comunicação de riscos que associa o conhecimento técnico e científico e o conhecimento da população. Esta “cultura de risco” valoriza as práticas de prevenção, precaução e vigilância que se baseiam na experiência da população exposta. A pesquisa terá como piloto as áreas contaminadas. Os resultados da pesquisa serão traduzidos em normas de ação que permitirá a elaboração de um protocolo de sensibilização-comunicação e participação que será implementado pela CETESB e poderá servir de modelo para outras instituições.

Problema: compreender a dinâmica da sociedade de risco

O desenvolvimento espetacular dos riscos ambientais nas sociedades contemporâneas foi analisado por Ulrich Beck que propôs a noção de *sociedade de risco*. Segundo Beck “a produção social de riquezas é sistematicamente relacionada com a produção social de riscos” (Beck, 2001. p. 36). Estes riscos contemporâneos do qual Beck enfatiza a seriedade não são apenas aqueles vindos de fora da sociedade (desastres naturais) mas os que são gerados pela própria sociedade visto que a ciência e a tecnologia não cessam de produzir efeitos inesperados. Tornamo-nos “mestres e possuidores da natureza”, como previa Descartes, mas o produto desse controle, a tecno-natureza profundamente hibridizada, estas misturas inextricáveis de elementos naturais e sociais, proliferam e são difíceis de controlar: por exemplo, o caso de Chernobyl, as mudanças climáticas, entre outros. Estas análises transformam profundamente a concepção de riscos bem como a diferença entre os riscos naturais e tecnológicos está desaparecendo em favor da categoria de riscos ambientais. Os riscos emergentes surgem de inovações técnico-científicas e de mudanças sociais, sendo que a produção e socialização de riscos são feitas agora na forma de transbordamentos. Este é o efeito dominó que denota o risco multiplicador constituído pela presença, num mesmo território, de várias instituições em risco ou pela possível combinação de riscos industriais e naturais em um evento. O efeito dominó reflete o acoplamento entre os processos (Provotolo 2005). À complexidade dos riscos suscetíveis de entrar em ressonância uns com os outros em um mesmo território se soma a complexidade das funções metropolitanas e dos ecossistemas que, por sua vez, vão amplificar esses riscos. Os riscos emergentes são caracterizados por um elevado grau de complexidade, incerteza e ambiguidade (Funtowicz, Ravetz, 1992, Cothorn 1996; Renn, Stirling, Müller-Herold 2004) e tornaram-se invisíveis, imperceptíveis e difíceis de decifrar sem instrumentação científica. Desta forma, o conhecimento científico sobre a avaliação de risco e a sua implementação são incompletas e parciais, apontando que a resolução de problemas não pode ser realizada unicamente pelo governo ou pela competência exclusiva dos especialistas, mas requer uma outra maneira de entender a avaliação como um processo institucional, plural e participativo para identificar e prevenir os impactos dos riscos emergentes tanto na sociedade como no ambiente. Em outras palavras, os riscos emergentes, assim como outros problemas ambientais, exigem uma compreensão junto às populações expostas, ou seja, junto àqueles que são afetados diretamente por esses problemas e que estão diretamente interessados em sua resolução.

Questões Metodológicas: desenvolver uma cultura de risco

Diante do exposto, nosso projeto visa contribuir para o desenvolvimento de uma “cultura de risco” junto aos moradores, que possa lhes permitir melhor viver e morar em cidades expostas ao risco como São Paulo. Entendemos por “cultura de risco” uma concepção ampla da comunicação de risco que associa o conhecimento técnico e científico e o conhecimento da

população. Esta cultura de risco promove as práticas de prevenção, precaução e vigilância que se baseiam na experiência da população exposta. Propomos para o desenvolvimento de uma cultura de risco experimentar métodos para que as populações que vivem em áreas contaminadas de São Paulo 1) façam “a experiência de risco” apesar de seu caráter invisível à experiência humana e antes do evento acontecer 2) possam exercer a sua “reflexividade”, ou seja, compreender os efeitos secundários latentes e as dinâmicas de “transbordamento” as quais elas contribuem e que caracterizam a sociedade de risco. 3) vivam melhor em áreas de risco, o que pressupõe mudar a percepção em relação às áreas contaminadas tanto pela população como pelo poder público, empresas, técnicos, gestores e demais segmentos envolvidos. Assim, pressupõe compreender tais áreas não somente como zonas de risco mas como um meio de vida no qual seus habitantes estão ligados.

Métodos para desenvolver a cultura de risco

- **Criar uma ambiência de risco para sensibilizar a população exposta**

Para trabalhar com a experiência sensível dos moradores e apreender sobre suas experiências em áreas de risco, propomos nos apoiar na noção de ambiência que é tanto um instrumento para a compreensão da experiência do habitante como um possível recurso para a ação coletiva na medida em que ela traduz a riqueza dos laços que unem os habitantes a seus territórios de vida. A noção de ambiência pode também enriquecer a gestão de riscos, favorecendo a participação dos moradores através da percepção sensorial e a integração das suas preocupações nas políticas de gestão de risco.

- **Análise de controvérsias para melhor compreender os impactos dos riscos emergentes**

Propõe-se contribuir para uma melhor avaliação dos “riscos emergentes” na cidade de São Paulo, identificando seu impacto sobre o ambiente de vida das populações expostas e a percepção desses riscos emergentes, por meio da análise de controvérsias que vai se apoiar: no diagnóstico participativo envolvendo populações expostas, na coleta e interpretação de informações, na análise retrospectiva de crises anteriores que ocorreram em São Paulo. A controvérsia é uma situação problemática em que há uma superposição de incerteza científica, estratégias conflitantes das partes interessadas e uma forte mobilização social. A análise das controvérsias pode, portanto, ser utilizada como uma ferramenta metodológica para a compreensão de como se constituem novas questões públicas, nas quais os riscos emergentes são um excelente exemplo. Como a análise de controvérsias será incluída no processo participativo, ela vai permitir o exercício da reflexividade da população exposta aos riscos emergentes.

- **A estética participativa para criar e revelar o conhecimento local dos moradores**

Os métodos de estética participativa visam restaurar uma parte da experiência sensorial, estética, vivencial dos habitantes a fim de coletar os saberes locais. Para ilustrar estes métodos, propomos um exemplo aplicado em uma pesquisa realizada na bacia do Vallée du Var, localizada no território da cidade de Nice, no sul da França.

“Cartes de Gullive” e experiências com inundações

A oficina de fotografia aérea é um dispositivo de pesquisa participativa do tipo “*Cartes de Gullive*” que permite recolher a fala dos moradores em diferentes condições de inquérito clássico por questionário. Ela se baseia em uma grande fotografia aérea plastificada, de 8 metros por 3 (reprodução a grande escala 1/3000) que é colocada ao ar livre. Os participantes são convidados a colocar os post-it (ou desenhar com giz indicações) na foto aérea para

expressar suas reações e seus comentários. Algumas questões são colocadas como: Quais são os locais que eles apreciam? Quais são as transformações atuais? O rio (no caso da Bacia Vallée du Var) é perigoso? A análise das entrevistas permite muitas informações sobre a percepção das pessoas. Por exemplo, nessa oficina aplicada na Bacia do Vallée du Var foram recolhidas informações importantes sobre a memória do risco causado por uma inundação, que destacou, entre os moradores expostos, posturas de negação sobre o risco existente e posturas de vigilância, revelou uma memória ampla (que não se limita ao visual) da experiência vivida na ocasião de enchentes, capaz de restituir sua ambiência particular.

- **Seminários Participativos: empoderar os habitantes para cuidar do território contaminado**
Os seminários participativos se constituem em reais assembleias de moradores em áreas de risco pois os testemunhos recolhidos contribuem para o aumento do conhecimento sobre a história e o grau de contaminação, a poluição, a vulnerabilidade da área do ponto de vista dos habitantes, além de favorecer a expressão pública das histórias de vida em áreas de risco, das falas singulares dos moradores carregadas de emoção, esperança e sofrimento. Estes intercâmbios entre os participantes expressam a vulnerabilidade conjunta dos moradores e seus ambientes de vida. Eles refletem o fato de que um território exposto ao risco, um local contaminado, afetado, poluído, continuam a ser um ambiente de vida. Considerá-lo como um meio de vida permite uma reapropriação do lugar pelos seus habitantes e o empoderamento coletivo.

Conclusão

O conhecimento produzido pela pesquisa pretende melhorar as políticas de gestão de risco das instituições responsáveis por estas questões como a CETESB.

Este projeto de pesquisa faz parte de um programa de cooperação franco-brasileiro que tem como objetivo desenvolver conhecimento sobre “risco” complementar ao que já vem sendo produzido pelas instituições responsáveis pela gestão do risco, como a CETESB. Desta forma, o conhecimento sobre risco que propomos desenvolver neste programa está centrado na experiência da população exposta, ou seja, mais especificamente: os modos de habitar em áreas de risco; a experiência sensível das populações expostas ao risco; o impacto dos riscos emergentes nas populações expostas; a experiência vivida em situações de crise que envolvem emergência e risco. Enfim, o programa vai enfrentar o seguinte desafio científico: como articular os dois principais tipos de conhecimento sobre risco, um baseado em dados objetivos e outro sobre a experiência da população exposta?

Bibliografia

- Beck U., (2001) - La société du Risque. Sur la voie d'une autre modernité, Aubier [1^é éd. 1986].
- Cothorn, Richard C. (1996) - Handbook For Environmental Risk Decision Making. Lewis Publishers, New York.
- Funtowicz S. O. and Ravetz J. R., (1992) - Three Types of Risk Assessment and the Emergence of Post-Normal Science, in Krinsky S. and Golding D. (eds) Social Theories of Risk, Westport (CN), Praeger, p. 251-273.
- Provitolo D., (2005), Un exemple d'effets de dominos : la panique dans les catastrophes urbaines, Cybergeog: European Journal of Geography [En ligne], article 328, mis en ligne le 29 novembre 2005. URL: <http://cybergeog.revues.org/2991>

COMUNICAÇÃO DE RISCOS E JORNALISMO: CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTA RELAÇÃO A PARTIR DAS MUDANÇAS DO CLIMA

Eloisa Beling Loose

Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná.

Bolsista CAPES - proc. n° 99999.003712/2014-01

eloisa.loose@gmail.com

RESUMO

O objetivo do trabalho é evidenciar o papel do jornalismo no âmbito da comunicação de riscos, a partir dos riscos decorrentes das mudanças climáticas. Além de uma discussão teórica, o artigo evidencia a forma como o jornal *Gazeta do Povo*, impresso de maior circulação no estado do Paraná, Brasil, trata dos riscos climáticos durante as divulgações do 1º Relatório Brasileiro de Mudanças Climáticas e do 5º Relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês). Para tanto, realiza-se um mapeamento das notícias que articulem os riscos atrelados às alterações do clima no período já mencionado e uma análise de seus enquadramentos, com o fim de verificar de que modo este jornalismo tem retratado o assunto e, consequentemente, participado na comunicação dos riscos climáticos.

Palavras-chave: comunicação de risco; jornalismo; mudanças climáticas

Introdução

A ideia deste paper é enfatizar a relação existente entre a atividade jornalística e seu papel no âmbito da comunicação de riscos, tendo em vista seu alcance e potencial para disseminar e promover ações de enfrentamento, sejam elas de prevenção, mitigação ou adaptação. Além de uma breve discussão teórica, apresenta-se a forma como o jornalismo do impresso *Gazeta do Povo* tratou dos riscos climáticos nas divulgações do 1º Relatório Brasileiro de Mudanças Climáticas e do 5º Relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, ocorridas no segundo semestre de 2013.

Para a análise foi realizado um mapeamento das notícias que articulam - de forma explícita ou implícita - os riscos atrelados às mudanças climáticas nos períodos já citados e uma análise de seus enquadramentos. A intenção foi verificar de que modo o jornalismo da *Gazeta do Povo* tem contribuído na comunicação dos riscos climáticos, já que é o maior diário que circula em Curitiba, Paraná, e, portanto, possui grande alcance na formação de opinião da população local.

Comunicação de risco

A comunicação e o acesso à informação qualificada sobre riscos são apontados por vários especialistas como o ponto inicial necessário para que haja prevenção de riscos (Salazar Vindas, 1999). Também durante e após os desastres seu papel tem ganhado destaque para conduzir processos de reconstrução, mitigação dos danos e de governança dos riscos. Mais do que apenas transmitir informações e permitir o diálogo com diferentes sujeitos atrelados aos riscos (afetados, especialistas, poder público e demais envolvidos), o processo de comunicação atua na construção de determinadas percepções e significados que podem facilitar ou dificultar a gestão integral dos riscos. Aqui, a comunicação de risco estudada é aquela atrelada aos riscos relacionados às mudanças climáticas, sendo assim, parte da gestão e governança ambiental, de forma ampla, e climática, de forma mais específica.

A comunicação de risco pode ser entendida como “[...] o processo de troca entre a comunidade acadêmica, os profissionais das agências reguladoras, os grupos de interesse e a o público em geral, em que se considera como melhor avaliar e gerenciar os riscos” (Powell & Leiss, 2005:92). A ênfase na comunicação de riscos como “[...] importante instrumento de demorização do processo de tomada de decisão diante de um determinado risco” (UFSC, 2012:22) evidencia que esta extrapola os meios de comunicação, ainda que sua abrangência esteja, muitas vezes, diretamente relacionada a eles em razão de seu alcance social.

Serra (2009), ao tratar do tema, avalia que os *media* desempenham pelo menos três funções: 1) agendamento e enquadramento dos riscos, de modo a nos dizer sobre o que pensar e como pensar a respeito; 2) intermediação, pois os *media* relacionam os poderes instituídos aos cidadãos; e 3) legitimação da tomada de decisões, na medida em que funcionam como um fórum em que as questões relativas aos riscos são analisadas e discutidas sob diferentes óticas. Em razão disso parte-se do pressuposto que a forma pela qual os riscos são apresentados pelo jornalismo, para além de formatar uma perspectiva (evidenciando alguns aspectos e omitindo outros), permitem que os leitores possam enfrentar os riscos de formas diferentes (mais ou menos ativas).

Jornalismo “de riscos”

Mesmo que pertencente ao campo da comunicação, o jornalismo possui lógicas próprias que, nem sempre, contribuem para o cumprimento dos objetivos da comunicação de risco. As rotinas produtivas, pressionadas sempre pelo pouco tempo, assim como a busca por fatos que se encaixem nos valores-notícia e rendam audiência, tendem a dar destaque apenas quando a ameaça já se tornou desastre, tragédia. Notícias sobre prevenção, adaptação e mitigação não costumam entrar na pauta com a mesma frequência do que as situações de emergência, justamente por não terem o mesmo apelo do factual e do impacto às vidas humanas.

No entanto, mesmo sem a intenção de se envolver com a gestão dos riscos, a imprensa contribui (positiva ou negativamente) para o processo na medida em que catástrofes, desastres ou anúncios de riscos tornam-se pauta na imprensa. A visibilidade que o tema ganha na esfera pública através da cobertura jornalística e o modo com o qual o tema é abordado refletem na informação (ou desinformação) do público em relação ao fato. O envolvimento e o enfrentamento dos riscos está intimamente ligado à comunicação que se faz dos riscos (Giulio, 2010) e o jornalismo é um importante vetor na disseminação de estratégias que estabeleçam relações entre os que avaliam e aqueles que vivenciam o risco. Para que haja gestão dos riscos e também promoção da governança de baixo para cima é preciso empoderar os leitores com informações contextualizadas e formas de combater as consequências do problema que é posto.

Breve análise da divulgação de relatórios sobre Mudanças Climáticas

O 1º Relatório Brasileiro de Mudanças Climáticas, divulgado na primeira quinzena de setembro, não teve muita repercussão no jornal analisado, tendo apenas duas notícias publicadas a respeito. Já o 5º relatório do IPCC, que foi divulgado no dia 27 do mesmo mês, começou a render notícias no dia 20 e seguiu divulgando seus desdobramentos até 02 de outubro, totalizando 11 textos sobre este relatório e 13 dos dois. Onze destes são oriundos de agências de notícias nacionais e internacionais.

A análise realizada neste trabalho buscou identificar como os riscos climáticos (entendidos como as consequências do fenômeno derivados de perigo calculável ou acontecimento previsível

fruto das atividades humanas) se fazem presentes nestes momentos de divulgação científica sobre o tema mudanças climáticas. Para tanto, utiliza-se o conceito de *frame* ou enquadramento de modo a operacionalizar como os riscos são apresentados nas notícias. Adota-se o entendimento de Entman (1993), que atrela os *frames* jornalísticos diretamente aos textos e usa o verbo *to frame* para indicar a seleção de alguns aspectos da realidade percebida e fazê-los mais proeminentes em um texto, de maneira a promover definições particulares de um problema, interpretações causais, avaliações morais e/ou recomendações para o tratamento do assunto descrito.

Logo, investiga-se nos textos citados a recorrência da apresentação de tais riscos (aumento de temperatura, secas prolongadas, impactos na agricultura, etc.) e o lugar que ele ocupa na notícia (título e subtítulo, *lead* e texto), atentando que a força de seu destaque é diretamente atrelada ao lugar onde o risco é apresentado (nos títulos recebe mais destaque, no lead um pouco menos e no texto a força da saliência é menor ainda). A tabela abaixo busca sintetizar a visão geral dos riscos das notícias analisadas:

	Títulos (enquadramentos muito fortes)	Subtítulos (enquadramentos muito fortes)	Leads (enquadramentos fortes)	Restante dos textos (enquadramentos fracos)
Apresenta a palavra “risco”	Apenas um texto: “Aquecimento põe em risco até 57% das espécies de árvores”			Apenas um texto (o mesmo do título): “Duas outras pesquisas indicam o risco de danos causados pelo aquecimento [...]”
Apresenta riscos sem mencionar o termo (expõe efeitos calculáveis derivados das atividades humanas - neste caso ligado às emissões de gases de efeito estufa)	Em oito. Exemplos: “Temperatura deve subir até 6° C no Brasil até o final do século”; “IPCC: Amazônia pode perder 70% da área caso estação seca aumente”; “Cientistas concluem que planeta está ameaçado”	Em sete. Exemplos: “Concentração de CO2 na atmosfera chegou a 40% agravando o aquecimento da Terra”; “Aumento médio de 2,5° C na temperatura do país até o ano de 2100 vai alterar o regime de chuvas, causando impactos econômicos e sociais”	Em nove. Exemplos: “[...] trazendo consequências como alterações no regime de chuvas; aumento ou diminuição do volume dos rios; impactos na agricultura, pesca e setor hidrelétrico”; “A sobrevivência [...] das espécies de árvores [...] será ameaçada de extinção [...]”	Em nove. Exemplos: “Com mais CO2 e temperaturas mais altas, o derretimento de geleiras se intensifica, assim como o nível dos oceanos aumenta e a ocorrência de eventos climáticos extremos se torna mais frequente”; “A elevação da temperatura deve ser acompanhada por diversas mudanças climáticas, como ondas de calor, inundações e secas”

Assim, embora a apresentação do risco não seja explícita, percebe-se que em todas as matérias, de forma mais ou menos forte, se fazem presentes, trazendo a ideia de ameaça, de afetação, de impacto. Mesmo que a maioria das notícias tenha enquadramentos fortes e fracos (e não muito fortes), é possível afirmar que os riscos climáticos estejam sendo recorrentemente acionados na divulgação deste tipo de relatórios, ainda que os títulos e subtítulos, neste caso, tenham dado preferência à abordagem da certeza de que o homem esteja contribuindo para o aquecimento global, como frisou o último relatório do IPCC.

Conclusão

Verifica-se que no período estudado a *Gazeta do Povo* mostrou-se preocupada em salientar os riscos climáticos de modo a chamar atenção de seus leitores para a questão das mudanças climáticas. Goiricelaya (1998) afirma que é um princípio democrático o de informar a sociedade sobre os acontecimentos que colocam em risco às pessoas, seus efeitos e qual é a resposta que

está sendo tomada em relação a eles. Neste sentido, constata-se que o jornal publicou notícias sobre os relatórios atentando para alertar a população sobre possíveis consequências das mudanças do clima e o papel que a atividade antropogênica assume neste cenário.

O trabalho realizado pelos meios de comunicação e, especialmente, pelo jornalismo, que é o subcampo responsável pelos acontecimentos factuais, pela informação, tem crucial relevância na medida em que pode participar da educação do público sobre riscos e desastres, no momento de alerta, e também na discussão sobre os sistemas de resposta e prevenção aos riscos. A forma como a imprensa medeia as situações de riscos interfere na forma pela qual os cidadãos vão perceber e enfrentar tal realidade.

Nesse sentido, o jornalismo “de riscos” coloca-se como parte do processo de gerenciamento dos mesmos, informando a população das ameaças que estão postas, mas também das possibilidades que cada um tem para superá-las ou contorná-las. Estudos mostram que, embora o tema mudanças climáticas se apresente como incerto, difuso e, muitas vezes, muito maior que o indivíduo - o que prejudica seu enfrentamento -, aproximar as possíveis perdas trazidas por este fenômeno do cotidiano do leitor pode gerar outros movimentos de ação mais responsáveis (Morton *et al.*, 2011). No caso da *Gazeta do Povo*, observou-se que os riscos, ainda que presentes em todas as notícias, são apresentados de forma bastante distante, sendo necessário construir relações que interliguem o aspecto global com a realidade local de modo a tornar tais riscos mais perceptíveis à população.

Bibliografia

- Entman, Robert. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43 (4): p.51-8.
- Giulio, Gabriela Marques di; Figueiredo, Bernardino; Costa Ferreira, Lúcia da; Araújo dos Santos, José Ângelo Sebastião. (2010). Comunicação e Governança de Riscos: a experiência brasileira em áreas contaminadas por chumbo. *Ambiente & Sociedade*, v. XIII, n. 2, Campinas- SP, p. 283-297.
- Goiricelaya, Ernesto. (1998). *Desastres y medios de comunicación* (El caso de Biescas. Agosto de 1996). Gallarta: Emergencia 112.
- Powell, Douglas; Leiss, William. (2005). Um diagnóstico das falhas de Comunicação sobre Riscos. In: Massarani, Luisa; Turney, Jon; Castro Moreira, Ildeu de. (orgs). *Terra Incógnita - a interface entre ciência e público*. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, p.183-201.
- Salazar Vindas, Sandra. (1999). *Guía para la comunicación social y la prevención de desastres: “La prevención de desastres comienza con la información”* (Taller regional sobre comunicación social y prevención de desastres América Latina) / Sandra Salazar Vindas (org.) - 1a. ed. - San José, C.R.: Secretaría DIRDN, unidad para América Latina y el Caribe. Disponível em: <<http://helid.digicollection.org/en/d/Jops02/2.1.html>>. Acesso em: 05 maio 2014.
- Serra, Paulo. (2009). *A mediatização dos riscos: o caso dos riscos ambientais*. Disponível em: < <http://www.bocc.ubi.pt/pag/bocc-serra-mediatizacao.pdf>>. Acesso em 28 de julho de 2014.
- Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). (2012). *Promoção da cultura de riscos de desastres: relatório final* / Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres. - Florianópolis: CEPED.

RISK COMMUNICATION AT UNIVERSITY CAMPUS

Angela Santos

Centre for Geographical Studies, Institute of Geography and Spatial Planning,
Universidade de Lisboa, Portugal.
angela.santos@campus.ul.pt

Margarida Queirós

Centre for Geographical Studies, Institute of Geography and Spatial Planning,
Universidade de Lisboa, Portugal.
margaridav@campus.ul.pt

ABSTRACT

The aim of this paper is to report the preliminary results of an experiment conducted at Faculty of Letters of Lisbon University (FLUL), from May to July 2014, on risk perception, with a 20% users' sample. Mental maps and spatial awareness in a hypothetical earthquake and fire were the source of the research. Preliminary results show that the FLUL users are young, mostly students that are familiar with the building for less than 4 years. They know what to do if a fire occurs, however further educational activities should be provided regarding earthquake's safety because they do not know what to do if an earthquake occurs. In general the users are not aware of any safety equipment (fire-extinguishers, exit signs and emergency doors), do not know where the meeting point is located and as well the location of their workplace. For these reasons more effective ways of communicating the risk should be attempted.

Keywords: Natural hazards, mental maps, human behavior, public buildings, emergency equipment.

Introduction

The authors have analyzed the safety condition at the Faculty of Letters of Lisbon University (FLUL) and found several traps that could be a barrier to a quick emergency evacuation (Santos and Queirós, 2015). For that reason a pilot-evacuation exercise was conducted on March 21, 2012, where a restricted group of users participated. This was the first time that this kind of activity was carried out at the Lisbon University campus. After the exercise was finished, they answered a questionnaire. The main conclusions of that study showed that in spite of the initial traps, the FLUL building is very well provided with emergency equipment (fire extinguishers, hoses, exit signs, emergency doors and emergency buttons). Still, the participants of the evacuation exercise were not aware of it. Furthermore, some of the participants evacuated running instead of walking, which showed that more safety education and evacuation exercises are needed. Therefore, a more elaborated questionnaire was conducted at FLUL, on risk perception, with a 20% users' sample. The objective of this study is to present and discuss the preliminary results of this questionnaire.

Methodology

The study is focused on mental maps and spatial awareness in a hypothetical earthquake and fire. The questionnaire was elaborated to 20% of the FLUL population (students, researchers, professors and staff) as presented in Table I. The questionnaire consisted on a total of 22 questions regarding personal information, safety issues, and indicating the safety equipment on the plants of each floor. Furthermore, the survey was conducted between May and July, 2014 on several hours of the day, on the floors zero, one and two of the building.

Table I: The FLUL population and the analyzed sample in this study.

Population	Total number	Analyzed sample of 20 %
Under-graduated students	2805	561
Master students	601	120
PhD students	331	66
Post-Graduation students	26	5
Researchers	15	3
Professors	241	48
Staff	140	28
Total	4159	832

Results

A total of 832 questionnaires were analyzed. The questionnaire had a total of 22 questions however in this study only the preliminary results of 14 questions will be presented and discussed. The preliminary results are shown in Table II. Most of the participants are women (484), representing 58.2 %. The FLUL users are in general young people, with less than 30 years old (question two), which represents 84.3 % of the population. Most of the users are at FLUL for more than 1 year (634, or 76.2 %). At the moment of the questionnaire (question four), 33.1 % of the participants said they were on the ground floor (275).

Table II: Results of the questionnaire.

Questions	Answers	%
1. Sex		
Females	484	58.2
Males	337	40.5
NA	11	1.3
2. Age		
20 or less	199	23.9
21 - 30	502	60.3
31-40	62	7.5
41-50	30	3.6
51 or more	32	3.8
NA	7	0.8
3. How long have you been at FLUL?		
Less than 1 year	189	22.7
1 - 2 years	159	19.1
2 - 3 years	145	17.4
3 - 4 years	106	12.7
More than 4 years	224	26.9
NA	9	1.1
4. Indication of the present floor.		
3rd Floor	5	0.6
2nd Floor	180	21.6
1st Floor	239	28.7
Ground Floor	275	33.1
Basement	108	13.0
NA	25	3.0
5. Have you ever felt unsafe at the FLUL?		
No	674	81.0
Yes	155	18.6
NA	3	0.4
6. What should you do in case of a fire (2 steps)?		
3 steps	54	6.5
2 steps	530	63.7
1 step	230	27.6
NA	18	2.2
7. What should you do in case of an earthquake (2 steps)?		
3 steps	23	2.8
2 steps	399	48.0
1 step	377	45.3
NA	33	4.0
8. Indication of your position on the plant.		
Correct	608	73.1
Incorrect	130	15.6
NA	94	11.3

Questions	Answers	%
9. Indication of fire-extinguishers on the plant.		
0	492	59.1
1	195	23.4
2	94	11.3
3	35	4.2
4	9	1.1
5	1	0.1
6	1	0.1
Several	5	0.6
10. Indication of exit signs on the plant.		
0	575	69.1
1	183	22.0
2	36	4.3
3	22	2.6
4	6	0.7
5	1	0.1
Several	9	1.1
11. Indication of emergency doors on the plant.		
0	447	53.7
1	241	29.0
2	69	8.3
3	40	4.8
4	15	1.8
5	3	0.8
6	8	1.0
7	1	0.1
Several	8	1.0
12. Indication of emergency buttons on the plant.		
0	796	95.7
1	25	3.0
2	4	0.5
3	1	0.1
4	1	0.1
Several	5	0.6
13. Indication of the meeting point on the plant.		
Outside the building	203	24.4
Inside of the building	132	15.9
NA	497	59.8
14. Indication of the work place on the plant.		
Correct	272	32.7
Incorrect	35	4.2
Other floors	223	26.8
NA	302	36.3

However, five (0.6 %) said they were on the 2nd floor, which does not exist, and 25 participants (3.0 %) were not able to identify in which floor they were. 81.0 % of the participants said they have never felt unsafe at the FLUL building (question five). Although in question six only two steps were asked about safety procedures if a fire would occur, 54 participants (6.5 %) remembered three steps. However, 18 participants (2.2%) did not know what to do to protect them in a fire, while the majority of 63.7 % were able to remember two procedures. In question seven, two procedures were asked if an earthquake would occur and 23 participants (2.8 %) remembered three steps, but 33 (4.0 %) did not know what to do, and 48 % were able to remember 2 procedures. Most of the users, 608 that correspond to 73.1 %, were able to correctly point out where they were on the floor, but 94 participants (11.3 %) did not know where they were (question 8). The large majority of the users are not aware of any safety equipment (questions 9, 10, 11 and 12), since 59.1 % (492 participants) did not see any fire-extinguisher, 69.1 % (575 participants) did not see any exit sign, 53.7 % (447 participants) did not see any emergency doors, and 95.7 % (796 participants) did not see any emergency buttons. Regarding the meeting point (question 13) the majority of participants do not know about it (59.8 %, or 497), and 132 users (15.9 %) think it is located inside the building. Finally, only 272 participants (32.7 %) were able to correctly point out their work place on the plant (question 14).

Conclusion

In this study 832 questionnaires were analyzed, that correspond to 20 % of the FLUL users (students, researchers, professors and staff). The survey was conducted from May to July, 2014. Although the questionnaire had a total of 22 questions, in this study only preliminary results of 14 questions are presented and discussed.

The results show that the FLUL users are young, being 84 % less than 30 years old. Most of them are students (90.4 %) that are familiar with the building for more than one year (76.2 %). The participants of the survey know what to do if a fire occurs (at least theoretically) since only 2.2 % did not remember any procedure, while more than 90% remember one or two procedures, and 6.5 % remembered three procedures. However further educational activities should be provided regarding earthquake' safety because although 96 % of the participants remembered what to do if an earthquake occurs, most of those actions are wrong (not shown in the text). In addition, the fact that 73 % of the users were able to indicate where they were, and only 33 % could point out where their workplace is shows that the spatial knowledge of the FLUL is quite poor and therefore, educational activities to improve this situation should be carried out.

In general the users are not aware of any safety equipment (fire-extinguishers, exit signs and emergency doors) since 59 % did not see any fire-extinguisher, 69 % did not see any exit sign, 54 % did not see any emergency door, and 96 % did not see any emergency button. Also, 60 % of the users do not know where the meeting point is located, and 16 % think it is located indoors. For these reasons more effective ways of communicating the risk should be attempted, and the evacuation exercise conducted in 2012 should be repeated to all FLUL users.

Acknowledgements

This research was supported by the TsuRiMa Project - TSUnami RiSk MAnagement for spatial planning and civil protection (PTDC/CSGEO/118992/2010), funded by the Foundation of Science and Technology (FCT), Portugal.

Bibliography

Santos, A.; Queirós, M. (2015) - Public buildings safety: addressing a pilot evacuation exercise, *Safety and Reliability: Methodology and Applications* - Nowakowski et al. (Eds) Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-02681-0, p. 2009-2015, Available at http://riskam.ul.pt/images/pdf/santos_queiros_2015.pdf.

RISCO AMBIENTAL E VULNERABILIDADE: DISCUSSÃO CONCEITUAL A PARTIR DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO EM BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS/BRASIL

Carla Juscélia de Oliveira Souza

Departamento de Geociências, Curso de Geografia.
Universidade Federal de São João del-Rei/MG, Brasil
carlaju@ufsj.edu.br

RESUMO

A escola, tempo e espaço para educação básica de criança e jovem brasileiros, move-se em direção à construção de sujeitos cidadãos. O movimento compreende ações diversas, entre elas o ensino e aprendizagem de conteúdos significativos organizados em disciplinas escolares. Atentos a esses princípios, trabalhos de conclusão de curso (TCC) e propostas didático-pedagógicas que considerem a temática “Áreas de risco socioambiental” têm sido desenvolvidos no âmbito acadêmico, a partir de realidades locais e de escolas públicas de Belo Horizonte. Este texto apresenta e discute o tipo de abordagem e os conteúdos referentes a riscos presentes em três trabalhos de TCC. Nessa discussão foram considerados os conceitos vulnerabilidade, perigo e risco, importantes na literatura referente a Riscos. Cada um dos trabalhos analisados contemplou a questão “Risco” de maneira direta ou indireta em pesquisas que consideraram abordagem do tema pelas perspectivas da percepção ambiental, da concepção de riscos e dos saberes escolar. Nas áreas onde os três estudos foram realizados existe o risco de inundação no entorno das escolas e na vila Bacuraus. Na discussão foram valorizados a importância e o papel social da geografia escolar. A análise e discussão desses trabalhos mostraram possibilidades didático-pedagógicas com assuntos que podem ser desdobrados do tema, mas, também, a necessidade de mais leituras e fundamentação teórica sobre o tema risco.

Palavras-chave: Risco, Escola e Geografia.

Introdução

O trabalho compreende a análise conceitual dos termos área de risco ambiental e vulnerabilidade presentes em três Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), na área da Geografia, realizados no período de 2010 a 2011, em universidade de Belo Horizonte. Os TCC's abordaram os assuntos “Saberes de geografia física no cotidiano da escola; Concepção de risco socioambiental entre alunos do ensino médio e Percepção ambiental da população da vila Bacuraus”. O objetivo, de retomar os referidos trabalhos, foi o de verificar a concepção dada aos termos risco ambiental e vulnerabilidade nos trabalhos. Em eventos diversos da Geografia, verifica-se aplicação genérica e às vezes inadequada do uso dos termos riscos ambiental e vulnerabilidade em diversos trabalhos acadêmicos. Portanto, tem-se esse fato como uma das hipóteses a ser verificada.

Os trabalhos selecionados foram desenvolvidos com sujeitos da Escola Estadual Conceição Martins de Jesus (Trabalho 1) e da Escola Municipal Secretário Humberto Almeida (Trabalho 2) e, ainda, com moradores da Vila Bacuraus (Trabalho 3), na cidade de Belo Horizonte. Para a análise dos conceitos risco ambiental e vulnerabilidade presentes no referidos trabalhos adotou-se a metodologia da análise do conteúdo, com leituras direcionadas, a fim de: i) Intear do conteúdo geral dos trabalhos de TCC; ii) Verificar a presença ou não da discussão dos termos risco, vulnerabilidade, e a concepção apresentada pelos sujeitos da pesquisa; iii) Identificar o tipo de abordagem, se percepção, concepção e ou representação sobre o assunto, pelos sujeitos. Durante as leituras, aproveitou-se para identificar expressões, exemplos e citações

que pudessem ser resgatadas durante a análise dos conteúdos qualitativos. Durante as discussões dos dados qualitativos e da análise dos trabalhos outros conceitos foram considerados, como perigo, cidadania, saberes e paisagem, considerados importantes na abordagem referente à tríade Riscos, Educação e Ensino de geografia, conforme discutido por Souza (2013).

O trabalho um (1) abordou a concepção de risco ambiental entre alunos do ensino médio, especificamente alunos do terceiro ano, em 2010. O objetivo foi o de investigar qual era a concepção de risco ambiental existente entre alunos, utilizando para essa investigação o recurso didático maquete (Figuras 1 e 2).

Figura 1 e 2: Maquete hipotética e representação de área de risco do grupo 2.

Fonte: GUIMARÃES E PEREIRA, 2010.

O trabalho dois (2) contemplou o assunto “Saberes de geografia física no cotidiano da escola e potencial de risco no contexto escolar” e foi realizado com professor de geografia e alunos do 9º ano, da Escola Municipal Secretário Humberto Almeida, em 2011 (Figura 3). O estudo do meio da área do entorno dessa escola possibilita discussões in loco a respeito de dinâmica fluvial, crescimento urbano, uso e ocupação do terreno, perigos, vulnerabilidade dos sujeitos e edificações e dos riscos ambientais.

Figura 3: Ambiente no entorno da escola

Fonte: SANTOS et. al (2011)

O trabalho três (3), referente à Percepção ambiental da população da vila Bacuraus teve como objetivo verificar a percepção sobre riscos ambientais dos moradores e a relação que eles têm com o lugar onde moram (Figura 4). A vila foi revitalizada em 2005, o córrego retificado e novas residências construídas para a população ribeirinha. A população preferiu ficar no local e ocupar as novas edificações.

Figura 4a (1999)

Figura 4b (2011)

Figuras 4a e b: Vila bacuraus antes e depois da revitalização.

Fonte: FARA e QUINTÃO, 2011.

Discussão dos termos risco e vulnerabilidade nos trabalhos

Os trabalhos um (1) e três (3) contemplaram a questão “Risco” de maneira direta ao fazerem perguntas e abordagens sobre o assunto aos seus entrevistados. Em ambos, a ideia de risco refere-se à questão da combinação da presença humana próximo a canais de drenagem e, ou ocupando encostas. Nota-se uma concepção limitada do termo Risco. Sobre a concepção de risco ambiental, os autores mostraram que o grupo (1), alunos mais velhos (32 a 40 anos), fundamenta tal concepção na definição de degradação ambiental ocasionada pela ação humana, conforme é mostrado nas citações seguintes: “[...] a exploração inadequada do solo e a degradação da natureza”; “[...] o risco ambiental e mau utilização do solo que vem causando vários tipos de erosão” e “[...] falta de coleta de lixo seletiva, pois alguns tipos de lixos contaminam o solo”. Essas falas referem-se à ideia de degradação ambiental e suas causas e não exatamente à ideia de risco, qual seja a da exposição humana a perigos de ordem natural, combinados com os sociais e tecnológicos que possam desencadear risco de perda de vidas e/ou bens materiais. Já os alunos mais jovens, grupo 2, com idade entre 18 e 20 anos, relacionaram o risco ambiental a fenômenos naturais e a situações induzidas pelo homem, as quais causam efeitos negativos sobre o próprio homem (Figuras 1 e 2), como cortes e ocupação de terrenos íngremes.

Nas respostas dos sujeitos do grupo 2, constata-se que a ideia de risco ambiental refere-se aos riscos de deslizamento e inundações, para maioria dos entrevistados. E, de acordo com esses sujeitos (100%), a vulnerabilidade se dá devido à localização dos sujeitos na área considerada de risco, conforme se observam nas frases elaboradas pelos sujeitos entrevistados: [...] “para pessoas que moram próximo ao rio por causa das enchentes”; [...] “inundação de água nas casas que estão em áreas de risco”; [...] “a estrada também porque se um carro estiver passando e estiver chovendo e cai um pedaço de terra a pessoa está correndo risco” e [...] a “construções em locais onde há deslizamentos e casas próximas ao rio e perto de estrada de rodagem”.

A noção de risco ambiental, que considera a perspectiva social de apropriação do espaço pela sociedade, a interação dos efeitos dessa apropriação e a dinâmica dos fenômenos naturais revelam a complexidade existente na ideia de riscos ambientais, apesar de geralmente ser simplificada nos estudos observados. Nota-se a falta de clareza entre termos como risco, perigo, vulnerabilidade, áreas de riscos, mas o senso comum. A ideia de vulnerabilidade como sendo a da exposição geográfica do alvo ao perigo foi a única presente na discussão dos trabalhos (1) e (3). O trabalho dois (2), apesar de não ter como foco a questão de área de risco, quando aborda os conteúdos de geografia física na escola básica e os saberes do professor, revela dentro da questão ambiental a ser explorado pela geografia escolar, as condições da dinâmica fluvial e a existência de áreas de risco no entorno escola. Esse risco se deve à interação dos aspectos, alvo, perigo e vulnerabilidade, como colocado por Veyret (2013). A vulnerabilidade, indicada nesse caso, relaciona-se à localização geográfica dos alvos, assim como apontado, também, pelos sujeitos das pesquisas um (1) e (3).

Em todos os trabalhos nota-se que a ideia de vulnerabilidade apoia-se principalmente como exposição direta do alvo ao perigo local, como encostas íngremes e inundações dos cursos d'água, o que leva ao risco de perdas humanas e materiais. Essa ideia corresponde a uma das possibilidades de se entender o conceito de vulnerabilidade, o qual é amplo e variado, portanto complexa. Para Dauphiné (2001) *apud* Veyret (2013, p.393), vulnerabilidade “exprime o grau das consequências previsíveis geradas por um fenômeno natural e que podem afetar o alvo”. Nota-se nas definições que vulnerabilidade compreende a análise estimativa dos danos potenciais que podem afetar o alvo e não somente a exposição geográfica do alvo. Na análise são levados em consideração outros aspectos como ausência ou não de infraestrutura, condições estruturais das edificações, a capacidade de resposta institucional, condições socioeconômicas da população alvo (VEYRET, 2013) e à própria representação e percepção de risco por parte dos sujeitos e o conhecimento sobre o assunto.

Conclusão

A análise e discussão de trabalhos elaborados como TCC mostraram que existem interesses de graduandos pela discussão da temática “riscos ambientais” pela perspectiva geográfica, tanto no âmbito do estudo de caso, como aconteceu com o trabalho na Vila Bacuraus, quanto no âmbito da geografia escolar. Neste âmbito, os conteúdos presentes na temática mostraram possibilidades didático-pedagógicas, como o estudo de área do entorno da escola, por meio do método estudo meio, de visita orientada, ou de pesquisa e trabalhos com fotografias e imagens de satélites disponíveis na internet, como as do *Google*, entre outras. Além disso, o levantamento e análise do conteúdo e da temática trouxeram à tona, durante diálogos sobre riscos e educação no interior deste trabalho, a importância e a necessidade de se considerar a temática “riscos ambientais” no contexto escolar, principalmente pelos caminhos da geografia. De acordo com Veyret (2013) uma verdadeira educação sobre os riscos é capaz de reduzir a vulnerabilidade. As análises possibilitaram, também, constatar que os autores dos TCC's ao optarem trabalhar com o tema “riscos” e “risco ambiental” realizaram breves leituras gerais sobre o referido tema, atentando-se para definições e alguns autores conhecidos, não constituindo uma revisão bibliográfica sobre o assunto. A iniciativa para se trabalhar de maneira aplicada tal tema a estudo de caso e ou a propostas escolares é bem vinda e deve ser estimulada. Mas, são necessárias mais leituras sobre o tema “riscos” com abordagem conceitual. Essas leituras e discussões no âmbito acadêmico ainda são recentes e limitadas a alguns cursos de graduação

em Geografia, no Brasil. Acredita-se que a iniciativa de eventos como o III Congresso Internacional, I Simpósio Ibero-americano, II Encontro Luso Brasileiro de riscos contribua para que mais leituras e discussões sobre a temática riscos sejam ampliadas e aprofundadas.

Bibliografia

- DAUPHINÉ, André. **Risques et catastrophes: observer, spatialiser, comprendre, gérer**. Paris: Armand Colin, coll. 2001.
- FARAH, Aline M. e QUINTÃO, Renata C. **Um estudo sobre a percepção ambiental da população da região da Vila Bacuraus**. Belo Horizonte: UNIBH, (Trabalho de conclusão de curso. Geografia), 16p, dez. 2011.
- FERNANDES, Bruno de Jesus; ROCHA, Geraldo César. **Educação sobre riscos ambientais: uma proposta metodológica**. Virtú (UFJF), v. 4, p. 01-15, 2007.
- GUIMARÃES, Lucas V. e PEREIRA, Luciana M. **Levantamento da concepção de risco ambiental entre alunos de geografia do ensino médio por meio do uso de maquete**. Belo Horizonte: UNIBH (Trabalho de conclusão de curso. Curso de Geografia), 20p, dez. 2010.
- SANTOS, Bruno F. dos; Rocha, Charles O. e SANTOS, Varlei B. dos. **Saberes da Geografia física no cotidiano da escola**. Belo Horizonte: UNIBH (Trabalho de conclusão de curso. Geografia), 20p, jun. 2010.
- SOUZA, Carla J. O. “Área de risco socioambiental nas cidades: prática educativa na formação docente e na geografia escolar”. In: VI Congresso Ibérico de Didática de Geografia. **Anais... VI Congresso Ibérico de Didática de Geografia**. Porto, Portugal, p.563-575, mar.2013.
- VEYRET, Yvette. **Os riscos - o homem como agressor e vítima do meio ambiente**. São Paulo: Contexto, 2013.

LEVANTAMENTO DA CONCEPÇÃO DE RISCO AMBIENTAL E ÁREAS DE RISCO NA ESCOLA BÁSICA EM SÃO JOÃO DEL REI - BRASIL: RESULTADO PRELIMINAR

André Barbosa Ribeiro Ferreira

Departamento de Geografia, Universidade Federal de São João del Rei/MG, Brasil
andreribeirogeo@gmail.com

Larissa Trindade Tarôco

Departamento de Geografia, Universidade Federal de São João del Rei/MG, Brasil
larissa_taroco1994@hotmail.com

Carla Juscélia de Oliveira Souza

Departamento de Geociências, Curso de Geografia
Universidade Federal de São João del-Rei/MG, Brasil
carlaju@ufsj.edu.br

RESUMO

Os desastres ambientais ocorrem em todo mundo com frequência, devido à combinação de fatores naturais e à intensificação e ação antrópica. Diante disso, surgiu o interesse por investigar a maneira como o tema é discutido na disciplina de Geografia, em duas escolas públicas de São João del-Rei, por meio de um projeto piloto, no âmbito de pesquisa de iniciação científica em andamento. Esse objetivou efetuar diagnóstico sobre o conhecimento e a concepção de risco ambiental e área de risco presentes entre alunos, além de investigar como o assunto é trabalhado pelos professores de Geografia. O levantamento e diagnóstico serão feitos através da coleta de informações por meio de questionário semiestruturado e, também pela observação em sala de aula durante a discussão do assunto. As bases teóricas que fundamentam a pesquisa encontram-se no contexto da Geografia e da Psicologia, referentes à noção de representação, percepção e de “Riscos”. A fase atual do trabalho compreende leituras, contato com os sujeitos das escolas e início da coleta de dados nas escolas. Durante a coleta, ainda sem a análise das respostas escritas, foi possível constatar entre as falas dos alunos a ideia de que em situação de inundações das casas o que tem há fazer é esperar a água abaixar, como acontece sempre quando há inundações na cidade. Os resultados finais estão previstos para novembro de 2014. A partir deles, espera-se propor atividades e ações com intuito de alertar, orientar e educar a população escolar para os riscos ambientais.

Palavras-Chave: Concepção; Risco Ambiental; Educação Geográfica.

Introdução

Atualmente destaca-se uma grande preocupação com os riscos ambientais. Estes, conforme Zanirato et. al. (2008), até a década de 1980 eram objeto de estudo unicamente da geografia física, enquanto as atividades de riscos sociais eram objeto da geografia humana, até que movimentos franceses geraram a unificação da problemática dos riscos, alegando que os mesmos possuem envolvem características humanas e físicas, sendo socialmente construído e psicologicamente orientado. Os riscos não constituem em si um novo campo de estudo ou disciplina especificamente geográfica e sim um tema de abordagem global que integra ciências como a geologia, meteorologia, química, física, sociologia e outras (VEYRET, 2007). No entanto, a geografia, por ser uma área de estudo ampla, multidisciplinar, físico e social, ocupa um lugar evidente nesse meio da problemática do risco, ela se interessa pela percepção, gestão e dimensão espacial dos riscos. A percepção do risco ocorre na escala do indivíduo e deve ser considerada no coletivo da população, para fins de conhecimentos que possam contribuir para a formação dessa população ou da comunidade, inclusive a escolar. A escola, como instituição socialmente reconhecida como espaço e tempo para a educação formal, deve contribuir para

com essa percepção, consciência e leitura do mundo, a partir de problematizações sobre situações cotidianas (SOUZA, 2013). A educação é uma forma de intervenção no mundo e o educando precisa se conscientizar de que ele é um agente transformador do mundo, capaz de refletir criticamente sobre seu papel nos processos sociais, transcendendo para a ideia de que ele pode promover profundas transformações em si e no mundo em que vive.

No Brasil existem os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's), documento auxiliar nas orientações de temas e conteúdos por área de conhecimento, como Meio Ambiente. Neste e nos conteúdos de Geografia existe a indicação para se trabalhar com o tema riscos ambientais. A escola e a Geografia escolar tem abordado esse conteúdo? Ao término do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, qual a concepção e percepção que os alunos apresentam sobre esse risco ambiental? Essas questões, combinadas com a importância do assunto e a possibilidade de contribuição da escola e da Geografia, motivaram a realização da pesquisa sobre concepção de riscos ambientais, entre alunos e professores do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Pio XII e do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Milton Campos, como projeto piloto. Um dos objetivos é verificar se a concepção de área de risco ambiental, entre os jovens, se encaixa nas perspectivas “da Submissão, do Combate ou da Interação e Entendimento”, como discutidas por Nunes (2009). A seleção dessas escolas deve-se ao fato de que o bairro está localizado, em sua maior parte, em áreas consideradas como de risco, estando susceptíveis a alagamentos, inundações e desmoronamentos. São João del-Rei possui 88.469 habitantes, sendo 79.857 residentes em área urbana. Desse total, 20.153 habitantes residem no bairro Matozinhos (IBGE, 2010), o qual é o maior bairro da cidade. O referido bairro apresenta topografia predominantemente plana, cortada por vários canais fluviais, como o córrego da Água limpa, Córrego do Lenheiro e o Rio das Mortes. Segundo Passarelli (2012), no ano de 1917 já havia relatos jornalísticos sobre a “pavorosa enchente de segunda feira”, que causou enormes estragos no local, arrastando pontes e casas. A última grande enchente ocorreu no ano de 2012 e deixou cerca de 800 residências alagadas e 300 famílias desalojadas.

Procedimento metodológico

Com base nos pressupostos teóricos e conceituais citados neste texto, a pesquisa está sendo realizada em três etapas inter-relacionadas: leituras e pesquisas sobre a área de estudo, trabalho de campo e gabinete. Para as etapas têm-se os procedimentos técnico-operacionais como: i) revisão bibliográfica, para o entendimento de representação, conhecimento e definição de espaço e lugar, com objetivo de se entender as inter-relações existentes entre esses e o homem; ii) trabalhos de campo, para localização das áreas de risco no bairro Matozinhos; levantamento do número de alunos matriculados no 9º ano do Fundamental II e no 3º ano do Ensino Médio, registros fotográficos e pesquisa na Defesa Civil e Prefeitura Municipal; iii) elaboração do questionário semiestruturado; iv) coleta de dados primários entre os sujeitos da pesquisa v) tabulação, sistematização, representação gráfica, análise e interpretação dos dados.

Breve revisão sobre o tema

De acordo com Kuhnen (2009) a percepção dos riscos ambientais atrela-se a estudos da psicologia social e psicologia ambiental, levando em conta que a situação perigosa se converte em desastre devido ao comportamento dos sujeitos e sua compreensão do lugar, da sua experiência não nítida, do seu apego ao território e apropriação do espaço sem efetuar a pausa para o

conhecimento. Tal pausa faz do espaço desconhecido um lugar (TUAN, 1983), mas a ausência da percepção leva o indivíduo a se instalar e reinstalar em zonas de risco. Nesse sentido surge à influência do trabalho exercido pela psicologia social e ambiental, intervindo em uma sociedade que não avalia os riscos. A percepção de risco não é um mero estímulo físico objetivo, ele é uma construção social subjetiva e multidimensional já que se trata de juízos, atribuições, memória, emoção, motivação, categorização sobre o risco ou as distintas fontes de risco tecnológicas, ambientais ou sociais.

Risco, segundo Zanirato (2008), é qualquer coisa que possua um potencial de transformação prejudicial para os indivíduos que ocupam determinado espaço. O risco passa a existir quando as transformações ocorrem em ritmo acelerado, ultrapassando o potencial de tolerância do meio e iniciando uma situação que conduz a catástrofes. Ele representa a percepção de um possível perigo previsível pela experiência própria ou indireta de determinado indivíduo ou grupo social (ZANIRATO, 2008). Para Dagnino (2007), o risco se apresenta em situações ou áreas em que existe a probabilidade, susceptibilidade, vulnerabilidade, acaso ou azar de ocorrer algum tipo de ameaça, perigo, problema, impacto ou desastre. De acordo com Veyret (2007), o risco pode ser definido como um conhecimento e uma percepção da ameaça comum a um determinado grupo social. O risco surge a partir do momento em que um grupo integra perigo e sua estimativa depende da maneira de integração e percepção da sociedade em relação à ocorrência de uma crise ou catástrofe. Sendo assim o risco é inscrito em dado contexto social, econômico e cultural, apresentando uma grande dose de subjetividade que se traduz em diferentes limites de aceitabilidade. Segundo Moraes (1998), os riscos ambientais integram um dos complexos aspectos de interação entre homem e natureza e decorrem da estreita interação do homem com o meio. Portanto os riscos não são naturais por si só, eles resultam da interação da natureza, sociedade e indivíduo.

Segundo Veyret (2007), os riscos naturais são pressentidos, percebidos e suportados por um grupo social ou um indivíduo sujeito a ação possível de um processo físico, enquanto o risco ambiental é uma associação deste com os processos agravados pela atividade humana e pela ocupação do território. A expansão da ocupação humana, seguida de instalações materiais tem aumentado continuamente os espaços ou áreas de riscos. Essas áreas são consideradas como são impróprias para o assentamento humano devido a sua instabilidade e fragilidade, são susceptíveis a ocorrência de fenômenos naturais ou induzidos que geram consequências sociais, econômicas e ambientais (SALES, 2010).

Resultados parciais

Até setembro de 2014 foram realizadas leituras para a fundamentação teórica, trabalhos de campo e visita às escolas. Os trabalhos de campo foram divididos em duas partes. Durante a primeira, as áreas, susceptíveis a alagamentos, foram identificadas por meio de visita in loco, nas proximidades do Rio das Mortes e do Córrego Água Limpa. Na segunda, as áreas de risco de deslizamentos foram levantadas e registradas por meio de fotografias. As leituras, as imagens e registros coletados em campo (Foto 1 e Foto 2) colaboraram para entendimento do sistema local e contribuíram para elaboração dos questionários e entrevistas. Os questionários apresentam questões referentes ao conhecimento que os discentes possuem sobre área de risco e como o assunto é retratado pelo professor de Geografia. Os questionários aplicados aos professores avaliarão suas práticas de ensino referentes ao tema e confirmarão ou não, através de comparações, a compatibilidade de respostas entre discentes e docentes.

Fotos 1 e 2: Vista parcial da várzea do Rio das Mortes; Lote em aterro e contenção.
Fonte: Acervo dos autores, 2014.

O número de alunos do 9º ano corresponde a 52 (2 turmas) e do 3º ano do Ensino Médio à 105 (3 turmas). Desse total, 94% responderam o questionário, o qual ainda não foi analisado, em função do prazo extinto para envio do presente texto ao congresso. Apesar disso, durante a coleta, ainda sem a análise das respostas escritas, foi possível constatar entre as falas dos alunos a ideia de que em situação de inundações das casas o que se tem a fazer é esperar a água abaixar, como acontece sempre que ocorrem inundações na cidade.

Conclusão

Na região do bairro Matozinhos existem vários trechos susceptíveis a inundações e deslizamentos, durante a estação chuvosa em São João del-Rei. Nesses trechos existe ocupação por residência, galpões e pastagens. Os alunos das duas escolas residem próximos a esses trechos e, portanto, conhecem “de perto” a alteração da paisagem durante as cheias dos rios. Os resultados finais estão previstos para novembro de 2014. A partir deles, espera-se propor atividades e ações com intuito de alertar, orientar e educar a população escolar para os riscos ambientais.

Bibliografia

- DAGNINO, R; JUNIOR, S (2007). Risco Ambiental: Conceitos e Aplicações. Climatologia e Estudos da Paisagem Rio Claro - Vol.2 - n.2, p. 50.
- IBGE (2014) - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. IBGE Cidades - São João del-Rei. Disponível em: <<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=316250&search=minas-gerais|sao-joao-del-rei>>.
- KUHNEN, A (2009). Meio Ambiente e vulnerabilidade - a percepção ambiental de risco e o comportamento humano. Geografia (Londrina) v. 18, n. 2, 2009 <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia>.
- NUNES, Luci Hildago (2009). Compreensões e ações frente aos padrões espaciais e temporais de riscos e desastres. Territorium, v. 16, p. 181-189.
- MORAES, D (1998). A percepção do Meio Ambiente: Contribuições ao estudo dos Riscos Ambientais. Revista Humanitas, v.2, nº2. Campinas.
- PASSARELLI, U (s.d); Matosinhos, Histórias e Festas - Pontes de Matosinhos. 2012. Disponível em: < <http://festadodivinosjdr.blogspot.com.br/2012/12/pontes-de-matosinhos.html>>. Acesso em: jun.2014.

- SALES, L.F.P (2010). Ocupações em Áreas de Risco. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina. Acesso em: jul.2014. Disponível em: < <http://www.crea-sc.org.br/portal/index.php?cmd=artigos-detalle&id=894#.VACdqWNAd1w>>.
- SOUZA, C.J.O (2013); Riscos, geografia e educação. Riscos naturais antrópicos e mistos; Universidade de Coimbra, Departamento de Geografia. Disponível em: < http://www.uc.pt/fluc/depgeo/Publicacoes/livro_homenagem_FRebello/127_142>. Acesso em: set.2014.
- TUAN, Y (1983). Espaço e lugar, a perspectiva da experiência. Tradução de Livia de Oliveira, São Paulo.
- VEYRET, Y(2007). Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente. São Paulo: Contexto.
- ZANIRATO, S. et.al.(2008) Sentido do Risco: Interpretações teóricas. Universidade de Barcelona, Revista Bibliográfica de Geografia e Ciências Sociais. Vol. XIII.

EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA E RISCOS SOCIOAMBIENTAIS: EXPERIÊNCIAS EM ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Carla Juscélia de Oliveira Souza

Departamento de Geociências, Curso de Geografia,
Universidade Federal de São João del-Rei/MG, Brasil
carlaju@ufsj.edu.br

RESUMO

O tema riscos socioambientais no ensino de geografia possibilita analisar e interpretar a espacialidade e a dinâmica de fenômenos sociais e naturais que podem levar à geração do Risco. O entendimento da noção de risco, do contexto geográfico e dos fenômenos possibilita discussões que promovam atitudes e ações individuais e/ou coletivas de prevenção, quando necessárias. Apesar desse fato, são poucas as discussões na educação geográfica para a construção de conceitos e de educação para a prevenção de desastres. Portanto, este trabalho retoma experiências vivenciadas em atividades de extensão com crianças e jovens da educação básica, de Belo Horizonte e São João del-Rei, entre 2004 e 2014, a partir das quais almeja discutir algumas possibilidades de trabalho com o referido tema na educação. Os projetos iniciais não tinham o Risco como foco, apesar de abordarem a interação fenômenos naturais, paisagem e sociedade. A partir de 2009, a ideia de fenômenos naturais, desastres e risco socioambiental ganhou destaque entre os projetos. Mais de 350 pessoas participaram diretamente das atividades, entre alunos, professores e graduandos. Os temas discutidos foram espaço geográfico, bacia hidrográfica, fenômenos naturais e cultura, natureza, perigos e riscos. As atividades compreenderam confecção de maquetes, modelos em argila e discussões a respeito de áreas de risco socioambiental, no espaço de vivência. O tema risco e desastres despertou e desperta sempre interesse entre as crianças e jovens. Isso é um aspecto importante a ser aproveitado.

Palavras-chave: Educação geográfica, Extensão, Riscos socioambientais.

Introdução

O entendimento da noção de risco, do contexto geográfico (social, econômico e político) e dos fenômenos possibilita discussões que promovam atitudes e ações individuais e/ou coletivas de prevenção. Essas discussões devem e podem ser trazidas para o âmbito do ensino de geografia e da extensão universitária. Portanto, este trabalho objetiva apresentar trabalhos já realizados, seus resultados e os trabalhos em andamento em 2014, inseridos no projeto de extensão da Universidade Federal de São João del-Rei (2014) e do Centro Universitário de Belo Horizonte/ UNIBH (2004 - 2009), atentos à Educação geográfica para os riscos.

Há mais de 10 anos, a preocupação em estabelecer diálogos entre sujeitos da universidade e da comunidade faz parte das atividades de extensão, ensino e pesquisa desenvolvidas pela autora deste trabalho, com escolas públicas da educação básica de Belo Horizonte e de São João del-Rei, Minas Gerais. Em todas as atividades a confecção de maquetes temáticas foi o meio para envolver, motivar, levantar saberes, construir conceitos e discutir assuntos sobre a realidade e o espaço de vivência de diferentes sujeitos e comunidades. Os projetos iniciais não tinham o Risco como foco, apesar de abordarem a interação fenômenos naturais, paisagem e sociedade. A partir de 2009, a ideia de fenômenos naturais, desastres e risco socioambiental ganhou destaque entre os projetos.

Para este texto, consideraram-se três projetos: a) Projeto “Aprender a Aprender, Pensar e Fazer - Representar e Problematicar”; b) Projeto “Ler e ver os conteúdos geográficos” e c) Projeto “Fenômenos naturais e paisagem: relação entre sociedade, natureza e riscos”. Para o período 2014/2015, estão sendo desenvolvidos em São João del-Rei os projetos “Representação do

espaço urbano em maquete” e “Representação de áreas de risco socioambiental em maquete: proposta didático-pedagógica”.

Os riscos não estão circunscritos a uma dimensão da realidade, mas exprimem toda a complexidade da sociedade contemporânea em seus diferentes embates e natureza (MARANDOLA E HOGAN, 2004). Se existem os riscos, significa que há presença de algum perigo em processo e de vulnerabilidade humana a esse perigo, que pode ser de ordem natural e, ou social. O perigo é entendido como condição ou fenômeno com potencial de ameaçar a vida humana, a saúde, a propriedade ou os elementos da natureza, trazendo consequências desagradáveis (FERNANDES E ROCHA, 2007).

Com base nessas ideias e termos, cabe à escola, por meio da educação formal, contribuir com a percepção e leitura do mundo considerando a questão dos riscos e perigos, a partir de problematizações sobre situações cotidianas. À Geografia cabem diversas contribuições, entre elas: problematizar a espacialidade das ocorrências de áreas de riscos socioambientais, os motivos da maior ou menor vulnerabilidade das pessoas aos perigos e, ainda, é questionar a situação do próprio espaço de vivência, quanto à infraestrutura, saneamento, transporte, saúde, emprego, lazer e tantos outros aspectos (SOUZA e OLIVEIRA, 2012).

Materiais e metodologia

Em todos os projetos citados a metodologia compreendeu a confecção de maquetes, acompanhadas de atividades que objetivaram: realizar a sondagem do conhecimento prévio e do saber local; problematizar sobre o fato ou fenômeno representado e socializar ideias e produções coletivas. Os trabalhos fundamentaram-se no princípio da Prática Educativa e dos conteúdos Conceituais, Procedimentais e Atitudinais discutidos por Zabala (1998) e em educação geográfica, à luz de autores como Callai (2009) e Cavalcanti (2008).

Resultados e discussões

Projeto “Aprender a aprender, pensar e fazer - representar e problematizar”.

Os trabalhos foram realizados em 2004/2006 com crianças e jovens da Comunidade Havaí, em Belo Horizonte. Essa extensão desenvolveu trabalhos com os temas “Abrigo natural e relevo Carste”; “Caminho das águas superficiais” e “Representação da minha bacia hidrográfica”. Aqui é apresentado o resultado desse último tema, a qual atendeu 41 pessoas, sendo crianças (10 a 12 anos) e adolescentes (13 a 15anos), em três dias de atividades para cada grupo (Fotos 1 e 2).

Foto 1: Montagem da base da maquete
Fonte: Acervo pessoal, 2005.

Foto 2: Pintura da maquete hidrográfica
Fonte: Acervo pessoal, 2005.

As atividades levavam em consideração o conhecimento de cada sujeito, a transposição do bi para o tridimensional durante a confecção da maquete e a resolução de um desafio: “Em uma bacia hidrográfica, qual o local mais indicado para se instalar a indústria de tecido?”. O resultado foi a construção da noção de processos e sistemas, bem como a discussão sobre o risco de contaminação humana pelos rejeitos químicos da indústria quando essa se encontra instalada a montante dos moradores da bacia e não apresenta medidas de tratamento de seus rejeitos. Nas discussões em sala foi possível considerar os fatores que levaram os moradores a se instalarem na área de risco. De acordo com participantes a experiência significou contato com práticas pedagógicas interessantes, vivência e aprendizagem com diferentes sujeitos e a possibilidade de se discutir a educação não formal. Para os jovens da comunidade ficou o sentimento positivo de aprender mais sobre o ambiente, sobre a água, sobre sua bacia hidrográfica, no espaço universitário, abrindo-lhe a expectativa e o desejo de retornar como graduando, no futuro.

Projeto “Ler e ver os conteúdos geográficos”

O projeto utilizou a mesma metodologia do anterior. Esse teve início em 2006 e estendeu até 2008 com os alunos da Escola Estadual Dr. Simon Tamm, em Belo Horizonte. Nesse período, 100 alunos, 4 professores e 7 graduandos foram envolvidos. O projeto compreendeu atividades e temáticas organizadas em módulos de aprendizagem intitulados: Onde estamos?; Modelando elementos do ambiente; Espaço Geográfico; Oficina: Pluviômetro e Oficina de Maquete. Os conceitos como natureza, meio ambiente, espaço geográfico, risco socioambiental e ciclo hidrológico foram abordados durante as oficinas. Para isso, os alunos modelaram, em argila, elementos do meio ambiente, os quais foram aproveitados na montagem de suas maquetes referentes ao espaço geográfico (Fotos 3 e 4), com destaque para a distribuição desses elementos e a existência ou não de áreas de riscos, como vulcanismo, enchentes ou terremotos.

Foto 3: Meu espaço geográfico
Fonte: Acervo pessoal, 2007.

Foto 4: Meu espaço geográfico
Fonte: Acervo pessoal, 2007.

A experiência vivenciada revelou a possibilidade de se aprender enquanto se “brinca sério”, quando existem atividades, combinados, respeito, conhecimento, liberdade de expressão, convívio coletivo, trabalho em grupo, conteúdo, responsabilidade, conflitos, direitos e deveres sociais e individuais.

Projeto “Fenômenos naturais e paisagem: relação sociedade, natureza e risco”.

Esse projeto compreendeu experiências entre 2008 e 2009 nos laboratórios de Geomorfologia e de Práticas Educativas. Estas objetivaram trabalhar a percepção das crianças a respeito dos conceitos paisagem e fenômenos naturais. Então, aproveitou-se para problematizar sobre os fenômenos naturais e os riscos naturais. Na época foram atendidas 50 crianças, com idade de 6 a 9 anos, as quais ficaram atentas, e participativas, durante seguintes os questionamentos: “Existem fenômenos naturais onde vocês moram? Eles são parecidos com esses mostrados ou são outros?” “Qual a diferença entre furacão e tornado?”; “O que sai do vulcão?”; “O furacão destrói tudo!”, “Aqui não tem terremoto?” Outras questões foram feitas sobre paisagem: Como são as paisagens que vocês conhecem? Os homens modificam a paisagem? Como o homem modifica a paisagem? Essas questões foram trabalhadas em desenhos, modelagem e por meio de observação de maquetes (Foto 5). O explorar as maquetes promoveu algumas colocações por parte das crianças, como: “Morar perto do vulcão é perigoso”. A maquete que mais se destacou foi a do vulcão do Monte Fuji - Japão, com as construções próximas à sua base. Esse arranjo espacial chamou a atenção das crianças, as quais fizeram a seguinte colocação: “Se esse vulcão sair lava vai queimar todas essas casas e pessoas”. A partir de suas observações aproveitou-se para falar sobre o sistema de monitoramento que existe nessa região e em outras onde existem pessoas convivendo com fenômenos como o vulcanismo. As crianças puderam fazer a própria representação de fenômenos naturais e paisagem (foto 6).

Foto 5: Observação do interior do vulcão

Fonte: Acervo pessoal, 2009.

Foto 6: Representação de vulcão.

Fonte: Acervo pessoal, 2009.

Projetos “Representação do espaço urbano em maquete” e “Representação de áreas de risco socioambiental em maquete: proposta didático-pedagógica para alunos do ensino fundamental II”

O projeto pretende atender mais de 100 alunos da escola Estadual Governado Milton Campos e envolverá professores e bolsistas. São objetivos desses projetos: construir duas maquetes geográficas, contendo áreas de inundações e deslizamento em espaço urbano; realizar atividades que incluam a observação e a investigação das áreas de risco ambiental no entorno da escola e levantar a percepção e concepção dos alunos, do ensino fundamental II, sobre áreas de risco ambiental, como pesquisa/extensão. Os resultados auxiliarão novas ações e práticas educativas em prol da Educação para o risco, como já acontece em vários países do mundo.

Conclusão

A maquete mostrou-se eficiente para motivar, despertar a curiosidade e possibilitar construção de conceitos e diálogos entre os sujeitos. A temática “ambiental e risco” foi sempre bem vinda e despertou interesse e satisfação entre as pessoas ao falarem e aprenderem a respeito. Os temas risco e desastre despertaram e despertam o interesse entre as crianças e jovens. Isso é um aspecto importante a ser aproveitado. Mais de 350 pessoas participaram diretamente das atividades entre alunos, professores e graduandos.

Bibliografia

- CALLAI, Helena C. Aprendendo a ler o mundo: a geografia nos anos iniciais do ensino fundamental. **Caderno. Cedes**, Campinas, vol. 25, n. 66, p. 227-247, maio/ago. 2005.
<<http://www.cedes.unicamp.br>> Acesso em: 20 mar. 2014.
- CAVALCANTI, Lana. de S. **A geografia escolar e a cidade**. Ensaio sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidiana. Campinas: Papirus, 2008.
- FERNANDES, Bruno. de J. e ROCHA, Geraldo C. - Educação sobre riscos ambientais: uma proposta metodológica. *Virtú* (UFJF), v. 4, pp. 01-15. 2007.
- MARANDOLA JUNIOR, Eduardo e HOGAN, Daniel J. Natural hazards: o estudo geográfico dos riscos e perigos. **Ambiente & Sociedade**, Campinas, v. 7, n. 2, pp. 95-110. 2004. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/asoc/v7n2/24689.pdf>>. Acesso em: 25 mai. 2013.
- SOUZA, Carla J. de O. e OLIVEIRA, Janete R. Representação de áreas de risco socioambiental: geomorfologia e ensino. **Revista Territorium**. Coimbra, n.18; pp. 175-184, 2012.
- ZABALA, Antoni **A prática educativa: como ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 1998.

IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO DO RISCO EM DESTINOS TURÍSTICOS COM PERIGOSIDADE NATURAL ELEVADA: O CASO DA ILHA DA MADEIRA

Daniel Márcio F. Neves

Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra
daniel.nevespc@gmail.com

José Luís Zêzere

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa
zezere@campus.ul.pt

RESUMO

Considerando que a vulnerabilidade no turismo é um facto incontornável, e que os turistas costumam observar e privilegiar os destinos que evidenciam medidas e ações viradas para a sua segurança e bem-estar, torna-se relevante comunicar riscos e medidas de autoproteção adequadas às características físicas dos territórios, bem como às atividades turísticas desenvolvidas.

A ocorrência de fenómenos naturais com efeitos catastróficos nos últimos anos, em destinos turísticos como a Ilha da Madeira, tem contribuído para uma mudança de paradigma ao nível do conhecimento sobre os riscos em áreas turísticas, assistindo-se à adoção de políticas abertas e transparentes em alguns destinos turísticos, a fim de melhorar a imagem, reputação e confiança dos mercados. Contudo, verifica-se que a grande dificuldade reside na forma de comunicar o risco - informação útil sobre situações de risco para que o turista se sinta protegido e ao mesmo tempo seja protagonista da sua própria segurança, - o que por vezes leva à omissão dos riscos, por preconceitos relacionados com o alarmismo e impactos negativos para a imagem do destino turístico.

Neste contexto, os locais na Ilha da Madeira normalmente procurados pelos turistas para obtenção de informações e/ou orientações (ex. Postos de Turismo), bem como os colaboradores ligados ao sector do turismo e hotelaria, devem estar habilitados e munidos de informações sobre possíveis riscos e lugares críticos (pontos que carecem de atenção redobrada no domínio da segurança por parte dos turistas), bem como ao nível da divulgação de comportamentos e medidas de autoproteção a adotar. Adicionalmente, a organização de campanhas direcionadas para consciencialização da população criará condições favoráveis para a implementação de estratégias de comunicação e gestão de situações de risco.

Palavras-chave: Comunicação do Risco; Segurança; Autoproteção; Destino Turístico; Imagem.

Introdução

Nas últimas décadas assistimos a grandes mudanças na mentalidade, hábitos e valores da sociedade, e estas alterações fizeram com que o mundo passasse a ser visto pelas pessoas de modo diferente.

Fruto destas mudanças, o turismo tem vindo progressivamente a desenvolver-se, produzindo um crescente impacto na sociedade e na economia globais e, particularmente, nos estados e regiões arquipelágicas que sempre exerceram sobre as populações continentais uma forte atracção. De entre os fatores que determinam a escolha dos destinos turísticos, a segurança desempenha um papel determinante.

Em termos de segurança, os destinos turísticos são escolhidos em função quer dos índices de criminalidade, quer do risco de ocorrência de desastres naturais, tecnológicos ou sociais, isto é, quanto maior e mais conhecidos forem os casos de incidência de manifestações de risco, menos boa será a imagem e menor será a procura dos destinos por parte de turistas. Mesmo

sabendo que, na maior parte das vezes, a ocorrência de desastres naturais ou tecnológicos acontece quando e onde menos se espera, a existência e, sobretudo, a consciência por parte dos visitantes de uma cultura e de condições materiais de segurança é fundamental na criação da imagem turística de um destino. É muito importante que o Ser Humano, antes de mais nada, se sinta seguro e tranquilo no destino que escolheu. A sua percepção de segurança poderá ser reforçada através de acções preventivas e de pro-actividade por parte do sistema de protecção civil e das entidades que concorrem para garantir um eficiente sistema de segurança e protecção ao nível local.

Saliente-se que nas diversas modalidades de viagem, desde o seu início até ao retorno ao local de origem, os turistas estão sujeitos a riscos que, se ignorados, podem causar pequenos contratempos, graves complicações ou até mesmo, em casos extremos, levar à morte. Apesar disso, é natural que as pessoas prefiram dar ênfase apenas ao prazer e ao exotismo da viagem e da experiência. Se as agências tendem a valorizar os destinos com apelos promocionais, os turistas procuram um “refúgio” do quotidiano e encontrar o lugar idealizado, mas seguro e sem perigos.

Comunicar um destino turístico, promove-lo e levar o consumidor a deslocar-se até ele é uma tarefa árdua e que envolve acções de comunicação específicas. Ter como ponto de partida a avaliação das vantagens competitivas que o destino apresenta e que podem criar valor para o consumidor, poderá ser uma fonte de inspiração para a promoção do destino. Estas especialidades da comunicação, são aquelas que melhor podem explicar ao turista o valor que pode ser construído e contribuir para que aqueles que têm percepções de segurança mais elevadas, revelem intenções mais fortes de recomendar o destino e de regressar, na lógica de que para o promotor, é mais difícil adquirir um cliente novo do que manter os clientes actuais.

A Percepção e a Avaliação de Riscos no Turismo

Nos territórios insulares, como o caso concreto da Ilha da Madeira, cujas dimensões são determinadas pelas necessidades da sua gestão, a sua variação dos riscos ocorre a diferentes níveis, tais como: Área; Geomorfologia; Hidrologia; Biodiversidade; Ordenamento do território; Sistemas administrativos, culturais e socioeconómicos. As características geográficas e a quantidade de recursos disponíveis na Ilha da Madeira, como sabemos, é bastante apetecível, o que explica, em grande parte, a forte pressão turística e urbanística a que tem sido sujeita. No entanto, não podemos esquecer que constitui um recurso insubstituível, finito e não renovável a escala humana.

A ilha da Madeira é dotada de grande dinâmica, onde o mar e a terra interagem constantemente. Não admira, por isso, que seja alvo de processos complexos, muitos dos quais são, ainda, mal conhecidos. A atuação destes processos confere uma dinâmica muito intensa, da qual resulta a sua constante mutabilidade. Estas complexidades e variabilidades, inerentes aos sistemas naturais presentes, estão na origem das suas grandes potencialidades mas, simultaneamente, tornam-na num território de perigosidade natural elevada e de difícil gestão, dada a relativa facilidade com que os fatores de risco se alteram.

Neste domínio, a comunicação dos riscos reveste-se de vital importância para que os turistas expostos a riscos estejam conscientes desse facto. Impõe-se, portanto, que o risco a que estão sujeitos lhes seja comunicado, que saibam interpretar os sinais, que se possam autoproteger, adotando posturas adequadas que possam optar por aquele destino e/ou atividade conscientemente. Perante isto, surgem algumas questões pertinentes, nomeadamente:

- Será que os turistas, estão conscientes da vulnerabilidade a que estão sujeitos?
- Será que conhecem o tipo de riscos que poderão ter de enfrentar?
- Será que sabem o que esta na origem desses riscos?
- Será que reconhecem as causas das situações de risco?
- Optariam por visitar determinados sítios se as tivessem alertado a priori?
- Quem serão ou quem deverão ser as entidades com competência na comunicação do risco?
- Como procederiam ou como deveriam proceder a tal tarefa?
- Qual o timing certo para o fazer?

Estas questões consubstanciam-se no argumento central que é o de que na atualidade a comunicação de riscos é imprescindível, e uma exigência, dada a panóplia de riscos naturais e tecnológicos com que lidamos e a quantidade e diversidade de informação a que temos acesso, embora nem sempre muito clara. (Santos, 2008). A presente comunicação é elaborada no âmbito da Tese de Doutoramento Intitulada “A Influência da Segurança na Imagem e Escolha dos Destinos Turísticos: Segurança e Gestão do Risco na Ilha da Madeira”, ao Programa Doutoral em Ciências do Risco - Território Risco e Políticas Públicas promovido pelas Universidade de Coimbra, Lisboa e Aveiro, a qual aborda de uma forma geral, a segurança e gestão do risco no turismo.

Saliente-se que no desenvolvimento do estudo supramencionado pretende-se dar a conhecer a atitude dos turistas que visitam a Ilha da Madeira perante situações de risco, a forma como e efetuada a comunicação do risco e tenta averiguar quem são as entidades com competência para o fazer.

Segundo Flynn e Slovic (2000), “o risco é um ajuizar da exposição potencial no perigo, sob uma série de circunstâncias, que podem ser definidas e caracterizadas com vários níveis de pormenor”. Neste contexto, o risco esta presente em todas as atividades, ou seja, tudo o que o Ser Humano faz comporta perigo mas só se tem noção dele quando algo corre mal. No entanto, esta percepção não é efetuada do mesmo modo por todas as pessoas. Um especialista não vê o risco na mesma perspetiva de um leigo, isto é, de uma pessoa não especialista. Convém esclarecer que por percepção do risco se entende a forma como os não especialistas pensam sobre o risco e refere-se à avaliação subjetiva do grau de ameaça potencial de um determinado acontecimento ou atividade” (Lima, 2005), ou seja, a forma como o público se apercebe do risco e das suas possíveis consequências.

Riscos Inerentes ao Turismo na Ilha da Madeira

Como referimos, na Ilha da Madeira, as situações mais críticas estão associadas à desorientação e perda de indivíduos de um determinado grupo. Muitas vezes o afastamento do grupo, mesmo que por poucos instantes, em terrenos desconhecidos, difíceis e com condições meteorológicas adversas, por exemplo com má visibilidade, podem levar a incidentes ou mesmo a acidentes de alguma gravidade. Quando analisamos os factores que mais contribuem para este tipo de situações saltam logo à vista as características climáticas da ilha, com particular evidência para a ocorrência frequente de nevoeiros em altitude (Fig.1), bem como a existência de muitos topoclímas determinados pela influência do relevo. As pessoas desorientadas podem facilmente ser vítimas de cansaço e de hipotermia, podendo, em casos extremos, acontecer mesmo a morte. Os factores naturais que mais facilitam a desorientação são: terreno bastante acidentado e, em certas zonas, com vegetação densa diminuindo a visibilidade; paisagem monótona em alguns sectores, criando dificuldades em estabelecer pontos de referência; existência de uma

extensa área sem vias de comunicação, não obstante, a boa sinalização e informação sobre os percursos (Neves, et al., 2010).

Figura 1 - Fatores desencadeantes de Acidentes nos Percursos Pedestres (Nevoeiro)

Existem, também, nas áreas em estudo, factores naturais que propiciam a ocorrência de quedas. A paisagem é marcada pelo acidentado do relevo em que as vertentes são, habitualmente, juncadas de cascalheiras e blocos de diferentes dimensões. Assim, especialmente fora dos caminhos e trilhos marcados, o terreno é bastante irregular, declivoso e juncado de pedras soltas. A ocorrência de chuva e o aumento de humidade junto aos cursos de água tornam os fragmentos de rocha ainda mais escorregadios. A visibilidade reduzida resultante das condições atmosféricas ou da ausência de luz solar bem como a realização de caminhadas em trilhos bastante irregulares, facilita, também a ocorrência de quedas, que ocorrem com frequência, também, quando da realização de actividades de aventura. O acesso a pontos de água para lazer (Fig. 2) faz-se, em muitas áreas, pelo meio da vegetação, em locais bastante acidentados e de piso irregular, o que concorre para o mesmo efeito (Neves, et al., 2010).

Figura 2 - Sinalização de Condições Perigosas

Para os turistas que visitam a Ilha da Madeira, a grande questão que se coloca é a de que o descanso e o lazer tão esperados podem transformar-se, subitamente, em situações de dor e angústia, se a segurança não for, de facto, incorporada em todos os pormenores da viagem. Muitas vezes são, se não ocultados, pelo menos pouco divulgados, para não prejudicar a imagem do destino turístico Madeira. No entanto, esta estratégia, a longo prazo, acaba por ser pouco útil, na medida em que dificulta o estudo e implementação de medidas para evitar e socorrer casos de novos acidentes.

Os profissionais do turismo têm por obrigação fornecer aos turistas uma informação realista e objectiva sobre os destinos, as condições de viagem, de acolhimento e de estada. Devem também assegurar a transparência perfeita das cláusulas dos contratos propostos aos clientes, quer em matéria da natureza, preço e qualidade dos serviços que se comprometem fornecer, quer das contrapartidas financeiras que lhes incumbem em caso de ruptura unilateral, por sua parte, dos referidos contratos. Nestes contratos as questões de segurança devem ser claramente inscritas, e não omitidas, como quase sempre acontece.

De acordo com os princípios do Código Mundial de Ética do Turismo, as autoridades públicas têm por missão assegurar a protecção dos turistas e dos seus bens. Devem conceder especial atenção à segurança dos turistas estrangeiros, por causa da sua particular vulnerabilidade e devem disponibilizar-lhes meios específicos de informação, de prevenção, de protecção, de seguros e de assistência. Por outro lado, os atentados, agressões, raptos ou ameaças visando os turistas e os trabalhadores da indústria turística, bem como as destruições voluntárias de instalações turísticas ou de elementos do património cultural ou natural, devem ser severamente condenadas e reprimidas em conformidade com as respectivas legislações nacionais.

Como exercício final, considerando os impactes resultantes dos 2 grandes desastres que ocorreram na Ilha da Madeira em 2010 (Aluvião de 20 Fevereiro e os incêndios florestais com início a 13 de Agosto), as questões de segurança mostram-se absolutamente fundamentais para a consolidação dos destinos e dos produtos turísticos. Saliente-se que estes eventos potenciaram uma discussão político-social em torno do risco, nomeadamente no que diz respeito à vulnerabilidade do sector do turismo, pelo facto de a segurança constituir uma variável incontornável nesta actividade e ser hoje preponderante a escolha do destino também em função da imagem de segurança a nível físico, psicológico e material que este oferece (Neves, et al., 2010).

De acordo com Lima (2006), a comunicação de riscos é essencial para informar ou para promover a adoção de medidas de autoprotecção, devendo ser feita de forma a envolver o público no processo, ou seja: deve incluir as suas preocupações; indicar o que há a fazer; apontar as áreas de incerteza.

Figura 3 - Fatores Contingências da Aceitabilidade do Risco no Turismo

A comunicação eficiente de riscos deve incluir o fornecimento da informação sobre esses riscos de modo a permitir, aos indivíduos, tomar decisões ou alterar comportamentos que reduzam a sua exposição a esses riscos e, consequentemente, atenuar os danos sociais (Fig. 3), no geral (Alaszewski, 2005). Segundo Hampel (2006), a comunicação de risco tem as seguintes funções:

- Educação e sensibilização;
- Formação sobre o risco e indução de mudança de comportamento (para ajudar as pessoas a lidarem com os riscos);
- Confiança nas instituições que fazem a avaliação e a gestão do risco;
- Envolvimento em situações relacionadas com o risco e resolução de conflitos;

Considerações Finais

O risco existente para os turistas é impossível de eliminar em absoluto, uma vez que ele é inerente às actividades praticadas. No entanto, este risco pode ser fortemente mitigado através de um conjunto de iniciativas para sensibilizar e incentivar medidas de auto protecção. É importante que os operadores turísticos responsáveis por estas actividades melhorem as condições de segurança dos produtos que oferecem. Outro aspecto fundamental passa pela regulação da actividade, por exemplo com a criação de uma linha de apoio aos utentes em que seja possível dar e receber informações sobre os percursos e actividades a realizar.

Referências Bibliográficas

- ALASZEWSKI, A. (2005): Risk communication: identifying the importance of social context in Health, Risk and Society, Vol. 7, no 2, pp. 101-105;
- BECK, U. (1992) - Risk society. Towards a new modernity, Sage, London.
- BENSON, C. et al. (2001): NGO Initiatives in risk reduction in Disaster, vol.2;
- CUNHA, Lúcio; CRAVIDÃO, Fernanda Delgado (1998) - "Notas para uma geografia dos desportos radicais em Portugal". Inforgeo.
- CURBET, J. (2005), Turismo y Seguridad: una relación de amor-odio, Seguridad Sostenible, [on line], Edición 25, Disponível em: www.iigov.org/ss/article.
- DAKE, K. (1992): Myths of Nature: Culture and the Social Construction of Risk in Social Issues, vol.48, no4;
- GURABARDHI, Z.; GUTTELING, J. M. e KUTTSCHEUTER, M. (2004): The development of risk communication - an empirical analysis of the literature in the field in Science Communication, Vol. 25, no 44, pp. 323-349;
- GRUNEWALD, L. (2001), Seguridad: Manual de Pautas de Seguridad para el Residente y el Visitante de un Destino Turístico, Disponível em: <http://www.paph-oea-cct.com/>
- HAMPEL, J. (2006): Different concepts of risk - a challenge for risk communication in International Journal of Medical Microbiology (in press);
- KASPERSON, R. E. (1992): The social amplification of risk: progress in developing an integrative framework in Krinsky, S. e Golding, D. (Editores), Social Theories of Risk, CT, Praeger, pp. 153-178;
- NEVES, Daniel (2010) - Turismo e Riscos na Ilha da Madeira. Avaliação, percepção, estratégias de planeamento e prevenção. Diss. Mestrado em Dinâmicas Sociais e Riscos Naturais e Tecnológicos. Coimbra.
- PETTS, J. et al. (2001): Social Amplification of Risk: The Media and the Public, HSE;
- LIMA, M. L. (2005): Percepção de riscos ambientais in L. Soczka (Ed.), Contextos Humanos e Psicologia Ambiental, Fundacao Calouste Gulbenkian, Lisboa, pp. 203-245;
- RINALDI, A. (2007): A Importância da Comunicação de Risco para as Organizações, dissertação apresentada ao Centro Universitario do SENACXANDRA.pd;
- SLOVIC, P.(2001): The Risk game in Journal of Hazardous Materials, no 86, pp. 17-24;

PERCEPÇÃO DE RISCO AOS EVENTOS ATMOSFÉRICOS EM MAPUTO, MOÇAMBIQUE

Luci Hidalgo Nunes

Departamento de Geografia, Universidade Estadual de Campinas

luci@ige.unicamp.br

RESUMO

A percepção climática, em especial quanto aos riscos, foi avaliada em Maputo, por meio de 144 entrevistas conduzidas em novembro de 2009 e outubro de 2012, constando questões para caracterizar a pessoa (idade, escolaridade, gênero etc.) e perguntas abertas sobre tempo e clima, de forma a aferir conhecimentos, percepções, preferências e fontes de informação. Os resultados revelaram que muitas pessoas usam o conhecimento empírico, as vezes associando com informações provenientes da mídia, e que muitos temas acontecidos em locais remotos mas veiculados incessantemente são entendidos como influentes nos fatos atmosféricos vividos por eles. Os entrevistados entendem que Maputo apresenta grande variabilidade das condições atmosféricas e a maioria acredita estar havendo sinais de mudanças climáticas (mais calor e maior irregularidade). Muitos foram críticos com a atuação do poder público, mas vários lembram que a população também teria culpa no advento de calamidades. Os fenômenos mais citados como passíveis de engendrar transtornos foram as cheias, o que condiz com a realidade climática. Vários entrevistados afirmaram já ter passado por situações de risco, tendo sido a mais citada a cheia associada à passagem de um ciclone tropical no ano 2000. As pessoas gostam dos lugares onde vivem e acreditam que o poder público é ineficaz no gerenciamento de condições calamitosas. Não houve grandes diferenças entre as respostas de acordo com gênero, idade e grau de escolaridade.

Palavras-chave: percepção de risco, tempo, clima, questionários, Maputo.

Introdução

Desde os primórdios de sua história o ser humano observa as condições da atmosfera: os ciclos sazonais marcaram hábitos e tradições, estabelecendo forte relação entre os grupos sociais e seus meios físicos, e nas mitologias de diferentes povos são inúmeros os exemplos de divindades associadas ao tempo e ao clima. Hoje, todavia, as pessoas ficam confinadas em ambientes artificializados, não raro sendo surpreendidas pelas variações do tempo, o que atesta seus crescentes distanciamentos das condições físicas. Isso acarreta perda da identidade com o lugar de vivência, fato que se associa diretamente à produção do risco. Desse modo, em estudos de risco é fundamental saber como as situações atmosféricas são percebidas e acompanhadas pelas pessoas, pois não raro elas são vitimadas por ocorrências relacionadas à dinâmica atmosférica natural do local onde elas vivem e circulam cotidianamente. Faz-se necessário, também, aferir como os indivíduos observam os ritmos climáticos e como enxergam a si próprios e ao poder público como agentes para a diminuição das consequências negativas dos eventos climáticos que, mesmo rotineiros, afetam suas vidas.

Para Tuan (1997) a experiência simboliza a capacidade de aprender pela própria vivência; a partir dessa abordagem o autor procura apreender as atitudes e os valores do sujeito com seu meio e de que maneira ele sente e vivencia o espaço; não obstante, ainda que as condições de tempo e clima influenciem o comportamento e o estado psicológico dos indivíduos (Sartori, 2000), as percepções podem ser bem distintas devido à experiência pessoal, ao momento, à idade, à escolaridade e à condição econômica do indivíduo, o que faz com que situações iguais ou muito similares sejam sentidas diferentemente pelas pessoas.

Sob essa ótica, o foco desta pesquisa foi a avaliação da percepção das condições atmosféricas, em particular, das situações de risco, a partir de entrevistas a residentes de Maputo, Moçambique. Procurou-se aferir como as condições de tempo e clima são observadas e entendidas pela população e se os riscos associados à dinâmica atmosférica estão presentes no imaginário da população. Vale ressaltar que Maputo é rotineiramente afligida por diferentes ocorrências calamitosas, como cheias e ciclones tropicais, devido as suas características físicas, ao crescimento populacional e ao deficiente planejamento do uso da terra.

Resultados

De maneira a aferir a percepção de risco face aos fenômenos atmosféricos, foram aplicados questionários em dois momentos: na primeira fase, entre 15 e 18 de outubro de 2009 e na segunda, de 9 a 11 de novembro de 2012, em cada um totalizando 74 enquetes. As pessoas foram escolhidas ao acaso em diferentes pontos e horários do município. Foram consideradas na análise apenas os questionários respondidos por pessoas que moravam no mesmo local por ao menos 5 anos e maiores de 20 anos, que em princípio teriam conhecimento empírico das situações atmosféricas locais.

Na Tabela I constam os resultados das perguntas iniciais, caracterizadoras das amostras:

Tabela I - Resultado das questões caracterizadoras da amostra

	Gênero		Nascimento			Faixa Etária (anos)				
	Masc.	Fem.	Maputo	Outro		21-30	31-40	41-50	51-60	> 60
2009	49	25	41	33	31	20	11	8	4	
2012	37	37	59	15	31	24	13	5	1	
			Escolaridade (anos)							
	s/ estudos		1-5	6-10	11-15	superior	estudante			
2009	2	8	29	14	14	7				
2012	0	2	23	28	13	8				

Houve número maior de entrevistados mais jovens e como a escolha das pessoas foi aleatória, nota-se que esse fato reflete a característica etária do país. Somente dois entrevistados em 2009 afirmaram não ter escolaridade alguma. Nos dois momentos a maioria apresentou escolaridade média, mas diversos indivíduos disseram ter diploma superior e alguns revelaram ter ou estar cursando mestrado, aspecto surpreendente, pois os índices de alfabetização do país são baixos. As diferenças de gênero foram maiores na primeira amostragem. Nos dois momentos a maior parte dos entrevistados era nascida em Maputo.

O questionário continha perguntas abertas para estimar as percepções das pessoas quanto à variabilidade das situações atmosféricas locais, bem como as fontes de obtenção de informações sobre a previsão do tempo (mídia ou observação pessoal). As perguntas 9 e 12 somente foram respondidas no caso das anteriores (Questões 8 e 11) terem tido respostas positivas. As perguntas foram:

Q1 - O senhor (a) gosta do local onde reside?

Q2 - Qual a influência do clima em sua vida?

Q3 - Que tipo de situação atmosférica lhe traz algum incômodo?

Q4 - Em quais meses o(a) senhor (a) percebe maiores alterações do tempo?

Q5 - No seu dia a dia para saber a previsão do tempo, o(a) senhor(a) se orienta consultando meios de comunicação ou observa as situações de tempo?

Q6 - Alguém lhe ensinou a observar a natureza para prever o tempo? Quando e como o(a) senhor(a) aprendeu?

Q7 - O(a) senhor(a) acha que o tempo e o clima variam mais hoje do que no passado? Por que?

Q8 - O(a) senhor(a) já vivenciou alguma situação relativa à condições de tempo que lhe causou transtorno?

Q9 - Caso positivo, como foi e quando? Houve perdas materiais / humanas?

Q10 - Como o(a) senhor(a) avalia a atuação do poder público em relação ao evento?

Q11 - Existe alguma ação de sua coletividade com vistas a solucionar os problemas que acontecem por causa das condições de tempo e clima?

Q12 - Caso positivo, ela conta com algum tipo de participação do governo local?

As respostas foram transformadas em concordância (sim) ou discordância (não). Nessa contagem foram classificadas como “não”, além das negações claras, respostas do tipo “não sei”, “não se importa” ou quando o entrevistado não opinou. Os resultados aparecem na Tabela II:

Tabela II - Respostas, transformadas em afirmação ou negação

	2009		2012			2009		2012	
	Sim	Não	Sim	Não		Sim	Não	Sim	Não
Q1	67	7	66	66	Q7	66	8	67	7
Q2	69	5	64	39	Q8	39	35	57	17
Q3	69	5	71	22	Q9(*)	22	52	20	54
Q4	22	52	68	39	Q10	39	35	65	9
Q5	72	2	72	60	Q11	60	14	54	20
Q6	45	29	60	6	Q12(*)	6	17	8	46

Notou-se semelhança entre as respostas nos dois períodos nas questões, 1, 2, 3, 5, 7 e 9. Quanto à Q1, percebeu-se que as pessoas gostam do local onde vivem, o que poderia ter implicações positivas, no sentido de esforços pessoais e comunitários em prol da preservação dos lugares. Com poucas exceções os indivíduos reconhecem a influência do clima em suas vidas (Q2), tendo sido citados problemas de saúde, bem estar geral ou mesmo negócios. Na Q3, muitas respostas atribuíram sensação de desconforto a alguma ou a um conjunto de circunstâncias atmosféricas, especialmente calor - o mais lembrado nos dois momentos.

Em 2009 muitos entrevistados afirmaram não reconhecer um período em que haveria maior variabilidade das condições atmosféricas (Q4), mas as respostas positivas apontaram principalmente para janeiro e dezembro. Em 2012 o número de pessoas que conseguiram dar uma resposta foi bastante superior.

Quanto à Q5, com exceção de duas pessoas, os entrevistados em 2009 disseram procurar informações sobre a previsão do tempo, 66 deles tendo por fonte principal a televisão. Poucos disseram que tentam sua própria observação (alguns, em associação com outras fontes) e fatos como doença (asma) ou migração de pássaros (andorinhas) foram alegados como elementos auxiliares para tentar fazer a própria previsão do tempo. Na Q6 as respostas foram, em geral, positivas. Ainda que a família tenha sido mais citada, vários lembraram ter aprendido isso na escola.

As respostas à Q7, que visou estimar a percepção da variabilidade temporal do clima, independente de fundamentação científica, mostraram que a maior parte dos entrevistados reconhece mudanças no padrão do tempo atual em relação ao passado, especialmente maior variabilidade e calor. Muitos indivíduos deram resposta similar: antes, as estações eram mais bem caracterizadas enquanto que hoje é muito variável.

Mesmo com diferenças entre os dois períodos, como resposta à Q8 inúmeras pessoas relataram ter passado por situação de transtorno ou perigo associada a condições de tempo, sendo os fenômenos citados ciclones tropicais, cheias, ventos e granizo. Em 2000 houve dois ciclones

tropicais fortes, e eles foram lembrados por grande número de indivíduos. Entre as dificuldades causadas por esses episódios foram citados locomoção, problemas de saúde e perdas financeiras. Fenômenos mais recentes foram referidos, mas dois entrevistados - um em 2009 e um em 2012 - relataram uma ocorrência na década de 1960. Diversos indivíduos disseram ter vivência desse tipo de situação, mas não conseguiram precisar o período, enquanto outros complementaram que mesmo não tendo testemunhado eventos que os afetaram, conheciam pessoas que passaram por transtornos. Houve algumas respostas particularmente dramáticas: um entrevistado de 2009 contou ter perdido duas irmãs em uma cheia de 1983, e duas entrevistadas em 2012 contaram ter perdido amigo e familiar nas cheias de 2001.

Houve discrepância entre os dois anos para as respostas às questões 10 e 11, que tiveram por intuito aferir como as pessoas percebem a atuação do poder público a partir do advento de uma catástrofe hidrometeorológica. Alguns mencionaram os esforços do INGC (Instituto Nacional de Gestão das Calamidades), mas há descrédito ou desconhecimento das ações governamentais para minimizar os impactos. Na Q12, alguns citaram auxílio internacional da igreja e da Cruz Vermelha. Vários disseram haver ações para minimizar os impactos de condições do tempo e clima oriundas do esforço da comunidade (Q11), enfatizando a solidariedade do povo moçambicano, mas houve quem admitisse que a própria população não colabora (uma entrevistada disse que as pessoas alugam as novas moradias intermediadas pelo governo e retornam às áreas de risco). Para os que avançaram na pergunta 12, a imensa maioria afirmou que as ações da coletividade seriam espontâneas.

Conclusão

Os moradores de Maputo reconhecem a importância das situações da atmosfera e suas relações com as calamidades naturais que assolam o país e observam sinais que são interpretados como de mudanças em relação a sua própria vivência, em especial, maior variabilidade atual, o que gera sentimento de desconfiança na previsão de tempo, seja própria ou aferida em algum meio de comunicação. Muitos alegaram já ter passado por algum episódio dramático, inclusive com perdas de familiares ou amigos. Diversos procuram entender os sinais da natureza por meio de observação própria, pelas explicações de familiares ou como conteúdo formal na escola; entretanto, vários disseram não confiar muito em suas capacidades, atribuindo a isso a variabilidade atual do clima. Não houve consenso quanto ao entendimento das ações governamentais para prover ações efetivas quando ocorrem calamidades, mas alguns entrevistados disseram que muitos não agem como cidadãos e, assim, a comunidade também falha em ações proativas.

Agradecimento

Essa pesquisa foi financiada pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Brasil), Processo 308269/2009-8.

Referências

- Sartori, M. da G. De B. (2000) - *Clima e percepção*. São Paulo, FFLCH, Universidade de São Paulo, Tese (Doutorado).
- Tuan, Y.F. (1983) - *Espaço e lugar: a perspectiva da experiência*. São Paulo, DIFEL, 250p.

SEQUIAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CONSTRUCCIÓN DE DISCURSOS SOBRE RIESGOS HÍDRICOS EN ANDALUCÍA

Pilar Paneque

Departamento de Geografía, Historia y Filosofía, Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
ppansal@upo.es

Jesús Vargas

Laboratorio de Geografía, Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla
jvarmol@upo.es

RESUMEN

Cada episodio de sequía lleva aparejado un debate entre distintos actores sociales que queda reflejado en los medios de comunicación, a través de los que se intentan legitimar distintas visiones, valores y propuestas de gestión de estos riesgos hídricos. Con el objetivo de avanzar en el análisis del grado de adaptación institucional a las sequías y, en particular, del aprendizaje acumulado tras los últimos episodios vividos en Andalucía y los importantes cambios normativos y de planificación hidrológica acaecidos desde el año 2000 en el contexto europeo, en este trabajo centramos la atención en los discursos y contenidos recogidos en la prensa escrita. Con la finalidad de profundizar en el mejor conocimiento de las resistencias que puedan existir a nuevos modelos de gestión así como de la participación de actores y la identificación de temas clave en el debate, se realiza un análisis discursivo y de contenidos de medios de comunicación de Andalucía en los años hidrológicos 2004-2005 y 2011-2012, a través de la aplicación del software Atlas.ti.

Palabras clave: Andalucía, Discursos, Medios de comunicación, Riesgos hídricos, Sequías.

Introducción

La realización de análisis discursivos en torno a las sequías contribuye a la mejor comprensión de los procesos que afectan a su gestión y sobre los que se debe actuar para minimizar las afecciones generadas por estos riesgos hídricos. En particular, el análisis discursivo y de contenidos en relación con las sequías permite identificar los actores que protagonizan los debates sobre su definición y formas de gestión así como la evolución de los temas clave, que explican los avances, resistencias y conflictos ligados a los distintos episodios de sequías. Los trabajos centrados en la construcción y análisis de discursos, patrones y marcos de comunicación son bien conocidos (Hajer, 1995; Benford y Snow, 2000; Wodak y Meyer, 2003); y son muchos los autores que han defendido la especial importancia que tiene el contexto discursivo en fenómenos de aparición lenta como las sequías, que están más abiertos a distintas definiciones de problemas y soluciones (Wilkins y Patterson, 1990; Sonnett et al., 2006).

Con el objetivo de avanzar en el análisis del grado de adaptación institucional a las sequías y del aprendizaje acumulado tras los últimos episodios vividos, sin olvidar los efectos del nuevo ciclo de planificación, en este trabajo centramos el análisis en los discursos y contenidos que sobre la sequía reflejan y transmiten los medios de comunicación.

El trabajo que se ha llevado a cabo se ha centrado en el análisis del debate reflejado en los medios de comunicación regionales de Andalucía y, en particular, en la comparación de los años hidrológicos clave: 2004-2005 —el primer año del último gran episodio de sequía— y 2011-2012 —el último año en el que nos encontramos con una fuerte sequía meteorológica y en el que se teme el comienzo de otro episodio más extenso—. La fuente de información utilizada ha sido la prensa regional andaluza, extraída a través de la base de datos iConoce, cuya explotación ha dado lugar a un corpus de 460 noticias. El análisis se ha apoyado en la utilización de los

denominados CAQDAS, programas de análisis cualitativo asistido por ordenador y, en particular, en el software Atlas.ti.

Resultados: análisis de actores, de temas clave y de concurrencia.

La primera de las cuestiones analizadas se ha dirigido a saber quiénes han estado presentes en las noticias que reflejan los medios de comunicación sobre las sequías en los años hidrológicos 2004-2005 y 2011-2012. Para ello, se han codificado un total de 98 actores, agrupados en 12 familias y se realizado un análisis de frecuencia de éste código primario (Figura 1). Tanto en el año hidrológico 2004-2005 como en 2011-2012 tres familias concentran el mayor número de apariciones en las noticias relacionadas con las sequías: “organizaciones agrarias”; “gobierno central del agua”; y, “gobierno andaluz del agua”. Frente a esta concentración del discurso se observa una casi simbólica presencia de otro tipo de organizaciones, que podrían diversificar los mensajes que se transmiten a la población a través de los medios de comunicación, como es el caso de las “organizaciones ambientalistas/conservacionistas”; las “organizaciones de usuarios”, que dejan de aparecer; y las “organizaciones vecinales”.

Figura 1. Frecuencia de aparición de códigos de familia de actores (%).

Fuente: Elaboración propia.

Existen también dos familias de actores sobre las que es necesario llamar la atención: los “expertos” y el “gobierno europeo del agua”. En el caso de los “expertos” esta mayor presencia relativa en el último año hidrológico analizado se debe a las consultas realizadas a la Agencia Estatal de Meteorología para explicar la situación de sequía meteorológica que se vive, en la que no se llega a entrar. Por otra parte, el “gobierno europeo del agua” gana presencia relativa por su mayor aparición pero siempre en noticias en las que se reclaman ayudas a la Unión Europea. Se analiza también cuáles son los temas clave abordados en relación con las sequías (Figura 2). Se observa, por una parte, una serie de temas cuya presencia en los medios de comunicación se debilitan desde el año hidrológico 2004-2005 al 2011-2012, como es el caso particular de las “desaladoras”, los “seguros” y los “pozos”, o incluso desaparecen como las referencias a las “restricciones en abastecimientos”, los “Decretos de sequía” y la ya mencionada “Directiva Marco del Agua”. En este sentido, hay que tener en cuenta el hecho de que en el año 2004-2005 aún estuviera presente el recuerdo de la última gran sequía de los años noventa, se estuviera

apoyando la construcción de desaladoras y se abordaran medidas más extremas como las restricciones en los abastecimientos y la aprobación de Decretos de sequía.

Figura 2. Frecuencia de aparición de códigos temáticos (%).

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, se identifican dos temas cuyas frecuencias de aparición relativa no se modifican sustancialmente de un año hidrológico a otro y cuyos contenidos se consolidan: las referencias a la “concienciación en el consumo/ahorro” y a las “infraestructuras”, que resulta ser el tema más consolidado.

En tercer lugar, hay que llamar la atención sobre el aumento significativo de la presencia de tres temas que se refuerzan, los de “precios/tarifas” (críticas de regantes), o incluso emergen, como son los del “contexto socioeconómico” (ligados a la crisis económica) y la “planificación del agua” (coincidiendo con la aprobación de protocolos y planes).

Atlas.ti permite además realizar análisis de concurrencia a partir del cual se concluye cómo las familias de actores “organizaciones agrarias”, “gobierno central del agua” y “gobierno andaluz del agua”, que ya habíamos identificado como aquellas que concentran las mayores frecuencias de apariciones en prensa, presentan los mayores índices de concurrencia con aquellos temas que a su vez han ganado peso en el debate: aquellos ligados al contexto socioeconómico y a la planificación del agua. Es decir, estos actores son los encargados de introducir y reforzar los temas dominantes en los medios de comunicación ligados a las sequías. El protagonismo de las organizaciones agrarias es el que más se refuerza a través de intervenciones consolidadas y hegemónicas.

Por otra parte, también cabe destacar concurrencias significativas respecto al tema de infraestructuras y la familia de partidos políticos, lo que refuerza la afirmación de que las soluciones ligadas a las obras e intervenciones hidráulicas siguen muy presentes en el debate público, a pesar de los avances teóricos que suponen la puesta en marcha de los Planes de Sequía (Estrela y Vargas, 2012). Ello manifiesta que estos planes se alejan de la visión preventiva que deben definir a las sequías ya que, como afirma Brufao, básicamente gestionan las fases de

prealerta, alerta y emergencia y no, como sería deseable, la de “normalidad” e incluso la de “postsequía”, sobre las que apenas se realizan avances (2012).

Conclusiones

De forma paralela a los cambios normativos sucedidos desde el año 2000, que afectan a la gestión de las sequías, es importante también analizar la paulatina modificación de los discursos estructurados en torno a estos riesgos, que ayudan a clarificar conceptos y a realizar precisiones clave para entenderlos y afrontarlos.

El análisis cualitativo, de los discursos y contenidos, reflejados en los medios de comunicación nos permite identificar los actores que protagonizan los debates sobre su definición y formas de gestión así como la evolución de los temas clave, que explican los avances, resistencias y conflictos ligados a los episodios de sequías analizados.

De este análisis se concluye la hegemonía del discurso por parte del sector agrario, que determina en gran medida los temas que se consolidan y emergen, pero también la aparición de nuevos actores —expertos, gobierno europeo del agua y organizaciones sociales—, aun minoritarios, que diversifican los contenidos que se presentan en relación con las sequías aunque no logran repercutir en los medios de comunicación de forma significativa para así trascender a la opinión pública y colaborar a la superación de una serie de creencias y valores referidas a los usos del agua. En cuanto a los temas abordados también se observan cambios en cuanto al debilitamiento de las medidas más reactivas frente a las sequías (Decretos, restricciones), aunque se consolidan los argumentos y la presencia del tema de las infraestructuras, ligados fundamentalmente a la hegemonía discursiva del regadío andaluz. Por último, es importante señalar que los temas que emergen, ligados al contexto socioeconómico y a la planificación del agua también están dominados por las organizaciones agrarias y los gobiernos central y autonómico, reforzándose así la capitalización del discurso en torno a las sequías.

Bibliografía

- Benford, R. D. y Snow, D. A. (2000) - Framing processes and social movements: an overview and assessment. *Annual Review of Sociology*, 26. 611-639.
- Hajer, M. A. (1995) - *The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process*. Clarendon Press, Oxford.
- Sonnett, J. et al. (2006) - Drought and declining reservoirs: comparing media discourse in Arizona and New Mexico, 2002-2004. *Global Environmental Change*, 16. 95-113.
- Wilkins, L. y Patterson, P. (1990) - Risky business: covering slow-onset hazards as rapidly developing news. *Political Communication and Persuasion*, 7. 11-23.
- Wodak, R. y Meyer, M. (2003) - *Métodos de análisis crítico del discurso*. Gedisa, Barcelona.

Agradecimientos

Proyecto de Investigación del Plan Nacional I+D+i 2008-2011, Convocatoria 2011. Ministerio de Ciencia e Innovación. DIRECTIVA MARCO DEL AGUA Y RIESGOS HÍDRICOS: GESTIÓN Y MITIGACIÓN DE SEQUÍAS (GESTISEQ). CSO2011-29425 (2012-2014).

Proyecto de Investigación de Excelencia, Convocatoria 2011. Junta de Andalucía. DESARROLLO DE UN MODELO DE ANTICIPACIÓN A LAS SEQUÍAS BASADO EN ESCENARIOS DINÁMICOS (GUADALSEQ). P11-HUM-7922 (2013-2016).

CLASSIFICAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES ASSOCIADAS A ALUVIÕES NA REGIÃO DO FUNCHAL, ILHA DA MADEIRA, COM RECURSO A CADEIAS DE MARKOV

Ana Ramalheira

Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e Georrecursos (DECivil), I.S.T.
a.c.ramalheira@gmail.com

Maria Manuela Portela

Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e Georrecursos (DECivil), I.S.T.
maria.manuela.portela@ist.utl.pt

António Betâmio de Almeida

Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e Georrecursos (DECivil), I.S.T.
aba@ist.utl.pt

RESUMO

As ocorrências de eventos extremos de precipitação na Ilha da Madeira sugerem que a excepionalidade desses eventos, quando exclusivamente considerada *per se*, possa não explicar a gravidade das consequências de alguns dos mesmos. Com efeito, admite-se que precipitações intensas com magnitudes próximas possam ter consequências distintas (inclusivamente, gerando ou não aluviões), presumivelmente em função das precipitações que as antecederam. Com o objectivo de averiguar a possibilidade de estabelecer critérios de dimensionamento que reconheçam situações de risco, descreve-se a abordagem desenvolvida para classificar eventos extraordinários de precipitação a qual faz intervir precipitações superiores a limiares de excepionalidade pré-definidos acumuladas em diferentes períodos sub-diários, ao longo de uma janela temporal à qual, nas aplicações efectuadas, se atribuiu a duração fixa de 4 dias. Para o efeito, recorreu-se à metodologia associada às cadeias de Markov, no pressuposto de as ocorrências de dias secos ou chuvosos serem condicionalmente dependentes da sequência antecedente daqueles dias. A abordagem foi aplicada à classificação de precipitações associadas a aluviões históricas na região do Funchal.

Palavras-chave: aluvião, cadeias de Markov, Funchal, precipitações excepcionais.

Introdução

As precipitações de Fevereiro de 2010 na região do Funchal, de que resultaram 47 mortes e elevados prejuízos materiais, sugerem que, para entender as consequências de alguns dos acontecimentos pluviosos intensos na Ilha da Madeira, possa ser necessário avaliar, para além das precipitações verificadas nas datas das suas ocorrências, as *condições antecedentes de precipitação*, designadamente no que respeita a precipitações acumuladas em dias anteriores a esses eventos.

Para equacionar a anterior expectativa ensaiou-se uma classificação dos acontecimentos pluviosos associados à ocorrência de aluviões na região do Funchal, de entre as identificadas por Quintal, 1999, e Abreu, 2013. Para o efeito utilizou-se a série de precipitações horárias no posto udográfico do Funchal, no período entre as 09:00 h de 1 de Outubro de 1980 e as 18:00 h de 06 de Julho de 2010, obtida no âmbito de SRES, 2010. Importa mencionar que os registos apresentavam falhas muito pontuais e em períodos habitualmente de baixo quantitativo de precipitação, que foram preenchidas atendendo aos registos diários nos períodos com falhas horárias. A classificação incidiu sobre precipitações acumuladas com diferentes durações sub diárias, embora perfazendo sempre o período total de acumulação da precipitação de 4 dias.

As datas com registo de ocorrência de aluviões na zona do Funchal e para as quais se precedeu à classificação de precipitações acumuladas foram as seguintes: 01.03.1984, 02.03.1984,

27.09.1989, 18.09.1990, 24.10.1991, 29.10.1991, 29.10.1993, 19.10.1997, 20.10.1997, 01.02.1998, 05.03.2001, 06.03.2001, 18.11.2007, 19.11.2007, 29.11.2007, 07.04.2008, 08.04.2008, 09.04.2008 e 22.12.2009. Dada a excepcionalidade da aluvião registada dias 20 e 21 de Fevereiro de 2010, e uma vez que se dispõe dos dados referentes a esse período, tais datas foram incluídas no conjunto das analisadas (num total de 21 datas).

Dado que a informação de que se dispõe sobre as aluviões históricas apenas especifica dias de ocorrência, houve que estabelecer o critério de cálculo de precipitações acumuladas antecedendo essas aluviões. Para o efeito, atendendo a que cada registo horário de precipitação é atribuído à hora que se segue à sua ocorrência, admitiu-se que as 24 h relativas a uma dada aluvião poderiam decorrer entre a 01:00 e as 24:00 h do dia especificado para a aluvião, ou seja, entre a 01:00 h desse dia e as 0:00 h do dia seguinte, como se exemplifica na Figura 1 para a aluvião histórica de dia 29.10.1993. Cada uma dessas 24 h foi designada por data de referência, tendo-se especificado para a mesma as precipitações acumuladas em diferentes períodos sub-diários nos 4 dias (96 h) antecedentes, finalizando nessa data, como se esquematiza mais adiante, na Figura 2. A data de referência foi, portanto, considerada móvel ao longo da janela de 24 h antes especificada (entre 01:00 h do dia da aluvião e as 0:00 h do dia seguinte).

Figura 1 - Representação gráfica das datas de referência extremas associadas à aluvião histórica de dia 29.10.1993 (registos de precipitações horárias entre 25.10.1993, 00:00 h, e 03.11.1993, 00:00 h).

Cadeias de Markov

A utilização de matrizes de frequência de cadeias de Markov baseia-se na hipótese de as ocorrências de dias secos ou chuvosos serem condicionalmente dependentes da sequência dos dias secos ou chuvosos antecedentes (Andrade *et al.*, 2009). Na aplicação de tais cadeias à classificação das precipitações associadas a uma dada aluvião na zona do Funchal especificou-se, para cada uma das correspondentes 24 datas de referência, a precipitação acumulada nas 96 h finalizando nessa data, para o que as 96 h foram descritas por sucessivos sub períodos com duração de k de 1, 3, 4, 6, 8, 12 e 24 h. Deste modo, o número de estados a classificar, n , correspondentes aos anteriores valores de k é de 96, 32, 24, 16, 12, 8 e 4, respectivamente. Esses estados foram classificados através de cadeias de zeros (estados não excepcionais) e de uns (estados excepcionais). A precipitação acumulada num qualquer intervalo de d h foi considerada excepcional quando superior ao quantil empírico para a probabilidade de

não-excedência de 75%, $P_{\frac{d}{2}}^d$ %, obtido por mera ordenação das precipitações máximas anuais com a duração de d h no período de 29 anos hidrológicos (de 1980/81 a 2008/09) em que por acumulação de precipitações horárias foi possível constituir as amostras de máximos anuais. O Quadro I exemplifica algumas das precipitações excepcionais assim obtidas e o Quadro II, a

utilização das cadeias de Markov. Nas cadeias de três dígitos o dígito mais à esquerda classifica a precipitação no intervalo de tempo de k h que finaliza na data de referência (intervalo de tempo mais recente).

Quadro I - Posto udográfico do Funchal. Precipitações excepcionais, $P_{75\%}^d$ (mm).

	$d=1$ h	$d=2$ h	$d=3$ h	$d=4$ h	...	$d=93$ h	$d=94$ h	$d=95$ h	$d=96$ h
75%	28.7	40.8	47.1	53.2		124.6	126.8	126.9	131.5

Quadro II - Exemplo de obtenção das cadeias de Markov de segunda ordem.

x_2 (estado da precipitação acumulada com (t-1) e (t-2) (duração total de 3k h)	x_1 (estado da precipitação acumulada com (t-1) (duração total de 2k h)	x_0 (estado da precipitação em t (duração total de k h)	
		$x_0 \leq P_{75\%}^{1k} \Rightarrow 0$	$x_0 > P_{75\%}^{1k} \Rightarrow 1$
$x_2 \leq P_{75\%}^{3k} \wedge x_1 \leq P_{75\%}^{2k} \Rightarrow 00$		00	00
$x_2 \leq P_{75\%}^{3k} \wedge x_1 > P_{75\%}^{2k} \Rightarrow 01$		01	01
$x_2 > P_{75\%}^{3k} \wedge x_1 \leq P_{75\%}^{2k} \Rightarrow 10$		10	10
$x_2 > P_{75\%}^{3k} \wedge x_1 > P_{75\%}^{2k} \Rightarrow 11$		11	11

De forma generalizada ter-se-á:

$$X_n = \begin{cases} 0, & \text{se } x_n \leq P_{75\%}^{(n+1)k} \\ 1, & \text{se } x_n > P_{75\%}^{(n+1)k} \end{cases}$$

em que n representa o número de estados a classificar, X_n , o estado da precipitação acumulada nos instantes t a $t-k$ (ou seja, em nk horas) e x_n , o valor dessa precipitação. A Figura 2 exemplifica para as aluviões históricas de 08.04.2008 e de 20.02.2010 o procedimento de constituição de uma das 24 sequências de precipitações acumuladas, para os valores de k de 1, 6 e 24 (números de estados, n , de 96, 16 e 4, respectivamente, conforme representado na figura). Para essas mesmas duas aluviões, especifica-se no Quadro III a composição das cadeias de Markov para $k=1$.

Figura 2 - Precipitações acumuladas nas 96 h, para k igual a 1, 6 e 24, para as datas de referência de 08.04.2008, às 09:00, e 20.02.2010, às 09:00 (a curva vermelha de cada gráfico representa o limiar de excepcionalidade, P_{b}^d %, para durações d até 96 h, discretizadas de k em k h).

Quadro III - Precipitações acumuladas nas datas de referência associadas às aluviões históricas de 08.04.2008 e 20.02.2010 e corresponden tes cadeias de Markov para $k=1$.

[illegible]

Quadro III (continuação).

[illegible]

Resultados: codificação *run-length* (*run length encoding*)

A partir das cadeias de Markov obtidas para cada aluvião, seleccionaram-se, de entre as 24 datas de referência dessa aluvião, as com as maiores seqüências de valores 1 (ou seja, as com maiores seqüência de estados excepcionais) para os diferentes valores de k .

Verificou-se, assim, que a maior parte das aluviões referenciadas para a zona do Funchal, concretamente, doze aluviões históricas, não coincidiu com precipitações excepcionais em qualquer dos períodos de acumulação até 96 h e em todas as datas de referência a elas associadas (cadeias de Markov totalmente compostas por zeros). Para as restantes nove aluviões, exemplifica-se, no Quadro IV, as datas de referência conducentes às mais longas sequências de estados excepcionais consecutivos, bem como a constituição das respectivas cadeias de Markov. Para tanto, considerou-se a precipitação acumulada com discretização temporal de 1 h, ou seja, $k=1$, por, de algum modo, tal valor de k conter a informação que advém para os restantes intervalos de tempo adoptados na discretização temporal da precipitação acumulada.

Quadro IV - Datas de referência seleccionadas em função da dimensão da sequência de estados excepcionais consecutivos, para $k=1h$, e cadeias de Markov geradas.

Data de registro da aluvião histórica	Sequência/cadeia de Markov com maior número de estados excepcionais		
	Data de referência	Número de estados excepcionais consecutivos	Constituição
27.09.1989	27.09.1989 06:00	31	00000000000000000000 00000000000000000000 00000000001111111111 111111111111111111110000
18.09.1990	18.09.1990 14:00	1	00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 0000000000000000000000
29.10.1991	29.10.1991 11:00	1	00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 0000000000000000000000
29.10.1993	29.10.1993 03:00	7	00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 00000111111000011110001
01.02.1998	01.02.1998 04:00	2	00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000 00000000000000000000011
08.04.2008	08.04.2008 09:00	85	11111111111111111111 11111111111111111111 11111111111111111111 1111111111100000000011
09.04.2008	09.04.2008 01:00	72	11111111111111111111 11111111111111111111 11111111111111111111 0000000000000000000000
20.02.2010	20.02.2010 11:00	95	11111111111111111111 11111111111111111111 11111111111111111111 11111111111111111111
21.02.2010	21.02.2010 01:00	81	11111111111111111111 11111111111111111111 11111111111111111111 1111111110000000000000

Conclusões

O Quadro IV evidencia que as aluviões de 18.09.1990, 29.10.1991 e 01.02.1998 só apresentam excepcionalidade de precipitação acumulada em curtos períodos de tempo próximos dos dias da sua ocorrência, os quais foram precedidos por períodos de vários dias sem precipitação excepcional. Das restantes aluviões, as de Abril de 2008 e Fevereiro de 2010 foram nitidamente precedidas de precipitações consistentemente excepcionais que, contudo, ao aproximarem-se da data de referência poderão ter perdido alguma da sua excepcionalidade. Embora com manutenção de condições gravosas por um menor intervalo de tempo, é também esta a situação da aluvião de Outubro de 1989. A aluvião de Outubro de 1993 regista períodos com precipitações acumuladas acima do limiar de excepcionalidade com outros abaixo desses limiares.

A principal conclusão do estudo sumariamente apresentado prende-se com a constatação de que não é possível associar à generalidade das aluviões registadas na região do Funchal precipitações excepcionais, seja quer pelas precipitações que geraram aquelas aluviões não serem de facto excepcionais, quer por os registos referentes ao posto udográfico do Funchal não descreverem as precipitações que localmente poderão ter desencadeado essas aluviões. No extremo oposto, foram reconhecidas aluviões em períodos com pluviosidade consistentemente muito excepcional. Deve, contudo, mencionar-se que um estudo paralelo indicou outros períodos com precipitações igualmente excepcionais mas que, aparentemente, não terão ocasionado aluviões. Globalmente conclui-se que, para eficazmente associar precipitações a fenómenos de aluvião, será necessário por um lado, catalogar todas as ocorrências dessas aluviões e, por outro lado, dispor de uma rede de monitorização da precipitação sub diária que permita detalhar a variabilidade espacial desse hidrometeoro.

Bibliografia

- Abreu, T. (2013). Riscos Naturais na Região Autónoma da Madeira. Análise dos Riscos Naturais de Maior Incidência. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas.
- Andrade, A., Freitas, J., Brito, J., Guerra, H., & Xavier, J. (2009). Aplicação da Probabilidade Condicional e do Processo de Cadeia de Markov na Análise da Ocorrência de Períodos Secos e Chuvosos para o Município de Garanhuns, Pernambuco, Brasil. Revista Ambiente e Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science, v4 n.1. doi:10.4136/ambi-agua.81
- Quintal, R. (1999). Aluviões da Madeira. Séculos XIX e XX. Territorium 6, p. 31-48.
- SRES, Secretaria Regional do Equipamento Social da Região Autónoma da Madeira (2010). Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões da Ilha da Madeira - Estudo de avaliação do risco de aluviões na Ilha da Madeira. Anexo A - Caracterização de precipitações intensas. Instituto Superior Técnico (IST), Universidade da Madeira (UM), Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC).

EXPANSÃO URBANA, OCUPAÇÕES DE BAIXA RENDA E RISCOS AMBIENTAIS, NA CIDADE DE BOA VISTA, RR/ BRASIL.

Miguel Cerqueira dos Santos

UNEB e Pós-Doutorando em Geografia pela UFRR

migcerq@yahoo.com.br

Artur Rosa Filho

Departamento de Geografia da Universidade Federal de Roraima

artur.filho@ufrr.br

RESUMO

O processo de urbanização da cidade de Boa Vista desencadeia caminhos antagônicos. No primeiro momento, as ocupações aconteceram de modo espontâneo, motivadas pelo desenvolvimento das atividades primárias, que aconteciam às margens do Rio Branco. Após a década de 1940, foi criado o Território do Rio Branco, possibilitando que esta cidade fosse a sua capital. Inspirada no modelo radial-concêntrico, Boa Vista começou a se configurar por meio de uma multiplicidade de funções. O sítio urbano da cidade em estudo é predominantemente marcado pela presença dos igarapés, os quais demandam sérios cuidados no tocante à ocupação humana. Este trabalho realizado numa interlocução entre o Grupo de Pesquisa Recôncavo/UNEB e o Programa Nacional de Pós-Doutorado, com o apoio da CAPES/UFRR tem como o objetivo investigar os principais riscos ambientais que permeiam as populações de baixa renda. No tocante aos percursos metodológicos, a pesquisa está sendo respaldada em autores clássicos e contemporâneos que discutem a temática. Os trabalhos de campo acontecem com a aplicação de entrevistas e questionários. O tratamento dos dados utiliza o apoio do SIG, com o emprego de *Softwares* como *SPSS* e *ArcGIS*. Como resultado final, está sendo produzido o artigo que poderá servir de subsídios para a elaboração de políticas públicas voltadas para as futuras trajetórias de desenvolvimento.

Palavras-chave: Expansão urbana, ocupações de baixa renda e riscos ambientais.

Introdução

O entendimento dos riscos ambientais encontrados nas populações de baixa renda, na cidade de Boa Vista, demanda reflexões sobre o processo de urbanização. No primeiro momento, as ocupações aconteceram de modo espontâneo, a partir do desenvolvimento das atividades primárias, motivadas pelo potencial encontrado às margens dos rios Branco e Caumé. Durante a década de 1940, foi criado o Território do Rio Branco, possibilitando que essa cidade fosse a sua capital. Inspirada no modelo de planejamento radial-concêntrico, Boa Vista começou a se configurar por meio de uma multiplicidade de funções. O sítio urbano é predominantemente marcado pela presença das lagoas e de igarapés, os quais demandam sérios cuidados no tocante à ocupação humana. Na Zona Leste da cidade, predominam os bairros mais estruturados, enquanto que a Zona Oeste constitui uma das poucas opções de acesso à moradia das populações de baixa renda. O objetivo deste trabalho é investigar os principais riscos ambientais que permeiam as populações em análise. No tocante aos percursos metodológicos, à pesquisa acontece mediante o respaldo em autores clássicos e contemporâneos que discutem a temática. Os trabalhos de campo estão sendo realizados a partir do diálogo com as populações da área em estudo, subsidiados pela aplicação de entrevistas e de questionários. O tratamento dos dados acontece com o apoio do SIG e como resultado final está sendo produzido o artigo que poderá servir de subsídios para a elaboração de políticas públicas voltadas para redução de desigualdades sociais.

Problemática ambiental e concepção de riscos

A passagem de um modo de vida rural para um modelo de crescimento urbano industrial estimulou o aumento de uma sociedade de consumo, o que demanda a realização de estudos sobre a problemática ambiental. As pesquisas sobre a temática tendem a aumentar, principalmente em decorrência dos múltiplos eventos que provocam danos à vida humana, a exemplo dos terremotos, vulcões, tsunamis e deslizamento de encostas, dentre outros. Os conceitos de riscos envolvem uma dimensão tão alargada quanto à problemática por eles envolvida. O uso do termo remete às inúmeras questões, que podem variar de acordo com os diferentes modos de vida. As primeiras respostas dos entrevistados, no tocante à aproximação com os termos vulnerabilidade, perigo e riscos, por exemplo, têm concepções variadas. Estas reações envolvem elementos materiais e imateriais contidos no espaço, conforme ressalta Santos (2011).

Na década de 1990, vale mencionar a perspectiva de estudos de riscos, com na dimensão social, discutida por Beck (1992). De certa forma, os riscos não estão somente relacionados com os fenômenos naturais, a exemplo de maremotos, terremotos e vulcões, mas, também, com as ações antrópicas, conforme salienta REBELO (2003). A discussão sobre esta temática vem passando por diferentes abordagens, o que está relacionado com os avanços ocorridos com o desenvolvimento das sociedades e das técnicas (Veyret, 2007). Diante dos processos de correlação dos estudos de riscos, com as diferentes dimensões espaciais, os mesmos passam a ser classificados como naturais, antrópicos ou mistos (Lourenço, p.109, 2007). Diante das reflexões relacionadas com os estudos da cidade de Boa Vista, adotamos a concepção de riscos ambientais como sendo a célula mãe, onde diferentes causas e efeitos podem estar associados. Dificilmente vamos falar de riscos, sem levar em consideração as múltiplas dimensões do espaço. É diante deste contexto que estamos trazendo a reflexão sobre os riscos ambientais encontrados nas ocupações de baixa renda na cidade de Boa Vista/RR.

A Zona Oeste de Boa Vista e os conjuntos Nova Esperança e Cruviana.

A ideia de uma cidade planejada, com base na intervenção ocorrida no metade do século XX, fica cada vez mais camuflada, diante das complexidades encontradas no modelo de expansão urbana. A cidade de Boa Vista surge por influências dos aglomerados que foram acontecendo próximo aos importantes mananciais aquíferos como Rio Branco e Caumé. As primeiras ocupações, ocorridas no sítio urbano, começaram a acontecer desde os primeiros cultivos existentes no Brasil Colonial, antes com as fazendas nacionais, depois com as fazendas reais, no período do império, até à entrada das fazendas particulares, com a criação da Lei de Terras (Lima, p.37, 2011).

A implantação do Território do Rio Branco, no ano de 1943, elevou a referida cidade à condição de capital, até o ano de 1988, quando houve a transformação para Estado de Roraima, desmembrado do grande Estado do Amazonas. A maior parte das pessoas que ocuparam a cidade de Boa Vista tem origem nas regiões Norte e Nordeste do país. A partir dos últimos anos, acelerou o processo de expansão para os bairros localizados na Zona Oeste. O crescimento da cidade estimula o processo de especulação imobiliária, com a constante valorização e revalorização do solo. Os resultados preliminares da pesquisa apontam para o aumento de um número significativo de loteamentos, situados em áreas de lagos ou de Igarapés, figura 1.

Figura 1 - O espaço urbano de Boa Vista-RR/Brasil

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014.

As populações mais abastadas conseguem adquirir os lotes em áreas dotadas de melhor infraestrutura, possibilitando modos de vida mais distantes dos riscos ambientais. Enquanto isso, os habitantes de baixa renda ocupam áreas de maiores vulnerabilidades. No trabalho de campo, houve a aproximação com a população que ocupa a área de estudo. Entre as inúmeras variáveis que foram levantadas, no diálogo com os entrevistados, convém mencionar, para esta etapa da pesquisa, os resultados do cruzamento das variáveis renda e número de filhos, Quadro I.

Quadro I - Cruzamento de dados da renda com o número de filhos

Número de filhos	Renda com base no salário mínimo nacional –R\$ 724,00				
	Menos de um	Um salário	Um a dois	Mais de dois	Outro
Nenhum	3,6	14,3	3,6	5,4	0,0
Um filho	0,0	16,0	3,6	1,8	0,0
Dois a quatro filhos	7,5	17,9	10,7	1,8	3,6
Cinco a sete filhos	1,8	3,6	1,8	0,0	0,0
Mais de sete filhos	1,8	0,0	3,6	0,0	0,0

Fonte: Pesquisa de Campo na Zona Oeste de Boa Vista/RR/Brasil, 2014.

A variável renda constitui um dos indicadores de maior dificuldade para obtenção de respostas, nos trabalhos de campo. Entretanto, a realidade evidenciada condiz com a condição da

população que habita a área de estudo. Os vencimentos familiares ficam abaixo de dois salários mínimos nacionais, ou seja, R\$ 724,00, setecentos e vinte e quatro reais. Há famílias que sobrevivem com menos de um salário mínimo e ainda têm mais de cinco filhos. No contexto da expansão urbana de Boa Vista, essas localidades apresentam algo diferente das demais. O Conjunto Cruviana surgiu da iniciativa pública, a partir do projeto de intervenção social, denominado Minha Casa minha Vida, apoiado pelo Governo Federal. Enquanto isso, o Loteamento Nova Esperança foi fruto de uma ocupação organizada pelos próprios moradores, no final da década de 2000, foto 1.

Foto 1 - Conjunto Nova Esperança/Boa Vista

Fonte: Trabalho de Campo, 2012.

O Conjunto Nova Esperança, assim como a maior parte das populações de baixa renda, está localizado em Área de Proteção Permanente (APP), Veras & Vladimir (2012). A população vivencia sérios problemas ambientais, principalmente no período das chuvas. A necessidade de ter uma habitação, a dificuldade de renda para investir em infraestrutura e a falta de apoio do poder público se destacam entre os principais motivos desta ocupação. Os resultados preliminares da pesquisa apontam indicativos como a inundação, a falta de saneamento básico e o aumento da violência, principalmente com o crescimento do uso de drogas, como sendo as ocorrências que mais provocam danos à qualidade de vida dos moradores.

Considerações

Os resultados obtidos apontam para o aumento da vulnerabilidade dos habitantes. A população em estudo ocupa os terrenos desprovidos de infraestrutura, carente de políticas públicas, implicando assim na elevação dos riscos ambientais. Os resultados preliminares da pesquisa apontam que a maioria dos entrevistados gosta de habitar no bairro e que a maior luta é conseguir as condições básicas, para a obtenção de uma vida digna. Os riscos encontrados vão além daqueles relacionados com alagamento, enchentes, desmoronamento ou deslizamentos. Existe, assim, forte crescimento dos riscos de dimensão social, resultante da falta de oportunidade de emprego e renda, do baixo nível de escolaridade e da carência de infraestrutura sanitária, além dos indicativos de aumento da insegurança. Diante do exposto, emerge a

necessidade de desenvolvimento deste estudo, visando melhor aproximar a problemática ambiental e refletir sobre os danos causados às populações de baixa renda.

Referências bibliográficas

- BECK, Ulrich (1992). *Risk Society*. London: SAGE publications.
- BONATO, Fabio (2012). *Transformação na paisagem natural de Boa Vista*. Tese de doutorado defendida na Universidade do rio de janeiro. Rio de Janeiro: UFRJ.
- LIMA, Maria Goretti Leite de (2011). *As transformações da paisagem do Sítio Histórico de Boa Vista*. Tese de Doutorado defendida no Departamento de Geografia da USP. São Paulo: USP.
- REBELO, Fernando (2003). *Riscos Naturais e Acção Antrópica: estudos e reflexões*, 2ª edição, Imprensa da Universidade, Coimbra.
- SANTOS, Miguel Cerqueira dos (2011). *Urbanização e riscos ambientais na cidade de Salvador*. In Revista territorium, 18, Associação Portuguesa de Risco, Coimbra, ,p.13 - 20.
- VERAS, Antonio Tolrino Rezende & SOUZA, Vlaidmir (2012). Panorama socioambiental do Igarapé Caranã. In Revista Acta Geográfica, volume 6. Boa Vista: UFRR, p.85-95.
- VEYRET, Yvette (2007). Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente. Traduzido por Dilson Ferreira da Cruz. São Paulo: contexto.

A HEMEROGRAFIA COMO MEIO DE LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE DESASTRES: ESTUDO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO - BRASIL NO PERÍODO 2001-2013

Bruno Zucherato

Departamento de Geografia, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Bolsista da CAPES proc. nº BEX 9537/13-9

bzucherato@fl.uc.pt

Maria Isabel Castreghini de Freitas

Departamento de Planejamento Territorial e Geoprocessamento (DEPLAN)/Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE)

- Universidade Estadual Paulista (UNESP) - Campus Rio Claro - Brasil

ifreitas@rc.unesp.br

RESUMO

A pesquisa hemerográfica, apresenta uma importante ferramenta para determinar à quais ocorrências de desastres uma localidade está sujeita. Com base nesse propósito, o estudo apresentado, buscou uma análise com base na referida técnica um levantamento de notícias de desastres no município de Campos do Jordão - SP (Brasil). Foram verificados, no sítio web do jornal “Campos do Jordão & Cia.” durante o período de 2001 até 2013, as notícias veiculadas sobre a ocorrência de desastres. Dessa maneira foram registradas as notícias de ocorrência de desastres e criado um banco de dados, onde foi possível obter o mês da notícia, o ano, e ainda classificá-las de acordo com a Codificação de Desastre Ameaças e Riscos. Os resultados do período analisado mostraram um total de 56 notícias, sendo o maior número de ocorrências no ano de 2004, com relação aos meses do ano, as notícias se concentraram principalmente no mês de Junho e o principal desastre registrado foi a ocorrência da geada.

Palavras-chave: Hemerografia, Campos do Jordão, Notícias de Desastre, Banco de dados.

Introdução

A intervenção antrópica no meio natural, assim como o crescente consumo desenfreado dos recursos naturais disponíveis, estão desencadeando uma série de eventos de desastres, que estão se mostrando cada vez mais frequentes nos últimos anos (EMA, 2004).

Os dados apresentados pelo Emergency Events Dataset (EM-DAT, 2014), mostram como a análise dos registros de ocorrências de desastres tem aumentado de maneira significativa durante a segunda metade do século XX e principalmente nas últimas décadas como pode ser observado a partir da Figura 1.

Figura 1. Número de Registos de ocorrências de desastres no Mundo (1901-2013)

Fonte: EM-DAT (2014)

Os dados mostram, que houve um significativo aumento no número de registros de ocorrências de desastres durante a segunda metade do período analisado, e que ainda durante as últimas décadas do século XX e anos iniciais do século XXI, esses valores se mostraram ainda maiores. Essa crescente no número de ocorrências de desastres registrados evidenciam a importância da realização de estudos na temática, procurando apresentar soluções para a identificação de riscos a desastres, bem como a prevenção, alerta, mitigação e recuperação de áreas afetadas por desastres (ISDR, 2004).

Nesse sentido, o estudo aqui proposto busca realizar um levantamento das ocorrências de desastres na cidade de Campos do Jordão - SP (Brasil), buscando como fonte de informação a hemerografia, ou seja as notícias veiculadas em jornais, durante o período de 2001 a 2013. Esse levantamento, além de mostrar quais os desastres que ocorrem com mais frequência na localidade, demonstram também, qual a importância social dessas ocorrências, uma vez que a tendência é que sejam noticiadas principalmente as ocorrências de maior impacto social.

Materiais e Métodos

A pesquisa hemerográfica é aquela que utiliza a consulta a materiais e impressos de circulação geral para obter dados veiculados em uma comunidade ou grupo social tendo como base informações e notícias (FORTES, 2003). Esse tipo de pesquisa apresenta além de dados sobre o objecto estudado, denota também a importância dessas notícias e o seu impacto social.

Para o estudo realizado foram consultados os arquivos do jornal “Campos do Jordão e Cia”, periódico de circulação semanal, com abrangência local, no período de 1 de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2013, totalizando 585 publicações (Edições de número 396 até 981). Disponíveis no site *web* do jornal.

O procedimento de pesquisa realizado consistiu na observação de cada edição do periódico, sendo registradas em um banco de dados contendo a manchete do desastre noticiado, a data e edição do ocorrido, além da classificação do desastre de acordo com o Código de Desastres Ameaças e Riscos (CODAR) (BRASIL, 2000).

A partir desse levantamento, foi possível estabelecer o perfil das ocorrências de Desastres no município, a Figura 2, apresenta o número de notícias registradas para cada ano no período analisado.

Figura 2. Número de notícias de desastres veiculadas no jornal analisado para o município de Campos do Jordão (2001-2013).

A partir dos valores apresentados, é possível perceber que no período analisado, que houveram notícias de desastres em todos os anos analisados, em contrapartida, houve uma concentração no número de notícias de ocorrências no período de 2001 a 2004, anos que ficaram em sequência todos contendo valores acima da média do período. Essa análise mostra também que o comportamento geral do número crescente de ocorrências de desastres em nível mundial não se repete na escala local, quando ao contrário apresentaram uma diminuição nos dois últimos anos, 2012 e 2013.

Em se tratando da distribuição das ocorrências ao longo dos meses do ano, o gráfico da Figura 3, apresenta o panorama observado na pesquisa realizada.

Figura 3. Número de notícias registradas para os meses do ano no para o município de Campos do Jordão (2001-2013)

As notícias de desastres registradas no período distribuídas pelos meses do ano mostram que existe uma clara concentração em sua ocorrência para os meses de maio, junho e julho, demonstrando que a maioria das ocorrências de desastres noticiados estão concentradas no período que vai do fim do outono, para todo o período do inverno, enquanto as ocorrências do meio de outono (mês de Abril) e primavera (Outubro e novembro) são menos frequentes.

Analizadas enquanto tipo de riscos, na classificação estabelecida pela CODAR, podemos observar a distribuição das ocorrências registradas de acordo com o gráfico apresentado pela Figura 4.

Figura 4. Percentagem de notícias de desastres registradas, classificadas de acordo com a CODAR para o município de Campos do Jordão (2001-2013).

A classificação dos desastres de acordo com a CODAR apresenta um panorama dos desastres para a localidade seleccionada que permite, um entendimento inicial melhor de tais ocorrências no período analisado. Assim é possível observar que 42% (27 notícias) registadas no período são relativas a ocorrência de Geadas, seguidas de Enxurradas/Inundações bruscas com 12% (8 notícias) e Incêndios Florestais com um valor de 7,7% (5 notícias), os demais tipos de desastres não apresentaram valores significativos com menos de 5 notícias no período analisado.

A análise dos dados levantados inicialmente podem levar ao delineamento de um perfil da ocorrência de desastres no município de Campos do Jordão, sendo necessário um aprofundamento com relação aos danos causados por essas ocorrências. Assim faz-se necessário como próximos passos da pesquisa um aprofundamento dos danos de cada um dessas tipologias de desastres observadas no levantamento inicial, para que se possam traçar as principais ameaças de desastre e então realizar um adequado mapeamento de risco e vulnerabilidade socioambiental.

Conclusão

A partir da pesquisa realizada é possível tirar algumas considerações importantes para o estudo de desastres e risco em escala local, uma vez que a obtenção de dados para esse tipo de estudo nem sempre são acessíveis ou consistentes.

A pesquisa hemerográfica permitiu estabelecer uma aproximação satisfatória com relação as principais ocorrências de desastres na área de estudo, sendo portanto uma técnica válida para o levantamento inicial de ocorrências de desastres e o estudos de risco em escala local.

A partir dos dados levantados foi possível estabelecer no intervalo histórico analisado em quais anos houveram mais notícias de desastres no local, e ainda em quais meses do ano essas ocorrências se concentraram, esses resultados podem ser úteis aos agentes de organização e acção em casos de desastres para o delineamento de uma gestão de risco mais eficiente.

Também foi possível estabelecer, em termos de ocorrências, quais os desastres mais comuns noticiados durante o período, sendo necessário um aprofundamento, nos danos e prejuízos causados por estes para que seja possível estabelecer as principais ameaças a qual a área está exposta.

Bibliografia

- Brasil, Ministério da Integração Nacional (2003) - *Manual de Desastres: Volume I - Desastres Naturais*. Brasília: Secretaria Nacional de Defesa Civil, 174p.
- EMA, Emergency Management Australia (2004) - *Emergency Management in Australia: Concepts and Principles* Manual numebr 1. Camberra: Australia Government, 22p.
- Fortes, W. G. (2003) - *Relações públicas: Processo, Funções, Tecnologias e estratégias*. São Paulo: Summus, 400p.
- International Disaster Database, EM-DAT (2014) - *EM-DAT The International Disaster Database: Centre of Research on the Epidemiology of Disasters - CRED*. Disponível em: <www.emdat.be> acesso em 14 de Setembro de 2014.
- ISDR, International Strategy for Disaster Reduction (2004) - *Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction Initiative*. New York and Geneve: United Nations, 133p.

A MÍDIA EM FOCO: EXEMPLOS DE DESINFORMAÇÃO CLIMÁTICA

Luci Hidalgo Nunes

Departamento de Geografia, Universidade Estadual de Campinas, Brasil
luci@ige.unicamp.br

Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni

Departamento de Geografia, Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil
cazamp@gmail.com

RESUMO

A mídia desempenha relevante função na formação de opinião pública sobre os mais diferentes temas, o que reforça seu papel central na sociedade democrática; porém, nem sempre a informação é repassada de forma adequada. Tal fato é particularmente relevante no caso de informações de caráter climático, estratégicas para uma série de condutas que norteiam ações específicas no território e que apresentam potencial para prevenir acidentes e perdas econômicas e/ou de vidas humanas. Ocorre que entre sua origem e seu receptor a informação, intermediada pela mídia, pode sofrer distorções, simplificações, inconsistências e erros, comprometendo seu uso. Foram avaliadas diversas notícias disseminadas de forma equivocada sobre fenômenos atmosféricos veiculadas em diferentes mídias e em distintos períodos. Em geral as notícias foram confusas, contraditórias, erradas, simplistas, alarmistas e sensacionalistas, podendo ter induzido a mal entendidos ou mesmo descrença e desinteresse pela temática. Com isso, a mídia falhou em sua importante função social, tanto como elemento-chave na tomada de medidas preventivas ou soluções mais eficientes para minorar as consequências de futuros episódios, como em sua função educativa, mais desinformando do que propriamente informando o leitor.

Palavras-chave: mídia, sensacionalismo, clima

Introdução

Os assuntos relacionados ao tempo e ao clima abarcam dimensões socioambientais, espaciais e econômicas, levantando interesse da sociedade e, assim, ocupando espaço crescente na imprensa. As informações veiculadas incluem não apenas a previsão do tempo, mas também a associação de algumas condições atmosféricas a aspectos relevantes, como saúde, agricultura, esporte, lazer, política e economia. Questões científicas como informações sobre mudanças climáticas e outros assuntos de natureza ambiental têm também ganhado maior projeção nas diferentes mídias, conforme alertam Weingart *et al.* (2000). Schäffer e colegas (2013) lembram que em alguns momentos esses assuntos recebem ainda maior atenção, como no período das reuniões anuais sobre as mudanças do clima (International Climate Summit). Esse mesmo fato foi observado por Zangalli Jr. (2013), que notou que em 2001 e 2007, anos em que foram divulgados dois dos relatórios produzidos pelo IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima), houve número maior de notícias sobre esse assunto em periódicos brasileiros.

As mídias podem ser classificadas seguindo diferentes critérios como, por exemplo, de acordo com a frequência (diária, no caso de jornais; semanal, quinzenal ou mensal, no caso de revistas, ou ainda mais rápida, com conteúdos constantemente atualizados, no caso de sítios da internet), com a abrangência (local, regional, nacional) ou mesmo de acordo com a qualidade da informação, tendo em vista que alguns veículos de comunicação são claramente sensacionalistas. No entanto, mesmo no caso de fontes de informação mais sérias e comprometidas com a qualidade, não chega a ser incomum a publicação de notícias apelativas, cujos propósitos são muito mais chamar a atenção do que realmente informar, inclusive nos assuntos relativos às situações do tempo e do clima.

Abordando essa temática, Carvalho (2007) assinala um paradoxo criado pela mídia, ao difundir informações contrastantes: a autora exemplifica esse fato a partir de um periódico britânico, cujas notícias alertam quanto aos riscos das mudanças climáticas e a necessidade de ação com base em pesquisas científicas, mas igualmente veicula propagandas pagas de corporações que contribuem para agravar esse problema. Nesses casos fica patente, também, que a imprensa abdica da função social de ser um elemento-chave na articulação de assuntos centrais na contemporaneidade e na formação da cidadania consciente. Por sua vez, Liedtke (2003) assevera que na lógica liberal a finalidade de lucro suplantaria as educativas e culturais nos meios de comunicação.

Considerando que as condições atmosféricas são complexas e centrais no cotidiano, e que a mídia é o principal canal para obter informações acerca desses assuntos para a grande maioria da população, a qualidade e até a ênfase na construção do discurso são elementos de enorme relevância. Tendo isso em vista, o objetivo desta pesquisa foi examinar a disseminação da informação de natureza atmosférica pela imprensa, avaliando alguns exemplos brasileiros.

Análise da qualidade da informação climática a partir de alguns exemplos da mídia brasileira

Imprecisões e erros na veiculação de notícias sobre fenômenos atmosféricos podem ter diversas origens e intencionalidades, sendo que os exemplos que seguem se atrelam a alguns dos tipos de inconsistências identificados. Foram consultadas as seguintes fontes: jornais O Estado de S. Paulo e Folha de MT, Revista Veja (semanário de alcance nacional) e a mídia *online* www.gazetadigital.com.br.

- reportagens muito breves, sem maiores referências e com simplificações e dubieidades que podem conduzir o leitor a interpretações parciais da realidade. Ex. (reportagem publicada em 1 de novembro de 2008, Jornal O Estado de S.Paulo): “Água devasta 30 km de floresta” - tratou-se de notícia acerca do rompimento de uma barragem, mas não houve esclarecimentos da causalidade (chuvas intensas, erros técnicos na construção ou outros);
- falta de explicação de informações derivadas de estudos científicos, comprometendo o entendimento do conteúdo. Ex. (notícia publicada em 31 de janeiro de 2008, Jornal O Estado de S.Paulo): “Aquecimento da água em 0,5°C aumenta furacões” - a informação reportava um evento registrado em setor do Atlântico Norte ocidental; porém, a falta de elucidação pode ter induzido o leitor ao raciocínio de que a partir de qualquer temperatura o incremento de 0,5° C propicia a formação dessa perturbação atmosférica;
- catastrofismo. Ex.1 (manchete publicada em 1 de fevereiro de 2008, Jornal O Estado de S.Paulo): “Aquecimento vai piorar fome até 2030” - o assunto é tratado como uma sina da qual não há escapatória, não discorrendo quanto a outras formas de combater a fome e imputando apenas a uma causalidade (climática) essa questão complexa. Ex.2 (reportagem publicada em 13 de setembro de 2008, Jornal O Estado de S.Paulo): “Furacão Ike: ‘É fugir ou morrer’, alerta Texas” - além do título chamativo, paira a dúvida, não dirimida ao ler a notícia inteira de quem estaria alertando, visto que Texas é um estado norte-americano; Ex.3 (edição de 21 de junho de 2006, Revista Veja): “Aquecimento global: os sinais do apocalipse” - reportagem de capa, ilustrada com a imagem de um urso polar - animal que vem sendo um ícone desse assunto - mescla abordagem mais comedida, com informações geradas por pesquisas empreendidas por cientistas de diferentes áreas do conhecimento, nações e centros de excelência, com termos sensacionalistas e exagerados;

- abordagem superficial, desconexa e descompromissa. Ex.1 (reportagem publicada em 31 de agosto de 2014, Jornal A Gazeta de Cuiabá/MT) “Clima seco dissemina doenças contagiosas” - além do conceito de clima ter sido utilizado para se referir ao tempo, no contexto da estação de inverno (estação seca) em Cuiabá/MT, a notícia apresenta relação direta da estação seca com as doenças contagiosas, não considerando problemas de gerenciamento da saúde local, acrescido da tendência de elevação das temperaturas acompanhadas de baixas porcentagens de umidade relativa derivadas das modificações no uso da terra, em especial aquelas que se atrelaram a obras de mobilidade urbana motivadas pela recente Copa do Mundo de 2014;
- ‘demonização’ de fenômenos atmosféricos: Ex (manchete publicada em 12 de maio de 2008, Jornal O Estado de S.Paulo): “Natureza em fúria: num único dia 34 tornados afligem os EUA” - adjetivação de fenômenos naturais com expressões que colocam a natureza como raivosa, vingativa e revanchista;
- informações erradas. Ex1 (manchete publicada 17 de setembro de 1997, Jornal O Estado de S.Paulo): “O fenômeno” - no corpo da reportagem aparece a seguinte afirmação: “O fenômeno, conhecido como El Niño, provoca graves alterações no clima mundial” - na verdade, esse processo afeta temporariamente as condições de tempo em locais do globo sob sua influência, sendo, assim, um componente do clima desses setores. Ex. 2a, 2b e 2c (manchetes publicadas em 05 de janeiro de 2008 e em 22 de junho de 2012, O Estado de S.Paulo, e em 22 de julho de 2014, Folha do Estado de MT): “Festival do gelo é prejudicado por clima quente”, “Clima no Brasil faz preço do café disparar em NY” e “O clima na Capital começa a voltar ao normal na terça-feira (29)” - nos tres casos o termo correto é tempo e não clima, já que as notícias se referem a condições específicas e momentâneas: esse é um erro muito recorrente na imprensa brasileira. Ex.3 (manchete publicada em 27 de agosto de 2012, no sítio www.gazetadigital.com.br)_“Massa de ar frio derruba temperatura” - neste caso, foi uma frente fria, derivada de chuvas frontais, já que a massa de ar frio quando atinge Cuiabá/MT, vem formando frentes com as massas de ar quentes sempre presentes nesta localidade. Além disso, a utilização da terminologia “derruba” remete à pretensa perversidade da força da natureza. Ex.4 (manchete publicada em 22 de julho de 2014, Folha do Estado de MT) - “Termômetros só voltam a subir na segunda-feira (28)” termômetros não sobem, mas a temperatura se eleva;
- falta de contextualização e conexões entre causas e responsabilidades. Ex. 1 (manchete publicada em 04 de setembro de 2014, Diário de Cuiabá): “Chuva, estragos e susto” - a reportagem atribui às chuvas a responsabilidade pelos problemas de ordem estrutural que ocorreram em vários pontos da cidade, inclusive no aeroporto local.

Outras práticas tendenciosas e que não contribuem para a disseminação de informação de boa qualidade podem ser elencadas: nações de maior projeção no cenário internacional ou mesmo regiões mais ricas de um país recebem maior atenção da mídia em qualquer tipo de informação, inclusive as de natureza atmosférica, fato assinalado por Nunes (2007 e 2009) e Carvalho (2007), que sublinha que notícias sobre áreas mais periféricas dos grandes centros de decisão somente aparecem quando há registro de desastres naturais ou induzidos pela ação humana, exemplificando com o continente africano. Na mesma linha, Weingart *et al.* (2000) asseveram que a propagação das notícias projeta preferências e prioridades dos grupos dominantes e influenciam percepções individuais e coletivas, bem como decisões políticas. Outro aspecto a ressaltar é que muitos assuntos ganham relevância em alguns momentos, mas passado algum tempo não há continuidade, de maneira que o leitor não sabe o desfecho do assunto: esse fato é muito presente quando acontece alguma catástrofe natural.

Conclusão

Além do papel óbvio da imprensa, que é ser informativa, o jornalismo tem potencial para desempenhar inúmeras funções vitais na sociedade contemporânea, com destaque para seu caráter educacional, sociocultural e político, formador de opinião e influenciador de decisões políticas relevantes para a sociedade.

As informações de caráter climático conjugam aspectos atraentes para o público leitor, como possibilidade de previsão de acontecimentos, projeções de cenários possíveis e planejamento de ações em diferentes prazos, o que as tornam cada vez mais presentes nas diversas mídias, divulgadas à luz de enfoques distintos. Contudo, faz-se necessário avaliar como as informações são passadas ao público e como elas são (ou não são) incorporadas a novas práticas e pensares. Esta pesquisa se propôs a examinar o primeiro desses aspectos, trazendo alguns exemplos de reportagens publicadas em mídias brasileiras que têm como proposta serem mais do que meramente informativas, serem formadoras de opinião.

Os exemplos são muitos, mas nos exemplos usados neste estudo destacam-se erros conceituais, ausência de explicações e conexões, exageros, termos inadequados e com caráter claramente sensacionalista.

Assinala-se que se de um lado a informação sobre tempo e clima é cada vez mais presente, por outro a forma como ela tem sido divulgada não contribui, necessariamente, para um conhecimento mais preciso dos fenômenos atmosféricos, que estão entre os que mais diretamente influenciam a vida das pessoas. Além disso, a disseminação de informações fidedignas cumpriria o papel de colaborar na construção da cidadania e informar os tomadores de decisão acerca da importância dessas questões para a construção de locais mais saudáveis e seguros, fatos que ao menos parte da imprensa brasileira não tem tido papel proativo.

Bibliografia

- Carvalho, A. (2007) - Communicating global responsibility? Discourses on climate change and citizenship. *International Journal of Media and Cultural Politics* v.3 (2), Commentaries. Intellect Ltd, Bristol, UK, p. 180-183.
- Liedtke, P.F. (2003) - Políticas públicas de comunicação e o controle da mídia no Brasil. *Tese - Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em Sociologia Política da UFSC*, v.1, (nº1). UFSC, Santa Catarina, p. 39-69.
- Nunes, L.H. (2007) - O papel da mídia na difusão da informação climática: o El Niño de 1997-98. *Geografia*, Rio Claro, 32, p.29-50.
- Nunes, L.H. (2009) - Media Communication of Extreme Events: A Case Study for Brazil. *European Conference on Severe Storms*, 5th. Landshut, Germany. 2p. Disponível em: <<https://www.essl.org/ECSS/2009/preprints/O11-3-nunes.pdf>>
- Schäffer, M.S.; Ivanova, A.; Schmidt, A. (2013) - What drives media attention for climate change? Explaining issue attention in Australian, German and Indian print media from 1996 to 2010. *International Communication Gazette*. v.76 (2), Sage Publications, p.152-176.
- Weingart, P.; Engels, A.; Pansegrau, P. (2000) - Risks of communication: discourses on climate change in science, politics, and the mass media. *Public Understanding of Science*, v. 9, Sage Publications, p. 261-283.
- Zangalli Jr., P.C. (2013) - *Entre a ciência, a mídia e a sala de aula: contribuições da geografia para o discurso das mudanças climáticas*. Presidente Prudente: FCT, UNESP. Dissertação (Mestrado), 148 p.

CAPÍTULO 2

GEOTECNOLOGIAS APLICADAS À ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS

POTENTIAL FOR THE APPLICATION OF A GRAVITY SENSING TECHNOLOGY FOR THE IMPROVEMENT OF THE ASSESSMENT OF SEISMIC HAZARDS

Arthur L.S. Valencio

State University of Campinas, Brazil

arthur_valencio@physics.org

Charles H.-T. Wang

SUPA Department of Physics, University of Aberdeen, UK

c.wang@abdn.ac.uk

ABSTRACT

Earthquakes of great magnitude are of great concern due to their high potential of damage and destruction of the *systems of objects* and *actions* of the affected communities. This work considers the recent progresses in the understanding of these events, particularly focusing on the co-seismic gravity variations. The challenges in empirical research in the field are analysed under the perspective of two variables: the *reliability* and the *precision* of the information about the risk. The research method consists of literature review and documentary research focusing different technologies in gravity sensing, including one in development at the University of Aberdeen. It is discussed if this technology could support the activities of the technical body in seismology.

Keywords: Earthquakes, co-seismic gravity sensing, gravity-sensing technologies.

Introduction: recent progress in the study of co-seismic gravity anomalies

Earthquake events change the distribution of mass in the Earth's crust, and this can be perceived by precise gravity sensors in the surface. Imanishi et al (2004) indicate two simultaneous effects involved: there is a variation in local gravity acceleration due to "the apparent addition or subtraction of Earth's mass [and due to] a change in the distance [from the equipment] to the center of the Earth".

The first observation of co-seismic gravity changes was made in the 1964 Alaska earthquake (Barnes, 1966), however, the results were a matter of debate for decades due to the long period between measures and possible drifts from the equipment. Only during 1998 Mt Iwate Earthquake, reliable readings indicating co-seismic gravity change were observed, using an absolute gravimeter (Tanaka et al, 2001). This latter observation - of -6 ± 1 microgal ($1\text{gal}=100\text{m/s}^2$) at 3km epicentral distance and 8 days period before and after the single earthquake event - confirmed the theory that gravity changes can be connected to earthquakes, encouraging further theoretical and empirical studies about the occurrence of this phenomena in different scenarios and how to address the inverse problem (obtain information about the seismic activity from the gravity signal).

Numerous models were developed to improve the knowledge about these co-seismic gravity changes in the near and far-field (ref. to earthquake source), enabling researchers to better understand the geophysical mechanisms in action during and after earthquakes. Using these models, associations were made possible between the gravity-change simulations and observational data, including patterns of stress accumulation and crustal deformations, thus allowing the development of improved risk scenarios.

Some of the most referred models are Sun & Okubo (1993) and Sun & Okubo (1998), the first related to surface gravity changes due to point displacements and the second due to finite faults, hence comprehending both the cases of far and near-field. The models indicates that

co-seismic gravity change readings are expected to be below few hundreds of microgal (from the scenario of 1964 Alaskan earthquake ($M_w=9.2$)), typically remaining in the order of few microgal in events such as the 1998 Mt Iwate Earthquake ($M_w=6.1$), which agrees with observations (Tanaka et al, 2001).

These results, however, may represent a challenge for current empirical research, once the magnitude of the measure in the order of few microgal, is close to the precision level of modern devices, as it will be detailed in this study.

Current state of technology

Four different technologies are considered in empirical research in surface gravity variations: mass-spring gravimeters, superconducting gravimeters, optical interferometry gravimeters and cold atoms gravimeters.

Mass-spring gravimeters measure the gravity acceleration using the amount of stretch in a spring due to the weight of a probe mass. Modern devices have the advantage of being portable and cheap compared to the other gravimeters. Superconducting gravimeters, on the other hand, use the equilibrium between a magnetically levitated superconducting sphere in the presence of a field produced by persistent currents from superconducting coils. Comparatively, the stability of the supercurrents act similarly to a perfectly stable spring (Goodkind, 1999), and the consequences are much higher precision and smaller drifts with superconducting gravimeters than with common spring gravimeters.

However, both devices are subject to instrumental drifts, requiring periodic calibration. Such drifts may bring questions about the model used for data correction (i.e. if drift was considered linear, exponential etc., and the adopted parameters) as well as the time between recalibrations. This is particularly critical for mass-spring gravimeters, due to the large values of its instrumental drifts, reaching up to miligals per month (as it will be detailed in Table I). It means that instrumental drifts reduce the *reliability* of the information, according to the definition:

Reliability (n.):

1. The ability of [something] to be trusted to work well or to behave in the way you want them to;
2. The likelihood of an information being correct

(Collins dictionary, 2014)

In optical interferometry and cold atoms gravimeters “the calibration is referenced to the wavelength of light used in the interferometers” (McGuirk, 2001), which, in turn, is locked to very stable atomic transitions, usually from Cesium or Rubidium. It implies that these devices do not have instrumental drifts, thence being referred *absolute gravimeters*. However, even without instrumental drifts, these devices may as well be susceptible to other types of influences (further described in Table I) that can also affect the *reliability* of gravity information. Optical interferometry gravimeters assess local gravity using the data of displacement over time from a free-falling corner cube in vacuum and obtaining the gravity acceleration of the cube. These displacements are precisely determined using a Mach-Zehnder optical interferometer, enabling commercial devices to reach microgal precision (Niebauer et al, 1995). Cold atoms gravimeters are still mainly objects of research, but recent comparisons have showed that they can achieve even higher precision than optical interferometry gravimeters in

the same integration time (Gillot et al, 2014). These latter operate using matter-wave interferometry of cold atom clouds, and many experimental setups possible, being the atomic fountain, which the cloud makes an upwards and free-fall movement, one of the most promising. Equipment such as the Rubidium atomic fountain gravimeter in development at the University of Aberdeen might soon reach the target accuracy of $1\mu\text{gal}$ or less (Wang, 2010).

The Table I, next, compares the precision (as given by manufacturers and researchers) and the factors that may negatively affect the reliability of the information produced by these four devices. The comparison indicates cold atoms gravimeters as a promising technology that may replace the use of optical interferometry gravimeters in future, due to its expected improved precision and progress in reducing factors affecting reliability. Relative gravimeters remain important, once superconducting gravimeters can reach the higher precision of the four, and mass-spring gravimeters are still more adequate for simple applications and development of gravity networks due to its low cost and portability.

Table I: Comparison between the four different technologies in surface gravimetry

		Relative Gravimeters		Absolute Gravimeters	
		Mass-Spring Gravimeter (reference device: gPhone)	Superconducting Gravimeter (reference device: iGrav)	Optical Interferometry Gravimeter (reference device: FG-5)	Cold Atoms Gravimeter (reference devices: LNE-SYRTE CAG and target for Aberdeen CAG (under development))
Precision	Precision ¹	Up to $1\mu\text{gal}$	Up to 1ngal (with a 1-2years integration time) $0.05\mu\text{gal}$ for 1 min averaging	$15\mu\text{gal}/\text{Hz}^{1/2}$ (reaches $1\mu\text{gal}$ in 4 min, $0.1\mu\text{gal}$ in 6 hours)	$1\mu\text{gal}$ in less than 100s, possibility of $0.2\mu\text{gal}$ in less than 2000s
	System noise	$< 6\mu\text{gal}/\text{Hz}^{1/2}$	$0.3\mu\text{gal}/\text{Hz}^{1/2}$		$< 3\mu\text{gal}/\text{Hz}^{1/2}$
	Agreement between gravimeters			$1 - 8\mu\text{gal}$	
Factors affecting reliability of the information	Drift ($\mu\text{gal}/\text{month}$)	300-1500	0.5	-	-
	External factors	Vibration, temperature, Weather	Vibration (causes offset), weather	Vibration ² , weather	Vibration ³ , weather
	Internal factors	Degradation of the spring system	Maintenance (especially cooling system and offsets)		Coriolis effect, laser aberrations ⁴

¹: As described by the manufacturers in the sources below

²: Superspring damping mechanism prevents most issues, undesired vibration may occur for high drop rates

³: Recent progress with active systems is designed to prevent vibration issues. The internal system is isolated from this problem

⁴: There is a work in progress to model Coriolis contribution over the cold atom cloud and in instrumentation to reduce aberrations.

Source: Systematized by the authors, using information from Micro-g LaCoste (2007), GWR Instruments (2009), Niebauer et al (1995), Wang (2010) and Gillot et al (2014).

Conclusion

Earthquake events pose a great threat to a considerable fraction of human society, due to the potential of these events in disrupting communities in a very short space of time, typically in the order of minutes. Three factors are comprised in this disruption: the direct risk that earthquakes present to the physical integrity of people, occasioning in a possible elevated number of injured and deaths during an event; the damage or destruction of the whole *system of objects* (Santos, 1998, p.90) that physically compose the space, effectively creating the disaster scenery; and the damage or destruction of the whole *system of actions* (*ibid.*, p.91) that may be previously related to the destroyed objects in terms of conferring them meaning

and functionalities which either ceased to be compatible with the new reality or should be drastically reinterpreted. It means that, within the space of few minutes, an earthquake event can create a disaster with long-lasting social, economic and health consequences and reach catastrophic levels, as exemplified by the 2010 Haitian earthquake and other events.

The risk analysis of earthquakes, however, is particularly delicate, once it has not yet been identified a completely reliable earthquake precursor which could be used to predict the occurrence of these events (International Commission on Earthquake Forecasting for Civil Protection [ICEF], 2011), and even the triggering mechanisms of earthquakes are still objects of research (Prejean and Hill, 2013). Therefore, the *technical environment* often makes use of probabilistic models based on the information provided by a set of different types of measurement - from minor seismic activities to underground Radon emissions. One of the types of measurement that have gained importance in the latter years is the monitoring of gravity anomalies, because it may indicate patterns of stress accumulation and crustal deformations which can also support the understanding of the triggering mechanisms.

Considering this, this study summarized some of the latest scientific and technological advances about the performance of four different technologies in gravity sensing used to analyze co-seismic events. We hope this contribution to be able support the *technical-operative community* in taking the best technical decisions in earthquake hazard monitoring for the near future.

Acknowledgements

A.V. thanks CAPES Foundation/Ministry of Education of Brazil for a scholarship during the course of this research (BEX5292/12-3).

Bibliography

- Barnes, D.F. (1966) - Gravity changes during the Alaska earthquake. *Journal of Geophysical Research*, 71(2), Malden (USA), p. 451-456.
- Gillot, P.; Francis, O.; Landragin, A.; Santos, F.P.; Merlet, S. (2014) - Stability comparison of two absolute gravimeters: optical versus atomic interferometers. *Metrologia*, 51(5), Sèvres (France) and Bristol (UK), L15-L17.
- Goodkind, J.M (1999) - The Superconducting Gravimeter. *Review of Scientific Instruments*, 70(11), Melville (USA), 4131-4152.
- GWR Instruments (2009) - *iGrav SG Meter: specifications brochure*. San Diego (USA), GWR Instruments, 4p.
- Imanishi, Y.; Sato, T.; Higashi, T.; Sun, W. and Okubo, S. (2004) - A Network of Superconducting Gravimeters Detects Submicrogal Co-Seismic Gravity Changes. *Science*, 306, Washington (USA), p. 476-478.
- International Commission on Earthquake Forecasting for Civil Protection [ICEF] (2011) - Operational Earthquake Forecasting: State of Knowledge and Guidelines for Utilization. *Annals of Geophysics*, 54(4), Bologna (Italy), p. 316-391.
- McGuirk, J.M. (2001) - *High Precision Absolute Gravity Gradiometry with Atom Interferometry*. Doctorate dissertation, Stanford (USA), University of Stanford, 168 p.
- Micro-g LaCoste (2007) - *gPhone Relative Gravity Meter: specifications brochure*. Lafayette (USA), Micro-g LaCoste, 3p.
- Niebauer, T.M.; Sasagawa, G.S.; Faller, J.E.; Hilt, R. and Klotting, F. (1995) - A new generation of absolute gravimeters. *Metrologia*, 32, Sèvres (France) and Bristol (UK), 159-180.

- Prejean, S.G. and Hill, D.P. (2013) - Where do we stand after twenty years of dynamic triggering studies?. *Proceedings of the American Geophysical Union Meetings*, 2013 AGU Fall Meeting, San Francisco (USA), p. S43 D-04.
- Reliability [Def.] (2014). *Collins English Dictionary*. Glasgow (UK), HarperCollins, 2340p.
- Santos, M. (1998) - *Técnica Espaço Tempo: globalização e meio técnico-científico informacional*. São Paulo (Brazil), Hucitec, 190 p.
- Sun, W. and Okubo, S. (1993) - Surface potential and gravity changes due to internal dislocations in a spherical earth: theory for a point dislocation. *Geophysical Journal International*, 114(3), Malden (USA), p. 569-592.
- Sun, W. and Okubo, S. (1998) - Surface potential and gravity changes due to internal dislocations in a spherical earth: application to a finite fault. *Geophysical Journal International*, 132, Malden (USA), p. 79-88.
- Tanaka, Y.; Okubo, S.; Machida, M.; Kimura, I. and Kosuge, T. (2001) - First Detection of Absolute Gravity Change Caused by Earthquake. *Geophysical Research Letters*, 28(15), Malden (USA), p. 2979-2981.
- Wang, C. (2010) - Nonintrusive Pipeline Inspection Using Quantum Technology. *NSRI-ICAN Scope Study: Maximising performance through intelligent condition monitoring and control*, Jul-Aug 2010 reports, Aberdeen (UK), p. 1-6.

O MAPA DE ESTADO AMBIENTAL EM ESCALA REGIONAL COMO SUBSÍDIO AO PLANEJAMENTO AMBIENTAL: O CASO DE TRÊS REGIÕES COSTEIRAS DO LITORAL BRASILEIRO

Raul Reis Amorim

Departamento de Geografia de Campos (GRC)
Universidade Federal Fluminense (UFF), Brasil
raul_reis@id.uff.br

Maria Crizalda Ferreira Santos

Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais (DCAA)
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Brasil
mcrizalda@ig.com.br

RESUMO

O mapeamento do Estado Ambiental representa um documento cartográfico de síntese que representa as diferentes categorias de Estado Ambiental, a intensidade dos efeitos e consequências das ações ambientais. O objetivo deste trabalho é a construção do Mapa de Estado Ambiental para três regiões litorâneas do território brasileiro: a Região Norte Fluminense que situa-se Estado do Rio de Janeiro, e as outras duas regiões, situam-se no Estado da Bahia: a Região Costa do Descobrimento e a Região Costa do Cacau. Para determinar o Estado Ambiental, construiu-se uma matriz, no qual, foi necessário a correlacionar os Geossistemas e os Sistemas Antrópicos de cada área de estudo. Para determinar o Estado Ambiental foi necessário fazer o somatório, no qual a partir do total, pode-se chegar as quatro categorias de Estado Ambiental: satisfatório; moderadamente satisfatório; insatisfatório; e esgotado.

Palavras-chave: Geossistemas; Sistemas Antrópicos; Estado Ambiental.

Introdução

A representação os fenômenos ambientais é bastante complexo, considerando que os aspectos naturais e sociais que compõem o ambiente apresentam inter-relações entre si, mas também mantém relações internas, entre os elementos constituintes dos referidos sistemas. Considera-se neste trabalho, que ambiente é produto das relações sistêmicas que ocorrem entre os Geossistemas, definido por Sotchiava (1977) e os Sistemas Antrópicos conforme o trabalho de Perez Filho (2007), sendo assim, é importante ressaltar que o Estado Ambiental é uma medida qualitativa-quantitativa conforme o trabalho de Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2004).

O Mapa de Estado Ambiental representa o resultado do grau de degradação ambiental na qual se encontram as unidades geoecológicas naturais. A representação cartográfica é feita com base na sua ocupação e seus impactos ambientais; as ações de modificação e transformação dos atributos das unidades ambientais que manifestaram-se na dinâmica dos processos naturais q nelas acontecem, refletindo os efeitos e consequências ambientais em cada unidade geoambiental das ações que experimentaram pela sua ocupação.

Tendo o exposto, o objetivo deste trabalho é apresentar a metodologia de construção do Estado Ambiental em escala regional (1:250.000). A determinação e a Cartografia do Estado Ambiental manifestam a situação ambiental dos Sistemas Ambientais representando um valioso instrumento para propor as formas para as quais deverão ser direcionados futuramente os processos de ocupação.

Os pressupostos para a delimitação do Mapa de Estado Ambiental: os Geossistemas e os Sistemas Antrópicos

Para construção do Mapa de Estado Ambiental, é necessário a correlação de dois mapas temáticos: o Mapa de Geossistemas e o Mapa de Sistemas Antrópicos para gerar o Mapa de Sistemas Ambientais, para no qual cada unidade mapeada se determinará o Estado Ambiental. Para a construção do **Mapa de Geossistemas** que tem como objetivo- este mapa teve a determinação, classificação e cartografia das unidades naturais da paisagem. Com o uso do software Arc GIS 10.2, delimitou-se os diferentes Geossistemas para as três regiões em estudo: Região Norte Fluminense, situada no Estado do Rio de Janeiro, e as Regiões Costa do Cacaú e Costa do Descobrimento, situadas no Estado da Bahia. Para delimitar os Geossistemas na escala 1:250.000 correlacionou-se os seguintes atributos físicos da paisagem: litologia, relevo, solos, vegetação, clima, além de aspectos morfométricos, como desníveis altimétricos e declividade. A nomenclatura de cada Geossistema se deu correlacionando as Formas de Relevo Predominantes somados aos processos pedogenéticos atuantes, o tipo climático e a cobertura vegetal natural. Tal mapa possibilitou compreender a dinâmica dos processos naturais, e identificar as áreas com fragilidade ambiental a inundações, processos erosivos e a movimentos de massa.

O **Mapa de Sistemas Antrópicos** apresenta a espacialização de Sistemas Antrópicos, que para facilitar sua interpretação, foram compartimentados em subsistemas. Para a sua confecção foi necessário além de trabalho de campo, a realização de uma pesquisa documental que possibilitou a dinâmica de uso e ocupação de cada Sistema Antrópico, facilitando a compreensão da estrutura e das consequências da ocupação de cada uma das regiões em estudo.

Por fim, o **Mapa de Sistemas Ambientais** foi construído com a sobreposição dos mapas de Geossistemas (representado em cores) e o Mapa de Sistemas Antrópicos (representado em hachura). Sua leitura possibilita visualizar a dinâmica de uso e ocupação dos Sistemas Ambientais em cada uma das unidades, e desta forma possibilitar determinar o Estado Ambiental.

A Construção do Mapa de Estado Ambiental

O Mapa de Estado Ambiental representa a situação ambiental de cada Sistema Ambiental, caracterizada pela presença de uma determinada combinação de processos de degradação (problemas ambientais). Essa situação ambiental determina a conservação ou perda da capacidade produtiva, de resiliência e autorregulação da unidade geoambiental (RODRIGUEZ, SILVA E CAVALCANTE, 2004).

Ao uso dos softwares dos Sistemas de Informações Geográficas facilitam a realização de operações como a álgebra de mapas e mesmo o somatório de índices atribuídos a diferentes variáveis, que aplicando o método analógico seria trabalhoso.

Para a construção do Mapa de Estado Ambiental adotando uma concepção sistêmica, será necessário seguir alguns passos: a construção do Mapa de Geossistemas Naturais; a delimitação dos Sistemas Antrópicos. Para cada Geossistema e Sistema Antrópico será atribuído as ações de impacto ambiental. Também é atribuído a cada um dos efeitos e consequências do impactos um índice que determinará a sua intensidade, sendo que cada um deles caracterizou-se por 4 (quatro) graus de intensidade, nos quais se colocaram pontos (*não se apresentam- 0; leve-1; médio- 2; forte- 3*).

Para determinar o grau do Estado Ambiental determinado para cada uma das unidades mapeadas, definiu-se uma escala dividida em quatro graus de estado, em dependência da somatória, dos valores atribuídos, dos efeitos e consequências ambientais: Satisfatório (0 a 4 pontos), moderadamente Satisfatório (5 a 7), insatisfatório (7 a 11) e esgotado (mais de 12). Cada um desses

graus de estado caracteriza-se por uma situação característica de estrutura e funcionamento, determinada pela conservação ou não de suas capacidades de funcionar e evoluir.

Como exemplo, apresentamos parte do Mapa de Estado Ambiental da Região Norte Fluminense-RJ. Reiteramos que por se tratar de um Resumo Alargado, apresentar os três mapas elaborados não são objetivos deste trabalho.

Geossistemas	Sistemas Antrópicos	Ações e Impacto Ambiental						Efeitos e Consequências ambientais														Estado Ambiental
		M	L	OUC	ONC	APP	D	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Colinas com Mata Atlântica no Clima Tropical Litorâneo úmido	Subsistema agrícola temporário				X	X	3	3	2	1	0	0	3	3	2	1	3	0	0	0	24	Esgotado
	Subsistema de formação florestal					X	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	5	Moderadamente Instável	
	Subsistema pastoril				X	X	3	3	3	2	0	0	3	2	0	0	3	0	0	1	26	Esgotado
	Subsistema urbano de alta densidade		X	X	X	X	2	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	1	35	Esgotado
	Subsistema urbano de média densidade		X		X	X	X	2	0	0	3	3	2	3	3	3	2	3	2	3	1	30

Legenda:

ACÇÕES DE IMPACTO AMBIENTAL

M - Mineração

L - Lixo

OUC - Ocupação Urbana Consolidada

ONC - Ocupação Não Consolidada

APP- Artificialização Parcial da Paisagem

D - Desamatamento

EFEITOS E CONSEQUENCIAS AMBIENTAIS

1. Desencadeamento de processos erosivos
2. Degradação da Vegetação e perda da Biodiversidade
3. Compactação do Solo por uso agrícola
4. Impermeabilização do solo

5. Contaminação da área por efluentes
6. Perda de caráter público do espaço
7. Fragmentação dos ecossistemas
8. Alteração da drenagem: interrupção do escoamento, mudança dos canais de circulação das águas, inundações e alagações
9. Poluição
10. Resíduos Sólidos (lixo)
11. Perda da Qualidade Visual
12. Perda do Patrimônio e da identidade cultural da paisagem
13. Carência de infraestrutura urbana
14. Queimadas

Figura 1 - Exemplo de Mapa de Estado Ambiental(recorte da Região Norte Fluminense-RJ).

O *estado Satisfatório* caracteriza as unidades geoecológicas, que apresentam poucos processos de degradação, os quais estão em estado pouco avançado. Assim as feições conservam, em geral, sua capacidade produtiva e sua capacidade de funcionar sistematicamente, desta forma conserva-se a estrutura original. Não existem problemas ambientais significativos que deteriore a paisagem. O nível dos processos geoecológicos tem um caráter natural. A influência antropogênica é muito pequena. São núcleos de estabilidade ecológica, principalmente paisagens primárias ou paisagens naturais, com limitado uso antropogênico;

O *estado moderadamente Satisfatório* caracteriza as feições que já experimentam alguns processos (2 ou 5) de grau leve ou médio. Ainda conservam refletem poucas mudanças na estrutura. Incidem alguns problemas de intensidade leve a moderada, que não alteram o potencial natural e a integridade dos Geossistemas. Constituem áreas que são desenvolvidas e utilizadas pelo homem, de tal forma, que o uso da terra está balanceado com o potencial e pode ser sustentado por várias gerações. Essas áreas necessitam de uma manutenção de baixo custo e um cuidado para assegurar que continue a sustentabilidade.

O estado *insatisfatório* abrange aquelas feições que já avançaram no estado de ocupação e que tem desarticulados os mecanismos, os fundamentais, as estruturas sistêmicas e o funcionamento. Tais mudanças da estrutura espacial e funcional, de tal maneira que não conseguem cumprir as funções ecológicas, pois parte dos Geossistemas, mesmo assim, conserva a integridade. A incidência de alguns problemas ambientais resultantes da sobre-exploração dos recursos dá lugar a um declínio na produtividade, que provavelmente se perca no curso de uma geração. Praticamente cumprem, com muita

Vários processos ambientais já avançaram fortemente e tem uma intensidade *média ou forte*. Além de processos de caráter areal, relacionados com o desmatamento e a substituição da cobertura vegetal, apresentam-se outros processos de caráter mais pontual.

O estado *esgotado* é característico pela perda e alteração generalizada da estrutura espacial e funcional. Os Geossistemas não estão em condições de cumprir as funções geoecológicas. Experimentam a atividade de um número significativo de problemas ambientais de intensidade muito forte. O potencial inicial de recursos foi completamente destruído. Não são áreas adequadas para o uso humano. A população necessita ser realocada, o que implica enormes custos.

Conclusão

A metodologia proposta se mostrou eficiente, o que refletiu-se na espacialização do Estado Ambiental de três diferentes regiões do litoral brasileiro. A Região Costa do Descobrimento e a Região Costa do Cacau sofrem a ação antrópica desde o século XVI, quando ocorreu a ocupação portuguesa, e se instalou os ciclos econômicos de extração do pau-brasil e do plantio de cana-de-açúcar. Já a partir do final do século XIX, a lavoura cacaueira instala-se em praticamente todo o Sul da Bahia, desencadeando transformações nos modos de uso e ocupação das Unidades de Paisagem. Com a crise na lavoura cacaueira na década de 1980, a porção Extremo Sul da Bahia, onde está inserida a Região Costa do Descobrimento, passa por transformações que levam a expansão da silvicultura de eucalipto voltada para a produção de celulose e o estabelecimento desta área como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Já na Região Costa do Cacau, houve a necessidade de diversificar as atividades econômicas, em decorrência da crise da lavoura cacaueira, e assim, dinamizou-se a economia com a inserção de novas atividades econômicas como a indústria e o turismo. A Região Norte Fluminense, que até meados

da década de 1970 tinha como principal atividade econômica a lavoura canavieira, deve com a descoberta da Bacia de Campos, grandes jazidas de hidrocarbonetos de petróleo, o que modificou todo os fluxos de matéria e energia desta região, com o crescimento urbano, implantação da indústria petrolífera e, a instalação de grandes empreendimentos como a Petrobrás, e recentemente, em meados do anos 2000, a implantação em andamento de grandes projetos de engenharia, como o Complexo Industrial Super-Porto do Açú, e o Complexo Barra do Furado.

Bibliografia

- Perez Filho, A. (2007) Sistemas Naturais e Geografia. In: SILVA, J. B.; LIMA, L. C.; ELIAS, D. (org.). **Panorama da Geografia Brasileira**. São Paulo: Annablume. v. 01, p. 333-336.
- Rodriguez, J. M. M.; Silva, e. D.; Cavalcanti, A. P. B. (2004) **Geoecologia da paisagem: uma visão geossistêmica da análise ambiental**. Fortaleza: EDUFC.
- Sochava, V. B. (1977). O Estudo de Geossistemas. **Métodos em questão**, 16. IG-USP. São Paulo.

UM MODELO ESPACIAL BASEADO EM MÉTODO DE CLASSIFICAÇÃO FUZZY, APLICADO AO MAPEAMENTO DE RISCO À EROSÃO.

Marcos César Ferreira

¹Instituto de Geociências, UNICAMP, Brasil
macferre@ige.unicamp.br

Danilo Trovó Garófalo

²Doutorando, Instituto de Geociências, UNICAMP, Brasil

Cassiano Messias

²Doutorando, Instituto de Geociências, UNICAMP, Brasil

Marta Marujo Ferreira

³Instituto de Ciências da Natureza, UNIFAL-MG, Brasil

ABSTRACT

The aim of this paper is to present a spatial decision model based on logistic regression, fuzzy classification and GIS-based techniques, applied to erosion risk mapping. The spatial database was composed by following maps: NDVI vegetation index (1); terrain slope calculated from ASTER-GDEM2 (2); structural lineaments density (3); road density (4) and a map of 729 gullies sites surveyed in the study area (5), obtained by Google images visual analysis and field trip. The values of maps 1 to 4 were classified in 10 classes using the quantil method. Total of gullies occurring in each class was calculated using overlay between one each of the maps 1 to 4, and the map 5. Odd ratios (OR) values indicating the chances in favor of a gully event in relation to the chances against it, in each class map, were estimated using logistic regression. Then, OR curves were converted in fuzzy values using membership functions (Mf). The erosion risk in each pixel was estimated using the weighted sum of the following fuzzified variables: vegetation index, terrain slope, road density and structural lineaments density.

Keywords: Fuzzy classification, GIS, risk map, gullies, logistic regression

Palavras Chave: classificação fuzzy, SIG, mapa de riscos, ravinas, regressão logística

Introdução

A maioria dos algoritmos de classificação de dados disponíveis em sistemas de informação geográfica (SIG) utilizam regras de decisão booleanas para definição dos limites das classes do mapa. Estas regras convencionais baseiam-se apenas em duas possibilidades de classificação dos dados mapeados: pertencer ou não pertencer a uma determinada classe do mapa. Contudo, a maioria das variáveis ambientais perde muito do seu detalhamento e de sua complexidade natural quando mapeada de acordo com a lógica de decisão booleana. Este problema se amplifica em processos de modelagem ambiental, em que, dados de mapas temáticos e imagens orbitais são combinados com objetivo de dar suporte a um processo decisório de atribuição de áreas a uma determinada classe de risco.

Uma das alternativas para minimização destes problemas é a utilização de um método de classificação contínua. Nos processos de decisão contínua, cada valor de uma variável ambiental tem maior afinidade a pertencer a uma classe A e menor afinidade a pertencer a uma classe B ou C do mesmo mapa, e, assim por diante, para todas as n classes do deste mapa. No processo classificatório fuzzy a afinidade de um valor a uma classe específica é estimada por meio de uma função de afinidade em relação a uma determinada classe.

A função de afinidade $f_A(x)$ associa um número real entre 0,0 e 1,0 a cada pixel x do mapa e indica a possibilidade de este x pertencer a classe A. A lógica utilizada neste tipo método de

classificação é conhecida como lógica fuzzy (Zadeh, 1965; Burrough, 1989; Burrough et al., 1992; Wang and Hall, 1996). Na lógica fuzzy os limites espaciais entre duas ou mais classes de um mapa são representados por zonas transicionais. Os valores de uma variável são distribuídos continuamente no mapa e representados por uma legenda com valores reais que variam entre 0,0 e 1,0.

Outro desafio comum à modelagem de riscos é a determinação dos pesos a serem atribuídos às variáveis ambientais envolvidas no modelo. De maneira geral, os pesos são escolhidos por meio de processos hierárquicos subjetivos baseados no senso comum, ou através de métodos de regressão linear baseados na relação entre uma variável de resposta X e um regressor Y. No entanto, na modelagem de risco, o regressor é uma variável binária ou dicotômica (ocorrência, Y = 1; não-ocorrência Y = 0). Neste caso, onde os valores de uma das variáveis são presença ou ausência de um fenômeno, o método de regressão logística é mais apropriado que o método de regressão linear (Panik, 2009). O objetivo geral deste trabalho é propor um modelo de decisão espacial baseado em regressão logística, lógica fuzzy e técnicas de SIG, aplicado ao mapeamento de áreas de risco à erosão em áreas montanhosas tropicais. Como objetivo específico, propomos a desenvolver um procedimento para atribuição de pesos a variáveis ambientais utilizadas em modelos de risco. Esta pesquisa foi desenvolvida na área de proteção ambiental (APA) Fernão Dias, localizada na Serra da Mantiqueira, sul do estado de Minas Gerais, Brasil (Figura 1).

Figure 1 - Localização da Área de Proteção Ambiental Fernão Dias, no sul do estado de Minas Gerais, Brasil (Fonte: Garófalo et al., 2012).

Material e Métodos

Uma base de dados composta por quatro mapas raster de variáveis ambientais que influenciam a erosão em áreas tropicais foi utilizada para desenvolvimento deste modelo. Estes mapas são os seguintes: índice de vegetação NDVI (VI); declividade do terreno (SL); densidade de lineamentos estruturais (LD) e densidade de estradas (RD). Os dados utilizados para o mapa VI foram gerados a partir de imagens Landsat TM5 de 21 de abril de 2011, nas bandas espectrais do vermelho e infra vermelho próximo. A imagem do índice de vegetação foi obtida pelo algoritmo NDVI, disponível no ENVI 4.8, e, posteriormente exportada para o SIG ArcGIS 10 (ESRI, 2010) no formato raster. O mapa SL foi produzido a partir de dados altimétricos do sensor ASTER GDEM2, processados no módulo de análise espacial do ArcGIS 10. Os mapas LD e RD foram produzidos a partir de interpretação de cartas topográficas 1:50.000 que cobrem a área de

estudo. Em seguida, estes foram exportados como arquivos vetoriais para o ArcGIS 10 e transformados, por meio do algoritmo Kernel, em mapas de densidade.

Os valores dos pixels dos mapas VI, SL, LD e RD foram agrupados em 10 classes por meio do método de classificação quantil. Este procedimento foi utilizado para minimizar o efeito das diferenças entre os tamanhos das áreas das classes dos mapas. Além dos mapas das quatro variáveis ambientais já citadas, um quinto mapa, contendo 729 pontos correspondentes ao centróide das linhas de ravinas (Garófalo et al., 2012), foi adicionado a base de dados. Este mapa foi obtido por meio de análise visual de imagens de alta resolução da plataforma Google Earth.

A relação entre a ocorrência de ravinas e os valores das variáveis ambientais da base de dados foi estimada por meio de operações de overlay entre o mapa de pontos das ravinas e cada um dos mapas VI, LD, SD e RD classificados. Assim, foi calculado o número de ravinas que ocorreram em cada uma das 10 classes dos mapas das variáveis ambientais. Em seguida foi calculado os valores do odd ratio (OR), que indicam a chance em favor da ocorrência de um evento de ravina (p_i) em relação a chance contra a ocorrência de um evento de ravina ($1-p_i$), conforme a Equação 1:

$$OR = \frac{p_i}{1 - p_i} \quad (1)$$

Os valores OR foram plotados em relação aos valores do ponto médio de cada uma das 10 classes dos mapas VI, LD, SD e RD. Em seguida, os valores originais destes mapas foram transformados em valores fuzzy, utilizando-se as seguintes funções de afinidade (Mf): mapa VI - função sigmoideal decrescente; mapa RD - função linear crescente; mapa LD - função triangular; mapa SL - função Gaussiana. O risco de erosão no pixel i (R_i) foi calculado por meio de um modelo baseado na soma ponderada dos valores fuzzificados dos mapas VI, SL, LD e RD no pixel i , de acordo com a Equação 2:

$$R_i = r_{OR-SL} \cdot SL_i + r_{OR-RD} \cdot RD_i + r_{OR-LD} \cdot LD_i + r_{OR-VI} \cdot VI_i \quad (2)$$

onde, r_{OR-LD} , r_{OR-RD} , r_{OR-VI} são, respectivamente, os coeficientes de regressão logística entre OR e os valores originais dos mapas SL, LD, RD e VI; SL_i , LD_i , RD_i and VI_i são, respectivamente, os valores fuzzificados de SL, SD, RD e IV no pixel i .

Resultados e Discussão

A Figura 2 mostra, como exemplo, o diagrama relacionando os valores de OR (a chance em favor de um evento de ravina em relação à chance contrária a ele), em função do valor do centro médio das classes do mapa de índice de vegetação. A Figura 3 mostra o mapa de risco à ravinamento na APA Fernão Dias, gerado por meio de operação espacial baseada em álgebra de mapas, de acordo com a Equação 2.

Figura 2 - Diagrama representando a distribuição dos valores de OR em relação ao centro médio das classes do mapa de IV.

Figura 3 - Mapa de risco à ocorrência de ravinas na APA Fernão Dias - MG, calculado a partir do modelo representado pela Equação 2.

Conclusões

A metodologia proposta neste artigo apresenta soluções para minimizar problemas associados à atribuição de pesos espaciais a variáveis utilizadas na identificação de áreas sob risco de erosão, e também, ao mapeamento destas áreas. A primeira solução refere-se a estimativa do peso de cada mapa temático envolvido no risco à erosão. Para estimar estes pesos utilizamos valores do coeficiente de regressão logística calculados entre a variável dicotômica (presença ou ausência

de ravinas) e os valores dos mapas das variáveis ambientais que contribuem para a ocorrência de ravinas. Como estes coeficientes foram calculados a partir de dados reais obtidos de mapeamento de ravinas existentes no terreno, os valores dos pesos atribuídos aos mapas foram mais precisos que aqueles utilizados em procedimentos convencionais subjetivos.

A segunda solução apresentada neste artigo baseia-se no uso da lógica de decisão fuzzy para atribuir a cada pixel a um determinado grau de risco à erosão. Neste caso, funções de afinidade foram atribuídas individualmente a cada variável ambiental, de acordo com curvas de dependência logística entre a chance de ocorrência de ravinas e os valores dos pixels dos mapas de índice de vegetação, densidade de estradas, densidade de lineamentos estruturais e declividade do terreno. Este procedimento permitiu um ajuste mais realista entre os valores dos pixels dos mapas e sua associação a um grau de risco de erosão.

Baseado na variabilidade dos valores de OR estimados entre a ocorrência/não ocorrência de ravinas e os valores dos mapas ambientais, no território da APA Fernão Dias, observamos que estas variáveis ambientais responderam diferentemente em relação a ocorrência de ravinas. A chance de ocorrer ravina foi muito elevada em áreas com baixo índice de vegetação (OR=0.788 em VI=0.24), e muito baixa em áreas com alto índice de vegetação (OR=0.001 at VI=0.75). No caso da densidade de estradas a dependência foi inversa, isto é, baixa chance de ocorrência de ravinas em áreas com baixa densidade de estradas (OR=0.043 em RD=0.40 km/km²) e alta chance em áreas com alta densidade de estradas (OR=0.169 em RD=2.71 km/km²). As demais variáveis - densidade de lineamentos estruturais e declividade do terreno mostraram, em relação às anteriores, relativamente menor influência na chance de ocorrência de ravinas. Em síntese, os graus de associação entre as variáveis ambientais estudadas e a chance de ocorrer ravinas podem assim ser ordenados: VI ($R^2 = 0,8958$); RD ($R^2 = 0,6573$); LD ($R^2 = 0,225$); SL ($R^2 = 0,072$).

A menor influência da declividade do terreno na ocorrência de ravinas se deu, principalmente, pelo fato de as áreas mais declivosas estarem protegidas legalmente dentro da APA, com restrição ao uso agropecuário e cobertas com remanescentes florestais, correspondendo a altos valores de IV. As áreas com topografia mais plana, por outro lado, encontram-se ocupadas com maior densidade de atividades agropecuárias e urbanas.

O modelo espacial aqui apresentado deve ser utilizado sob determinadas condições específicas. Os valores dos pesos e a equação de cálculo do risco são intrínsecos às características físico-geográficas de cada área a ser mapeada, e podem variar a depender das configurações geomorfológica, geológica e de uso e cobertura do solo da região. A maior eficiência do uso deste modelo está em condições em que o pesquisador deseja identificar locais que estarão sob risco futuro de ravinamento, com base em evidências já observadas em outros locais da mesma área de estudo. Portanto, o modelo utiliza a associação entre a ocorrência do fenômeno e a estrutura espacial observada e confirmada a priori, para simular e mapear, a posteriori, estas mesmas relações em outras locais da mesma área. Este modelo é adequado também ao mapeamento de riscos em áreas onde não haja a disponibilidade de mapas pedológicos ou geológicos em escalas médias a grandes.

Apoio Financeiro - FAPESP e CAPES.

Bibliografia

- Burrough, P.A. Fuzzy mathematical methods for soil survey and land evaluation. *Journal of Soil Science* 40: 477-492, 1989.
- Burrough, P. A.; MacMillan, R. A., and van Deursen, W. 1992. Fuzzy classification methods for determining land suitability from soil profile observations and topography. *Journal of Soil Science* 43: 193-210.
- ESRI - ArcGIS 10.0. ESRI, Redlands, California, USA, 2010.
- Garófalo, D. F. T.; Ferreira, M. C.; Ferreira, M. F. M.; Messias, C. G. - Mapeamento da densidade de processos erosivos e de movimentos de massa, a partir de imagens Google Earth georreferenciadas, utilizando o estimador kernel: uma aplicação na APA Fernão Dias (MG). *Anais do IX Simpósio Nacional de Geomorfologia*, Rio de Janeiro, 2012.
- Panik, M. - *Regression modeling: methods, theory and computation with SAS*. CRC Press, Boca Raton, FL, USA, 2009.
- Zadeh, L.A. (1965) - Fuzzy sets. *Information control*, 8:338-353.
- Wang, F.; Hall, G.B. - Fuzzy representation of geographical boundaries in GIS. *International Journal of Geographical Information Systems*, 10(5):573-590, 1996.

ASSESSMENT OF SAND DUNES MOVEMENTS RATE IN ATLANTIC SAHARA DESERT USING MULTI-TEMPORAL LANDSAT IMAGERY AND GIS TECHNIQUE

Ali Aydda

Department of Geology, Faculty of Sciences of the University of Cadi Ayyad, Marrakesh, Morocco
ayddaali@gmail.com

Ahmed Algouti

Department of Geology, Faculty of Sciences of the University of Cadi Ayyad, Marrakesh, Morocco
ahmedalgouti@gmail.com

ABSTRACT

The main goal of this paper is to determine the movement rate of barchans dunes in Atlantic Sahara desert (SW of Morocco) using remote sensing and Geographic Information System (GIS) techniques. Two Panchromatic Landsat band (15 m of resolution) covering the study area for one year were used to get up this subject. Firstly, both bands were being processed in term of geometric and radiometric corrections. The automated extraction of dunes shape using co-occurrence measurement is the second step of this work. After extraction, a classification using Support Vector Machine (SVM) algorithm is the next step. A vectorization of classified dunes is final step which is necessary to export it in GIS platform to assess the movement rate. The results show that the annual movement rate of dunes varies from 15 m to 90 m according to the dunes size.

Keywords: Movement rate of dunes; Panchromatic Landsat band; classification; automated extraction; GIS.

Introduction

Sand encroachment is one of the most common and serious environmental problems in Atlantic Sahara desert (SW of Morocco) by which all fields, cultivation areas, national road, and cities, are threatened. In this area, the massive aeolian erosion due to the extreme aridity is a major factor responsible for sand dunes dynamics. The mostly dunes forms exist in this area are barchans, are in crescent-shaped propagating under limited supply of sand and in roughly unidirectional winds (Wasson and Hyde, 1983; Cooke et al., 1993) (Figure 1.C). A monthly and annual tracking of the barchans dynamics was necessary to assess its movement rate to fight it. In our study area, the movement rate of barchans was performed at a single-dune scale and was based on coupling of GPS measurements and aerial photos (Elbelrhiti, 2011). The assessment of sand dunes movement rate by manual tracing on digital aerial photos and field investigation is an intensive work. Several recent studies have been shown that the use of remote sensing data is the best way to tracking sand dunes dynamics (Vermeesch and Drake, 2008; Hesse, 2009; Necsoiu et al., 2009; Bullard et al., 2011; Mohamed and Verstraeten, 2012).

The present work, we propose a new method based on coupling of multi-temporal remote sensing data and GIS techniques to evaluate movement rate of barchans in Atlantic Sahara desert.

Materials and Methodology

Study area

The study area is a part of central corridor of dunes of Atlantic Sahara desert (SW of Morocco) (Figure 1.A and B). From a climatic point of view, this region is a part of the Boreal domain of

maritime trade winds, where precipitation is less than potential evapotranspiration (Selouane, 2008). This wind is one of the most regular winds in the world (Elbelrhiti et al., 2005). According to Oulehri (1992) and Selouane (2008), the prevailing wind is mostly from the NNE with a yearly speed ranges from 4.5 to 8 m/s. The surface of this area is dominated by flat layering of hard rocks at the surface (Moghrebien Sandstone-Limestone Slab). This flagstone is overlain by movable sand on barchans form (Figure 1.C).

Data sets

In this study, two free panchromatic bands from Landsat satellite imagery (Operational Land Imager (OLI) sensor) covering the study area were used to assessing the annual movement rate of barchans dunes in this region. Table I lists the source of each image including date of capture and spatial resolution.

Table I: Multi-temporal images used for this study.

Satellite	Date	Band used	Band resolution (m)
Landsat OLI	24.04.2013	Panchromatic	15
Landsat OLI	04.04.2014	Panchromatic	15

Figure 1. The location map of study area.

Methodology

The practical aspects implemented in this study involve several steps as shown in Figure 2. The methodology will be started by processing of both panchromatic bands in term of geometric and radiometric corrections. For geometric correction, both images were transformed to a common projected coordinate system WGS84 UTM zone 28N. In addition, the radiometric correction procedures account to equalizing the brightness of all bands for that the interactive stretching and histogram matching were applied. The automated extraction of dunes shape using co-occurrence measurement is the second step of this work. The co-occurrence measurement tool product eight bands following three groups: contrast group (contrast, homogeneity and dissimilarity), Orderliness group (angular second moment and entropy) and Statistics group (mean, variance and correlation). In this work, we mask the contrast group bands to extract the dunes form. After extraction, a classification step was necessary for

differencing sand dunes from the hard rock that outcrop in surface. This classification was achieved by using Support Vector Machine (SVM) algorithm. A vectorization of classified data is final step which be necessary to export the dunes in GIS platform to assess its movement rate.

Figure 2. Methodology flow chart.

Results

The accuracy assessment for both dunes maps was made with an error matrix and was undertaken with the representative sites. The global accuracy was computed as well as the user's accuracy and the producer's accuracy for sand dunes and hard rock. The results obtained from the application of confusion matrix to classified data show that both classes are better classified, with high overall prediction accuracy and low rates of both commission and omission errors (Table II). Figure 3 show the superposition of both classified dunes maps.

In this research, the movement rate of selected barchans is between 15 m and 90 m per annum. This parameter is in relationship with the dunes size. Bagnold (1941) confirms that the movement rate of barchans decrease with its size. Figure 4 confirm this relation where the coefficient of determination (R^2) is in order of 0.93. According to Elbelrhiti 2011, the small barchans (1 m of height) are moved by 100 m per annum whereas the big barchans (7 m of height) are displaced by 25 m. The comparison of this research with our results confirm the potentiality of using the remote sensing and GIS techniques in assessment the movement rate of sand dunes.

Table II. Error matrix of SVM classification for both scenes

Date		1	2	User Accuracy (%)	Producer Accuracy (%)	Overall Accuracy (%)	Kappa coefficient (%)
24.04.2013	1.Sand dunes	85.8	3.7	84.62	85.83	94.29	0.82
	2. Hard rock	14.2	96.3	96.62	96.3		
04.04.2014	1.Sand dunes	87.9	2.39	89.71	87.93	95.75	0.86
	2. Hard rock	12.1	97.6	97.15	97.61

Figure 3. Superposition of two classified dunes maps.

Figure 4. Relation between barchans size and its movement rate.

Conclusion

The assessment of barchans movement rate in Atlantic Sahara desert is the subject of this research. This work presents a new method based on using remote sensing and GIS techniques. The results of this study confirm the importance of using this new method in assessment of sand dunes movement rate.

Bibliography

- Bagnold, R. A. (1941) - *The physics of blown sand and desert dunes*. London, Chapman and Hall, 265 p.
- Bullard, J. E., White, K., & Livingstone, I. (2011) - Morphometric analysis of aeolian bedforms in the Namib Sand Sea using ASTER data. *Earth Surface Processes and Landforms*, 36, p. 1534-1549.

- Cooke, R., Warren, A., Goudie, A. (1993) - *Desert Geomorphology*. London, UCL Press, 526 p.
- Elbelrhiti H, Claudin P, Andreotti B. (2005) - Field evidence for surface-wave-induced instability of sand dunes. *Nature*, 437, p. 720-723.
- Elbelrhiti, H. (2011) - Suivi morphodynamique des barkhanes par couplage télédétection et mesures GPS. Application au Sud-Ouest du Maroc. *Revue Télédétection*, vol 11, p. 32-42.
- Hesse, R. (2009) - Using remote sensing to quantify aeolian transport and estimate the age of the terminal dune field Dunas Pampa Blanca in southern Peru. *Quaternary Research*, 71, p. 426-436.
- Mohamed I.N.L., Verstraeten, G. (2012) - Analyzing dune dynamics at the dune-field scale based on multi-temporal analysis of Landsat-TM images. *Remote Sensing of Environment*, 119, p. 105-117.
- Necsoiu, M., Leprince, S., Donald, M., Cynthia, L., McGinnis, N., Walter, R. (2009) - Monitoring migration rates of an active subarctic dune field using optical imagery. *Remote Sensing of Environment*, 113, p. 2441-2447.
- Oulehri, T. (1992) - *Etude géodynamique des migrations de sable éoliens dans la région de Laâyoune (Nord du Sahara marocain)*. Thèse de Doctorat, Université Paris 6, France.
- Selouane, K. (2008) - *Etude géomorphologique et de la dynamique morpho-sédimentaire actuelle du Sahara Atlantique face à la vulnérabilité des aménagements entre l'Oued Draâ et Lagwira*. Thèse de Doctorat de l'Ecole des Mines de Paris, France, 437 p.
- Vermeesch, P., & Drake, N. (2008) - Remotely sensed dune celerity and sand flux measurements of the world's fastest barchans (Bodele, Chad). *Geophysical Research Letters*, 35.
- Wasson, R.J., Hyde, R. (1983) - Factors determining desert dunes type. *Nature*, 304, p. 337-339.

VULNERABILIDADE URBANA A DESLIZAMENTOS DE TERRA EM SÃO PAULO

Letícia Palazzi Perez

Escola Politécnica da USP
leticia.palazzi@gmail.com leticia.palazzi@usp.br

José Rodolfo Scarati Martins

Escola Politécnica da USP
scarati@usp.br

Magda Adelaide Lombardo

Instituto de Geociências e Ciências Exatas, UNESP, Rio Claro, Brasil
lombardo@rc.unesp.br

RESUMO

O município de São Paulo é o a maior do Brasil, possui 1.500 km² de área, com praticamente 80% do solo impermeabilizado, e população de aproximadamente 12 milhões de habitantes (IBGE, 2011). A urbanização desordenada e a ocupação irregular de topos de morro e outras áreas de necessária preservação, tornam comuns as ocorrências de deslizamentos de terra, principalmente nas áreas mais carentes da cidade. Com base na análise de dados pluviométricos de 23 postos da rede telemétrica de pluviômetros de superfície do Departamento de Águas e Energia Elétrica, foram selecionados 7 eventos extremos de chuva em São Paulo. Para estas datas, foram coletadas as ocorrências de deslizamentos de terra.

Levando em consideração que deslizamentos de terra são eventos hidrológicos, relacionados à precipitação, e que a vulnerabilidade a deslizamentos pode ser georreferenciada, este trabalho apresenta o uso de ferramentas de engenharia e geotecnologias, para mensurar a vulnerabilidade urbana a deslizamentos de terra em São Paulo. Como resultado são apresentados mapas de vulnerabilidade urbana a deslizamentos, além da distribuição espacial destas ocorrências, associada a localização de habitação irregular, bem como a distribuição espacial da vulnerabilidade, associada ao Plano de Habitação Social de São Paulo.

Palavras-chave: vulnerabilidade urbana, geoprocessamento, deslizamento de terra.

Introdução

As notícias de deslizamentos de terra na cidade de São Paulo, Brasil, nos períodos mais chuvosos do ano, já são corriqueiras. Os deslizamentos de terra trazem risco de morte, além de prejuízos econômicos para a população e para o poder público.

Os anos de negligência do poder público ao planejamento de habitação de interesse social refletem, hoje, em um grande número de pessoas vivendo em áreas de risco ambiental, em várzeas, vertentes ou topos de morro, carentes de infraestrutura urbana.

As causas dos deslizamentos de terra são diversas desde ocupação de áreas de preservação, regularizadas ou não, habitações precárias e outros fatores como o aumento da impermeabilização acima do previsto.

A chuva é o principal condicionante dos deslizamentos de terra, objeto deste estudo, pois trata-se de movimentos de porções de um terreno, agravados pela presença de água.

Assim, tomando-se o registro de ocorrências de deslizamentos de terra mapeadas pela Defesa Civil da Prefeitura de São Paulo, para sete eventos extremos de precipitação, pode-se, a partir do georrefenciamento semi-automático (Perez, 2013), desenvolver uma análise espacial destas ocorrências em concomitância com o registro dos eventos pluviométricos, com o intuito de compreender sua relação com a frequência destes eventos.

O objetivo deste trabalho é gerar um índice para mensurar a vulnerabilidade urbana de São Paulo a deslizamentos de terra, em função de eventos extremos de precipitação, com o apoio de geotecnologias, como subsídio à gestão urbana. Serão apresentados, como resultados, mapas de vulnerabilidade à ocorrência de deslizamentos de terra e sua relação com o mapeamento de assentamentos irregulares e o mapa de metas de intervenção da Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Paulo, a fim de compreender como a distribuição espacial dos deslizamentos de terra está relacionada com o uso e ocupação do solo urbano.

Materiais e métodos

Para os sete eventos de precipitação selecionados, eventos extremos de chuva em São Paulo. São estes eventos: 23 maio de 2005, 07 fevereiro de 2007, 18 dezembro de 2007, 06 setembro de 2009, 07 dezembro de 2009, 20 janeiro de 2010 e 10 janeiro de 2011, foi calculada a média de precipitação por mesobacias hidrográfica em São Paulo, com base em matrizes de precipitação, criadas pela junção de informações do radar meteorológico de São Paulo e os dados da rede telemétrica de pluviômetros de superfície, do DAEE, com dados de precipitação a cada 10 minutos (Rocha, 2012), gentilmente cedidos pela FCTH. Com a precipitação média por bacia, foram calculados os períodos de retorno (TR) das chuvas, para 6, 12, 24 horas, para cada bacia, utilizando as equações do DAEE (DAEE, 1999), e 48 horas, utilizando as equações do PDMAT 3 (DAEE, 2012), com o intuito de entender quais volumes de precipitação e consequentes TRs, seriam capazes de causar deslizamentos de terra.

De acordo com as correlações entre ocorrências de deslizamentos de terra e precipitação acumulada por período de retorno, foi possível verificar grande correlação entre chuvas “comuns”, ou seja, de curtos períodos de retorno, e as ocorrências. Assim, foram criadas classes de vulnerabilidade urbana das bacias para os TRs de 2, 5 e 10 anos, para cada período acumulado de chuva, de 6, 12, 24 e 48 horas, e as bacias foram classificadas, conforme Tabela I.

Tabela I - Classificação da vulnerabilidade a alagamentos.

Ocorrências de Deslizamentos de Terra DC	Vulnerabilidade
até 1	baixa vulnerabilidade
1 a 6	média vulnerabilidade
6 a 12	alta vulnerabilidade
mais de 12	muito alta vulnerabilidade

Fonte: Elaborada por Perez, 2013.

Resultados e discussão

Um primeiro resultado mostra, conforme mapa 1, a distribuição espacial das ocorrências de deslizamento de terra e os polígonos de habitação irregular e/ou favelas em São Paulo. A análise espacial mostra que 48% das ocorrências de deslizamento de terra se deram a até 100 metros de assentamentos precários e 82% das ocorrências de deslizamento de terra se deram a até 300 metros de assentamentos precários mapeados pela Habitação.

O segundo resultado apresenta o mapeamento da vulnerabilidade urbana a deslizamentos de terra, em função da precipitação, por período de retorno e precipitação acumulada, conforme figura 1.

As bacias mais vulneráveis são aquelas com maior concentração de áreas de habitação irregular e/ou favelas.

Figura 1 - Mapas de vulnerabilidade a deslizamentos de terra.

Mapa 1 e Mapa 2

Por fim, o cruzamento do mapeamento da vulnerabilidade urbana a deslizamentos de terra com o mapeamento do Plano Municipal de Habitação (PMH) de São Paulo, mapa 2, mostra que as bacias mais vulneráveis são as mesmas com maior número de projetos de regularização e melhoria de infra estrutura urbana dentro do PMH.

Conclusão

O uso de tecnologia de última geração, como imagens geradas a partir de dados da rede telemétrica de pluviômetros de superfície e imagens de radar, técnicas de geoprocessamento, programação, e análises estatísticas permitiram construir um índice de vulnerabilidade urbana a eventos extremos de chuva, frente a ocorrência de deslizamentos de terra. Os mapas de vulnerabilidade das bacias, comprovam que foi possível a construção de um instrumento eficiente.

Este instrumento, que é o próprio índice de vulnerabilidade, permitiu a classificação das bacias por faixas de vulnerabilidade para a confecção dos mapas, sendo possível comprovar que os desastres estão relacionados à precipitação, e que os mesmos ocorrem, em áreas urbanas, por questões claras de conflito de uso do solo.

A falta de fiscalização por parte do poder público, em relação à ocupação irregular, bem como a permissiva especulação imobiliária são um problema a ser enfrentado.

Bibliografia

- DAEE. Equações de chuvas intensas do Estado de São Paulo. Edição Revisada, São Paulo, Outubro de 1999. Convênio Departamento de Águas e Energia Elétrica e Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
- DAEE. Relatórios do Plano Diretor de Macrodrenagem do Alto Tietê (PDMAT 3), São Paulo, 2012.
- EMPLASA - Mapeamento GEGRAM. 1974.
- HABI-SP - SECRETARIA DE HABITAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Plano Municipal de Habitação, PMH. Disponível em <www.habisp.inf.br> Acesso em agosto de 2013.
- PEREZ, L.P. - Índice de vulnerabilidade urbana a alagamentos e deslizamentos de terra, em função de eventos extremos de clima, na Região Metropolitana de São Paulo: uma proposta de método. Tese de Doutorado. FFLCH - USP. São Paulo, 2013. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Dados Abertos. Acesso em maio/2014.
- <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/dados_abertos/>
- ROCHA FILHO, K.; CONDE, F.; ANDRIOLI, C.P. Correção em tempo real da precipitação estimada por um radar meteorológico com uma rede de superfície. XX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, Bento Gonçalves, Brasil. Nov 201

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIONES MEDIANTE TECNOLOGÍA DE GEO-PROCESAMIENTO RASTER Y VECTORIAL

María Isabel Andrade

Centro de Investigaciones Geográficas (CIG). IDIHCS. Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación.
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Argentina
miandrade1911@gmail.com

David Schomwandt

Centro de Investigaciones Geográficas (CIG). IDIHCS. Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación.
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Argentina
schomwandt@gmail.com

Nora Lucioni

Centro de Investigaciones Geográficas (CIG). IDIHCS. Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación.
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Argentina
noraclucioni@gmail.com

RESUMEN

El trabajo pretende exponer los primeros resultados obtenidos mediante una propuesta metodológica basada en las nuevas tecnologías de geo-procesamiento, la metodología comprende técnicas de teledetección y análisis multitemporal de tipo raster y vectorial. Los resultados bajo el análisis multivariado, fueron interpretados de acuerdo a la perspectiva de la Teoría Social del Riesgo.

El área de investigación es parte del escenario de extrema fragilidad de la llanura pampeana, gran parte de la misma ha sido sometida históricamente a eventos hidrológicos extremos, tanto de déficit como de excedentes hídricos.

Se ha logrado obtener una primera aproximación, en la caracterización y evaluación de las relaciones entre los procesos naturales y sociales que derivan de los procesos de anegabilidad. Como principal resultado se obtuvieron criterios para la evaluación de riesgo de inundación en el Gran La Plata, Región Pampeana, Argentina.

Parte de las conclusiones arribadas consideran que las modificaciones al medio natural se han llevado a cabo bajo un plan de ordenamiento territorial inadecuado. El manejo del ambiente se pone en evidencia en la salud de la población, en su calidad de vida, en los costos económicos para el mantenimiento de la cantidad y la calidad del agua para consumo y para la producción, en los costos sanitarios, económicos y sociales de la población involucrada y del Estado para hacer frente a las consecuencias de las emergencias hídricas.

Palabras Clave: riesgo hídrico, vulnerabilidad, incertidumbre, SIG, sensores remotos

Introducción

El área de estudio comprende el aglomerado de Gran La Plata, integrado por los Partidos de Berisso, Ensenada y La Plata, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina (Figura 1).

El marco de análisis de este trabajo, consiste en el tratamiento de las inundaciones desde la Teoría Social del Riesgo, según la cual se estudian los riesgos a determinados eventos “catastróficos” desde el reconocimiento que el abordaje realizado por la ciencia “normal” es insuficiente para el tratamiento de estas temáticas. Entendemos por ciencia “normal” aquella que responde al paradigma vigente. La visión reduccionista que ésta aplica deja afuera problemas importantes y/o manipula técnica o cuantitativamente variables de difícil cuantificación, como por ejemplo la incertidumbre (Funtowicz, 1994). La existencia de problemas ambientales reales, concretos, que afectan a una población real y concreta, suponen la búsqueda de herramientas metodológicas en un nuevo estilo de actividad científica que tenga en cuenta que lo “normal” puede ser la incertidumbre y la impredecibilidad.

La recurrencia del fenómeno de inundación en el área de estudio, no se debe sólo a causas naturales, sino también a factores antrópicos. Entre los factores naturales más relevantes se destacan: el régimen de precipitaciones, topografía del terreno plana, de muy bajo gradiente de pendiente y suelos hidromorfos de muy baja permeabilidad. Entre los factores antrópicos, pueden citarse: las modificaciones en el drenaje natural, con la consecuente pérdida en la capacidad de captar y almacenar agua de lluvia de los suelos por deterioro físico; el diseño de una infraestructura vial, que condiciona la acumulación y movimiento del agua en superficie; y la construcción de canales de manera anárquica, sin un criterio integral sobre el funcionamiento hidrológico regional.

Figura 1 - Mapa de Ubicación

Metodología

Las investigaciones más recientes que consideran a la cartografía del riesgo como herramienta en el análisis de la vulnerabilidad, se han centrado en definir, cuantificar y analizar la población expuesta a amenazas de índole ambientales (Andrade, 2009). La metodología que se expone en este trabajo pretende alcanzar la expresión cartográfica como herramienta útil en la valoración y gestión del riesgo al establecer una zonificación con la ayuda de la combinación de mapas de niveles de peligrosidad, vulnerabilidad y exposición. La línea de investigación que persigue en este trabajo considera a los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en combinación con la teledetección, una herramienta fundamental al momento de desarrollar modelos de exposición y vulnerabilidad en el área de estudio.

La construcción de una cartografía preliminar de riesgo de inundación del Gran La Plata fue a partir del tratamiento de sus componentes básicos:

- Peligrosidad es el potencial de peligro inherente a los fenómenos naturales que puede agudizarse por acciones humanas. En este trabajo se identifica la peligrosidad teniendo en

cuenta la red hidrográfica superficial, la altimetría del área, los usos de suelos y las obras de infraestructura que afectan el escurrimiento.

- **Exposición:** hace referencia a la distribución territorial de las personas y bienes que pueden verse afectados ante un evento catastrófico. La exposición precisa la interrelación entre peligrosidad y vulnerabilidad. Su construcción se elabora mediante la interpretación cartográfica y teledetección de usos de suelo y población afectada, para identificar áreas críticas.
- **Vulnerabilidad:** es la capacidad de hacer frente a un evento catastrófico. Se haya condicionada por la situación socioeconómica previa a la ocurrencia del evento.

Materiales y Métodos

El trabajo se apoyó en información fotogramétrica proveniente del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Un producto fue el Modelo Digital de Terreno (MDT) de resolución espacial de 7 metros, a partir de este se obtuvo el modelo de dirección del flujo (flow direction) basado en la metodología descrita por Jenson et al (1988). El segundo producto provisto por el IGN fue un mosaico fotogramétrico, en color natural e infrarrojo, de 0,40 metros de resolución espacial. Este último sirvió como base para la construcción en detalle del entramado urbano ajustado por captura de puntos GPS en terreno. Una vez registrada la información vectorial se extrajeron los valores de altura del MDT y los valores de dirección de flujo, ambos coincidentes con las intersecciones de los ejes calles. De esta manera se excluyó la topografía edilicia, las alturas asociadas al proceso de verticalización de la ciudad y sólo se concentró en los valores de cotas del trazado vial urbano. Con ello se obtuvieron las variaciones topográficas y las direcciones de flujo de la totalidad del entramado urbano del Gran La Plata.

En este trabajo se han procesado los datos provenientes del último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) con la finalidad de obtener una caracterización socioeconómica de la población con riesgo de inundación.

Resultados

En función de este abordaje técnico se construyó la cartografía preliminar de riesgo de inundación del Gran La Plata, que considera las características topográficas, la geomorfología y de una manera indirecta los factores hidrodinámicos, en esa misma línea también se considera el riesgo que combina el nivel de agua y las velocidades. De esta manera las áreas con riesgo de inundación que fueron clasificadas como “Muy Alto” riesgo de inundación, reúne el criterio de áreas de menor cota relativa, asociadas a cauces y planicies de inundación actualmente urbanizadas o en proceso de estarlo (Figura 2). Un punto más, considerado en la generación de cartografía de riesgo, fue el lapso de tiempo en el cual se mantuvo anegada una porción de la superficie del terreno, esta consideración involucra una serie de factores como es el caso de las características topográficas, que a su vez derivan en la esorrentía o dirección de flujo.

A fin de tener una aproximación del lapso de tiempo de las áreas anegadas, se utilizó teledetección como método indirecto. La imagen Landsat 8 del día 13 de abril de 2013 capturada 11 días posteriores al fenómeno de inundación en Gran La Plata sirvió como indicador de áreas anegadas.

Figura 2 - Mapa de Riesgo de Inundación, Gran La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina

Mediante la interpretación cartográfica y teledetección de usos de suelo y el procesamiento de los datos demográficos se procedió a calcular la población afectada por las áreas críticas de riesgo de inundación identificadas principalmente como “Alto” y “Muy alto” en el Gran La Plata (Tabla I).

Tabla I. Población afectada por las áreas calculadas con alto riesgo de inundación

PARTIDO	% Población	% Hogares	% Hogares con NBI*	%Población Desocupada	Riesgo
BERISSO	22,49	21,29	37,63	24,50	Muy alto
ENSENADA	21,23	20,53	21,02	22,77	Muy alto
LA PLATA	7,16	7,03	4,87	7,41	Muy alto
PARTIDO	% Población	% Hogares	% Hogares con NBI*	%Población Desocupada	Riesgo
BERISSO	2,70	3,06	1,91	2,38	Alto
ENSENADA	0,24	0,24	0,25	0,18	Alto
LA PLATA	11,06	10,73	9,53	11,11	alto

*NBI: necesidades básicas insatisfechas

Tal como se visualiza en la Tabla, la misma arroja que un alto porcentaje de la población con elevados porcentajes de NBI y concentrados en las periferias de los núcleos urbanos son susceptibles de ser afectados ante eventos extremos. Por otra parte, según investigaciones anteriores, al efectuarse la superposición entre las zonas Inundables y la Densidad de la Mancha Urbana, se determinó que en el casco fundacional, donde se encuentra la mayor heterogeneidad de densidad, se observan las zonas en donde predominan las áreas caracterizadas con valores de alto riesgo (Andrade et al, 2012).

Conclusión

La metodología aportó información sobre la modificación del sistema de drenaje natural debido al proceso de la urbanización, esto a su vez derivó en una primera aproximación de la cartografía en detalle de las áreas de riesgo de inundación en el Gran La Plata.

Se prevé en un futuro, la realización del análisis de las relaciones existentes entre los cambios producidos por el proceso de urbanización sobre la cuenca y la ocurrencia de los eventos de inundación a fin de cuantificar las áreas expuestas a ser anegadas o inundadas. En este sentido, se pretende realizar modelos predictivos para evaluar el riesgo hídrico en base a datos de percepción remota, estudios multitemporales y complementados con trabajo de campo de los sectores de peligrosidad natural ocupados por la expansión urbana en la actualidad y considerando las posibles expansiones urbanas en un futuro cercano.

Un aporte que esta investigación pretende llegar hacer a futuro es colaborar con la cartografía de gestión de emergencias, la misma es de fuerte carácter aplicativo por cuanto que su finalidad es la utilización en los procesos operativos de intervención ante la ocurrencia de desastres naturales.

Bibliografía

- Andrade, M. I. (2009) "Aplicación de la TD en la obtención de datos para mitigar la incertidumbre en el riesgo hídrico. Fenómenos de inundaciones y sequías en Buenos Aires, Argentina". En: Teledetección. Agua y Desarrollo Sostenible. Editores: Salomón Montesinos Aranda y Lara Fernández Fornos. ISBN 978-84-613-4257-0. Calatayud. Septiembre de 2009.
- Andrade, M.I., Lucioni, N. e Iezzi, L. (2012) "Factores de riesgo de inundaciones en el Gran La Plata, Argentina". En: IX Jornadas Nacionales de Geografía Física. Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, del 19 al 21 de abril de 2012. 14-24 pp. ISBN 978-987-1648-32-0
- INDEC (2010) Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Datos definitivos a nivel de radios censales. Argentina.
- Jenson S. K., J. O. Domínguez. (1988) "Extracting Topographic Structure from Digital Elevation Data for Geographic Information System Analysis". En: Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. Vol. 54, N° 11, november 1988, pp. 1593-1600.
- Funtowicz, S. (1994) "Epistemología política. Ciencia con la gente". En: Serie Documentos e Informes de Investigación N° 187, Mayo 1994, FLACSO, Buenos Aires, Argentina.

FIRE HAZARD AND SUSCEPTIBILITY TO DESERTIFICATION: A TERRITORIAL APPROACH IN NE PORTUGAL

Tomás de Figueiredo

CIMO - Mountain Research Centre, Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal
tomasfig@ipb.pt

Felícia Fonseca

CIMO - Mountain Research Centre, Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal
ffonseca@ipb.pt

Helena Pinheiro

CIMO - Mountain Research Centre, Câmara Municipal de Bragança, Portugal
helena.pinheiro@cm-braganca.pt

ABSTRACT

Continental Portugal endures an increase in desertification susceptibility, a process accelerated by soil degradation and wildfires. This work aims at discussing outcomes of a research, at territorial scale, on fire hazard relations with soil degradation and desertification susceptibility in NE Portugal, specifically in Bragança District, based on GIS desertification susceptibility fire hazard, land cover and soil degradation maps. High and very high fire hazard prevails in near 2/3 of the territory and around 3/4 are susceptible to desertification, falling in the semi-arid and dry sub-humid climatic domains; about 20% of the former fall in the semi-arid. In around 3/4 of the area with high/very high fire hazard soils depict severe or worse degradation status, and in around 40% they are covered by scrublands, where fuel stock is high and social control is negligible. This negative picture asks for measures towards effective soil protection, a key resource for territorial sustainability.

Keywords: Desertification susceptibility, soil degradation, fire hazard, NE Portugal

Introduction

Recent assessments showed that desertification susceptibility, increased in Continental Portugal when comparing 1960-1990 with 2000-2010 aridity index (PANCD, 2011). In NE Portugal, specifically in the Bragança District, the border of the susceptible belt moved west. For long considered spared from desertification processes due to its geographical position and climatic conditions, the North Portugal region depicts now a considerable extent of susceptible areas, and most of which in the Bragança District.

Besides climatic drivers, desertification is coupled with soil degradation and wildfires are a direct cause for accelerating both processes. A soil degradation map of NE Portugal has been recently presented and points out the wide distribution and extent of the degraded areas in this region (Figueiredo et al., 2014). This should be a matter of concern, especially considering that a significant part of the territory shows an over-exploitation of its soil resources, due to inadequate land use (Figueiredo, 2013). Apart from cartographic approaches, soil degradation is observed in burnt areas and soil experiments were carried out and are ongoing, in order to have a quantitative insight on the problem (Fonseca et al., 2011; Figueiredo et al., 2013).

A map-based approach, at territorial scale, allowed a quantitative insight on fire hazard relations with soil degradation and desertification in NE Portugal and this work aims at discussing the main outcomes of the research.

Available information and data treatment

The study area corresponds to the Bragança District, an administrative unit that assembles 12 municipalities in the NE corner of Continental Portugal, covering an area of around 6600 km². In the Portuguese Northern Region, this is the area with larger extent of areas affected by high susceptibility to desertification.

For the study area, the data bases were treated with GIS tools included the published maps of desertification susceptibility, 2000-2010 (PANCD, 2011), fire hazard (provided by Bragança Municipality) and land cover, COS2007, level 2 (free access online). The map of soil degradation status and risk, developed by the authors for NE Portugal, was also included in this work (Figueiredo et al., 2014). In each case, information is displayed in classes defined in the respective source. Furthermore, the administrative map allowed a more detailed analysis of these data, at municipality level. Data treatment consisted in basic frequency analysis of categorical information.

Land degradation in Bragança District: a general picture

The general picture of Bragança District in what concerns each one of the variables (or land attributes) considered in this study is presented in Figure 1. Fire hazard is high and very high in 62% of the area while around 1/4 corresponds to low and very low fire hazard. Bragança District is susceptible to desertification in as much as 3/4 of the area, for which the dry sub-humid and the semi-arid climatic domains contribute with 53% and 20%, respectively. Only 31% of Bragança District is not or moderately affected by soil degradation, mainly caused by runoff erosion, while a similar area is under high soil degradation risk. Soils in degraded status cover 38% of the area, the extreme class occurring in 5%. Agricultural land, comprising annual crops, permanent crops, and grazing areas, covers about 1/4 of the territory. At the level of detail provided by the available data, land cover categories as forests and scrubland are not precisely discriminated. However, they show the importance of these categories and it can be noted that personal knowledge of the territory and assessments performed elsewhere in NE Portugal indicate more than 30% cover by scrubland (CIMO, 2009).

Figure 1 - Surface area distribution (%) of Fire Hazard (a), Aridity Index (b), Soil Degradation status and risk (c) and Land Cover (d) classes in the studied territory.

Land degradation in Bragança District: coupling threats

In order to have a better insight on threats to land resources in Bragança District, the attributes analyzed above were coupled with fire hazard and the global results are depicted in Figure 2.

Figure 2 - Surface area distribution (%) of Aridity Index (a), Soil Degradation status and risk (b) and Land Cover (c), by Fire hazard class, and surface area (km²) of classes of those attributes with high and very high Fire hazard (d), in the studied territory.

High and very high fire hazard may occur in the 3 climatic domains defined by the Aridity Index. Even though semi-arid areas are proportionally more important under high and very high fire hazard, when compared with moderate to lower fire hazard classes, data suggest no clear association between these 2 attributes, meaning that fire hazard is a widespread threat in this territory, not specifically assigned to climatic domains defining desertification susceptibility (Figure 2a). On the contrary, a clear association exists between fire hazard and soil degradation (Figure 2b), meaning an increased threat to land tracts already enduring severe or extreme soil degradation, therefore requiring increased need for soil protection. The clearly higher extent of scrubland areas under high and very high fire hazard, when compared to moderate and lower hazard conditions (35% against 10% of the respective class area), indicates that the potential hazard is more likely to turn real damage in the former than in the latter (Figure 2c). In fact, scrublands, normally associated to remote marginal area or abandoned territory, represent an important fuel stock without the necessary social control to prevent fire occurrence. Figure 2d is intended to explicit the actual extent of the most threatened areas in Bragança District, showing that under high and very high fire hazard near

2700km² are also under desertification threat, near 2400km² are covered by degraded soils and more than 1000km² are scrublands.

The most threatened areas in Bragança District

Soils at extreme degradation status under very high fire hazard can be taken as examples of the most critical threats to land resources in Bragança District. Considering desertification susceptibility is driven by climatic constraints but it is also coupled with soil degradation processes, those critical conditions have wider consequences if occurring in semi-arid climatic regime and this is the picture represented in Figure 3.

Figure 3 - The most threatened areas in Bragança District: Municipalities' classified by Desertification Susceptibility (a); areas (km²) affected by Extreme Soil Degradation under Very High Fire Hazard in each Desertification Susceptibility class (b).

In earlier work (Figueiredo et al., 2014), the authors classified the Municipalities of Bragança District according to their susceptibility, considering the relative importance of the areas assigned to each aridity index class (Figure 3a). Five Municipalities qualify as semi-arid, yet split in two groups according to the relative importance of dry sub-humid areas, and six qualify as dry sub-humid, again split in two groups according to the relative extent of wet sub-humid and humid areas; the remainder Municipality qualifies as humid. Figure 3b shows that from a total of 380 km² of very much threatened land, 134 fall in the semi-arid and 191 in the dry sub-humid domains. These could be taken target areas for soil recovery initiatives, and the required efforts on such initiative could modulated according the results depicted.

Conclusion

Results presented describe a territory under several threats to land resources distributed over wide areas. Fire hazard adds to soil degradation risk as far as land cover is prone to fire (as it is the case of the largely represented scrublands), and the recovery of burnt areas is much constrained in drier conditions where desertification susceptibility is high. Besides change trends in land use, not explored in the paper, but that seemingly add negative elements to the picture drawn, these results ask for a deeper insight on measures able to tackle with and reverse process trends in the long term. In fact, territorial policy instruments and actions urge

in these circumstances, and they should be focused on land use planning and soil management practices towards effective soil protection, a key resource for territorial sustainability.

Bibliography

- CIMO (2009) - Novos Sistemas para os Espaços de Montanha - Projeto Transversal do CIMO. Centro de Investigação de Montanha, Bragança.
- Figueiredo, T. de (2013) - *Uma Panorâmica sobre os Recursos Pedológicos do Nordeste Transmontano*. Série Estudos 84. IPB, Bragança. 47 p.
- Figueiredo, T. de, Fonseca, F. & Nunes, L. F. (2014) - Os solos e a suscetibilidade à desertificação no NE de Portugal. In: Figueiredo, T. de, Fonseca, F. & Nunes, L. F. (Eds) *Proteção do Solo e Combate à Desertificação: oportunidade para as regiões transfronteiriças*. ESA/IPB, Bragança. p. 81-95 (in press)
- Figueiredo, T. de, Fonseca, F. & Queiroz, A. (2013) - Efeitos do Fogo na Erosão do Solo em áreas de Matos: Resultados de um ano de ensaio no Parque Natural de Montesinho. In: A. Bento Gonçalves & A. Vieira (Eds.) *Grandes Incêndios Florestais, Erosão, Degradação e Medidas de Recuperação dos Solos*, Universidade do Minho, Guimarães. p. 267-277.
- Fonseca, F., Leite, M. & Figueiredo, T. de (2011) - Soil properties in burned and unburned Mediterranean shrublands of Montesinho Natural Park, Northeast Portugal. In: Gonçalves, A. B. & Vieira, A. (Eds.) *Fire effects on soil properties*, NIGP-Univ. Minho and GEGOT, p. 144-147.
- PANCD (2011) - *Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação, Revisão 2010/2011*. Ponto Focal Nacional da Comissão das Nações Unidas de Combate à Desertificação, Lisboa.

USO DE SENSORES REMOTOS COM DIFERENTES RESOLUÇÕES ESPECTRAIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DAS TERRAS DE ÁREAS COM RISCO À INUNDAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE ITALVA E CARDOSO MOREIRA, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Claudio Henrique Reis

Departamento de Geografia de Campos, Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional,
Universidade Federal Fluminense (UFF) - Brasil
claudioreis@id.uff.br

Raul Reis Amorim

Departamento de Geografia de Campos, Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional,
Universidade Federal Fluminense (UFF) - Brasil
raul_reis@id.uff.br

RESUMO

O objetivo deste trabalho é verificar a eficácia no uso de sensores remotos distintos no mapeamento do uso e ocupação das terras para a área total dos municípios de Cardoso Moreira e Italva, e para as áreas sujeitas à inundações de ambas as localidades situadas no baixo curso da Bacia Hidrográfica do Rio Muriaé no Estado do Rio de Janeiro. Para atender ao objetivo proposto, utilizou-se o sensor Deimos para o mapeamento dos municípios em sua totalidade e o sensor Rapdeye para as áreas de inundação. Verificou-se que a proposta obteve o êxito esperado, uma vez que, o uso de ambos os sensores possibilitaram distinguir com exatidão as diferentes classes de uso e ocupação das terras. Tais documentos cartográficos são fundamentais para os órgãos públicos e para a Defesa Civil na prevenção e mitigação dos efeitos decoerentes das inundações tanto nas áreas urbanas como rurais das áreas es estudo.

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto; Uso e Ocupação das Terras; Inundações

Introdução

O mapeamento do uso e ocupação das terras das áreas sujeitas à inundações é importante para que o poder público e a sociedade civil tenham conhecimento de que população, empreendimentos agrícolas, urbanos e industriais estão sujeitos à inundações nos períodos de precipitação extrema. Os municípios de Cardoso Moreira e Italva, situados nas Regiões Norte e Noroeste Fluminense, respectivamente (Rio de Janeiro-Brasil) situam-se no baixo curso da Bacia Hidrográfica do Rio Muriaé. Tendo o exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia de diferentes sensores remotos no mapeamento do uso e ocupação das terras dos municípios de Cardoso Moreira e Italva, situados no baixo curso da Bacia Hidrográfica do Rio Muriaé, Rio de Janeiro (Brasil). Justifica-se a escolha da área de estudo, pois a mesma é sujeita a inundações periódicas que geralmente ocorrem entre os meses de novembro e março, período de maior incidência de chuvas na Bacia Hidrográfica, e o mapeamento do uso e ocupação das terras utilizando-se de um sensor de média resolução espacial para a área total do municípios, e de um sensor de alta resolução espacial para às áreas sujeitas à inundações, principalmente às áreas urbanas, torna-se uma ferramenta eficaz para a atuação da defesa civil de ambos os municípios na mitigação dos efeitos das inundações.

Material e Métodos

Para atender ao objetivo proposto, foi necessário atender seguir os seguintes pocedimentos: 1) Delimitação da área de estudo: delimitou-se a área de estudo, os municípios de Cardoso Moreira

e Italva, drenados pela Bacia Hidrográfica do Rio Muriaé; 2) Delimitação das áreas sujeitas à inundação: definiu-se as áreas sujeitas à inundação a partir da elaboração do Modelo Digital de Elevação (DEM) a partir da interpolação de pontos extraídos de ortofotos utilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na elaboração das Cartas Topográficas do Estado do Rio de Janeiro na escala 1:25.000. Com o uso do software Arc GIS 10.2, utilizou-se o interpolador “Topo to Raster”, método de interpolação desenvolvido especificamente para criar DEM hidrologicamente corretos. Além do uso do DEM, também realizou-se trabalhos de campo com os técnicos da Defesa Civil, portando um DGPS da marca Trimble GeoExplore 2800, afim de coletar pontos georreferenciados das principais áreas sujeitas à inundações; 3) Seleção dos sensores remotos utilizados para o mapeamento de uso e ocupação das terras nas diferentes escalas: para o mapeamento da área total dos municípios, utilizou-se o sensor Deimos, que apresenta resolução espectral de 22x22m por pixel, adquiridas pela Universidade Federal Fluminense, através de financiamento de pesquisa da Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ), e para o mapeamento das áreas urbanas e áreas sujeitas à inundação, adotou-se o sensor RapidEye, com resolução espectral de 5x5m por pixel, disponíveis de forma gratuita na Plataforma Geocatálogo do Ministério do Meio Ambiente (MMA); 4) Processamento das Imagens: As imagens foram processadas no software Spring versão 2.6, no qual foi necessário cumprir as seguintes etapas: (a) realce de imagens; (b) segmentação; (c) indicação das amostras na definição das classes; (d) classificação da imagem pelo método bhattacharya. 5) Vetorização das classes para gerar o mapa de uso e ocupação das terras; (5) Organização das classes de uso e ocupação das terras em das categorias: totalidade dos municípios e para a área de inundação e organização do Layout dos mapas no software Arc GIS 10.2.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

O Rio Muriaé a um dos principais afluentes do Rio Paraíba do Sul, e os municípios de Cardoso Moreira e Italva estão situados no baixo curso, e sua planície atinge cota altimétrica nestes municípios inferiores a 40m, o que faz com que esta seja uma área preferencial de inundação, e identificar o tipo de uso e ocupação das terras inundáveis pode mitigar efeitos das inundações tanto para a população do campo como das cidades (Prado *et al*, 2005).

O mapeamento de uso e ocupação das terras para a área total dos municípios de Cardoso Moreira e Italva comprovou que ambos apresentam similaridades no que refere-se ao uso e ocupação das terras: em ambos do municípios, conforme a Tabela 01, acima de 60% de suas áreas são ocupadas por pastagens, e seguidas por manchas de Mata Secundária (que em ambos os municípios são inferiores a 20%) e de Mata Ciliar, que abarca aproximadamente 15% em cada município (Figura 01A e Figura 02A).

Tabela I - Área classes de uso e ocupação das terras dos municípios de Cardoso Moreira e Italva, no ano de 2012.

CLASSES	Cardoso Moreira		Italva	
	área (km ²)	(%)	área (km ²)	(%)
Mata Ciliar	83	15,8	40	13,6
Mata Secundária	84	16,0	50	17,0
Pastagem	320	61,0	200	68,0
Cultura	23	4,4	1,2	0,4
Área Urbana	2	0,4	2,5	0,9
Área Não Classificada	13	2,4	0,3	0,1
Área Total	525	100	294	100

Fonte: Imagens DEIMOS (maio/2012).

Já nas áreas sujeitas à inundação (Figura 01B e Figura 02B), conforme a Tabela 02, o município de Cardoso Moreira apresenta maior área inundável, cerca de 120 km², o que corresponde a 23% da área total do município são áreas sujeitas à inundações. Cerca de 50% das áreas sujeitas à inundação do município de Cardoso Moreira correspondem ao uso de Pastagens. A área urbana de Cardoso Moreira abrange apenas 0,4% da área total do município (Tabela 01), e 1,3% da área sujeita à inundação (Tabela 02). Mesmo apresentando uma área tão pequena, a área urbana de Cardoso Moreira nos episódios de inundação, são atingidas em 80%. Além da área urbana, 78% das áreas de culturas e 40% das áreas de mata ciliar estão nas áreas inundáveis.

Tabela II - Área classes de uso e ocupação das terras das áreas de inundação dos municípios de Cardoso Moreira e Italva, no ano de 2012.

CLASSES	Cardoso Moreira		Italva	
	área (km ²)	(%)	área (km ²)	(%)
Mata Ciliar	34	28,4	4,7	33,0
Mata Secundária	8	6,6	1,2	8,1
Pastagem	57	48,0	6,2	44,0
Cultura	18	15,0	0,7	5,0
Área Urbana	1,6	1,3	1,3	9,2
Área Não Classificada	1	0,7	0,1	0,7
Área Total	119,4	100	14,2	100

Fonte: Imagens RAPIDEYE (maio/2012)

A configuração do relevo do município de Italva, faz com que apenas 5% da área total do município sejam sujeitas à inundações. No município de Italva, além da planície Fluvial do Rio

Figura 01 - A) Mapa de uso e ocupação das terras do município de Cardoso Moreira-RJ; B) Mapa de uso e ocupação das terras das áreas sujeitas à inundações do município de Cardoso Moreira-RJ.

Elaboração: Claudio Henrique Reis e Raul Reis Amorim

Muriaé, o modelado é composto predominantemente por baixas colinas e morros com declividades superiores a 25% (Prado *et al*, 2005).

O tipo de uso que mais sofre com as inundações são as áreas de pastagens (44%) e seguida das áreas de Mata Ciliar (33%) do total de áreas inundáveis. No que refere-se a cidade de Italva, 53% de sua área são inundáveis. Vale ressaltar que o tanto Cardoso Moreira quanto Italva apresentam áreas urbanas inferiores a 3% do total da área de seus municípios, e que em ambos, acima de 70% de sua população moram na área urbana, os episódios de inundações afetam grande parte da população.

Figura 02 - A) Mapa de uso e ocupação das terras do município de Italva-RJ; B) Mapa de uso e ocupação das terras das áreas sujeitas à inundações do município de Italva-RJ.

Elaboração: Claudio Henrique Reis e Raul Reis Amorim

Conclusão

Os episódios de inundações nos municípios de Cardoso Moreira e Italva ocasionam problemas tanto na área rural como na área urbana. Na área rural a inundações das áreas de pastagens e culturas afetam a economia dos municípios que obtém do setor primário a sua principal receita. As áreas urbanas, situadas às margens do Rio Muriaé são afetadas de forma intensa pelas inundações, fazendo com que grande parte da população sejam atingidas, seja de forma direta, por inundações de suas residências, ou de forma indireta quando os serviços públicos como postos de saúde, bancos, estabelecimentos comerciais e demais órgãos públicos são atingidos pela cheia do canal.

O caso do município de Cardoso Moreira, é mais grave, pois a sede de todos os órgãos públicos da cidade (incluindo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros) são atingidos pelas inundações, dificultando assim a ação do poder público na mitigação dos efeitos de tais ocorrências.

O mapeamento de uso e ocupação das terras, seja ele para toda a área dos municípios, seja específico para as áreas de inundação servem de ferramenta e informação para a intervenção dos órgãos públicos e Defesa Civil nas áreas que são atingidas com frequência.

Bibliografia

Prado, R. B. *et all.* (2005) - *Diagnóstico do meio físico da bacia hidrográfica do Rio Muriaé*. Rio de Janeiro, Embrapa, 76 p.;

GEOTECNOLOGIAS APLICADAS AO MONITORAMENTO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS NA REGIÃO DA REDEC-I 7 DO ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

Evandro Antônio Cavarsan

Coordenadoria de Defesa Civil de Cabralia Paulista
defesacivil@cabralia.sp.gov.br

Eymar Silva Sampaio Lopes

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
eymar@dpi.inpe.br

Lourenço Magnoni Júnior

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
lourenco.junior@fatec.sp.gov.br

RESUMO

A utilização de sistemas computacionais aplicados a questões do meio ambiente pode ser complexa e requer muitas variáveis a serem modeladas. Na literatura existem diversos modelos ambientais para as mais diversas aplicações como incêndios, enchentes, deslizamentos, entre outras. O desenvolvimento de geotecnologias com monitoramento em tempo-real de dados ambientais permite acompanhar as mudanças climáticas com potencial de deflagrar desastres. Neste contexto o Centro Integrado de Alerta de Desastres Naturais (CIADEN) instalado na Escola Técnica Astor de Mattos Carvalho de Cabralia Paulista - SP vem desenvolvendo aplicações fazendo uso da plataforma TerraMA² do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O objetivo deste trabalho é apresentar o monitoramento efetuado através de análises e alertas a incêndios florestais realizado na região de atuação da Regional da Defesa Civil do Estado de São Paulo Região Administrativa de Bauru (REDEC-I 7) através do CIADEN, onde concentram-se importantes empresas na área de reflorestamento e silvicultura como a DURATEX, SUZANO e LWARCEL. O sistema de monitoramento desenvolvido utiliza dados hidrometeorológicos coletados pelo INPE através dos sensores dos satélites GOES, NOAA e METEOSAT, variáveis como umidade relativa do ar, precipitação acumulada, temperatura, velocidade e direção do vento e focos de queimadas, que permitem definir índices de perigo a incêndios florestais. A área monitorada compreende os talhões de Eucalipto e Pinus sp. que estão localizados dentro dos 39 municípios que integram a REDEC-I 7. As análises de risco de incêndios são realizadas sobre as condições hidrometeorológicas dentro e num raio no entorno dos talhões. Sobre condições de baixa umidade, número de dias sem chuva, intensidade de vento, altura do dossel, presença de focos de queimadas nas faixas de distância de 5 à 10 km são os principais parâmetros para produzir alertas em quatro níveis, isto é, observação, atenção, alerta e alerta máximo. O sistema encontra-se em fase de implantação, mas os primeiros resultados já demonstram promissores para os agentes de combate a incêndios florestais na região.

Palavras-chave: Geotecnologias, Monitoramento, Incêndios Florestais, CIADEN, TerraMA²

Introdução

Incêndio florestais estão entre os desastres naturais que estão relacionados com a intensa redução das precipitações hídricas (CASTRO, 2003), sendo um grave problema ambiental que afeta não só o território brasileiro, mas também outros países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, países da União Européia e países do Sudeste Asiático. Apesar de serem desastres ditos naturais, aqui no Brasil, a quase totalidade dos incêndios são resultantes das queimadas causadas por atividades antrópicas, devido o uso inadequado de recursos naturais, como por exemplo, o desmatamento desordenado e as queimadas para a limpeza de pasto e preparo do plantio (SOUZA et al ., 2004), ou anda por incêndios criminosos.

Apesar do aperfeiçoamento das técnicas de controle e combate de incêndios florestais disponíveis, ainda há falta de um programa institucional consistente que contribua para redução

deste cenário. Neste caso, a melhoria das técnicas de prevenção e combate não pode ser feita somente pela adoção de tecnologias disponíveis em outros países, mas sim através de programas que visem aprimorar e aproveitar as experiências, desenvolver novas geotecnologias, fazendo-se a devida adequação à realidade brasileira.

Outro fato agravante deve-se a falta de informações integradas em âmbito nacional ou mesmo regional, que resulta em sérios problemas para os técnicos que atuam na prevenção e combate aos incêndios florestais, razão pela qual este trabalho apresenta o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Centro Integrado de Alerta de Desastres Naturais (CIADEN).

Dentre as medidas preventivas a utilização de um índice de perigo a incêndio confiável é fator fundamental para um planejamento mais eficiente das medidas de prevenção e para a adoção de ações rápidas e efetivas nas atividades de combate aos incêndios florestais, visando a redução das perdas e, consequentemente, dos prejuízos financeiros advindos da sua ocorrência.

O objetivo principal deste trabalho é apresentar o monitoramento efetuado através de análises e alertas a incêndios florestais realizado na região de atuação da Regional da Defesa Civil do Estado de São Paulo Região Administrativa de Bauru (REDEC-I 7) fazendo uso da plataforma TerraMA² (LOPES, 2012) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE. A Figura 1 mostra a localização da área de estudo.

Como objetivos secundários desse trabalho podemos citar:

- Implementar do Índice de Perigo de Angstron e Monte Alegre modificados;
- Implantar o Risco eminente baseado no índice de perigo e ocorrências de focos de queimada próximos;
- Disponibilizar análises com o TerraMA2 no aplicativo web desenvolvido pelo CIADEN.

Figura 1 - Localização da área de estudo e perímetros das empresas de reflorestamento.

Materiais e Métodos

Para desenvolvimento das análises foram utilizados dados hidrometeorológicos disponíveis na Divisão de Satélites Ambientais (DSA) e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), ambos do INPE. Os seguintes dados foram utilizados:

- Precipitação estimada por satélite GOES - produto Hidroestimador;
- Precipitação acumulada em 24 horas por satélite GOES;
- Número de dias sem chuva - produto integrado por satélite TRMM e estações pluviométricas;
- Umidade média nos últimos 5 dias - média da umidade relativa mínima do ar;
- Previsão numérica de tempo da precipitação em 60 minutos por modelo Eta;
- Previsão numérica de tempo da umidade relativa em 6 horas por modelo Brams;
- Previsão numérica de tempo da temperatura em 6 horas por modelo Brams;
- Focos de queimadas por satélite Meteosat.

Para realizar análises com os dados acima, os seguintes mapas estáticos foram incorporados ao banco de dados:

- Mapa municipal do Estado de São Paulo e REDEC-I7;
- Perímetros das empresas Suzano, Duratex e Lwarcel de reflorestamento.

Dois índices de perigo de incêndio foram utilizados e modificados para se ajustar aos dados ambientais disponíveis. No índice de Angstrom foram utilizados dados de previsão numérica de 6 em 6 horas até o limite de 24 horas para temperatura e umidade. Nota-se que para calcular este índice foi utilizado o maior valor de temperatura prevista e o menor de umidade relativa para um período de 24 horas a partir do horário atual.

Para o cálculo do índice de Monte Alegre foram utilizados dados de número de dias sem chuva e umidade relativa do ar nos últimos 5 dias. Além disso foi utilizado a previsão numérica para as próximas 6 horas, que permitiu definir porcentagens de redução do valor desse índice frente a probabilidade de chuva.

Uma outra análise realizada a partir desses índices foi realizada de forma integrada com a ocorrência de focos de queimadas do INPE, a qual permite alertar áreas que em se encontrando em estado de alerta, podem passar para alerta máximo caso exista focos próximos aos perímetros pré determinados das propriedades que estão sob monitoramento do CIADEN.

O Quadro I mostra os programas escritos em LUA para cálculo dos dois índices de perigo a incêndio.

Quadro I - Programas em LUA para cálculos dos índices de perigo a incêndio.

<pre>-- Início - Índice de Angstrom local T1 = soma_pn('Temp2m_brams5km', 1, 1) local T6 = soma_pn('Temp2m_brams5km', 6, 6) local T12 = soma_pn('Temp2m_brams5km', 12, 12) local T18 = soma_pn('Temp2m_brams5km', 18, 18) local T24 = soma_pn('Temp2m_brams5km', 24, 24) local TMax = math.max(T1,T6,T12,T18,T24) local H1 = soma_pn('Ur2m_brams5km', 1, 1) local H6 = soma_pn('Ur2m_brams5km', 6, 6) local H12 = soma_pn('Ur2m_brams5km', 12, 12) local H18 = soma_pn('Ur2m_brams5km', 18, 18) local H24 = soma_pn('Ur2m_brams5km', 24, 24) local HMin = math.min(H1,H6,H12,H18,H24) local B = 0.05 * HMin - 0.1* (TMax - 27) add_value(B, 'Índice de Angstrom') if B > 3 then return 0 -- Normal elseif B > 2.5 then return 1 -- Observacao elseif B > 1.5 then return 2 -- Atencao elseif B > 1 then return 3 -- Alerta else return 4 -- Alerta maximo end</pre>	<pre>-- Início - Índice de Monte Alegre local var1 = maximo('NDSC') or 0 local um5d = maximo('Um_Mim_5dias') or 0 local prec6h = maximo_pn('Prec_eta5km', 6) or 0 local contador = 1 local fma = 0 for contador = 1, var1, 1 do fma = fma + (100 / um5d) contador = contador + 1 end if prec6h <= 2.4 then fma = fma elseif prec6h <= 4.9 then fma = fma * 0.7 elseif prec6h <= 9.9 then fma = fma * 0.4 elseif prec6h <= 12.9 then fma = fma * 0.2 else fma = 0 end if fma <= 1 then return 0 -- Normal elseif fma < 3 then return 1 -- Observacao elseif fma < 8 then return 2 -- Atencao elseif fma < 20 then return 3 -- Alerta else return 4 -- Alerta maximo end</pre>
--	--

Resultados

Os resultados do Cálculo

Figura 2 - Cálculo dos índices de Angstrom e Monte Alegre para os municípios da REDEC-17.

Figura 3 - Perímetros das empresas de reflorestamento com alerta em função do índice de Angstrom previsto para o dia seguinte (12/09/2014).

Conclusão

A utilização de estudos para a avaliação do perigo de incêndio em tempo real constitui a melhor possibilidade de salvaguarda vidas, propriedades e recursos naturais. Além disso, a estimativa de índices de perigo de incêndio em curto prazo, com dados de observação e previsão numérica, tem em vista o apoio à tomada de decisões atualizadas.

Os índices calculados pelo sistema desenvolvido no CIADEN com a plataforma tecnológica TerraMA², mostram que os alertas e os resultados obtidos podem ser utilizados como base de dados na elaboração de planos preventivos aos riscos de incêndios florestais.

Esperamos que com o estabelecimento e acompanhamento de índices de perigo de incêndios florestais, por um período de tempo longo, em grandes áreas como a REDEC-I7, permite estabelecer quais são as zonas potencialmente mais perigosas ou propícias à ocorrência de incêndios, permitindo assim a adoção de medidas preventivas e advertindo o grau de perigo.

Bibliografia

- Lopes, E.S.S. TerraMA2 - Plataforma para monitoramento, análise e alerta a extremos ambientais. Apresentação de slides. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). São José dos Campos-SP - 2012.
- Castro, A.L.C. - Manual de desastres: desastres naturais. Brasília (DF): Ministério da Integração Nacional, 2003. 174 p. Disponível em: http://www.integracao.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=47a84296-d5c0-474d-a6ca-8201e6c253f4
- Cavarsan, E.A. Utilização do geoprocessamento na prevenção e estratégias de combate a incêndios florestais no município de Cabralia Paulista - SP. Brasil, Programa de Pós-Graduação em Geografia/UEM,. 187 p. (Tese de Mestrado). 2008.
- Soares, R. V. Índices de perigo de incêndio. Revista Floresta, v. 3, n. 3, p.19-40, 1972. 1972a.
- Soares, R. V. Determinação de um índice de perigo de incêndio para a região centro paranaense, Brasil. Turrialba, Costa Rica, CATIE/IICA,. 72 p. (Tese de Mestrado). 1972b.
- Soares, R. V. Prevenção e controle de incêndios florestais. ABEAS, 120 p. 1984.

LA INTERACCIÓN ENTRE ATMÓSFERA INSALUBRE Y POBLACIÓN URBANA: UNA APROXIMACIÓN DESDE LA GEOVISUALIZACIÓN DIGITAL PARA EL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

María Jesús Vidal Domínguez,

Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid
mariajesus.vidal@uam.es

Antonio Moreno Jiménez

Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid
antonio.moreno@uam.es

Ana Mellado San Gabino

Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid
ana.mellado@uam.es

Rosa Cañada Torrecilla

Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid
rosa.canada@uam.es

RESUMEN

La atmósfera urbana afecta a la salud y bienestar de la población, pero esa interacción resulta elusiva, por poco visible. Aunque conflictivo, hacer más perceptibles los peligros de un aire malsano constituye un ejercicio de transparencia obligado para la eclosión de conductas reactivas y proactivas de individuos e instituciones. En línea con recientes propuestas sobre las utilidades de las geotecnologías en los procesos de decisión espacial y de participación pública, esta contribución persigue hacer más notoria esa interacción entre sociedad y atmósfera urbana a través de la geovisualización digital. A tal fin se presentan y examinan varios productos concebidos con esa finalidad de comunicación y formación de opiniones colectivas.

Palabras clave: geovisualización, contaminación atmosférica, población urbana, riesgos socio-ambientales, sistemas de información geográfica, ciudades españolas.

Introducción

La urbanización aumenta la exposición de personas y bienes a ciertas amenazas y crea nuevos patrones de riesgo, cuyo desvelamiento resulta complejo. Su abordaje se justifica por tres tipos de razones. En primer lugar, para concienciar e informar a la ciudadanía de los peligros de una atmósfera insalubre y, particularmente, a las personas más vulnerables (Chambers, 2006). Segundo, por la existencia de una normativa europea que regula la emisión de contaminantes y los grados de peligrosidad. Y por último, para ayudar a la formación de decisiones, tanto en la planificación urbana, como en las múltiples actuaciones públicas y privadas que afectan a la calidad del aire.

En este trabajo se pretende facilitar, mediante nuevos productos cartográficos, la aprehensión de la relación sociedad-ambiente, para así impulsar la conciencia de los peligros y el empoderamiento social, que coadyuven a una mejor gobernanza y gestión de ciertos riesgos urbanos. A tal fin, se recurre a la geovisualización digital para mostrar conjuntamente la población vulnerable y la contaminación del aire (concentración de NO_2) en Madrid y Barcelona. El foco recae en desvelar los patrones espaciales de ambos fenómenos y sus coincidencias mutuas. Para ello se diseña con geotecnologías una variedad de productos de información visual, orientados a públicos diversos, que permitan apreciar mejor la potencial interacción espacial entre población y polución.

Aspectos metodológicos

Como ámbito de estudio se ha priorizado el área urbana donde reside la población. Los datos demográficos por secciones censales (totales y de algunos grupos vulnerables), procedentes del Padrón Municipal de Habitantes (1/1/2010), se asignaron a una cuadrícula (raster) con píxeles de 50 m. Un análisis de ellos se halla en Palacios y Vidal (2014). Los datos de contaminación del aire proceden de organismos públicos de Madrid y de Barcelona. La media anual de concentración en el aire de dióxido de nitrógeno en 2010, registrada en estaciones de monitoreo, fue luego estimada para todo el ámbito de estudio (píxeles de 50 m) con un procedimiento de interpolación espacial (*vid.* Cañada *et al.* (2014). Como valor crítico se adoptó el vigente en la normativa española, europea y de la Organización Mundial de la Salud ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$). La cartografía digital procede del Instituto Geográfico Nacional (CNIG), al igual que la ortoimagen de Madrid (resolución de 25 cm y captura entre 2009 y 2011).

La geovisualización como herramienta de análisis y gestión de riesgos

La geovisualización conforma una parcela vagamente delimitada en la que se incluye la exploración visual, el análisis, la síntesis y la presentación geoespacial de datos mediante la integración de enfoques que van desde la cartografía a los de otras representaciones de la información y de disciplinas de análisis, incluyendo visualización científica, análisis de imágenes, información de la visualización, análisis exploratorio de datos y “GIScience” (Dykes *et al.* 2005).

Un aspecto fundamental de estos productos de geovisualización atañe a los destinatarios, es decir ¿a quién van dirigidos?, ¿cuál es el mercado y quiénes son los usuarios finales? Su identificación ayudará a concebir productos que luego sean mejor comprendidos por los destinatarios y así lograr las utilidades máximas (Vidal, 2012). Al respecto cabe recordar como usuarios principales de mapas: A) Expertos (técnicos, profesionales, investigadores y profesores); se trata de personas altamente cualificadas en la llamada “*graphicacy*”. B) Decisores (líderes de organizaciones políticas, empresariales, sociales, etc.); su nivel de aptitud lectora de mapas puede ser variable. Y C) Otros grupos: estudiantes (universitarios, de secundaria y primaria), ciudadanos y participantes en procesos de decisiones colectivas (información pública); su desigual capacidad demandaría productos con un nivel variable de complejidad-simplicidad.

En esta comunicación se presentan mapas mostrando patrones espaciales en 2D y en 3D basados en capas de geodatos físicos y humanos, aptos para explorar estáticamente concomitancias espaciales multi-capas y captar así amenazas por la polución del aire.

Mapas con capas superpuestas representando la población expuesta y la zona de alta contaminación en 2D

Con este tipo de propuestas se trata de mostrar algunas ventajas y dificultades de productos de geovisualización en 2D. Para facilitar la ubicación contextual se ha puesto en la base la ortoimagen y el contorno de los distritos, encima la densidad de población mayor de 80 años y superpuesta la contaminación por NO_2 , bien como capa ráster semitransparente, bien como isolíneas (figuras 1 y 2).

En la figura 1, la distribución resulta ordenada y jerarquizada en las dos variables. La composición visual aparece equilibrada, estética y compensada. En este tipo de mapas la primera etapa de lectura implicaría una abstracción mental para filtrar la simbología a través de la leyenda, primero de una y luego de la otra variable. La segunda fase, de comparación de los dos patrones, conlleva un ejercicio visual-mental para examinar a la vez los dos planos superpuestos,

Figura 1. Mapa de Madrid con densidad de población anciana y contaminación por NO₂ (semitransparente). Elab. propia

Figura 2. Mapa de Madrid con densidad de población anciana y contaminación por NO₂ (isolíneas). Elab. propia.

penetrando en profundidad. Al superponerse las dos variables es factible concentrarse en cada zona y establecer similitudes y diferencias con más exactitud posicional que con mapas separados. La legibilidad general, sin embargo, no es tan buena como los mapas con una sola variable, debido a la dificultad de representar en un único mapa dos fenómenos y a la complejidad de seleccionar unas simbologías compatibles. En cuanto a los destinatarios potenciales cabe proponer que resulta idónea para cualquier individuo, porque se percibe con facilidad la interrelación entre las variables representadas en el mapa al estar clasificadas. Se aprecian así los espacios en los que hay más concentración de NO₂ y donde el nivel de población es alto y viceversa, aunque ello suponga algo de esfuerzo.

La segunda de las propuestas (figura 2) difiere de la anterior en que la polución aparece como isolíneas de NO₂, con gama de colores dicromática (del verde al rojo). La composición visual es más equilibrada, estética y compensada que la de la figura 1. Se permite de nuevo concentrarse en cada zona y establecer comparaciones con más facilidad que si estuvieran cada una en un mapa independiente, pero en este caso hay una mejora porque las isolíneas no perturban tanto la vista de la capa inferior. A nuestro entender la figura 2 posee una eficacia comunicativa superior a la figura 1, tanto de los valores de cada capa, como de las coincidencias/divergencias entre los patrones de ambas.

Vistas estáticas de varias capas en perspectiva 3D

Los mapas tridimensionales son productos de geovisualización complejos, no solo por lo sofisticado del software, sino por la preparación que exige su realización. En estos mapas en los que las capas son estáticas la distancia entre ellas es una de las cuestiones importantes a

solventar, pues al ser elegible la posición del observador (en altura y en orientación), la separación entre capas ocasiona mejor o peor visión (por posible ocultación), al tiempo que la orientación elegida puede generar desconcierto en el lector.

En las figuras 3 y 4 se ha puesto en la base el MDT con el contorno de los distritos, encima la población extranjera asiática y se ha incorporado una tercera capa de polución de NO_2 con una ligera exageración vertical, en aras de mejorar la visión y sobre todo la comparación entre capas. En el caso de Madrid (figura 3) las capas superiores se circunscriben al área urbana poblada, en Barcelona no (figura 4). Junto al efectismo e incluso espectacularidad, cabe subrayar que la legibilidad de la composición es más exigente. La percepción de los patrones por separado no resultaría difícil (con la salvedad de las ocultaciones), sin embargo, la comparación entre ellos implica movimientos óculo-mentales verticales, realizados según un plan de desplazamientos laterales y en profundidad (primero, segundo, tercer ... plano). Por tal motivo, y en cuanto a usuarios potenciales, los más directos serían los profesionales y estudiosos con un aceptable nivel de aptitud cartográfica. Para otros públicos menos versados, el logro de una comprensión aceptable probablemente requeriría de explicación y ayuda, por ejemplo de un experto, cuestión esta que no hemos tratado aún. Las posibilidades de navegar sobre esa composición con vuelos virtuales (también desarrollados en el proyecto), potencian la intelección del mensaje y estimulan la atención del observador a través las múltiples perspectivas elegibles.

Comentarios finales

En la actual sociedad de la geoinformación la generación y diseminación de imágenes sobre peligros territoriales y población expuesta constituye una labor fundamental en pro de la concienciación y participación en las decisiones colectivas. Con esas miras de comunicación, en

Figura 3. Mapa 3D de Madrid (izq.) con la densidad de población y el NO_2 (capa superior). En la base el MDT. Elab. propia.

Figura 4. Mapa 3D de Barcelona (dcha.) con la densidad de población y el NO_2 . En la base el MDT. Elab. propia.

este trabajo se han presentado algunos productos de geovisualización algo complejos, considerando aspectos técnicos del diseño, la legibilidad y los potenciales destinatarios. La interacción entre sociedad y aire contaminado, que constituye un tema central en la geografía y de alta relevancia actual, se nos muestra así más asequible a través del examen de novedosas composiciones cartográficas, que mejoren el conocimiento colectivo sobre esas amenazas.

Nota: Trabajo del proyecto “Contaminación atmosférica urbana y justicia ambiental: metodología de evaluación y estudio de casos con sistemas de información geográfica”, Ministerio de Economía y Competitividad de España, CSO2011-26177.

Bibliografía

- Cañada Torrecilla, R., Moreno Jiménez, A. y González Lorenzo, H. (2014) - Modelado de la calidad del aire. Un experimento metodológico con técnicas de interpolación espacial, *Boletín Asoc. de Geógrafos Españoles*, 65, p. 317-342.
- Chambers, R. (2006) - Participatory mapping and geographic information systems: Whose map? Who is empowered and who disempowered? Who gains and who loses?, *The Elec. Jou. Inf. Systems in Developing Countries*, 25 (2), p. 1-11.
- Dykes, J. , MacEachren, A. M. and Kraak, M. J. (2005) - *Exploring geovisualisation*. Amsterdam, Elsevier.
- Palacios García, A. y Vidal Domínguez, M.J. (2014) - La distribución intraurbana de los inmigrantes en las ciudades españolas: un análisis de casos con SIG y técnicas cuantitativas, *Cuadernos Geográficos*, 53-1, p. 98-121.
- Vidal Domínguez, M.J., Moreno Jiménez, A. y Cañada Torrecilla, R. (2012) - Geovisualización avanzada para la exploración de patrones y relaciones socio-ambientales con Sistemas de Información Geográfica: aplicación a la ciudad de Madrid. *GeoSIG*, año 4, p. 215-238,
- Vidal Domínguez, M.J. (2012) - “Exploración y valoración de patrones y relaciones socio-ambientales mediante geovisualización 3d”, en Moreno Jiménez, A. (Coord.), *Sistemas de Información Geográfica. Aplicaciones en diagnósticos territoriales y decisionesgeoambientales*. Madrid, Editorial Ra-Ma, p. 200-240.

MAPEAMENTO DE SUSCEPTIBILIDADE À EROSÃO EM ZONA DE AMORTECIMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS BRASILEIRAS, UTILIZANDO TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO

Taiana Evangelista dos Reis

Mestranda em Geografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro
taiana.geo@gmail.com

Vivian Castilho da Costa

Departamento de Geografia Física, Universidade do Estado do Rio de Janeiro
vivianuerj@gmail.com

Marta Foeppel Ribeiro

Departamento de Geografia Física, Universidade do Estado do Rio de Janeiro
mfoeppel@gmail.com

RESUMO

Conservar as últimas florestas tropicais é preocupação mundial. No Brasil, como forma de proteção legal, são criadas Unidades de Conservação da Natureza (UC), dedicadas à preservação e à manutenção da biodiversidade e dos recursos naturais. As áreas do entorno de UC são denominadas de Zonas de Amortecimento (ZA), nas quais as atividades devem ser restritas, a fim de não gerar impacto sobre a UC. O Parque Estadual do Ibitipoca (PEI) está localizado no Estado de Minas Gerais e possui uma ZA de 100,41 km². O presente trabalho visa estudar e mapear a susceptibilidade a erosão na ZA do PEI, proporcionada pelos mapas pedológico, de declividade e de uso e ocupação da terra, utilizando técnicas de geoprocessamento. Os resultados permitiram apontar as áreas mais impactadas decorrentes de explorações inadequadas no uso da terra e em áreas de solos e de declividade não compatíveis com a proteção dos recursos naturais existentes. Tais resultados auxiliarão os gestores da UC no controle dos locais mais impactados pela erosão, evitando o uso desordenado e o avanço das áreas rurais e urbanas na ZA e no interior da área protegida.

Palavras-chave: Zona de amortecimento. Geoprocessamento. Susceptibilidade a erosão

Introdução

No Brasil, a conservação das últimas florestas tropicais vem sendo prioridade do governo, que se preocupa com o aumento do número de áreas sob proteção legal. Atualmente, o país conta com várias Unidades de Conservação da Natureza (UC), sendo as mesmas essenciais à manutenção da biodiversidade, pois preservam um maior número possível de espécies.

O entorno das áreas de proteção integral (Parques) também é alvo de proteção legal e denomina-se zona de amortecimento (ZA) ou zona tampão. A ZA tem o propósito de reduzir os impactos negativos sobre as áreas protegidas, por meio de regras de uso e ocupação da terra. Segundo Miller (1997), a zona de amortecimento (ZA) é determinada com intuito de filtrar os impactos negativos das atividades externas a ela, como poluição, barulho, aparição de espécies exóticas e avanço da ocupação humana.

O presente trabalho visa estudar e mapear a susceptibilidade à erosão na ZA do Parque Estadual do Ibitipoca (PEI), proporcionada pelos tipos de solo, níveis de declividade e pelas formas de uso e de ocupação da terra. A susceptibilidade à erosão pode ser compreendida como o conjunto de “características inerentes do meio, representando a fragilidade do ambiente em relação aos escorregamentos” (SAITO, 2004, p. 32).

Segundo Veyret (2007), as áreas muito íngremes, que são exploradas por atividades antrópicas, estão mais propícias a movimentos de massa e, por isso, exigem um levantamento preciso das condições que possam agravar o risco ambiental. Este, por sua vez, resulta “da associação entre

os riscos naturais e os riscos decorrentes de processos naturais agravados pela atividade humana e pela ocupação do território” (VEYRET, 2007, p. 63).

O diagnóstico de áreas com risco de erosão tem sido utilizado como uma ferramenta importante no gerenciamento de áreas protegidas legalmente. Este diagnóstico é feito com o auxílio do geoprocessamento, que tem como produto final mapas de inventário, de suscetibilidade e de risco. É possível obter mapas com precisão e rapidez por intermédio das técnicas de geoprocessamento.

Área de Estudo

O Parque Estadual do Ibitipoca (PEI) foi criado em 1973 e pertence aos municípios de Lima Duarte e Santa Rita de Ibitipoca, no Estado de Minas Gerais, no Brasil. Sua zona de amortecimento foi estabelecida em 2006, por meio do Primeiro Plano de Manejo (VALOR NATURAL, 2006) e possui área de aproximadamente 100,41 km².

A população que vive no entorno do PEI utiliza a área para subsistência, criando gado e cultivando, consequentemente, as formas de uso da terra predominantes na ZA são a pastagem e a plantação de hortaliças, que juntas representam 50% da ocupação. Aproximadamente 33% da ZA é mata, sendo que 14% encontram-se em regeneração. O Eucalipto ocupa 1,36% da ZA, e as demais áreas são ocupadas por corpos hídricos, solos expostos, areais e áreas construídas.

O relevo no Parque e na ZA é bem acentuado e possui altitudes que variam de 800 a 1780 metros. A alta declividade é um fator agravante para os movimentos de massa e para a ocorrência da erosão. Na área de estudo, as classes de declividade foram determinadas a partir das Leis Federais 6.766/1979 e 12.651/2012 e definidas nas seguintes faixas: 0-5%, 5-10%, 10-20%, 20-30%, 30-47%, 47-100% e > 100%. As áreas com maior declividade estão próximas aos limites com o PEI, predominando ao norte, leste e oeste.

O tipo predominante de solos na ZA é o cambissolo háplico com o Latossolo Vermelho-Amarelo e Cambissolo Húmico, representando 57% de extensão nas áreas norte, leste e sul da ZA, enquanto 15% da área é ocupada por cambissolo háplico e 12% por cambissolo háplico e Latossolo Vermelho-Amarelo, ambos a oeste. No entanto, há presença de Cambissolo Húmico, Háplico e Latossolo Vermelho-Amarelo (com 1%) e Latossolo Vermelho Amarelo e Argissolo Vermelho em pequenas áreas espalhadas na ZA (7%), além de neossolo litólito e afloramentos rochosos com Cambissolo Húmico (9%) ao redor do limite do PEI.

Metodologia

A metodologia utilizada foi a análise multicritério, a qual se baseia na lógica básica da construção de um SIG. Moura (2007), em seu estudo, apresentou um roteiro metodológico, com base no SIG, dos procedimentos em relação a análise multicritério:

“...[1] seleção das principais variáveis que caracterizam um fenômeno, já realizando um recorte metodológico de simplificação da complexidade espacial; [2] representação da realidade segundo diferentes variáveis, organizadas em camadas de informação; [3] discretização dos planos de análise em resoluções espaciais adequadas tanto para as fontes dos dados como para os objetivos a serem alcançados; [4] promoção da combinação das camadas de variáveis, integradas na forma de um sistema, que traduza a complexidade da realidade; finalmente, [5] possibilidade de validação e

calibração do sistema, mediante identificação e correção das relações construídas entre as variáveis mapeadas.” (MOURA, op. cit., p. 2900)

Utilizando o programa de geoprocessamento ArcGIS 10.1, foi feito o mapa de uso e ocupação da terra, usando imagem de satélite em mosaico, Rapideye com uma resolução espacial de 5 metros, cedida pelo Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF), dos anos de 2009/2010. Para corrigir os erros de georreferenciamento e ortorretificação foi usada a ferramenta *Topology* do ArcGIS.

A partir das curvas de níveis, mapeadas em escala 1:50.000 e cedidas também pelo IEF, foi possível fazer o mapa altimétrico e, em seguida, o mapa de declividade, utilizando a ferramenta *Slope* do ArcGIS 10.1. As bases relativas ao mapa pedológico, em escala 1:50.000, foram cedidas pelo Departamento de Solo da Universidade Federal de Viçosa, possibilitando a compatibilidade com a escala de análise adotada.

Após a elaboração dos mapas de declividade, pedológico e de uso e ocupação da terra, foram atribuídos pesos de 0 a 100%. Cada classe de mapa temático recebeu notas que variaram entre 0 a 10. Tais pesos e notas foram realizados utilizando o Método Delphi (consultados especialistas e conhecimento empírico sobre a área de estudo). Segundo Moura 2007, o método Delphi é o que melhor se adequa ao uso da análise multicritério. (Tabela I).

Tabela I: Classes e pesos dos mapas utilizados na classificação

Pedológico- peso: 30%	
Classificação	Notas
Cambissolo Háplico	8
Cambissolo Háplico + Latossolo Vermelho-Amarelo + Cambissolo Húmico	8
Cambissolo Háplico + Latossolo Vermelho	7
Neossolo Litólico + Afloramento de Rocha + Cambissolo Húmico	10
Latossolo + Latossolo Vermelho-Amarelo + Argissolo Vermelho	3
Cambissolo Húmico + Cambissolo Háplico + Latossolo Vermelho-Amarelo	6
Uso e ocupação da Terra - peso: 35%	
Classificação	Notas
Corpo hídrico	1
Mata	3
Mata em regeneração	4
Pastagem	6
Área construída	6
Plantação	7
Areal	7
Eucalipto	8
Solo exposto	10
Declividade - peso: 35%	
Classificação	Notas
0% - 5%	1
5% - 10%	2
10% - 20%	4
20% - 30%	5
30% - 47%	6
47% - 100%	8
> 100%	10

Os mapas temáticos foram cruzados, utilizando-se o Método de Álgebra de Mapas no ArcGIS 10.1, por meio do qual fez-se o agrupamento e a reclassificação de cada um dos mapas temáticos utilizados, o que permitiu gerar um mapa final de susceptibilidade. Cada nota do mapa de susceptibilidade foi reagrupada e recebeu classes qualitativas. Esse mapa foi dividido em classes de baixa, media e alta susceptibilidade.

Resultados

Os resultados possibilitaram identificar que 19% da ZA, classificados como alta susceptibilidade, estão localizados ao redor do parque, em áreas com declives entre 47% e 100%, cobertas por neossolo litólico, cambissolo húmico, latossolo, latossolo vermelho-amarelo e argissolo vermelho, além de afloramentos rochosos. Os usos predominantes encontrados são plantações de eucalipto e solos expostos. Em terrenos ao sul e ao leste, também foi possível encontrar áreas com alta susceptibilidade, decorrente da predominância de pastagens degradadas, praticadas em latossolo vermelho-amarelo, os quais apresentam alta erodibilidade. As áreas de média susceptibilidade ocupam grande parte da ZA, abrangendo, aproximadamente 58% da sua extensão. As áreas de baixa susceptibilidade ocupam 23% da ZA e estão localizadas a leste e a oeste do Parque (figura 1).

Figura 1: Mapa de Susceptibilidade à Erosão na Zona de Amortecimento - Parque Estadual do Ibitipoca (MG)

Conclusão

O diagnóstico das áreas susceptíveis à erosão na ZA do PEI dará auxílio aos gestores na caracterização e no controle dos locais que estão sofrendo com a erosão, possibilitando assim, um manejo adequado da região, evitando que os impactos nas ZA avancem para o interior da área protegida.

Com o uso do geoprocessamento foi possível ter análises mais precisas sobre condicionantes físicos e assim usá-las no apoio à tomada de decisão, contribuindo para novos estudos sobre a UC e sua ZA. Espera-se que a presente pesquisa subsidie ainda o diagnóstico das áreas de

vulnerabilidade social da ZA, possibilitando estudos mais apurados da redefinição de seus limites e uso adequado do solo urbano e rural da região.

Bibliografia

- MILLER, K. R. Evolução do Conceito de Áreas de Proteção - Oportunidades para o século XXI. In: I Congresso brasileiro de unidades de conservação, Curitiba, 1997. Anais... UNILIVRE. 1997. v. 1.
- MOURA, A. C. M. Reflexões metodológicas com o subsídio para estudos ambientais baseados em Análise de Multicritérios. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 13. 2007. Florianópolis. Anais... Florianópolis: IMPE, p.2899-2906. Disponível em: <http://martes.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr@80/2006/11.13.14.41/doc/2899-2906.pdf> Acesso em: 11 fev 2014.
- OLDEMAN, L.R. The global extent of soil degradation. In: Soil Resilience and Sustainable Land Use. GREENLAND, D. J. & SZABOCLS, I (Eds.) Cab International, Wallingford, VK, p. 99-118, 1994.
- SAITO, S. Estudo analítico da suscetibilidade a escorregamento e queda de bloco no Maciço Central de Florianópolis-SC. Florianópolis. 132 p. Dissertação (Mestrado em Geografia), Universidade Federal de Santa Catarina, 2004.
- VALOR NATURAL. Plano de Manejo do Parque Estadual do Ibitipoca. Belo Horizonte. 2006.
- VEYRET, Ivette. (org.). Os Riscos: O homem como agressor e vítima do meio ambiente. Ed. Contexto, São Paulo - 2007.

CARTOGRAFIA MUNICIPAL DE RISCO COM RECURSO AO *MODEL BUILDER*

José Rocha

Departamento de Geografia, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho

jmanuelfrocha@sapo.pt

RESUMO

A cartografia municipal de risco, mais concretamente a cartografia de risco de incêndio é um método de identificação, caracterização e avaliação da ocorrência de risco dendrocaustológico. Contudo, a utilização da cartografia de risco permite uma articulação crucial para o planeamento de emergência, que indica os locais potenciais de perigosidade e de risco de incêndio contribuindo assim para uma prevenção e vigilância antecipada dos locais mais susceptíveis.

A utilização dos SIG torna-se numa ferramenta potencializadora para compreender, quantificar, validar e prever a localização das entidades e o seu comportamento, tornando-se, por isso, instrumentos fundamental para o desenvolvimento de uma visão integradora do território como um todo, de forma a facilitar a intervenção em áreas menores (Costa, 2010).

Com base no *Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios* elaborou-se um *Model Builder* para a Cartografia de Risco com o intuito de facilitar o processo de produção cartográfico.

Palavras-chave: (Cartografia; PDMFCI; *Model Builder*;;).

Introdução

«Os incêndios são considerados um fenómeno que ocorre globalmente (Bowman et al., 2009 e González-Pérez et al., 2004), havendo maior incidência no Sul da Europa (Portugal, Espanha, Grécia, Itália e França), EUA, Canadá, Chile e Austrália, tanto os países europeus como os restantes tem grande historial de investigação científica e gestão dos incêndios florestais, no entanto a incidência dos incêndios acompanha as mudanças globais do clima (Bento-Gonçalves et al., 2011)» (Rocha et. al., 2013).

O processo de avaliação do risco de incêndio florestal assume-se como complexo devido a complexidade dos fenómenos que resultam dos incêndios florestais. Este processo é potencialmente causado pelo homem, no entanto, estão também ligados outros factores, que contribuem para a propensão do incêndio florestal, onde se engloba: coberto vegetal, relevo e o clima, bem como as variáveis sociais. A avaliação do risco de incêndio, normalmente é traduzida em índices com intuito de possibilitar a concretização dos elementos em mapas caracterizadores do risco (Antunes, 2011).

A cartografia municipal de risco, mais concretamente a cartografia de risco de incêndio é um método de identificação, caracterização e avaliação da ocorrência de risco dendrocaustológico. Contudo, a utilização da cartografia de risco permite uma articulação crucial para o planeamento de emergência, uma vez indica os locais potenciais de perigosidade e de risco de incêndio contribuindo assim para uma prevenção e vigilância antecipada dos locais mais susceptíveis.

Assim sendo, com o recurso ao *software ArcGIS 10.1* e com base no *Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios* elaborou-se um *Model Builder* para a Cartografia de Risco com o intuito de facilitar o processo de produção cartográfico. Com estudo de caso, o Município de Guimarães, procedeu-se ao tratamento dos dados referentes aos anos de ocorrência de incêndio e das áreas ardidas, disponibilizados pelo Instituto de Conservação da Natureza e Floresta (ICNF).

A Metodologia

Em Portugal, a metodologia adoptada para a elaboração da cartografia de risco de incêndio baseia-se no modelo da AFN (Figura I), que é constituído por quatro parâmetros: probabilidade, vulnerabilidade, susceptibilidade e risco de incêndio.

Figura I - Modelo de Risco

Fonte: http://www.osgeopt.pt/sites/default/files/files/Comunicacao_SASIG4_PedroVenancio.pdf

A utilização do Modelo em *Model Builder*

O surgimento dos SIG possibilita novos fluxos de trabalho e também a simplificação de diversos métodos e índices transformando-os numa referência espacial, como por exemplo num mapa. Contudo, torna-se morosa essa tarefa devido a diversidade de ferramentas que têm de ser utilizadas através do *software*, porém essa tarefa é diminuta quando é elaborado um modelo de trabalho (*Model Builder*).

Assim sendo, o *Model Builder* permite criar modelos (representação simplificada e gerenciável da realidade) a partir de fluxos que unem uma sequência de ferramentas necessariamente presentes no ArcToolbox e base de dados. O *Model Builder* permite tanto criar fluxos de rotina de trabalho quanto a criar novas ferramentas (Medeiros, 2014).

No fluxo de trabalho foram criados 4 modelos (Fig. II), ou seja, o modelo de probabilidade, modelo de susceptibilidade, modelo de perigosidade e o modelo de risco

Figura II - *Model Builder*

Na construção do Modelo de Probabilidade (Fig. III) procede-se a individualização dos dados dos diferentes anos referentes às áreas ardidas, que incide desde 1990 até ao último ano disponibilizado pelo ICNF, no entanto no ao de 2004 não existem dados oficiais relativamente as áreas ardidas para o concelho de Guimarães.

«Esta probabilidade anual determina-se, para cada pixel, dividindo:

$$\frac{\Omega}{f \cdot 100}$$

Em que f é o número de ocorrências registradas, Ω o número de anos da série. (...), multiplica-se f por 100 podendo usar apenas valores inteiros, ignorando a parte decimal. Reclassifique o seu *raster* de probabilidade de modo a que todas as áreas que arderam apenas uma vez sejam igualadas às que nunca arderam. (...) As áreas que nunca arderam devem ser reclassificadas de zero para um (...)» (Direcção da Unidade de Defesa da Floresta, 2012).

Figura III - Extrato do Modelo de Probabilidade

A elaboração do Modelo de Susceptibilidade (Fig. IV) resulta da criação de um mapa de declives do concelho de Guimarães e da elaboração da Carta de Ocupação do Solo (COS).

Para a ocupação do solo é desejável a utilização de uma cobertura o mais actualizada possível. Os declives e a COS devem ser reclassificados, segundo as escalas e ponderações do Guia Técnico de PDMFCI.

Figura IV - Modelação esquemática em *Model Builder* do Modelo de Susceptibilidade

Obter o Mapa de Perigosidade (Fig. V) resulta da multiplicação do *raster* de probabilidade pelo *raster* de susceptibilidade. Seguidamente, reclassifique esse mapa através do método quantis em 5 classes,

Figura V - Modelação do Mapa de Perigosidade (Modelo de Perigosidade)

No Mapa de Risco de incêndio é necessário utilizar a shapefile do Mapa de Perigosidade anterior não reclassificado. Na tabela da shapefile da COS cria-se o campo “Vulnerabilidade” e o campo “Valor económico” (estes valores estão especificados no Guia técnico do PDMFCI), posteriormente multiplica-se o “Valor económico” pelo campo área da COS (em hectares). Seguidamente, converte-se em *raster* o valor que resultou da multiplicação anterior, o qual se denomina como “Valor”.

Com recurso ao *raster calculator* efectua-se a multiplicação da “Vulnerabilidade” com o “Valor”, obtendo-se assim o “Dano Potencial”. Por último, utilizando a ferramenta *raster calculator* multiplica-se o *raster* não reclassificado do Mapa de Perigosidade com o *raster* do

“Dano Potencial”, elaborando-se o Mapa de risco de incêndio, que deverá ser reclassificado pelo método de Quantis em 5 classes.

Figura VI - Modelação do Mapa de Risco (Modelo de Risco)

Conclusão

Os Sistemas de Informação Geográfica são cada vez mais uma ferramenta essencial, e que tornam o trabalho de análise do território mais simplista, pois como salienta Cláudia Costa, 2010, p. 28 «*Saber interpretar e correlacionar as características de determinado lugar é de extrema importância para todos aqueles que têm como objecto de estudo o território - avaliação da interacção entre indivíduos e o espaço em que ambos se adaptam e modificam ao longo do tempo. Para tal, tem-se recorrido cada vez mais aos Sistemas de Informação Geográfica (SIG)*».

Neste sentido, os SIG são ferramenta essencial para os técnicos dos gabinetes de SIG dos municípios. Além disso, o recurso ao *Model Builder* possibilita que a qualquer momento que seja necessário alterar ponderações ou acrescentar novos dados, isto pode ser feito através do modelo já existente sem necessidade de construir novamente todos o processos.

Bibliografia

- Antunes, Catarina Carvalho, Viegas, Domingos Xavier, & Mendes, José Manuel. (2011) - *Avaliação do Risco de Incêndio Florestal no Concelho de Arganil - Silva Lusitana*, 19(2), 165-179. Recuperado em 13 de setembro de 2014, de http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-63522011000300003&lng=pt&tlng=pt.
- Costa, C. (2010) - *Localização óptima do futuro Hospital de Sintra, Aplicação de Modelos de Location-Allocation no planeamento de Cuidados de Saúde* - Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação da Universidade de Lisboa.
- Direcção da Unidade de Defesa da Floresta (2012) - *Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PDMFCI) - Guia Técnico*. Autoridade Florestal Nacional;
- Medeiros, A. (2014) - *ArcGIS: Criando um Model Buldier* - <http://andersonmedeiros.com/como-criar-model-builder-no-arcgis/> - acedido em 8/09/2014.
- Rocha, J.; Torres, R.; Meneses, T. (2013) - *Os Solos: Teor de matéria orgânica em solos ardidos e não ardidos na Serra da Penha*. Guimarães, Licenciatura em Geografia e Planeamento (Policopiado).

SIMULAÇÃO DE CHEIA SEGUIDA DE INUNDAÇÃO NA CIDADE DE MIRANDELA

Maria Gouveia

Doutoranda, Departamento de Geografia e CEGOT,
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
mmalgouveia@gmail.com

Luciano Lourenço

Departamento de Geografia e CEGOT,
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
luciano@uc.pt

Carmen Ferreira

Departamento de Geografia e CEGOT,
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
dra.carmenferreira@gmail.com

Francisco Costa

Departamento de Geografia e CEGOT,
Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho
costafs@geografia.uminho.pt

RESUMO

A ocorrência de cheias no rio Tua e as consequentes inundações na cidade de Mirandela, são conhecidas pelo menos desde o século XV. Mais recentemente, também se verificaram nos anos de 1959, 1960, 1966, 2001, 2009 e 2012. Sabendo-se que a ocorrência de inundações na cidade de Mirandela é um fator condicionante para a vida dos cidadãos que aí residem, trabalham ou se deslocam para a visitar, pensou-se ser importante simular uma cheia, seguida de inundação. Utilizando-se ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica, foi possível elaborar uma animação em 3D, que permitiu a visualização sequencial da simulação de uma cheia e consequente inundação ao longo das margens do rio Tua. De seguida, efetuou-se a avaliação das consequências e uma proposta de medidas mitigadoras.

Deste modo, pretende contribuir-se para um melhor conhecimento do risco de inundação na cidade de Mirandela, podendo proteger-se mais eficazmente pessoas, animais e bens patrimoniais.

Palavras-chave: Mirandela, cheia, inundação, simulação.

Introdução

Sabendo-se que a ocorrência de inundações na cidade de Mirandela é um fator condicionante para a vida dos cidadãos que aí residem, trabalham ou se deslocam para a visitar, pensou-se ser importante simular uma cheia, seguida de inundação.

A simulação da ocorrência de uma cheia no rio Tua, seguida de inundação ao longo das suas margens, em plena cidade de Mirandela, permite conhecer os efeitos e os prejuízos que esta poderá causar direta ou indiretamente aos comerciantes, residentes ou outras entidades.

Desde o século XV que são conhecidas as inundações na cidade de Mirandela, altura dos primeiros relatos sobre a manifestação deste fenómeno podendo, mais recentemente, alguns deles ser lidos em jornais locais e regionais (Notícias de Mirandela, Mensageiro de Bragança, Jornal do Nordeste e Jornal Terra Quente), publicados nos anos de 1959, 1960, 1966, 2001, 2009 e 2012.

Simulação e animação de cheia seguida de inundação

“Simulação é a imitação de operações de processos reais ou sistemas sobre o tempo. Simular envolve a geração de uma história artificial do sistema e a partir da observação desse histórico

é possível inferir características do sistema real em representação.” (Leonel Deusdado, 2008:25).

Tendo-se tomado conhecimento das áreas inundadas na cidade de Mirandela, ao longo dos anos de 1959, 1960, 1966, 2001, 2009 e 2012 (Maria Gouveia e Luciano Lourenço, 2013), irá efetuar-se uma simulação e uma animação tridimensional de cheia e consequente inundação entre a foz da ribeira de Carvalhais e a ponte Europa, afetando cinco locais (figs. 1 e 2).

“Animar, significa literalmente, dar vida a algo, mover algo que não pode mover-se por si só.” (Leonel Deusdado, 2008:23). A animação permite a visualização de uma simulação ao longo de uma sequência temporal.

As animações tridimensionais foram elaboradas através da utilização da extensão *3D Analyst* do *software* de Sistemas de Informação Geográfica *ArcGIS*, versão 10.2, (licença que a Universidade de Coimbra disponibiliza aos seus alunos). O ambiente de visualização disponível através da extensão *3D Analyst*, que foi utilizado, denomina-se *ArcScene*.

Figura 1 - Áreas inundadas na cidade de Mirandela pela simulação de uma cheia.

Fonte: World Map Imagery, ESRI, 2014.

Efeitos das inundações e medidas mitigadoras

Através da leitura de jornais locais e regionais, designadamente, Notícias de Mirandela, Mensageiro de Bragança, Jornal do Nordeste e Jornal Terra Quente, ficaram a conhecer-se as consequências das inundações verificadas nos anos de 1959, 1960, 1966, 2001, 2009 e 2012, nomeadamente: estragos na ponte e corte ao trânsito; habitações, viaturas e estabelecimentos comerciais e industriais inundados; destruição de campos agrícolas, vias de comunicação, vedações e muros; pessoas isoladas e morte de animais; árvores derrubadas e lodo nos jardins.

Figura 2 - Simulação e animação 3D de cheia e consequente inundação na cidade de Mirandela - Sequência temporal.

Fonte: Carta Militar de Portugal, 1/25000, folhas 76 e 77, IGeoE, 1995.

Conhecendo-se os diversos relatos, foi possível aferir os efeitos da inundação simulada e representada na figura 1, nomeadamente:

- O parque de merendas ficou degradado e está impossibilitado de ser utilizado;
- Grande parte da Avenida da Princesa do Tua foi inundada, o trânsito foi interdito e foram afetadas oito casas de habitação e um estabelecimento de restauração e bebidas;
- O jardim no patamar inferior do Santuário de Nossa Senhora do Amparo ficou degradado e duas estátuas foram danificadas;
- Parte do Parque Dr. José Gama, foi inundado, salientando-se os estragos na esplanada de um estabelecimento de restauração e bebidas;
- No estacionamento no Largo do Cardal, foram inundadas três viaturas aí estacionadas e este local foi encerrado para efeitos de estacionamento.

A partir da simulação que se efetuou, foi possível determinar, aproximadamente, os prejuízos (em euros) associados aos efeitos acima mencionados (tabela I).

Tabela I - Simulação de cheia e consequente inundação na cidade de Mirandela - Prejuízos
(valores calculados com base em pesquisas em sítios da *internet*)

LOCAL	EFEITOS DIRETOS	EFEITOS INDIRETOS	PREJUÍZO
Parque de Merendas	- Degradação do parque de merendas	- Impossibilidade de ser utilizado	- Serviço de limpeza = 600€
Avenida Princesa do Tua: 8 casas de habitação	- Caves inundadas - Degradação de jardins - Lodo nos quintais	- Retirar a água das caves - Recuperar os jardins	- Serviço de bombagem de água = 100€ x 8 = 800€ - Serviço de recuperação de jardins = 250€ x 8 = 2000€
Avenida Princesa do Tua: 1 estabelecimento de restauração e bebidas	- Degradação da esplanada (6 mesas, 24 cadeiras e 4 guarda-sol)	- Recuperar a esplanada	- Serviço de limpeza = 200€ - 6 Mesas, 24 cadeiras e 4 guarda-sol = 560€
Avenida Princesa do Tua: corte ao trânsito	- Dos 25 moradores, 9 não se deslocaram para a escola e 16 não se deslocaram para o trabalho	- Os estudantes não se valorizaram - Os trabalhadores não receberam o salário	- 16 Trabalhadores sem salário durante 1 dia = 16 x 50 = 800€
Santuário de Nossa Senhora do Amparo: patamar inferior	- Degradação de jardins - Lodo no jardim - Degradação de estátuas	- Recuperar o jardim - Recuperar as estátuas	- Serviço de recuperação de jardins = 2000€ - Recuperar 2 estátuas = 1000€
Parque Dr. José Gama: 1 estabelecimento de restauração e bebidas	- Degradação da esplanada (14 mesas, 56 cadeiras e 10 guarda-sol)	- Recuperar a esplanada	- Serviço de limpeza = 200€ - 14 Mesas, 56 cadeiras e 4 guarda-sol = 3200€
Largo do Cardal: estacionamento	- 3 Viaturas inundadas - Fecho do parque de estacionamento	- Inutilização das viaturas - Impossibilidade de se estacionar	- 3 Viaturas novas = 45000€
Total dos prejuízos			56 360€

O valor total dos prejuízos relacionados com os efeitos diretos e indiretos derivados da simulação de cheia seguida de inundação ascende aos 56.360,00€, sendo este um valor considerável que deve ser tido em devida conta. De facto, os efeitos e os prejuízos das inundações que ocorreram até à atualidade, ultrapassam em muito o valor calculado, logo, seria muito mais vantajoso que se procedesse à implementação de algumas medidas de redução da exposição às vulnerabilidades (estruturais e não estruturais). Assim, para minimizar os prejuízos nos cinco locais afetados, propõem-se as seguintes medidas concretas:

- Parque de merendas, Avenida Princesa do Tua e Jardim, no patamar inferior do Santuário de Nossa Senhora do Amparo - construção de uma proteção/dique ao longo do rio Tua, a jusante do parque de merendas;
- Parte do Parque Dr. José Gama - sistema de aviso da ocorrência de cheias de modo a que se possam salvaguardar todos os bens, efetuar um seguro contra as inundações e promover ações anuais de informação sobre cheias e inundações;
- Largo do Cardal - instalar um sistema aviso da ocorrência de cheias, de modo a nesses dias evitar o estacionamento e a retirar atempadamente todas as viaturas estacionadas, bem como a colocação de uma placa com o aviso de possibilidade de ocorrência de cheias.

Conclusão

O exercício de criação de uma simulação e animação tridimensional, elaboradas em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica, foi bastante proveitoso para se conhecerem e visualizarem, em três dimensões, as áreas que ficaram inundadas. Com base na identificação dessas áreas e nas características do espaço urbano, foi possível propor-se um conjunto de

medidas de redução da exposição às vulnerabilidades, específicas para cada um dos cinco locais inundados.

Perspetivando-se um futuro que se pretende ser mais seguro para quem habita ou visita a cidade de Mirandela, efetuar-se-ão mais estudos sobre possíveis soluções para se minimizarem os impactes provocados pelas cheias.

Bibliografia

Deusdado, Leonel (2008) - *Ambientes virtuais povoados com simulação eficiente de detecção de colisões e planeamento de trajectos em navegação realmente 3D*. Dissertação de Doutoramento. Braga, Universidade do Minho, 236 p.

Maria Gouveia e Luciano Lourenço (2013) - “Simulação de um incêndio florestal, a que se seguiu precipitação intensa, com consequente inundaço”. *Grandes Incndios Florestais, Eroso, Degradao e Medidas de Recuperao dos Solos*, Universidade do Minho, Guimares, p. 111-120, ISBN: 978-989-968107214-2-5.

USO DE SENSORES REMOTOS COMO FERRAMENTA PARA MAPEAMENTO DE ÁREAS QUEIMADAS POR INCÊNDIOS FLORESTAIS. O EXEMPLO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL NO ANO DE 2013

Raphael Costa Cristovam da Rocha

Departamento de Geografia, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
raphaelrocha.br@gmail.com

Luciano Lourenço

Departamento de Geografia, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
luciano@uc.pt

Gil Rito Gonçalves

Departamento de Matemática, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
gil@mat.uc

RESUMO

Os incêndios florestais constituem um gravíssimo problema para a degradação do ecossistema global e há anos que Portugal vem sendo castigado por este fatídico evento. O uso da detecção remota, nas últimas décadas, tem-se tornado muito importante no estudo dos incêndios florestais, por proporcionar uma visão abrangente do território em análise, pois não se cinge somente a um local, pelo que esta ferramenta é uma mais valia para localização, delimitação, mitigação e prevenção de incêndios. O objetivo deste estudo é a utilização de sensores remotos como ferramenta chave para o mapeamento das áreas ardidas no ano de 2013, no município de Oliveira do Hospital, situado na região centro de Portugal. Foram cartografadas áreas incendiadas a partir de imagens de satélite LANDSAT 8, aplicando as técnicas de classificação supervisionada e o índice Normalized Burnt Ratio. Desta forma, demonstra-se uma forma alternativa de mapear as áreas ardidas.

Palavras-chave: Sensores remotos; Landsat 8; NBR; Incêndios florestais.

Introdução

Os incêndios florestais constituem, um pouco por todo o mundo, um problema de extrema importância para a degradação do ecossistema global.

Sendo mais característicos do clima mediterrânico, coincidem com o verão, quente e seco, pelo que a temporada (julho - setembro) dos incêndios está muito influenciada por este tipo de clima. Por isso, não será de admirar que os incêndios florestais sejam um grave problema, quase todos os anos, em Portugal.

Devido à grande variação espacial e temporal, bem como à incerteza da ocorrência dos incêndios florestais, estimar com precisão a área afetada e determinar a gravidade do incêndio, somente através de medições em terra, representa um enorme desafio para as autoridades envolvidas na DFCI - Defesa da Floresta Contra Incêndios. Em contrapartida, as técnicas de sensoriamento remoto proporcionam uma forma alternativa de detectar a variabilidade espacial e temporal dos efeitos de fogo, com menor custo e menos dispêndio de tempo, do que ficar dependentes exclusivamente de inventários de campo tradicionais (Lentile *et al.*, 2006, *apud* CHEN *et al.*, 2011). Face ao exposto, esta ferramenta constitui uma mais valia para localização e delimitação dos incêndios florestais, além de que também pode ajudar na sua prevenção e mitigação, através do uso de índices espectrais de vegetação, derivados das imagens dos satélites, uma vez que fornecem um método simples e eficiente para cartografar a abundância

da vegetação e já foram usados para a detecção e mapeamento das áreas afetadas pelos incêndios florestais (PEREIRA, 1999).

Metodologia

A detecção das áreas afetadas pelo fogo é possível através das diferenças que os sinais espectrais da vegetação queimada apresentam em contraste com a vegetação não queimada. Segundo CHUVIECO *et al.* (2002) *apud* TORRALBO e BENITO (2012) “*Remote sensing from satellite is set out as a very solid alternative for mapping burned areas, allowing a systematic observation of all land surfaces, in spectrum bands sensitive to discrimination of burned signal and in digital format*”.

Neste trabalho, será aplicado somente o índice NBR (*Normalized Burnt Ratio*)

$$(NBR_i = \frac{P_{i,NIR} - P_{i,SWIR}}{P_{i,NIR} + P_{i,SWIR}}),$$

onde $P_{i,SWIR}$ é igual à refletividade do pixel i na banda do SWIR - entre 1 e 2,5 microns. Este índice não somente serve para mapeamento das áreas queimadas, mas também para identificar os diferentes níveis de danos causados na vegetação pelo fogo (Garcia e Chuvieco, 2004).

As imagens utilizadas do satélite Landsat 8 são dos dias 17 de Abril, 15 e 31 de Julho; 23 de Agosto; 01 de Setembro de 2013 e 12 de Março de 2014, sendo imagens exatamente dos dias de pré e pós incêndio no município de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, região Centro de Portugal, com exceção dos dias 17 de abril de 2013 e 12 de março de 2014, por serem imagens somente de comparação e para finalizar um ciclo anual de imagens.

A literatura científica (CHUVIECO *et al* 2002 *apud* TORRALBO e BENITO, 2012) recomenda o uso das bandas 4, 5 e 7 do Landsat 8 para realizar composições multitemporais. Para a Classificação Supervisionada, foi utilizado o plugin “*Semi-Automatic Classification Plugin*” do software QGIS 2.2 Valmiera.

Objetivos

Apesar de Portugal mapear e catalogar os incêndios florestais de forma eficiente, o objetivo deste trabalho visa apresentar outra forma de localizar e medir as áreas ardidas de modo gratuito, utilizando ferramentas *open source* e imagens fornecidas gratuitamente pelo *website* da USGS (*United States Geological Services*), em <http://landsatlook.usgs.gov/>.

Resultados

Foram trabalhadas 5 imagens para cada dia em análise, com o intuito de ser escolhida apenas uma, ou seja, aquela que representaria o melhor produto final.

Deste modo, o mapa que melhor representa o território no dia 17 de Abril de 2013, foi com a classificação supervisionada (figura 1). Constatou-se que não houve incêndio nesse mês e observou-se que a classificação supervisionada é aquela que nos indica com maior clareza o uso e ocupação do solo. Para os mapas com o índice NBR e a composição SWIR, vimos que estes não resultam na perfeição para o objetivo do trabalho, uma vez que mostram os locais com solos nus como se fossem áreas ardidas. A composição TrueColor apresentou uma imagem com bastante ruídos.

Depois, no dia 15 de Julho, a imagem com composição 7-5-4 (SWIR) foi aquela que melhor representou o incêndio ocorrido no dia 8 de Julho, com a indicação do local ardido em vermelho

na imagem (figura 1). Esta indicação foi realizada após uma minuciosa procura na imagem do local queimado, devido a área ardida ser de pequena dimensão (4,1 ha - dado obtido através de delimitação por GPS pelo Eng. José Carlos Marques, da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital), situada a Norte das Caldas de São Paulo. Para as imagens obtidas pós aplicação do índice NBR, notámos que a área queimada, por ser muito pequena, é de difícil localização, além do facto de ter indicado com grande representatividade os solos nus. Para a composição 4-3-2 (TrueColor) e a classificação supervisionada, observou-se que estas imagens não conseguiram enaltecer a área queimada. No que respeita às imagens do dia 31 de Julho, a composição SWIR foi a que melhor representou a área queimada, em vermelho, no dia 29 de Julho, localizada junto a freguesia de Seixos da Beira e com a área de 6,9 ha (figura 1). A classificação supervisionada classifica alguns pixels dos solos nus como áreas queimadas, sabemos que, neste caso, não o são e, dessa forma, o mapa torna-se viável para sua utilização. Porém a composição 7-5-4 (SWIR) indicou as áreas queimadas com maior precisão. O mapa do índice NBR não nos serviu uma vez que só identificou um dos incêndios. A composição TrueColor também não serviu para identificação das áreas queimadas, pelo que apenas serviu de referência para a realidade do município.

Quanto ao dia 23 de Agosto, a imagem com o índice NBR aplicado resultou na melhor representação, pois além de informar o grau de stress hídrico (figura 1), também permitiu localizar o incêndio de 21 de Agosto, com a área de 150 ha, situado junto a Penalva de Alva. Neste caso, foi aplicado um limiar no índice que apresentasse somente os pixels com valores negativos, pois, segundo KEY e BENSON (2006), *“Because NBR measures the difference of R4 minus R7, it is positive when R4 is greater than R7. This is the case over most vegetated areas that are productive. When it is near zero, R4 and R7 are about equal, as occurs with clouds, nonproductive vegetation (cured grasses), and drier soils or rock. When NBR is negative, R7 is greater than R4. This suggests severe water stress in plants and the nonvegetative traits created within burns”*. Desta forma, o stress hídrico do solo foi categorizado em 4 graus de intensidade, relacionando-se, assim, à severidade do incêndio. A classificação supervisionada para este dia, resultou numa imagem muito confusa e cheia de ruídos. Já a composição SWIR ajudou a entender porque é que a classificação supervisionada não resultou tão bem, pois verificámos que uma boa parte do município apresentava grande quantidade de solo exposto. A composição TrueColor ajudou-nos a melhor compreender as condições em que se encontravam os solos do município, confirmando a composição SWIR.

No dia 1 de Setembro, a composição SWIR foi a que melhor representou o incêndio de 25 de Agosto, ocorrido em Lagares da Beira, com a área de 830 ha (figura 1), embora praticamente todas as outras técnicas tenham sido eficientes na identificação da área. A escolha pela composição SWIR deve-se ao facto desta representar o maior número de áreas queimadas e distinguir os solos expostos das áreas queimadas, não causando confusão no operador da imagem.

No último dia de análise deste estudo, a imagem mais representativa foi a da classificação supervisionada (figura 1). Apesar de até este dia, 12 de Março de 2014, não ter ardido mais área, a exposição do solo devido aos incêndios supra apresentados é bem identificada na imagem, pelo que a classificação supervisionada mostra com bastante precisão as diferentes formas de uso do solo do município. Por outro lado, a composição SWIR indicou-nos, ainda que de forma suave, os solos expostos, enquanto que a composição TrueColor, por conter muita informação, pode confundir o operador da imagem. Já o índice NBR mostra os solos expostos do antigo incêndio como se tivessem ardido no momento da imagem, sendo por isso inútil ao estudo, por distorcer a realidade.

Conclusão

Neste estudo pretendeu-se mostrar de forma simples e eficiente o mapeamento gratuito de incêndios florestais através de *softwares open source* e imagens de satélite tais como *Landsat 8*, que são fornecidas gratuitamente pelo *website* da NASA (*National Aeronautics and Space Administration*) <http://landsatlook.usgs.gov/>.

A partir das imagens, foram feitas combinações e aplicações de índices de vegetação a fim de evidenciar as áreas queimadas pelo incêndio e aplicou-se a técnica de Classificação Supervisionada.

O uso dos sensores remotos do satélite *Landsat 8* mostrou ser uma ferramenta de mais valia e de grande importância no mapeamento de incêndios florestais, uma vez que proporcionou um estudo temporal do ano de 2013, para todo o município de Oliveira do Hospital, podendo, assim, manter uma base de dados sempre atualizada de forma gratuita e eficiente.

Bibliografia

- CHEN, X.; VOGLEMANN, J. E.; ROLLINS, M.; OHLEN, D.; KEY, C. H.; YANG, L.; HUANG, C.; SHI, H. (2011) - Detecting post-fire burn severity and vegetation recovery using multitemporal remote sensing spectral indices and field-collected composite burn index data in a ponderosa pine forest. *International Journal of Remote Sensing*. Vol. 32, No. 23, 7905-7927
- GARCIA, M.; CHUVIECO, E. (2004) - Assessment of the potential of SAC-C/MMRS imagery for mapping burned areas in Spain. *Remote Sensing of Environment*, Issue 92, pp. 414-423
- KEY, C. H.; BENSON, N. C. (2006) - *Landscape Assessment - Sampling and Analysis Methods*. USDA Forest Service Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-164-CD.
- PEREIRA, J. M. C. (1999) - A comparative evaluation of NOAA/AVHRR Vegetation Indexes for Burned Surfaces Detection and Mapping. *IEEE Transactions On Geoscience And Remote Sensing*, Vol. 37, nº. 1, January.
- TORRALBO, A., F.; BENITO, P.; M. (2012) - *Landsat and MODIS Images for Burned Areas Mapping in Galicia, Spain*. Master's of Science Thesis in Geoinformatics, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden

UTILIZAÇÃO DA DETECÇÃO REMOTA NA CONSTRUÇÃO DE MAPAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DELIMITAÇÃO DE ÁREAS INCENDIADAS

Raphael Rocha

Mestrando em Geografia Física, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
raphaelrocha.br@gmail.com

Bruno Martins

Departamento de Geografia, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e CEGOT
bruno.martins@uc.pt

António Pedrosa

RESUMO

A utilização de mapas de uso e ocupação do solo e limitação das áreas incendiadas é de grande utilidade para a cartografia de susceptibilidade geomorfológica. A disponibilidade de imagens de satélite sem custos para o utilizador, aliada à visão abrangente do território, faz da sua utilização uma alternativa aos inventários de campo tradicionais na elaboração deste tipo de cartografia. Foi realizado um processo de composição multi-temporal a partir das imagens de satélite LANDSAT 8 para uma área amostra, com base no uso das bandas 4 (banda do visível azul), 5 (infravermelho próximo) e 7 (SWIR) a partir da função Build Virtual Raster, disponíveis no software QuantumGIS 2.2 Valmiera. A resolução espacial das imagens de satélite permitiu uma rigorosa definição de áreas com diferentes uso e ocupação do solo (áreas incendiadas, povoações, floresta e solo exposto) e ainda, categorizar graus de severidade do incêndio sobre a vegetação por comparação de bandas.

Palavras-chave: Detecção remota; LANDAT 8; incêndios florestais; Penalva do Alva; Centro de Portugal.

1. Introdução

São variados os processos erosivos associados a processos geomorfológicos, que para além da componente física, estão associados à ação antrópica. A identificação rigorosa dos diferentes usos e ocupação do solo assume desta forma importância para o desenvolvimento de cartografia de susceptibilidade geomorfológica. Por outro lado, os violentos incêndios florestais recorrentes no território português implicam uma definição rigorosa das áreas ardidas, uma vez que se trata de áreas particularmente susceptíveis à erosão (Lourenço, 2004). A contribuição dos sensores remotos aplicados ao estudo de erosão dos solos surge por volta de 1940. Proporcionam uma visão abrangente do território e são uma alternativa aos inventários de campo tradicionais utilizados não só para a cartografia de uso e ocupação do solo, mas também, para a delimitação de áreas incendiadas (Pereira, 1999). Com o lançamento do satélite LANDSAT 1 em 1972 emerge a possibilidade da utilização dos valores de refletância da superfície permitindo o desenvolvimento de vários mapas temáticos, e ainda, a identificação de ravinas, deslizamentos e fluxos detríticos (Vrieling, 2005; Shruthi et al. 2011). Para o estudo apresentado foi utilizado o índice NBR (Normalized Burnt Ratio) obtido a partir das imagens de satélite LANDSAT 8, trabalhado a partir da função Raster Calculator do software QuantumGIS 2.2 Valmiera. Este índice foi utilizado para a identificação das áreas incendiadas e os diferentes níveis de severidade causados pelo incêndio na vegetação (Garcia & Chuvieco, 2004), e para a construção de mapas do uso e ocupação do solo para uma área amostra próxima de Penalva do Alva.

2. Área de estudo

A área de estudo localiza-se próximo da povoação de Penalva de Alva, concelho de Oliveira do Hospital. Do ponto de vista geomorfológico está incluída nos terrenos do Maciço Antigo e pertence à zona Centro-Ibérica. Apresenta uma marcada heterogeneidade litológica, com o predomínio de rochas eruptivas e metamórficas, em particular, granitos e metassedimentos. Os quartzitos, rompem geralmente em afloramentos um tanto localizados, mas que introduzem, pela sua resistência, acentuados contrastes de relevo (Lourenço, 2007). A área apresenta ainda uma complexa rede de falhas e fraturas que terá permitido uma maior infiltração em profundidade contribuindo desta forma para uma maior eficácia na meteorização, especialmente em substrato granitóides, onde é comum a presença de mantos de alteração. Destaca-se a presença de ravinas, algumas profundas, localizadas em vertentes de forte declive e regularizadas por mantos de alteração. Associado às características climáticas, a formação de ravinas está relacionada com fatores físicos como o declive, forma e tamanho da bacia hidrográfica, propriedades físicas, químicas e mineralógicas dos solos ou a presença de material pouco coeso a regularizar as vertentes, como mantos de alteração ou depósitos de vertente (Martins et al. 2014). No entanto, os factores antropogénicos são fundamentais na instalação e desenvolvimento de ravinas. No caso das ravinas presentes na área de estudo, a exposição das vertentes a sucessivos episódios de incêndios, mais ou menos severos para a vegetação, terá contribuído certamente para a instalação de sulcos que terão evoluído para ravinas, ao destruírem grande parte da vegetação, em especial herbácea e arbustiva, expondo o solo diretamente à precipitação. Neste sentido, é particularmente útil o desenvolvimento de mapas de uso e ocupação do solo e, no que respeita às áreas incendiadas, a sua rigorosa delimitação, bem como a intensidade da severidade do incêndio sobre a vegetação.

3. Metodologia

As imagens selecionadas para a construção do mapa de uso e ocupação do solo e delimitação das áreas incendiadas corresponderam à do dia 23 de Agosto de 2013, obtida a partir do satélite LANDSAT 8, dois dias depois de um grande incêndio ter ocorrido na área de estudo. Foi realizado um processo de composição multi-temporal das imagens escolhidas com base no uso das bandas 4 (banda do visível azul), 5 (infravermelho próximo) e 7 (SWIR) a partir da função Build Virtual Raster, disponíveis no software QuantumGIS 2.2 Valmiera. Posteriormente procedeu-se à composição de imagens com cores verdadeiras com base nas bandas 4, 3 e 2 (bandas TrueColor). Foi feita ainda uma tentativa de mapeamento das ravinas utilizando as imagens processadas para a identificação das áreas incendiadas e o software QuantumGIS 2.2 Valmiera para o processamento das imagens. O índice NBR permitiu identificar o grau de intensidade do incêndio, categorizado a partir da diferença entre R4 (banda 5) e o R7 (SWIR) (Key & Benson, 2006). Os píxeis com valores negativos obtidos a partir desta diferença (píxeis de cor vermelha) representam os sectores de maior severidade causados pelo incêndio.

4. Resultados

O índice NBR permitiu identificar o grau de intensidade do incêndio, categorizado a partir da diferença entre R4 (banda 5) e o R7 (SWIR) segundo a metodologia proposta por Key & Benson (2006) (figura 1). Os píxeis com valores negativos obtidos a partir desta diferença (píxeis de cor vermelha) representam os sectores de maior severidade causados pelo incêndio. A resolução espacial de 30 metros do satélite LANDSAT 8 permitiu uma rigorosa definição das áreas com

diferentes uso e ocupação do solo, em particular, as áreas incendiadas, povoações, floresta e solo exposto (figura 2).

Figura 1 - Intensidade do fogo sobre a vegetação (imagem de satélite LANDSAT 8).

No entanto, a identificação de ravinas revelou-se tarefa mais árdua. Recorrendo à composição 4-3-2 (True Color) (figura 3) e à composição 7-5-4 (SWIR) (figura 4) é possível identificar ravinas de maiores dimensões, como a ravina do Corgo, que apresenta nos sectores intermédios e final, profundidade superior a 4 metros. Não permite contudo identificar ravinas mais superficiais.

Figura 2 - Mapa do uso e ocupação do solo (imagem de satélite LANDSAT 8).

4. Conclusão

A utilização de mapas de uso e ocupação do solo e limitação das áreas incendiadas é de grande utilidade para a cartografia de susceptibilidade geomorfológica. O recurso ao sensoriamento remoto demonstrou ser uma ferramenta interessante para a concretização deste tipo de mapas.

A disponibilidade de imagens de satélite sem custos para o utilizador, aliada à visão abrangente do território, faz da sua utilização uma alternativa aos inventários de campo tradicionais. No trabalho realizado foram utilizadas as imagens do dia 23 de Agosto de 2013, obtida a partir do satélite LANDSAT 8, com o objectivo de produzir um mapa de uso e ocupação do solo e um mapa de delimitação das áreas incendiadas numa área amostra próxima da povoação de Penalva do Alva. Foi realizado um processo de composição multi-temporal das imagens escolhidas com base no uso das bandas 4 (banda do visível azul), 5 (infravermelho próximo) e 7 (SWIR) a partir da função Build Virtual Raster, disponíveis no software QuantumGIS 2.2 Valmiera. A resolução espacial do satélite LANDSAT 8 de 30 metros permitiu uma rigorosa definição das áreas com diferente uso e ocupação do solo (áreas incendiadas, povoações, floresta e solo exposto). Permitiu ainda categorizar graus de severidade do incêndio sobre a vegetação por comparação de bandas. No entanto, para a identificação e cartografia rigorosa das ravinas (comprimento, profundidade e largura) encontradas na área de estudo, o grau de resolução das imagens trabalhadas não permitiu resultados satisfatórios exigindo níveis de resolução maiores.

Bibliografia

- Key, C. & Benson, N. (2006) - *Landscape Assessment - Sampling and Analysis Methods*. USDA Forest Service Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-164-CD.
- Lourenço, L. (2004) - *Riscos de Erosão após Incêndios Florestais*. ed. 1. Coimbra: Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais.
- Lourenço, L. (2007) - *O povoamento alto-medieval entre os rios Dão e Alva*. *Trabalhos de Arqueologia*, 50. Instituto Português de Arqueologia, Lisboa.
- Martins, B.; Santos, P.; Rebelo, F. (2014) - Conhecimento e cartografia da espessura das formações superficiais na área de Pensalvos (serra do Alvão, norte de Portugal), *Territorium*, 21, Coimbra, 115-123 p.
- Pereira, J. (1999) - *A comparative evaluation of NOAA/AVHRR Vegetation Indexes for Burned Surfaces Detection and Mapping*. IEEE Transactions On Geoscience And Remote Sensing, Vol. 37, nº. 1.
- Shruthi, R. Kerle, N.; Jetten, V. (2011) - Object-based gully feature extraction using high spatial resolution imagery. *Geomorphology*, Elsevier, 134, p. 260-268.
- Vrieling, A. (2005) - Satellite remote sensing for water erosion assessment: a review. *Catena*, Elsevier. Science Direct, 65, 2-18p.

CAPÍTULO 3

TERRITÓRIOS DE RISCOS

(PREVISÃO, PREVENÇÃO,
CONSEQUÊNCIAS E REABILITAÇÃO)

CAPÍTULO 3.1

RISCOS GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS

MODELAÇÃO E ANÁLISE DE PERDAS ASSOCIADAS AO RISCO SÍSMICO

Luis Sá

Autoridade Nacional de Proteção Civil
luis.sa@prociv.pt

Patrícia Pires

Autoridade Nacional de Proteção Civil
patricia.pires@prociv.pt

Paulo Henriques

Câmara Municipal de Lisboa
paulo.franco@cm-lisboa.pt

Maria João Telhado

Câmara Municipal de Lisboa
joão.telhado@cm-lisboa.pt

RESUMO

Portugal possui um elevado risco sísmico tendo em conta as vulnerabilidades associadas à ocupação humana bem como ao histórico de eventos sísmicos registados. Face à inevitabilidade da ocorrência de sismos, a abordagem a esta questão num contexto nacional deve assentar na análise dos seus aspetos fundamentais, e que simultaneamente reflitam necessariamente sobre os fatores que contribuem para a existência de um risco “real” de desastre para a sociedade. É inestimável a existência e a manutenção de um simulador de danos resultantes de um sismo com a capacidade de visualização de um cenário, com indicação de danos potenciais, cuja tipologia possui uma incerteza difícil de determinar empiricamente. Presentemente existem duas regiões do país abrangidas por tais ferramentas, Lisboa e o Algarve, persistindo uma lacuna no que respeita ao restante território. Assim, numa tentativa para colmatar este facto, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e a Câmara Municipal de Lisboa (CML) através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil, unindo esforços e conhecimento técnico-científico, estão a desenvolver um protótipo de simulador de Risco Sísmico cuja metodologia poderá ser aplicável ao continente português de forma transversal.

Palavras-chave: Modelação. Risco Sísmico. Consequências

Painel: Riscos Geológicos

Introdução

É inestimável a existência e a manutenção de um simulador de danos resultantes de um sismo com a capacidade de visualização de um cenário, com indicação de danos potenciais, cuja tipologia possui incerteza difícil de determinar empiricamente. Até agora só existiam duas regiões do país abrangidas por tais ferramentas, Lisboa e o Algarve, persistindo uma lacuna no que respeita ao restante território. Assim, numa tentativa de colmatar esta realidade, a ANPC e a CML, unindo esforços e conhecimento técnico, estão a desenvolver um protótipo de simulador cuja metodologia poderá ser aplicável ao continente português de forma transversal. No presente trabalho, dá-se a conhecer as etapas desenvolvidas na construção do protótipo do simulador:

- I. Recolher, tratar, compatibilizar e integrar no simulador dados e metodologias nacionais e internacionais desenvolvidas durante as ultimas décadas na área do risco sísmico que contaram com a participação da ANPC e da Proteção Civil do município de Lisboa.
- II. Modelar o simulador com os principais modelos de cálculo nas seguintes áreas de desenvolvimento, i) leis de Atenuação, modelo de cálculo dos efeitos dos solos na propagação da onda sísmica desde o substrato rochoso até superfície e quantificação da ação sísmica à

superfície; ii) distribuição espacial, por subsecção estatística, da população móvel e a população presente “in-house” e “out-house” para cada mês do ano e ao longo de vários períodos do dia; iii) modelos de cálculo de danos para o Edificado, População e para a componente financeira e iv) resultados da modelação de Tsunamis, sob a forma de Altura de Onda,

III. Conceber, desenvolver e adaptar o simulador para utilização pela ANPC e posteriormente noutros serviços de proteção civil distrital e municipal, como é o caso de Lisboa.

Desenvolvimento de Conteúdos

Como pré-requisitos, foram utilizadas como fonte de informação, e de dados, diversas variáveis estudadas para a realização do *Estudo do Riscos Sísmico da Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos Limítrofes* (AML-CL) e do *Estudo do Risco sísmico e Tsunamis do Algarve* (ERSTA). Através da colaboração conjunta com o SMPC do município de Lisboa (CML), obtiveram-se informações técnicas sobre o simulador municipal de risco sísmico desenvolvido para esta cidade na década de 90, do qual derivaram metodologicamente os actuais simuladores em uso pela ANPC, com a vantagem de recorrer ao uso de compilações em código aberto. Outras fontes de informação que merecem destaque são as informações técnicas apenas ao software HAZUS/FEMA e ao projeto de investigação EU FP-6 - *NERIES*. Desenvolvido sobre o ambiente EXCEL, em linguagem Visual Basic, todos os scripts presentes neste simulador são editáveis por um utilizador credenciado, a ser definido consoante o tipo de perfil do utilizador. Somente como ferramenta de visualização optou-se pelo já decano ArcView 3.2 da ESRI por ainda ser um software de utilização rápida, eficaz e ainda atualmente reconhecido como tal pela maioria dos utilizadores de SIG, correndo em ambientes tão distintos como o antigo Windows 98 ou o atual Windows 8, o que denota a sua abrangente versatilidade. A construção da metodologia assenta na premissa que o risco sísmico é estimado em função do perigo de ocorrência de um fenómeno e da exposição dos elementos vulneráveis a essa ocorrência.

Leis de Atenuação - Esta análise foi baseada em sete leis de atenuação criadas com dados de diferentes áreas do globo, incluindo a Península Ibérica a nível micro e ao nível macro. Através de uma metodologia iterativa assente numa combinação dessas sete leis de atenuação, obtiveram-se resultados que integram uma relação satisfatória entre magnitude, epicentro e a distância a este.

Impedância - A modificação do movimento sísmico devido às condições topográficas e geotécnicas locais é chamada de efeito local. Esta amplificação, ou atenuação é obtida comparando a resposta de um sítio com a de um local de referência, isto é, um ponto localizado na rocha plana. O contraste de impedância entre sedimentos e rocha caracteriza as propriedades de um solo. Assim, quanto menor o contraste de impedância, mais brandos os sedimentos (na figura identificado com a letra A) são quando comparados com o substrato rochoso/rocha-mãe (B). Considera-se o caso simples de uma camada de solo horizontal ao longo de um espaço elástico. A partir da rasterização da carta geológica de Portugal 1:1.000.000 e do cruzamento da informação associada com as subsecções estatísticas do INE de 2011, via geoprocessamento em SIG, foi possível obter qual a formação geológica predominante por subsecção. Seguidamente obtiveram-se para cada formação geológica os valores de referência para a velocidade de propagação de onda e para a densidade específica, tendo-se estabelecido como rocha-mãe os

- i. **Bakun and Wentworth (1997): California, USA**

$$I_{MMI} = 3.67 + 1.17 M_W - 3.19 \log(R_{epi})$$
- ii. **Bakun and Scotti (2006): French SCR**

$$I_{MSK} = 4.48 + 1.27 M_W - 3.37 \log\left(\sqrt{R_{epi}^2 + h^2}\right)$$
- iii. **Bakun (2006): Basin & Range, USA**

$$I_{MMI} = 0.44 + 1.70 M_W - 0.0048 \Delta_h - 2.73 \log(\Delta_h)$$

where:

$$\Delta_h = \sqrt{R_{epi}^2 + h^2}$$

$$h = 10$$

$$\sigma = 0.58$$
- iv. **Pasolini et al. (2008): Italy**

$$I_{MCS} = I_E - 0.0086 \left(\sqrt{R_{epi}^2 + h^2} - h \right) - 1.037 \left[\ln \left(\sqrt{R_{epi}^2 + h^2} \right) - \ln(h) \right]$$

where:

$$I_E = 2.460 M_W - 5.862$$

$$h = 3.91$$

$$\sigma = 0.69$$
- v. **Esteve & Rosenblueth (1967): California**

$$I_{MMI} = c1 + c2M - c3 \ln R$$
- vi. **Lopez et al. (2000): Iberia**

$$I = 5.557 + 0.902 \cdot I_0 + 0.014 \cdot I_0^2$$
- vii. **Crespellani et al. (1993): Italy**

$$I_{MMI} = 6.39 + 1.756M - 2.747 \ln(R + 7)$$

Figura 1 - Leis de Atenuação usadas

Figura 2 - Modelo Unidimensional de Estratificação

valores associados às formações do tipo rocha ígnea plutónica ou intrusiva, como são o caso de Monchique, Sintra, Estrela e outras formações rochosas situadas mais a Norte. A partir da informação obtida foi então possível obter uma classificação continental de 19 classes de contraste impedância (B). **Estimação da Vulnerabilidade** - A vulnerabilidade é definida como nível de danos de um elemento, ou conjunto de elementos expostos, resultante da ocorrência de um fenómeno natural ou tecnológico (Julião *et al*, 2009), Funções de vulnerabilidade (ou curvas de fragilidade) de um elemento exposto representam a probabilidade de que a sua resposta ao terremoto excede os seus vários estados limites de desempenho com base em considerações físicas e económicas e sociais. Os procedimentos genéricos usados para o desenvolvimento de funções de fragilidade podem ser agrupadas como empíricos ou analíticos. Um exemplo marcante é o proposto por Giovinazzi e Lagomarsino (2004) que levaram à definição de funções de probabilidade de dano com base na escala EMS-98 (Grünthal, 1998). **Curvas de Fragilidade** - A escala EMS-98 define descrições qualitativas de “poucos”, “muitos” e “a maioria” para cinco graus de danos (D1 a D5) para os níveis de intensidade que variam de V a XII, por cinco ou seis classes diferentes de vulnerabilidade (A a E ou A a F). As matrizes de probabilidade de danos produzidas para cada classe de vulnerabilidade foram relacionadas com o parque edificado através da utilização de um índice de vulnerabilidade empírico que depende do edifício, tipologia e as práticas de construção tipicamente utilizadas. As informações sobre o edificado nacional foram recolhidas a partir dos resultados dos Censos 2011. Um modo para associar cada edifício a uma tipologia foi feito com a ajuda do EMS98. Levando em consideração Teves-Costa *et al*. (2011), valores mínimos, médios e máximos de índices de vulnerabilidade foram escolhidos por tipologia.

Date of construction	Number of floors	Concrete (EBAR)	Masonry (EARG)	Adobe/ Mud (EPAT)	Other (EORE)
Before 1919	All	---	B	A	A
1920 - 1960	All	C	C	A	A
1961 - 1985	All	D	C	A	A
1986 - 2009	All	E	D	A	A

Figura 3 - Tipologia de Edificado (A a E)

$$(1) \quad \mu_D = 2.5 \left[1 + \tanh \left(\frac{I + 6.25V_i - 13.1}{2.3} \right) \right]$$

A partir do cruzamento das últimas duas tabelas, obtém-se um valor médio de vulnerabilidade (V_i) para cada classe. Neste ponto, aplica-se a expressão (1) para obter μ_D que é o nível de vulnerabilidade. Seguidamente a função dano é estimada, usando uma distribuição beta de execução compatível com o software Excel2007 e o MiniTab15. As curvas de fragilidade podem finalmente ser estimadas após o cálculo da função de densidade de probabilidade. Concomitantemente no cálculo da vulnerabilidade utilizado neste simulador recorreu-se simultaneamente ao método Cambridge que, no caso dos edifícios efetivamente colapsados

(colapso total), considera a taxa de mortalidade de 90%, e a taxa de feridos igual a 10%, seguindo uma distribuição análoga à preconizada no modelo original. Coburn e Spencer (2002) também propuseram um modelo global de estimativa de vítimas, considerando no momento do sismo, por edifício: o tipo de construção, o número de ocupantes discriminando os que se encontram presos no desabamento, a sua ocupação, o número de ocupantes presos, distribuição das lesões em situações de colapso e pós mortalidade em colapso. *Estimação do Risco* - O valor final de risco será calculado pela combinação do perigo (cálculo das intensidades macrosísmicas via leis de atenuação) com a vulnerabilidade do edificado (através das metodologias de Coburn&Spencer + Giovinazzi&Lagomarsino&Cambridge) expressa em função de danos, i) nº de vítimas mortais; nº de vítimas com ferimentos ligeiros; nº de pessoas desalojadas; ii) nº edifícios colapsados; nº edifícios com danos severos; nº edifícios com danos moderados; nº edifícios com danos ligeiros; iii) perdas financeiras e iv) altura de potencial tsunami, em caso de cenário costeiro via Gusev e Chubarov (1987).

Conclusão

Procurou-se com este trabalho proporcionar à ANPC um instrumento de planeamento de emergência e de apoio às políticas de Prevenção e Resposta a situações de ocorrência de sismos de moderada a elevada intensidade. Embora aparentemente complexo, o simulador desenvolvido está desenhado por forma a, sem intervenção do utilizador, definir qualquer cenário, ativando um conjunto de opções pré-definidas, que constituem uma aproximação equilibrada a qualquer situação. Assim, o utilizador apenas terá que fazer opções de formulações alternativas se assim o desejar e quando se sentir preparado para o fazer. Por fim, a introdução de um procedimento que gera de forma automática ficheiros de resultados estatísticos pré-formatados para cada um dos cenários escolhidos, constitui uma forma de, com extrema simplicidade, incorporar toda essa informação em textos, relatórios, mapas e apresentações ou outras formas de comunicação, estudo ou divulgação da informação produzida de apoio à prevenção e à emergência. Esperamos assim ter contribuído para uma mitigação do risco sísmico e um incremento da segurança de quem amamos.

Bibliografia

- Baptista, M. A., Miranda, J. M., Batlo, J., & Ferreira, H. (2012, April). Tsunami flooding along Tagus estuary, Portugal, the 1531 event. In EGU G.A. Conference Abstracts (Vol. 14, p. 4910).
- Bernardini, A., Giovinazzi, S., Lagomarsino, S., & Parodi, S. (2007). The vulnerability assessment of current buildings by a macroseismic approach derived from the EMS-98 scale.
- Coburn, A. Spence, R. (2002) Earthquake Protection, 2nd Edition ISBN: 978-0-470-84923-1
- Erdik, M., Sesetyan, K., Demircioglu, M., Hancilar, U., Zulfikar, C., Kakti, E. & Harmandar, E. (2010). Rapid earthquake hazard and loss assessment for Euro-Mediterranean region. *Acta Geophysica*, 58(5), 855-892.
- Giovinazzi, S., Lagomarsino, S. (2004). A macroseismic method for the vulnerability assessment of buildings. In 13th WCEE, Vancouver, BC, Canada (pp. 1-6).
- Gusev, V. K., and L. B. Chubarov (1987), Numerical modeling of generation and propagation of tsunami in coastal zone, *Izv. Phys. Solid Earth*, 23, (11), 53.
- Grünthal, G. (ed.): European Macroseismic Scale 1998 (EMS-98). *Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie* 15, Luxembourg, 99 pp., 1998.

- Julião, et al (2009) . Guia metodológico para a produção de cartografia municipal de risco e para a criação de sistemas de informação geográfica (SIG) de base municipal. Autoridade Nacional de Proteção Civil, pp 93.
- Oliveira, C. S., Pais, I. (1995). Technical approaches for earthquake emergency planning: Recent application to the city of Lisbon.. London E and FN Spon, 58-72.
- Sousa, M.L., (2007). “Hierarquização das regiões de Portugal Continental em função do seu risco sísmico”. Sísmica 2007 - 7º Congresso de Sismologia e Engenharia Sísmica, 26-28 de Setembro, FEUP, Porto, Portugal.
- Teves-Costa, P, Barreira E, Omira R (2011). Estimativa de cenários de danos para a cidade de Lisboa. RISK-UE. www.risk-ue.net

IDENTIFICATION DES ZONES SOUMISES À LA DÉGRADATION DU SOL DANS LE BASSIN VERSANT DE N'FIS (MAROC)

Adama Amaya

Département de Géologie, Faculté des Sciences, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.
amayaadama@gmail.com

Abdellah Algouti

Département de Géologie, Faculté des Sciences, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.
abalgouti@gmail.com

Ahmed Algouti

Département de Géologie, Faculté des Sciences, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.
ahmedalgouti@gmail.com

Nadia El Aggad

Département de Géologie, Faculté des Sciences, Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.
n.elaaggad@gmail.com

RÉSUMÉ

Le présent travail porte sur une étude de l'évolution de la végétation dans le bassin versant de N'fis. Elle est réalisée à l'aide de la télédétection. La méthodologie utilisée est la réalisation des cartes d'occupation du sol à partir des images satellites Landsat TM de trois années différentes (1988, 2000 et 2011). La détection de changement en comparant les trois cartes, fait ressortir les zones sensibles à la dégradation. Ainsi on enregistre une dégradation de la forêt avec l'évolution du temps et une perte de sol au profit des roches nues. Ceci est mis en relation avec la pluviométrie irrégulière et la sécheresse des dernières années.

Ces cartes constituent un guide pour les décideurs dans l'attribution des zones de cultures dans la région. Ce sont aussi des cartes thématiques qu'on peut combiner avec d'autres facteurs, pour évaluer l'érosion hydrique. Des mises à jour régulières en comparant ces cartes d'occupation du sol avec celles issues des images Landsat plus récentes, permettront le suivi des zones à risques.

Mots clés : image satellite, végétation, sol, risque.

Introduction

Le bassin versant de N'fis est particulièrement touché par la dégradation du sol, du fait des caractéristiques géologiques et climatiques qui sont favorables à cette dernière. Les conséquences de cette dégradation ont été catastrophiques surtout dans le développement socio-économique dans le bassin. Par conséquent, des méthodes de contrôle des processus de dégradation des terres s'avèrent nécessaires afin de les protéger contre ce phénomène. L'objectif de ce travail est d'étudier le changement de l'occupation du sol dans le bassin versant de N'fis à partir d'images Landsat datant de 1988, 2000, et 2011, dans le but de déterminer les zones sensibles à la dégradation. Ceci permet aux décideurs d'envisager un meilleur plan pour la prévention de risque.

Dans cette étude, la méthodologie choisie s'appuie sur la télédétection et les systèmes d'information géographique (SIG) qui sont de plus en plus utilisés pour l'étude des phénomènes de surface et forment des outils essentiels dans les systèmes interactifs d'aide à la décision et opérationnels pour des opérations de gestion du risque (Wachal and Hudak, 2000 ; Shrimail et al. 2001; Bou Kheir et al. 2006).

Présentation de la zone d'étude

L'oued N'fis est située entre les latitudes Nord 30° 5' et 31° 2' et les longitudes Ouest 7° 55' et 8° 40', dans le Haut Atlas occidental au Sud de la ville de Marrakech (figure 1).

Cette dernière se trouve sous un climat méditerranéen continental caractérisé par une aridité relative, mais notre région d'étude, de part sa nature montagneuse, montre un climat tempéré voire humide dans sa partie amont. Elle est caractérisée par une variabilité spatio-temporelle des précipitations (Alifriqui et al., 1995). La pluviosité moyenne annuelle est de l'ordre de 400 mm à la station d'Imin El Hammam, et les précipitations maximales annuelles peuvent atteindre 700 mm dans les hautes stations. La température à l'inverse des précipitations est assez régulière. Les mesures montrent une température moyenne annuelle de 18,6 °C, avec une maximale absolue de 46 °C (mois de Juillet et Aout) et une minimale absolue de -7,5 °C (mois de Décembre et Janvier).

La partie amont du bassin, qui constitue la zone axiale du Haut Atlas de Marrakech, est formée par des terrains magmatiques (granites, granodiorites, andésites, rhyolites, basaltes etc.) et des roches métamorphiques (Schistes, gneiss, quartzites). Sa partie aval qui fait partie de la zone subatlantique septentrionale constitue la zone des plateaux avec, surtout, des terrains mésozoïques et cénozoïques dont la lithologie est composée d'une alternance de roches plus tendres : grès, siltite, et argile. Les observations du terrain combinées à l'analyse numérique de la carte géologique 1/500 000, montrent que les roches tendres (sols perméables) occupent de 20% du bassin, les semi- tendres (sols semi-perméables) ont une proportion de 9% et les roches dures (sols imperméables) occupent 71% du bassin. Cette grande répartition des sols imperméables est un facteur de l'érosion car ces derniers favorisent le ruissellement.

La géomorphologie du bassin est marquée par la dominance des cônes de déjection et des terrasses fluvio-torrentielles, remodelés en glaciais sur leurs surfaces qui sont lacérées par des ravins plus ou moins profonds (Nahid et Benzakour, 2002).

Figure 1: Localisation de la zone d'étude (Amaya et al, 2014)

Matériel et méthode

Les matériels utilisés sont:

- La carte géologique de Marrakech 1/500 000 (Choubert, 1957). Elle a permis de localiser les grandes unités lithologiques du bassin versant.
- Une carte pédologique à l'échelle 1: 1 500 000 (Cavallar, 1950). Elle a permis à déterminer les types de sols soumis à la dégradation.
- Onze cartes topographiques (1/50 000) couvrant tout le bassin versant de l'oued N'fis. Ils ont permis de guider les travaux de terrain.
- Un fichier MNT (modèle numérique de terrain) de la « Shuttle Radar Topography Mission » dont la résolution de 90 m. Il a permis de tracer le bassin versant de N'fis.
- Les images Landsat 5 TM des années 1988, 2000 et 2011. Elles ont permis de réaliser des cartes d'occupation du sol des années respectives, à l'aide du logiciel ENVI.

La méthodologie du travail est résumé dans la figure 2.

Figure 2: Organigramme méthodologique des cartes d'occupation de sol

Résultat et discussion

Les résultats de la classification supervisée appliquée aux images Landsat de 1988, 2000 et 2011 sont présentés dans les figures 3, 4 et 5. En comparant les trois cartes obtenues, on constate que la carte d'occupation du sol de 1988 présente une superficie de forêt dense et de forêt peu dense plus élevée par rapport aux autres années. Celle de 2011 est la moins fournie en forêt et présente la plus grande aire de sol nu rocailleux. Ce constat est mis en relation avec la pluviométrie de la région. L'année 1988 est une année pluvieuse par contre 2000 et 2011 sont des années sèches. On peut ainsi dire qu'il y a une dégradation évolutive de la forêt qui expose le sol aux phénomènes climatiques, et à son tour, le sol est dégradé jusqu'à la roche mère. Les secteurs du bassin versant les plus exposés sont localisés à l'extrême-nord, à l'ouest et au sud-est du bassin.

Figure 3: Carte d'occupation du sol du bassin de N'fis (année 1988)

Figure 4: Carte d'occupation du sol du bassin de N'fis (année 2000)

Figure 4: Carte d'occupation du sol du bassin de N'fis (année 2011)

Conclusion

Cette étude a permis de faire des cartes d'occupation de sol du bassin versant de N'fis. Celles-ci peuvent être combinées avec d'autres cartes thématiques pour mieux localiser les zones susceptibles aux éventuels risques hydriques, et pour évaluer la perte de sol dans la zone d'étude. Elles constituent une base de données pour des travaux futurs, et un guide pour le reboisement dans le cadre d'un aménagement du bassin versant.

Bibliographie

- Alifriqui, M. ; M'Hrit, O. ; Michalat, R. ; Peltier, J.P. (1995) -Variabilité des précipitations dans le Haut Atlas Occidental marocain. *Le climat*, Vol. 13 (1), 11-28.
- Amaya,A.;Algouti,Ab. and Algouti,Ah.(2014) - The use of remote sensing and GIS to identified water erosion risks areas in the moroccan Hight Atlas. The case study of the N'fis wadi watershed. *International Journal of Sciences*. V320140205.
- Bou Kheir, R. ; Cerdan, O. ; Abdallah, C. (2006) -Regional soil erosion risk mapping in Lebanon. *Geomorphology*, 82: 347-359.
- Cavallar, W. (1950) - *Esquisse Préliminaire de la Carte des Sols du Maroc*. Direction de l'Agriculture, du Commerce et des Forêts du Maroc, Division de l'Agriculture et de l'Elevage.
- Choubert, G.(1952) - *Histoire géologique de l'Anti Atlas*. Note et mem. Serv. Géol. Maroc, 100, pp.75-194.
- Nahid, A.;Benzakour, M. (2002) - Enregistrements sédimentaires et contrôle tectonique dans la genèse des archives morphosédimentaires quaternaires de la coupe d'Alhnayn (vallée méridienne du N'fis, Maroc). *EstudiosGeol.*, 58: 145-158.
- Shrimalil, S.S.; Aggarwalz, S.P. and Samral, J.S.(2001) -Prioritizing erosion-prone areas in hills using remote sensing and GIS - a case study of the Sukhna Lake catchment, Northern India. *International Journal of Applied Earth Observationand Geoinformation*, 3:54-60.
- Wachal, D.J.; Hudak, P.F.(2000) -Mapping land slide susceptibility in Travis County, Texas, USA. *GeoJournal*, n° 51, 2000, p. 245-253.

ÁREAS DE RISCO DE DESLIZAMENTO DE ENCOSTAS NO BRASIL: UM ESTUDO SOBRE AS FAVELAS EM CAMPOS DO JORDÃO-SP.

Artur Rosa Filho

Departamento de Geografia da Universidade Federal de Roraima, Brasil
artur.filho@ufrr.br

RESUMO

Nas últimas décadas do século XX e no início do século XXI, os deslizamentos de encostas têm aumentado consideravelmente, principalmente nos países subdesenvolvidos, bem como, nos países classificados como em desenvolvimento. A construção de habitações em encostas acentuadas alteram a paisagem urbana, agravando os movimentos gravitacionais de massa. Conhecida por muitos como a “Suíça brasileira”, Campos do Jordão-SP, possui cerca de 47.000 habitantes. Encontramos na cidade, além de belos bairros residenciais, onde são construídos palacetes pelas elites, o seu lado triste, onde reina a miséria, a fome e o desemprego, são suas favelas, que quase nunca são vistas pelos turistas durante o Festival de Inverno. Esse estudo partiu do pressuposto de que as pessoas ao morarem em áreas de risco, ficam vulneráveis aos deslizamentos e colocam-se à mercê do acaso e nem a experiência adquirida com os deslizamentos anteriores, as livram da exposição e das tragédias que um novo deslizamento pode provocar.

Palavras chaves: favelas, áreas de risco, deslizamentos de encostas.

Introdução

O fenômeno de intensa urbanização ocorrido nas últimas décadas e o agravamento da crise econômica do Brasil reduziu as alternativas habitacionais da população de mais baixa renda. Essa população passou a ocupar áreas geologicamente desfavoráveis, sem planejamento e infra-estrutura. Esse quadro tem contribuído para o incremento das situações de risco associadas a processos do meio físico. Grande parte dessas situações está associada aos escorregamentos e processos correlatos. Esses têm provocado acidentes com graves danos sociais e econômicos em várias cidades, além de danos diversos em obras civis (estradas, dutovias etc.) em diferentes regiões.

Segundo Cerri (1993), no Estado de São Paulo, encontramos zonas de média, alta e muito alta suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa, tanto, como fenômenos da dinâmica natural de evolução do relevo, quanto processos induzidos pela ocupação. Destacam-se, pela grande frequência de acidentes associados a deslizamentos, a região da Serra do Mar (Baixada Santista e Litoral Norte), a Região Metropolitana de São Paulo e o Vale do Paraíba, assim como a Serra da Mantiqueira (Campos do Jordão).

Esses deslizamentos constituem riscos da natureza, que provocam consequências graves como, por exemplo, o bloqueio de vias de circulação, o soterramento de casas e, conseqüentemente, a ocorrência de vítimas fatais. Além disso, provocam diversos danos ambientais, alterando a paisagem urbana e, com isso, tornando a mesma mais vulnerável a novas ocorrências.

O objetivo geral da pesquisa foi realizar um estudo, através de uma abordagem perceptiva, dos deslizamentos de encostas nas favelas em áreas de risco no município de Campos do Jordão-SP. O conjunto desses estudos, sob o ponto de vista da sociedade urbana de Campos do Jordão, nos permitiu a elaboração de uma crítica mais consistente sobre as precárias condições de moradia e o baixo padrão de vida dos moradores residentes na favela Britador, como pode ser observado na fotografia um (1), localizada em encostas acentuadas, sujeitas à riscos de deslizamentos.

Fotografia.1- Favela Britador-Campos do Jordão-SP Fonte: Sidnei Silva, 2000

A pesquisa fundamentou-se na procura de respostas humanas para a problemática da ocupação urbana em áreas de riscos de deslizamentos. A abordagem perceptiva dada na pesquisa pode contribuir para a tomada de consciência dos sujeitos que moram nessas áreas de risco.

Esse estudo partiu do pressuposto de que as pessoas, que sem opções na escolha do local de moradia, ficam vulneráveis aos deslizamentos de encostas e colocam-se à mercê do acaso. Não sabendo quando irá acontecer um deslizamento, ficam despreparadas para a ocorrência do fato.

Além disso, essas pessoas possuem pouca informação e poucos recursos quando se deparam com um deslizamento. Nem a experiência adquirida com os deslizamentos anteriores as livram da exposição e das tragédias que um novo deslizamento pode provocar.

Entretanto, embora vivendo em áreas de risco, os moradores das favelas Britador e Santo Antônio permanecem no local, sendo possível identificar em suas percepções: a) não têm para onde ir; b) não têm condições de pagar aluguel; c) já vivem nas encostas há muito tempo, possuindo raízes históricas com o local; d) pensam sempre que o risco pode ocorrer com o outro e nunca consigo mesmo.

Os moradores das favelas não ignoram o risco, mas permanecem no local, sobretudo pela imposição do quadro econômico com o qual lidam, e, também, devido a laços afetivos que mantêm com o lugar.

“A Suíça Brasileira” e as Favelas

Conhecida por muitos como a “Suíça brasileira”, Campos do Jordão, com cerca de 45.000 habitantes, apresenta, além de belos bairros residenciais, onde são construídos palacetes pelas

elites, o seu lado pobre e triste, onde reina a miséria, a fome e o desemprego. Suas favelas abrigam muitas pessoas, entre crianças e adultos, que necessitam, principalmente na época do frio, da nossa compreensão e ajuda material.

Para Oliveira (1991), aproximadamente 56% da população encontram-se na condição de favelados. Para ele, antigamente, o povoamento das favelas em Campos do Jordão estava associado aos migrantes em busca de trabalho, mas a partir dos anos 80, o crescimento passou a estar relacionado mais diretamente com as demandas requeridas pela economia.

As favelas em Campos do Jordão surgiram na década de 1940 como mostra a fotografia dois (2). Mas, foi a partir dos anos 70 do século XX, que tiveram início as grandes invasões nas áreas verdes, áreas de lazer dos loteamentos e áreas particulares, todas nos morros da cidade.

Fotografia. 2 Surgimento das favelas em Campos do Jordão

Fonte: Condellac C. Andrade, 1948

Muitos imóveis nas "Vilas Operárias" de Vila Albertina, Morro das Andorinhas, Britador, Vila Santo Antonio, Vila Maria e outros locais foram ocupados com o incentivo de autoridades que deveriam ter coibido essas ações. Sérios e fatais deslizamentos ocorreram e dezenas de vidas foram perdidas no bairro da Vila Albertina nos anos de 1972 e 2002.

Conclusão

Ao analisar a questão inicial, por que essa população não deixa as áreas de risco, mesmo sabendo do perigo, levantou-se a priori, que a principal dificuldade em sair da área está na decorrência da falta de outras perspectivas de lugar de moradia. Entendemos que essas favelas configuram-se, sob a lógica da urbanização brasileira, como áreas de segregação sócio-espacial, representativas das periferias das cidades turísticas e/ou industriais.

Observou-se que essas pessoas apresentam uma certa acomodação em relação ao seu local de moradia, chegando a quase um estado de inércia, o que dificulta a remoção dos mesmos para outras áreas. Há ainda a percepção do perigo distorcido, ou seja, o morador percebe que o perigo pode acontecer com o outro e nunca consigo mesmo.

Alem disso, há fatores de ordem econômica, cultural e histórica que corroboram para esse estado de inércia desses moradores. Estas questões foram investigadas a partir de pesquisas técnicas, pesquisas de campo, entrevistas com moradores e turistas, aplicação de questionário. A pesquisa bibliográfica foi importante para ampliar a leitura sobre o tema e, sobretudo, ultrapassar a imagem criada pela mídia de que Campos do Jordão, a “Suíça Brasileira”, limita-se a apenas ser uma cidade turística de inverno. É esta mesma imagem que ao atrair novos moradores, em busca de uma vida melhor, acaba por impor-lhes uma precária condição de vida urbana, quase sempre sem perspectivas de mudança.

As condições precárias de submoradias e o baixo padrão de vida dos moradores dessas favelas decorrem, quase sempre, do baixo padrão de remuneração que obtêm em subempregos, da localização das favelas, localização esta em relação à acessibilidade social, ou seja, aos “benefícios” urbanos e, ainda, das políticas públicas que reiteram a segregação sócio-espacial no município.

Bibliografia

- CERRI, Leandro Eugenio Silva. 1993. **Riscos Geológicos Associados a Escorregamentos: Uma Proposta para a Prevenção de Acidentes**. Tese de Doutorado. UNESP. Rio Claro-SP.
- OLIVEIRA, José Oswaldo Soares de. 1991. **A Quem Interessa a Urbanização Clandestina? Estudos sobre Campos do Jordão**. Dissertação de Mestrado. Escola de Engenharia de São Carlos- USP-SP.
- ROSA FILHO, Artur. 2006. **Percepção Geográfica de Escorregamentos de Encostas em Favelas nas Áreas de Risco-Campos do Jordão-SP**. Tese de Doutorado. Universidade Estadual Paulista-UNESP-Rio ClaroSP.

DESAFIOS COLOCADOS À CARTOGRAFIA DAS ÁREAS DE SUSCEPTIBILIDADE DE RAVINAMENTO A PARTIR DE ESTUDOS NO CENTRO DE PORTUGAL

Bruno Manuel Martins

Departamento de Geografia e CEGOT, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra
bruno.martins@uc.pt

Luciano Fernandes Lourenço

Departamento de Geografia e CEGOT, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra
luciano@uc.pt

Raphael Costa Cristovam da Rocha

Departamento de Geografia, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
raphaelrocha.br@gmail.com

RESUMO

Os ravinamentos são formas de erosão resultantes de processos geomorfológicos que podem contribuir para a perda de solo. De per si, nem sempre afetam áreas de interesse económico. No entanto, mesmo que a perda de solo e de produtividade de um campo agrícola por ravinamento, no seu conjunto, seja considerada de menor importância, os efeitos secundários, podem traduzir-se em grandes prejuízos. A importância da cartografia deste tipo de processo geomorfológico, que se traduz numa manifestação de risco geomorfológico, é proporcional à dificuldade da sua execução. O estudo da ravina do Corgo pretende analisar a multiplicidade de factores que estão na sua génese, bem como a arduidade de os representar espacialmente.

Palavras-chave: Ravinamentos; riscos geomorfológicos; cartografia; Corgo.

Introdução

A presença de ravinas é particularmente comum em áreas de montanha. Em muitas regiões, participa de forma muito influente como processo erosivo, contribuindo para a degradação e perda de solo, bem como fonte de material para sedimentação. Vários estudos têm demonstrado que a produção de sedimentos associado aos ravinamentos deverá implicar uma maior atenção (Kheir *et al.* 2007), em especial nas regiões semi-húmidas e semiáridas dos países mediterrâneos (Rebello 2010; Tsimi *et al.* 2012). Os processos de erosão hídrica associados aos processos de ravinamentos traduzem-se em prejuízos agrícolas, perda da capacidade produtiva dos solos e de perda de qualidade da água, em especial nos rios, lagos e reservatórios (Martinez-Casasnovas, *et al.* 2003). A formação de ravinas está associada às características climáticas e está relacionada a fatores físicos como o declive, forma e tamanho da bacia hidrográfica, propriedades físicas, químicas e mineralógicas dos solos ou a presença de material pouco coeso a regularizar as vertentes, como mantos de alteração ou depósitos de vertente (Martins *et al.* 2014). Os factores antropogénicos são fundamentais na instalação e evolução das ravinas e na capacidade erosiva das mesmas, através da desflorestação, incêndios, lavra, pastagens, remoção da vegetação remanescente ou construção de estradas. Na maioria das vezes, promovem a concentração da escorrência e a diminuição da infiltração. Neste artigo é objetivo identificar os fatores mais importantes na formação e desenvolvimento das ravinas e a sua arduidade de os representar espacialmente, a partir do caso da ravina do Corgo, situada frente às Caldas de São Paulo, no vale do rio Alva. Para além da análise dos aspectos físicos, é também analisada a participação do ser humano, como fator ativo no desenvolvimento deste tipo de processo, em especial, através dos incêndios florestais.

Processos fundamentais na génese e evolução das ravinas

Do ponto de vista teórico poder-se-ão distinguir dois tipos de erosão: (i) erosão “natural”, sem intervenção antrópica; (ii) erosão acelerada por intervenção antrópica. Esta última traduz-se por uma rápida remoção do solo, em resultado da ausência de vegetação, expondo-o diretamente à ação erosiva, especialmente hídrica e eólica, com consequências no aumento da capacidade e competência erosiva. A formação de ravinamentos associa-se, na grande maioria das vezes, a este último tipo de erosão. Sem proteção pela presença de vegetação, o processo de ravinamento inicia-se com a precipitação, em particular, com o efeito do *splash* sobre o solo. O impacto da gota de chuva sobre a parte superior do solo desagrega-o e as partículas são lançadas em todas as direções induzindo uma poro-pressão positiva no solo e formação de *ponds* (DePloey, 1983). Este fenómeno é especialmente importante quando se trata de material pouco coeso. À medida que a dimensão dos *ponds* aumenta, rompem-se e ligam-se entre si através de *knickpoints*, gerando um processo de escorrência que conduzirá à formação de pequenos canais que poderão evoluir para ravinas (*RillGrow*) (figura 1). Este processo desenvolve-se geralmente nos sectores da vertente mais próximos da base (Favis-Morlock, 1996) à medida que a área fornecedora de água aumenta de montante para jusante. O processo de iniciação de uma ravina implica necessariamente que haja uma certa concentração do fluxo de água e que sejam rompidos certos limites em termos de condições hidráulicas. A passagem de sulcos para ravinas está em parte condicionado pelo declive que determina as condições de energia potencial e de energia cinética de uma vertente. Para que se formem ravinas é necessário que haja valores de declive superiores a 2 ou 3 graus (DePloey, 1983). O aumento de declive influi na velocidade do fluxo de água de escorrência, factor fundamental na formação e no desenvolvimento de ravinas. Simulações em laboratório sugerem velocidades superiores a 3,2 cm/s para a formação de ravinas (Slatery e Bryan, 1992). Assim, a presença de sulcos poderá ser um indicador de erosão e de uma hipotética evolução para ravinas. A forma e tamanho da bacia hidrográfica é também um fator que vai ter influência na susceptibilidade de uma vertente ao processo de ravinamento, por influir no tempo de concentração e no pico de escorrência. Bacias mais largas apresentam maior susceptibilidade ao aumentarem o rácio de escorrência por tempo. Tal situação sugere que, embora o declive seja um dos factores mais importantes no desenvolvimento das ravinas, excetuando os declives inferiores a 2 graus ou os próximos da verticalidade, a presença de ravinas pode ocorrer em qualquer sector da vertente.

Figura 1 - Esquema simplificado de formação de ravinas, adaptado de Slatery e Bryan (1992) e DePloey (1983).

O exemplo da ravina do Corgo

A ravina desenvolve-se numa vertente de forte declive, superior a 30 graus, numa área de contacto entre rochas granitóides e metassedimentares. A presença de inúmeras falhas terá contribuído para a existência de um manto de alteração profundo, funcionando como goteira ao permitir uma maior infiltração da água em profundidade. A presença do manto de alteração é fundamental para a evolução da ravina em profundidade. Trata-se de material constituído fundamentalmente por areias grossas em que a classe granulométrica mais abundante são as areias com 2 mm de diâmetro. Contrariamente a fração silto-argilosa é escassa, gerando uma marcada assimetria entre a quantidade de partículas grosseiras e finas (figura 2). As características arenosas do sedimento onde se desenvolve a ravina confirma a ideia de que as ravinas que se desenvolvem sobre este tipo de material tendem a ser mais profundas e estreitas (foto 1) em contraste com material mais rico em argila, onde tendem a ser mais largas, mais curtas e menos profundas (Bowyer-Bower & Bryan, 1986). A elevada capacidade de absorver grandes quantitativos de água permite que a meteorização vá progredindo de forma mais intensa e profunda. No caso da vertente da ravina do Corgo, a espessura dos mantos ultrapassa em inúmeros sectores da vertente 5 metros de profundidade e dita o perfil longitudinal da ravina.

Figura 2 - Ilustração gráfica de algumas medidas descritivas da curva granulométrica;

Foto 1 - Secção intermédia da ravina do Corgo.

A cartografia das áreas incendiadas

A cartografia das áreas incendiadas tem vindo a assumir grande interesse nos últimos anos, uma vez que se trata de áreas de maior susceptibilidade a processos erosivos (Lourenço e Nunes, 2014), em particular, à formação de ravinas. A sua inclusão na cartografia de susceptibilidade é consequentemente muito importante. A ravina do Corgo desenvolve-se numa vertente que foi sujeita a repetidos episódios de incêndios, mais ou menos intensos, ao longo dos últimos anos. Este terá sido um dos fatores mais importantes na sua génese. Para a definição das áreas incendiadas e a sua intensidade foi utilizado o índice NBR (Normalized Burnt Ratio) obtido a partir das imagens de satélite LANDSAT 8 trabalhado a partir da função Raster Calculator do software QuantumGIS 2.2 Valmiera. Este índice, para além da identificação das áreas incendiadas, permite identificar ainda os diferentes níveis de danos causados pelo fogo na vegetação (Garcia & Chuvieco, 2004). Foi realizado um processo de composição multi-temporal das imagens escolhidas com base no uso das bandas 4 (banda do visível azul), 5 (infravermelho próximo) e 7 (SWIR) a partir da função Build Virtual Raster, disponíveis no software QuantumGIS 2.2 Valmiera. Foi feita também a composição de imagens com cores verdadeiras com base nas bandas 4, 3 e 2 (bandas TrueColor). Para o mapeamento das ravinas foram utilizadas as imagens processadas para a identificação das áreas incendiadas e o software QuantumGIS 2.2 Valmiera para o processamento das imagens. A imagem selecionada para a composição e aplicação dos índices de vegetação correspondeu à do dia 23 de Agosto de 2013, obtida dois dias depois de um grande incêndio ocorrido na área de estudo.

Resultados

O índice NBR permitiu identificar o grau de intensidade do incêndio, categorizado a partir das diferença entre R4 (banda 5) e o R7 (SWIR). Os pixéis com valores negativos obtidos a partir desta diferença (pixéis de cor vermelha) representam os sectores de maior severidade causados pelo incêndio (figura 3B). A resolução espacial do satélite LANDSAT 8 é de 30 metros permite uma rigorosa definição das áreas incendiadas e uso e ocupação do solo (figura 3B). No entanto, a identificação de ravinas é tarefa mais difícil. Recorrendo à composição 4-3-2 (True Color) e à composição 7-5-4 (SWIR) é possível identificar as ravinas de maiores dimensões, como a ravina do Corgo, mas não permite identificar a morfologia e delimitação de forma rigorosa.

Figura 3A - Severidade do incêndio sobre a vegetação (imagem de satélite LANDSAT 8);

Figura 3B - Mapa do uso e ocupação do solo (imagem de satélite LANDSAT 8).

Conclusão

A formação de ravinas depende de fatores físicos como as características climáticas, geologia, forma e tamanho da bacia hidrográfica, propriedades físicas, químicas e mineralógicas dos solos. A presença de falhas e fraturas é outro importante fator porque, ao participar diretamente na relação escoamento/infiltração, induz uma meteorização mais intensa e profunda. Este processo ganha força em rochas granitóides, como é caso da vertente onde se desenvolve a ravina do Corgo, onde a presença de um profundo manto de alteração, superior a 5 metros em vários sectores da vertente, permitiu o desenvolvimento da ravina em profundidade. Por outro lado, o uso e ocupação do solo é outro fator essencial no desenvolvimento de ravinamentos. Neste particular, a intervenção antrópica ganha força, em especial, através dos incêndios, pelo que a delimitação das áreas queimadas e a definição dos respetivos graus de severidade. Se, por um lado, urge o desenvolvimento de técnicas que permitam a cartografia da espessura das formações superficiais, por outro lado, é também muito importante a definição rigorosa das diferentes áreas de ocupação do solo. A utilização de imagens de satélite mostrou-se muito eficaz nesses desafios. No entanto, para a identificação e cartografia de ravinas, o grau de resolução das imagens trabalhadas (LANDSAT 8) não permitiu resultados satisfatórios exigindo níveis de resolução maiores.

Referências bibliográficas

- Bowyer-Bower, T. & Bryan, R. (1986) - Rill initiation: concepts and experimental evaluation on badland slopes. *Z. Geomorph N.F.*, 60, 161-175.
- DePloey, J. (1983) - Runoff and rill generation on sandy and loamy topsoils. *Z. Geomorph. N.F.*, 46, 15-23.
- Favis-Mortlock, D. (1996) - An evolutionary approach to the simulation of rill initiation and development. *Proceedings of the 1st International Conference on GeoComputation*, Leeds, Inglaterra, 248-281.
- Garcia, M. & Chuvieco, E. (2004) - Assessment of potential of SAC-C/MMRS imagery for mapping burned areas in Spain. *Remote Sensing of Environment*, 92, 414-423 p.
- Kheir, W.; Ismail, G.; El-Nour, A.; Tawfik, T.; Hammad, D. (2007) - Assessment of the efficiency of duckweed (*Lemna gibba*) in wastewater treatment. *Int. J. Agric. Biol.* 5: 681-689.
- Lourenço, L. e Nunes, A. (2014) - O flagelo das chamas e a recorrência de eventos hidrogeomorfológicos intensos: o exemplo da Bacia do Rio Alva (Portugal). *WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers - Thematic Area Series SATAD - TA8 - Water-related Disasters* - Vol. 1 N.º 1, p. 43-90.
- Martinez-Casasnovas (2003) - A spatial information technology approach for the mapping and quantification of gully erosion, *Catena*, Elsevier, 50:293-308.
- Martins, B.; Santos, P.; Rebelo, F. (2014) - Conhecimento e cartografia da espessura das formações superficiais na área de Pensalvos (serra do Alvão, norte de Portugal), *Territorium* 21, Coimbra, 115-123 p.
- Slatery, M. e Bryan, R. (1992) - Hydraulic conditions for rill incision under simulate rainfall: a laboratory experiment. *Earth Surface Processes and Landforms*, 17, 127-146.
- Rebelo, F. (2010) - *Geografia física e riscos naturais*, Coimbra, Imprensa da Universidade, 215 p.
- Slatery, M. & Bryan, R. (1992) - Hydraulic conditions for rill incision under simulate rainfall: a laboratory experiment. *Earth Surface Processes and Landforms*, 17, 127-146.
- Tsimi, C., Ganas, A.; Dimoyiannis, D.; Valmis, S.; Lekkas, E. (2012) Catchment-wide estimate of single storm interrill soil erosion using an aggregate instability index: a model based on geographic information systems. *Natural Hazards*, Springer, 62(3).

O PAPEL DA VULNERABILIDADE SÍSMICA NA MITIGAÇÃO DO RISCO SÍSMICO DE NÚCLEOS URBANOS ANTIGOS

Romeu Vicente

Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Aveiro
romvic@ua.pt

Tiago M. Ferreira

Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Aveiro
tmferreira@ua.pt

Rui Maio

Departamento de Engenharia Civil, Universidade de Aveiro
ruimaio@ua.pt

RESUMO

Apesar da exposição a um determinado risco compreender responsabilidades políticas, económicas e sociais, na grande maioria dos casos, as estratégias de sensibilização e mitigação do risco sísmico surgem apenas na sequência de um evento de impacto significativo nas sociedades. Assim, a mitigação do risco é aqui abordada, incidindo na avaliação da vulnerabilidade sísmica de núcleos urbanos antigos, zonas particularmente vulneráveis das nossas cidades, na tentativa de contrariar esta tendência. Com esse objectivo aplicou-se uma metodologia simplificada que possibilitou a estimativa de cenários de dano e de perdas económicas e humanas. Através do mapeamento destes resultados, integrados num Sistema de Informação Geográfica, poderão ser elaborados planos estratégicos de reabilitação do edificado urbano, de emergência e evacuação em caso de ocorrência sísmica.

Palavras-chave: risco sísmico; vulnerabilidade sísmica; índice de vulnerabilidade; núcleos urbanos antigos; cenários de dano; estimativa de perdas.

Introdução

Este artigo aborda a redução da vulnerabilidade do edificado como a medida mais sustentável na mitigação do risco sísmico. Dada a incerteza associada à ocorrência de um evento, a perigosidade sísmica é, de entre os três vetores definidores do risco, aquele que não é passível de ser minimizado. Quanto à exposição, a qual avalia o valor dos elementos em risco (humanos e materiais), esta pode contribuir para a mitigação do risco sísmico através da adopção de medidas no sentido de condicionar a construção e o desenvolvimento das cidades em locais de elevada perigosidade sísmica. Desta forma, a redução da vulnerabilidade sísmica do edificado apresenta-se como a estratégia mais sustentável na mitigação do risco sísmico.

O centro histórico de Faro como caso de estudo

O Bairro Ribeirinho do núcleo urbano antigo de Faro, Portugal, foi a zona de estudo escolhida para a avaliação da vulnerabilidade sísmica segundo esta metodologia. A sua seleção baseou-se no facto de esta ser uma das zonas com elevada concentração de edifícios em alvenaria, muitos destes com níveis de alteração estrutural muito reduzidos. Refira-se ainda que, de forma a melhorar e otimizar a gestão de todas as propriedades do parque edificado, foi desenvolvido e utilizado um sistema de informação em software ArcGis 10.2® (ESRI, 2005), o qual combina dados georreferenciados com informação relativa a cada edifício avaliado.

Metodologia do Índice de Vulnerabilidade

A formulação do índice de vulnerabilidade foi originalmente desenvolvida em Itália pelo GNDT II (1994), para a avaliação da vulnerabilidade sísmica de edifícios de alvenaria através da observação

e catalogação de danos e mecanismos após a ocorrência de um evento sísmico. Em Portugal, esta metodologia foi adaptada à realidade dos nossos edifícios por Vicente (2011), introduzindo uma análise e inspeção mais cuidada e ainda outros novos parâmetros contabilizando a interação entre edifícios adjacentes. Inicialmente aplicada à Baixa da cidade de Coimbra (Vicente, 2011), esta metodologia foi recentemente utilizada na avaliação do núcleo urbano antigo do Seixal (Ferreira *et al.*, 2013). A metodologia assenta na determinação de um índice de vulnerabilidade, I_v , o qual é calculado para cada edifício através de uma média ponderada de 14 parâmetros distribuídos em 4 classes de vulnerabilidade crescente, C_{vi} , de A a D, possuindo diferentes pesos relativos, p_i , consoante a sua relevância no comportamento sísmico do edifício. A definição detalhada de cada um destes 14 parâmetros pode ser consultada em Vicente (2011).

Resultados

A aplicação da metodologia do índice de vulnerabilidade a cada um dos 191 edifícios avaliados é apresentada na Figura 1 (a), através do mapeamento do I_v para cada edifício. Na Figura 1 (b) são identificados os edifícios com um valor de I_v superior a 40, e que deverão por isso, ser motivo de maior atenção no estabelecimento de prioridades e estratégias de intervenção. Note-se que aproximadamente 15% dos edifícios apresentam um I_v superior a 40, com 5% acima de 45 (equivalente a uma classe de vulnerabilidade A na escala EMS-98). Por outro lado, apenas 4% dos edifícios avaliados apresentam um I_v inferiores a 20 (equivalente a uma classe de vulnerabilidade B na escala EMS-98).

Figura 1. Mapeamento do índice de vulnerabilidade para o Bairro Ribeirinho de Faro (a) e identificação dos edifícios com $I_v > 40$ (b).

Relativamente aos valores médios do índice de vulnerabilidade, $I_{v,mean}$, foi efetuada uma primeira avaliação considerando apenas os 53 edifícios avaliados detalhadamente para a qual foi obtido um $I_{v,mean}$ igual a 36.15.

De acordo com esta metodologia, o grau médio de dano, μ_D , pode ser estimado para diferentes intensidades através da aplicação da Eq. (1), desenvolvida para esse fim por Bernardini *et al.* (2007).

$$\mu_D = 2.5 \times \left[1 + \tanh \left(\frac{I + 6.25 \times V - 13.1}{Q} \right) \right] ; 0 \leq \mu_D \leq 5 \quad (1)$$

$$V = 0.592 + 0.0057 \times I_s \quad (2)$$

onde I representa a perigosidade sísmica descrita em termos de intensidade macrossísmica, V representa o índice de vulnerabilidade (ver Eq. (2)), e onde Q é o factor de ductilidade que descreve a ductilidade de certas tipologias construtivas (considerado igual a 3.0). A Figura 2 (a) e (b) apresenta os cenários de grau médio de dano para as intensidade macrossísmicas, $I_{(EMS-98)}$, VIII e IX, respetivamente.

Figura 2. Cenários de dano para intensidades $I_{(EMS-98)} = \text{VIII}$ (a) e $I_{(EMS-98)} = \text{IX}$ (b).

A estimativa de edifícios colapsados e inutilizáveis, de extrema utilidade para as entidades governamentais e de proteção civil, foi neste artigo avaliada com base num modelo desenvolvido por Bramerini *et al.* (1995) que define os estados de dano que relacionam a probabilidade de se exceder um determinado grau de dano com a probabilidade de colapso e perda funcional. A estimativa do número total de edifícios colapsados e inutilizáveis para diferentes intensidades sísmicas, $I_{(EMS-98)}$, e para o valor $I_{v,mean} = 34.12$, encontra-se apresentada na Figura 3.

Figura 3. Estimativa do número de edifícios colapsados (a) e inutilizáveis (b).

Também na avaliação das perdas humanas e número de desalojados foi utilizado o modelo desenvolvido por Bramerini *et al.* (1995). Para isso, definiu-se a percentagem de mortos e feridos graves como sendo 30% do número total de habitantes residentes em edifícios colapsados e inutilizáveis. A estimativa do número de mortos e feridos graves e de desalojados, para o $I_{v,mean} = 34.12$, é apresentada na Figura 4. Note-se que estes números podem ser significativamente agravados em função da sazonalidade própria da região do Algarve e da hora a que ocorra o sismo.

Figura 4. Estimativa do número de mortos e feridos graves (a) e desalojados (b).

De acordo com Vicente *et al.* (2011) a probabilidade de custo de reparação para um determinado evento sísmico caracterizado por uma intensidade I , $P[R|I]$, pode ser calculada através do produto da probabilidade condicional do custo de reparação para cada grau de dano, $P[R|D_k]$ com a probabilidade condicional de condição de dano para cada nível de vulnerabilidade e intensidade sísmica, $P[D_k|I_v, I]$. Assim, de forma a estimar o custo de reparação associado a diferentes valores de vulnerabilidade na estimativa de perdas, considerou-se um custo unitário de 482 €/m² em função do valor sugerido pela Portaria n.º370/2013 (Portugal, 2013). A Figura 5 apresenta a estimativa global dos custos de reparação para o Bairro Ribeirinho de Faro.

Figura 5. Estimativa dos custos de reparação.

Comentários Finais

De um modo geral os resultados estão coerentes com as características e o estado de conservação do edificado do Bairro Ribeirinho de Faro. Estando associada à cidade de Faro uma perigosidade sísmica moderada, estes resultados revelam que a ocorrência de evento sísmico de intensidade

moderada poderá causar danos e perdas significativas, motivadas, quer pela vulnerabilidade do próprio edificado, quer pela falta de preparação das entidades responsáveis e da população. Por último, sublinhe-se que uma avaliação rigorosa e competente da vulnerabilidade sísmica dos núcleos históricos antigos, complementada com soluções apropriadas de reforço estrutural e sísmico, podem reduzir significativamente os danos e as perdas humanas e económicas causados por futuros eventos.

Agradecimentos

Este trabalho foi financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) ao abrigo do projeto de investigação URBIS: Avaliação da Vulnerabilidade e Gestão do Risco Sísmico à Escala Urbana (PTDC/ECM-URB/2564/2012).

Bibliografia

- Bernardini, A.; Giovinnazzi, S.; Lagomarsino, S. e Parodi, S. (2007) - Vulnerabilità e previsione di danno a scala territoriale secondo una metodologia macrosismica coerente con la scala EMS-98. *ANIDIS*, In: XII Convegno Nazionale L'ingegneria sismica in Italia. 10-14 Junho, Pisa, Itália
- Bramerini, F.; Di Pasquale, G.; Orsini, A.; Pugliese, A.; Romeo, R. e Sabetta, F. (1995) - *Rischio sismico del territorio italiano: proposta per una metodologia e risultati preliminari*. Servizio Sismico Nazionale, Relatório Técnico SSN/RT/95/01, Roma;
- ESRI (2005) - *Geographic Information Systems*. Nova Iorque nº310, Redlands, 92373-8100, E.U.A.
- Ferreira, T.M.; Vicente, R.; Mendes da Silva, J.A.R.; Varum, H. e Costa, A. (2013) - Seismic vulnerability assessment of historical urban centres: case study of the old city centre in Seixal, Portugal. *Bulletin of Earthquake Engineering, Springer*, vol. 11, p. [1753-1773], DOI: 10.1007/s10518-013-9447-2;
- GNDT (1994) - *Scheda di esposizione e vulnerabilità e di rilevamento danni di primo e secondo livello (murata e cemento armato)*, Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, Roma, Itália.
- Portugal (2013) - *Portaria nº370/2013, de 27 de Dezembro de 2013*. Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, Diário da República, 1ª série, nº251, Portugal.
- Vicente, R.S.; Parodi, S.; Lagomarsino, S.; Varum, H. (2011) - Seismic vulnerability and risk assessment: case study of the historic city centre of Coimbra, Portugal. *Bulletin of Earthquake Engineering, Springer*, Holanda, vol. 9(4), p. [1067-1096];

O PROCESSO DE OCUPAÇÃO, RISCOS E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DAS ENCOSTAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS: SUBSÍDIOS PARA SEU PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL

Fabiano dos Santos Nunes

Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil
fabiano.nunes.79@facebook.com

Ednice de Oliveira Fontes

Universidade Estadual de Santa Cruz; Brasil
ednice@uesc.br;

Ana Maria Souza Santos Moreau

Universidade Estadual de Santa Cruz, Brasil
amoreau@uesc.br;

Joandre Neres de Jesus

Universidade Estadual de Santa Cruz. Brasil
joandreneres@gmail.com

RESUMO

O perfil geomorfológico da cidade apresenta muitas áreas de encostas escarpadas, constituídas de um espesso manto argiloso, suscetível aos processos erosivos. A ocupação dessas encostas em Ilhéus ocasiona um grande problema no contexto sócioeconômico, pois o uso e ocupação destes territórios sucedem-se de forma irregular, fora dos padrões de segurança que garantam a apropriação pelo homem, sem que haja riscos físicos e sociais, podendo levar até a perda de vidas humanas. Neste trabalho o tema pesquisado é de fundamental importância, pois objetiva-se identificar as áreas e os fatores que concorrem para que haja movimentos de massa nas encostas da cidade. Para tal, após consistente revisão bibliográfica, foram buscadas informações em órgãos públicos e efetuada a pesquisa de campo, em encostas das áreas norte e sul da cidade, para assim obter-se resultados mais abrangentes com um melhor distribuição espacial. Os lugares visitados foram fotografados e georreferenciados. A análise e interpretação dos dados foi feita através de enfoques qualitativos e quantitativos, e o mapeamento com uso do software ArcGis 10.1. Por fim, revelou-se as condições precárias nas áreas de encostas com sérios riscos e registros de ocorrência de movimentos de massa ao longo dos últimos 13 anos. Entende-se a necessidade urgente por parte das autoridades competentes de soluções para as questões básicas de infraestrutura e planejamento urbano das encostas da área urbana de Ilhéus - Bahia. **Palavras-Chave:** Movimentos de Massa, Erosão, Ocupação Urbana

Introdução

Com o progresso das pesquisas e a conseqüente mecanização intensiva, reduziu-se fortemente a oportunidade de emprego no campo, fazendo com que a população da zona rural comesse a migrar para as cidades em busca de melhores condições de vida. Tem-se início o processo de expansão urbana no país, e parte desse contingente populacional, se deslocou em direção ao litoral. Na cidade de Ilhéus esse processo não se deu de modo diferente, o que difere no entanto o processo de ocupação dessas cidades é o seu modelado, que na cidade de Ilhéus é de marres de morros, o que dificulta e coloca em risco sua ocupação de modo inadequado, em razão da declividade de suas encostas.

No Brasil, os movimentos de massa que mais têm provocado à perda de vidas humanas associam-se a escorregamentos em encostas ocupadas. Trabalhos já realizados em áreas costeiras têm mostrado que os principais casos de erosão reportados podem ser entendidos e explicados como: a) o resultado direto dos padrões de dispersão e transporte de sedimentos; b) resultado

de intervenções humanas, onde se desenvolve intensamente atividades turísticas, construção de obras de engenharia, muitas vezes através de usos do solo inadequados.

Desta forma, o estudo das vertentes encontra-se, atualmente, no centro das preocupações geomorfológicas, isso porque as encostas constituem-se como o elemento dominante do relevo na maior parte das regiões. Esse setor é bastante complexo, pois envolve a ação e a compreensão das formas atuais do relevo e a análise dos processos de formação e remoção (erosão) do material detrítico.

A ocupação das encostas, em Ilhéus - Ba ocasiona um grande problema no contexto social e ambiental, pois o uso desses espaços se sucede de forma irregular, ou seja, fora dos padrões de segurança que garanta a uma qualidade de vida e não se traduza em risco de morte.

Nesse trabalho, o tema pesquisado é de fundamental importância, pois identifica quais os fatores (erosividade da chuva, propriedades do solo, cobertura vegetal e características das encostas), que concorrem para que haja movimentos de massa nas encostas de Ilhéus, e com isso, pretende-se sensibilizar a população da área ocupada para a problemática existente, orientando-os para um melhor uso desse espaço ocupado.

Metodologia

Os procedimentos metodológicos fundamentaram-se nos levantamentos e análises documentais e bibliográficas e no trabalho de campo. Os levantamentos e análises documentais e bibliográficas realizados na pesquisa se referem aos aspectos socioeconômicos e ambientais do Programa Habitar Brasil/ Bid Sub-programa de Desenvolvimento Institucional-DI, Plano Estratégico Municipal para assentamentos Sub-normais - PEMAS e Mapeamento e montagem de banco de dados dos assentamentos subnormais da cidade de Ilhéus realizado em 2002, elaborada pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Os dados coletados permitiram a identificação das áreas de risco (encostas), figura 3, mais ocupadas na zona urbana da cidade, proporcionando informações sobre a população (por habitantes), a década de início e fase de ocupação, a área total delimitada (m²), a densidade bruta sobre a área total (por habitantes), os habitantes por domicílio, a renda familiar média (R\$) e o número de domicílios das localidades. Outras importantes informações foram colhidas das ocorrências de acidentes na cidade, envolvendo movimentos de massa (escorregamentos deflagrados diretamente ou não pela ação das chuvas), registradas no Corpo de Bombeiros de Ilhéus, no período de janeiro de 2002 a julho de 2014, esses dados se referem, ao local de ocorrência, a data e as perdas socioeconômicas.

Figura 3 - Potencial de Uso do solo urbano 2010.

Fonte: Base de dados da SEI, 2008. **Elaboração:** FONTES, E.O., 2011.

Ocupação e características das áreas de risco da cidade de Ilhéus

A ocupação das encostas na cidade de acordo com a pesquisa, datam de períodos diversos (Quadro I). Existem áreas de ocupação recente, como o Alto do Teotônio Vilela, cujo a fase inicial, ou seja, o período de adensamento populacional ocorreu na década de 90, e há áreas de ocupação mais antigas, que pode ser exemplificadas pelos Altos do Socorro, Tapera, Bela Vista, Vidigal e outros, estas, ocupadas a partir da década de 40. Constatou-se que o maior volume de adensamento populacional, de forma desordenada e negligente, ocorreu nas décadas de 60 e 70, pois as áreas do morro sendo desvalorizadas pelo difícil acesso, foram recebendo a população excedente da cidade, ou melhor, a classe menos favorecida deslocada e marginalizada da elite dominante. Além disso, com o agravamento da crise da lavoura cacaueteira, a população proveniente do campo instala-se, na cidade, nas áreas menos privilegiadas.

Andrade (2003), caracteriza a infra-estrutura dos morros em Ilhéus como deficientes, pois, as redes de água e esgoto são precárias e o acesso é feito ou por ruas onde, às vezes, é impraticável a circulação de veículos, ou por escadas. As chuvas intensas, que caem freqüentemente, trazem problemas sérios para aqueles que habitam o morro, uma vez que a falta de cobertura sobre o solo agrava o deslizamento de terra nas encostas, constituindo-se em uma grande ameaça a vida de quem vive nessas áreas de risco.

Quadro I: Áreas de risco (encostas) mais ocupadas na zona urbanas de Ilhéus-Ba.

	Nome da Área	Início da ocupação	Área total (m ²)	Pop.	Hab./ Domicílio	Domicílios	Renda Familiar média (R\$)	Nota média de padrão construtivo (1-10)
1	Basílio	70	426,216	5.732	4,46	1.592	115	2,78
2	Alto do Coqueiro	70	137,592	2.785	5,44	774	91	3,80
3	Alto do Teotônio Vilela	90	229,007	2.489	4,14	691	62	1,65
4	Alto da Bela Vista	40	247,517	2.368	4,30	658	57	2,87
5	Alto de N ^o 5 ^a da Vitória	80	458,961	2.039	5.00	566	55	148
6	Soledade	60	127,056	2.005	4,61	557	121	3,72
7	Alto da Esperança	70	109,011	1.987	4,71	552	95	2,70
8	Alto do Vidigal/Cascalheira	40	92,644	1,851	4,52	514	102	2,69
9	Esperança	60	122.685	1,765	4,30	490	149	3,57
10	Alto da Ganboa	60	101.052	1.654	3,50	459	83	3,78
11	Alto da Jamaica/Rombudo	60	82,368	1.496	4,75	416	137	347
12	Alto do Cacau/Uberlândia	60	117.721	1.251	5,47	348	114	3,58
13	Alto do Amparo	70	80.473	1.150	4,31	319	136	2,96
14	Alto do Socorro	40	73.144	1.053	3,20	293	219	4,12
15	Alto do Seringal	70	72.751	937	4,46	260	150	1,67
16	Tapera/Bela Vista	40	106,731	912	4,23	253	108	3,30
17	Alto da Legião	70	37,229	792	4,27	220	115	3,37

Fonte: Secretaria do Planejamento da Prefeitura Municipal de Ilhéus.

A cidade de Ilhéus é caracterizada por duas feições geomorfológica. Um conjunto de colinas ou mamelões, que são áreas onduladas com topos arredondados, de declividade suave, e uma área extensa de tabuleiros, que corresponde aos locais mais elevados com topos quase planos e cortados por vales profundos escavados por leitos de antigos rios, que originam encostas escarpadas constituídas de um espesso manto argiloso, formado de gnaisses, granulitos e rochas básicas.

O trabalho de campo precedeu-se em áreas de encostas do norte e do sul da cidade, para assim se obter resultados mais abrangentes e com uma melhor distribuição espacial. No norte, onde se situam as maiores parte das encostas da cidade, foram observadas e estudadas áreas pertencentes aos bairros: Basílio, Alto da Legião, Rua do Cano, Esperança (Avenida Esperança), Alto do Cacau/ Uberlândia (Avenida Itabuna). Na região sul, há poucas áreas de encostas ocupadas, a mais densamente povoada é o Alto de Nossa Senhora da Vitória.

Os problemas nas encostas surgem com as dificuldades de execução de obras que visam abertura de vias de acesso aos altos. Todos os lugares visitados apresentavam de difícil, a muito difícil acesso. As ruas estão em estado precário, os caminhos são estreitos não permitindo a passagem de veículos, isso quando não estão interditadas pelo acúmulo de sedimentos decorrentes dos movimentos de massa, além de tudo, as escadarias são muito longas e íngremes. Pelo difícil acesso aos altos, ocorrem também dificuldades técnicas de construção de sistemas de drenagem e esgotamento sanitário. Agravando ainda mais a situação da população residente, constatou-se deficiência na coleta de resíduos sólidos. O lixo é jogado e acumulado nas encostas, acelerando assim a ação dos processos erosivos, isso foi detectado visualmente na Rua do Cano, no Alto da Legião e no Alto do Cacau/ Uberlândia.

A ocupação do espaço nos morros se caracteriza por serem efetuadas em gradação de altitude, primeiro são ocupadas as áreas mais baixas das encostas, depois as áreas intermediárias e por fim as áreas mais elevadas, isso faz com que as áreas de risco se localizem constantemente na frente (perfil batimétrico) e nos fundos (perfil altimétrico) das casas.

Segundo Pisani (1998), a água atua na desestabilização das encostas elevando o grau de saturação do solo e consequentemente diminuindo sua resistência, consequentemente gera o escoamento superficial e diversos tipos de erosão (laminar, em sulcos e boçorocas) que aumentam a instabilidade nas encostas.

Nas áreas visitadas, foram observadas condutores para transporte de lixo e poucas contenções existentes, quando não são construídas pelo poder público, são executadas pela iniciativa dos moradores, e estas, ainda não são bem planejadas, pois são feitas aleatoriamente só para solucionar o problema imediato, sem constituir uma solução satisfatória, vez que o problema continua existindo, a terra continua cedendo e o povo continua enfrentando o perigo e ocupando outras encostas.

Conclusão

As características naturais detectadas na área de estudo, possuem uma correlação com os movimentos de massa e áreas de riscos identificadas, elas foram analisadas de acordo com: o relevo, o tipo de solo, vegetação existente e os índices pluviométricos.

As relações entre essas características naturais a área urbana de Ilhéus tem gerado conseqüências desastrosas nas as áreas de encostas, pois o principal agente desencadeador dos movimentos gravitacionais de massa, como os escorrimentos, quedas, e corridas de massas por exemplo, é a água. Portanto, o grande índice de precipitação, aliado a declividade das encostas e o

material de origem dos solos se configuram como responsáveis naturais pelas ocorrências de movimentos de massa nas áreas de risco, e que são agravadas nestes casos pela ocupação desordenada das encostas. O que torna o quadro mais grave é ausência de um planejamento habitacional, que transforme essas áreas de risco eminentes de ocorrência de movimentos de massa, que podem provocar desde grandes impactos ambientais até ocasionar perdas de vidas humanas.

REFERENCIA

- ANDRADE, Maria Palma. **Ilhéus passado e presente**. 2º Ed. Ver. E ampl. Ilhéus, Ba: Editora Editus, 2003.
- PLANO ESTRATÉGICO MUNICIPAL PARA SSENTAMENTOS SUBNORMAIS DE ILHÉUS - PEMAS . Salvador: URPLAN/ Programa Habitar Brasil/BID - Subprograma de Desenvolvimento Institucional, 2002. 25p.
- PISANI, Maria Augusta Justi. **Áreas de riscos (associado a escorrimentos) para a ocupação urbana: detecção e monitoramento com o auxílio de dados de sensoriamento remoto**. 1998.188f. Tese (Doutorado em Engenharia) - Faculdade de Engenharia Civil e Urbana, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.
- SEI. Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia . Municípios em síntese . Disponível em: <<http://www.sei.ba.gov.br/>>. Acesso em: 04 jan. 2010.

RISCOS ASSOCIADOS A PROCESSOS GEOMORFOLÓGICOS NA SERRA DO MAR PAULISTA

Marcelo da Silva Gigliotti

Faculdade de Geografia, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Brasil
marcelo.gigliotti@puc-campinas.edu.br

Estéfano Seneme Gobbi

Faculdade de Geografia, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Brasil
estefano.gobbi@puc-campinas.edu.br

Pedro Henrique de Mello Bacci

Comissão Permanente de Licitação, Companhia Docas do Estado de São Paulo, Brasil
pedro.bacci@portodesantos.com.br

RESUMO

As encostas da Serra do Mar do estado de São Paulo, Brasil, apresentam uma alta complexidade na estruturação do relevo devido às inúmeras variáveis e intensidade para a área verificadas. Possuem declividades superiores a 30%, podendo chegar a desníveis de 1200 metros em poucos quilômetros e elevado índice pluviométrico, tornando-a um sistema de intensa dinâmica de processos de formação de relevo, como deslizamentos e rolamento de blocos. Alinhado a complexidade dos agentes geomorfológicos, existe a ação antrópica atuante nas encostas, que acarretam em riscos devido à intensificação da erosão. A partir do entendimento da interação dos sistemas naturais e antrópicos, este trabalho apresenta a gênese e o funcionamento dos processos geomorfológicos e como estes podem se transformar em riscos para a população. Entretanto as dinâmicas de morfogênese ocorrem de maneira diferenciada na porção setentrional e na área centro-meridional do litoral paulista, fato facilmente compreendido ao analisar a mudança no lineamento do Planalto Atlântico e na gênese das praias paulistas. Na região da jazida da bacia do Rio Ribeira de Iguape há o recuo das escarpas, entretanto os riscos estão associados, devido à baixa declividade, a ocorrência de eventos de inundação.

Palavras-chave: Mapeamento de Riscos, Planície Costeira, Serra do Mar

Introdução

Para a compreensão dos sistemas ambientais, há a obrigatoriamente da compreensão dos sistemas naturais e dos sistemas antrópicos, bem como suas respectivas interações. Apesar de possuírem dinâmicas de funcionamento distintas, existe uma interferência direta, podendo o antrópico, a partir de diferentes níveis de ocupação, acarretar na aceleração ou retardamento de alguns processos naturais. Entretanto, a dinâmica desses eventos, a depender da sua intensidade e frequência, modifica o modo de ocupação antrópica, por vezes impossibilitando-a. Dentre os fatores naturais atuantes destacam-se os geomorfológicos que são responsáveis pela esculturação e gênese das formas e estruturas de relevo, apresentando grande importância tanto para o entendimento da paisagem como para as análises de riscos ambientais. A dinâmica de esculturação do relevo está diretamente relacionada com os eventos geomorfológicos, sendo estes responsáveis por ações capazes de transformar as formas de relevo. Segundo Guerra (1998), ao discorrer sobre a gênese e evolução das formas, os processos são responsáveis pelas ações capazes de criar ou destruir as formas de relevo, de fixá-las em um local ou deslocá-las. A existência e funcionamento desses na superfície terrestre estão relacionados a diversas forças atuantes tanto de origem interna, como externa.

Para Christofolletti (1979), os processos geomorfológicos são definidos como morfogenéticos, sendo os responsáveis pela esculturação das formas de relevo e representam a ação da dinâmica externa agindo de forma conjunta com os processos endógenos.

A estruturação e gênese da Serra do Mar estão relacionadas ao caráter intempérico, cunhado em uma estrutura de relevo serrana de litologia resistente formada por rochas cristalinas, resultante principalmente por eventos endogenéticos (oriundas do interior da terra), como confronto de placas tectônicas. Em referência as suas formas de relevo, pode se observar um conjunto de vertentes abruptas de grande desnível altimétrico de gênese orogênica, caracterizado por ser uma zona dispersora de energia e matéria, sendo entendida como um sistema de encostas, que constitui uma forma de relevo complexa que apresenta maior expressão sobre a superfície terrestre.

Delimitação de áreas de riscos associado aos processos geomorfológicos.

Perante a influencia da declividade, comprimento das vertentes e formas de relevo que influenciam nos processos geomorfológicos adotou-se como parametro de distinção das áreas de riscos na Serra do Mar os seguintes parametros:

- Declividade baixa a media associadas à níveis altimétricos de 20 a 80 metros, identificados como o sopé da Serra do Mar, relacionados áreas de movimentos de massa e depositos gravitacionais.
- Altas declividades associadas à níveis altimétricos superiores a 80 metros estão relacionados a áreas de escarpas, com rolamentos de blocos e áreas fonte de material.
- Áreas de proximidade de 30 m aos canais de drenagens estão suscetíveis a inundação periódica e/ou corridas de lama.

Partindo destes parametros, fez-se a sobreposição dos indices de declividades e níveis altimétricos, a partir do modelo digital de terreno, construído com dados topográficos, obtendo as áreas relacionados a riscos associados a erosão covlucionar, movimento de massa e inundação, com intuito de identificar os principais riscos associados a dinâmica da Serra do Mar Paulista.

A Serra do Mar: Gênese e Dinâmica Geomorfológica

De acordo com Ab' Saber (1955), a geomorfogênese da Serra do Mar remonta a dois momentos. O primeiro diz respeito ao fim do Cretáceo, quando parte dos falhamentos do Sudeste brasileiro tiveram sua origem e um segundo momento, no Cenozóico Inferior (ALMEIDA & CARNEIRO, 1998), quando a gênese do Planalto Atlântico relaciona-se com movimentos epirogenéticos e eustáticos, originando escarpas festonadas e abruptas, constituído em maior quantidade por rochas pré-cambrianas por vezes metaforfisadas e com grande resistência à denudação. Para a área do Estado de São Paulo, o lineamento estrutural apresenta um direcionamento em NE-SW do sul do estado até o Canal de São Sebastião, onde ocorre uma mudança na direção, adquirindo o sentido N-S, pois passa a ter um recuo para oeste do Planalto Atlântico.

Essa modificação na direção das estruturas cristalinas da Serra do Mar vai propiciar diferenciações na morfologia das praias do litoral paulista, pois na porção meridional haverá maiores áreas de deposições sedimentares e maior desenvolvimento das bacias de drenagem, enquanto que nas áreas setentrionais serão verificadas pequenas praias (*pocket beaches*), segregadas por indentações do Planalto Atlântico. As escarpas da Serra do Mar, quando compartimentadas em conjunto com a segmentação litorânea do Estado de São Paulo, podem ser caracterizadas por apresentar uma maior proximidade com o Oceano Atlântico dando “a impressão de grandes muralhas maciças, recortadas profundamente pelos canais de drenagem” (CRUZ, 1974).

A suscetibilidade das encostas da Serra do Mar em eventos de movimentos de massa é ocasionada basicamente pela grande declividade das vertentes, pela alta pluviosidade apresentada na região, pelo manto de alteração e seu respectivo embasamento rochoso, exposto às intempéries do clima local. Agregado a estes fatores, a ação e ocupação humana nestes locais, com conseqüente retirada da cobertura vegetal, só vem a agravar um quadro de latente instabilidade estrutural. Guerra (1998) aborda que a tipologia da chuva, as propriedades do solo, a cobertura vegetal e as características das encostas, além da intervenção antrópica são fatores controladores e determinantes das variações nas taxas de erosão.

Assim sendo, estudos geomorfológicos de áreas de vertentes com maior grau de declividade, ou seja, maior variação de cotas altimétricas ao longo de um menor espaço constitui uma área de vertentes com maior energia cinética, capaz de proporcionar rolamentos de blocos fraturados, por ação gravitacional, erosão do manto pedológico oriundo de intemperismo e movimentos de massa, decorrentes de instabilidade.

Desta maneira, o litoral norte, por apresentar planícies sedimentares de áreas reduzidas e, conseqüentemente, uma área de depósitos menor, com transição abrupta de altas declividades para uma pequena planície, constitui-se como de riscos associados a processos geomorfológicos, dificultando a ocupação humana nas áreas de encostas da Serra do Mar e na zona de contato escarpa/planície.

Entretanto, nas áreas do litoral sul paulista e baixada santista, devido a recuo das escarpas da Serra do Mar, existe uma área mais extensa de planície que proporcionou a ocupação humana, porém esta ocupação já apresenta os mesmos problemas encontrados no litoral norte, pois já existem assentamentos em áreas de encosta.

Riscos Associados à Dinâmica Serra do Mar Paulista

Levando em consideração a interação da Serra do Mar com a Planície Costeira, pode-se dividir em duas áreas de análise de acordo com a proximidade da Serra com o oceano, a Serra do Mar Paulista em porção Norte e Baixada Santista. (Figura 1).

De maneira geral, o sistema das Escarpas da Serra do Mar, devido aos altos índices de declividade, solos de profundidade variável e uma vegetação densa tem como característica, a existência de inúmeros processos geomorfológicos.

A composição litológica, prevalecendo gnaisses e granitos, que possuem um alto grau de coesão e resistência, quando expostos ao intemperismo químico (bastante intenso na área devido ao alto índice pluviométrico, alta temperatura e a floresta tropical) o material rígido fragmenta-se formando blocos que, após a ação do escoamento superficial, são transportados.

Outra variável importante é o desenvolvimento do entalhamento da drenagem nas áreas de encosta, onde existe um desnível muito acentuado entre a linha de cumeeada e o curso d'água, favorecendo o aumento da energia cinética, permitindo um grande volume de material transportado e um processo deposicional no talvegue dos rios e, que posteriormente são transportados para as áreas de planície.

Apesar de a Serra do Mar apresentar dinâmica homogênea com movimentos de massa nas áreas de escarpas e erosão coluvionar nas áreas de base, (contato com a planície costeira) existe uma diferenciação na intensidade e grandeza que esses processos ocorrem. No caso da região da Baixada Santista, apresenta uma área de erosão coluvionar mais larga e com ocorrência de zonas de inundação nas áreas de planícies (Figura 2), isso devido ao distanciamento do oceano para a serra possibilitando a formação de planícies litorâneas maiores.

Já na região norte devido ao contato do oceano com as escarpas da Serra do Mar não foi possível a formação de grandes planícies, prevalecendo movimentos de massa nas escarpas devido à predominância em relação às áreas transicionais de planície e serra. (Figura 3).

Esses processos acarretam numa instabilidade natural apresentada na área das Escarpas da Serra do Mar, associada ao recente processo de ocupação da população, acaba por intensificar os processos geomorfológicos devido principalmente a impermeabilização do solo e a mudança do escoamento sub e superficial ocasionando maior energia de transporte e acúmulo de águas nas regiões mais baixas, intensificando os processos de inundações. Além disso, o desmatamento elimina a proteção natural que a vegetação exercia perante o solo, deixando-o mais vulnerável aos processos erosivos.

Conclusão

Esta intensificação dos processos geomorfológicos torna-se um problema para ocupação que vivencia todos esses eventos, podendo ocorrer riscos de alta gravidade como desmoronamento das casas, comprometimento de edificações e perda de vidas humanas, exigindo, portanto um cuidado com o entendimento dos processos naturais, das variáveis responsáveis por esses eventos visando um diagnóstico e previsão de tais eventos, a fim de minimizar os problemas para os assentamentos existentes.

Bibliografia

- AB'SABER, A. N. *Contribuição à Geomorfologia do Litoral Paulista*. In *Revista Brasileira de Geografia*. Rio de Janeiro, nº 1 p. 03-44. 1955
- ALMEIDA, F. F. M. & CARNEIRO, C. D. R. *Origem e evolução da Serra do Mar*. In: *Revista Brasileira de Geociências*. v 28, nº 2. p.135-150. 1998
- CHRISTOFOLETTI, A. *Geomorfologia*. São Paulo - SP: Ed. Edgard Blücher. 1979
- CRUZ, O. (1974) *A Serra do Mar e o litoral na Área de Caraguatatuba-SP: Contribuição a Geomorfologia Litorânea Tropical*. São Paulo - SP.
- GUERRA, A. J. T. *Processos Erosivos nas Encostas*. In CUNHA, S. B. & GUERRA, A. J. T. (orgs). *Geomorfologia: Uma atualização de Bases e Conceitos*. 3ª Ed. Rio de Janeiro - RJ: Bertrand Brasil. 1998.

RISCOS E VULNERABILIDADES NA COMPARTIMENTAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DA SUB-BACIA DO RIO GAVIÃOZINHO, BAHIA, BRASIL

Rafael Carvalho Santos

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, Brasil
rafac.16@gmail.com

RESUMO

A relação sociedade-natureza quando realizada de forma inadequada pode ocasionar uma série de riscos e vulnerabilidades não apenas para a sociedade, como também para a natureza. Neste sentido, este trabalho tem o objetivo de caracterizar os aspectos geomorfológicos da Sub-bacia do Rio Gaviãozinho e identificar os possíveis riscos e vulnerabilidades ambientais desencadeados/intensificados pelo uso e ocupação do solo de forma inadequada. Para tanto, realizou-se um levantamento bibliográfico e documental, assim como pesquisa de campo, posteriormente os dados coletados foram analisados e sistematizados. A compartimentação geomorfológica da Sub-Bacia do Rio Gaviãozinho é composta por duas unidades: o Planalto dos Geraizinhos e o Piemonte Oriental do Planalto de Vitória da Conquista. Devido à ocorrência de chuvas torrenciais e a degradação da vegetação natural, associados ao substrato geológico e ao desnível topográfico desta área, são oferecidas condições propícias a atuação do intemperismo químico e de processos erosivos, principalmente, no contato com outras unidades geomorfológicas que ocorre de maneira abrupta. Assim, devido às transformações ambientais geradas pelos diversos usos econômicos a área de estudo se encontra fortemente vulnerável a ocorrência de movimentos de massa e outros impactos negativos.

Palavras-chave: Relevo, Uso do solo, Degradação ambiental.

Introdução

A relação sociedade-natureza quando realizada de forma inadequada pode ocasionar uma série de riscos e vulnerabilidades não apenas para a sociedade, como também para a natureza. Neste sentido, este trabalho tem o objetivo de caracterizar os aspectos geomorfológicos da Sub-bacia do Rio Gaviãozinho - SBRG e identificar os possíveis riscos e vulnerabilidades ambientais desencadeados/intensificados pelo uso e ocupação do solo de forma inadequada. Para tanto, realizou-se um levantamento bibliográfico e documental, assim como pesquisa de campo, posteriormente os dados coletados foram analisados e sistematizados.

Riscos e Vulnerabilidade Ambiental: breve reflexão

A ocorrência de desastres ambientais se torna cada vez mais freqüente. No Brasil, por exemplo, muitas áreas do estado do Rio de Janeiro têm passado por inundações e deslizamentos de terra. Isto afeta diretamente a vida da população que vive naquelas áreas e as coloca numa situação de perigo, já que diante das condições ambientais e sociais em que vivem estes desastres podem ocorrer novamente. Daí, a geografia ao tratar dessas questões tem buscado os conceitos de riscos e perigos, permitindo compreender as interações sociedade-natureza.

Segundo Acsehrad (2006, p. 2), a noção de vulnerabilidade é relativa e “está normalmente associada à exposição aos riscos e designa a maior ou menor susceptibilidade de pessoas, lugares, infra-estruturas ou ecossistemas sofrerem algum tipo particular de agravo”. Logo, este conceito é dotado de amplas possibilidades de análise nas mais diversas ciências, emanando o entendimento de questões interdisciplinares e outros conceitos também associados a ele.

Assim, antes de tratar da vulnerabilidade ambiental é necessário entender a noção de perigo e riscos. Observa-se que os riscos são diversos na sociedade atual e são gerados pela combinação de fatores diversos. Conforme exposto por Sanchez (2008), deve-se diferenciar os conceitos de perigo e risco, sendo assim:

Perigo é definido como uma situação ou condição que tem potencial de acarretar consequências indesejáveis [...]. O risco, por sua vez, é conceituado como a contextualização de uma situação de perigo, ou seja, a possibilidade da materialização do perigo ou de um evento indesejado ocorrer (SANCHEZ, 2008, p. 318-319).

No mesmo sentido, Veyret (2007) afirma que

O risco nasce da percepção de um perigo ou de uma ameaça potencial que pode ter origens diversas e que denominamos uma álea. Esta é sentida pelos indivíduos e pode provocar, ao se manifestar, prejuízos às pessoas, aos bens e a organização do território. À luz dos acontecimentos que podem desencadear uma crise, a análise dos prejuízos remete ao que se denomina vulnerabilidade. Pode-se, portanto, definir o risco como a representação de um perigo ou álea (reais ou supostos) que afetam os alvos e que constituem indicadores de vulnerabilidade (VEYRET, 2007, p. 30).

A discussão sobre riscos é ampla e complexa, existem vários conceitos relacionados à noção de risco, incluindo o conceito de vulnerabilidade. Segundo Dagnino e Carpi Jr. (2007), várias são as possibilidades de classificação de risco, destacam-se os riscos naturais, tecnológicos, sociais e ambientais, por serem os mais citados na literatura sobre o assunto. Sendo o último, o risco ambiental, entendido como uma espécie de síntese dos anteriores, pois ele associa os problemas ambientais ao homem, enquanto indivíduo e sociedade.

O conceito de vulnerabilidade é complementar a noção de risco, e possui a dimensão ambiental e social. Para os objetivos desta pesquisa, a conceituação de vulnerabilidade estará voltada para a dimensão ambiental, ou seja, serão consideradas as fragilidades da área de estudo juntamente com os riscos ambientais advindos dos usos inadequados pela sociedade.

Costa e outros (2007, p. 2493), compreendem vulnerabilidade ambiental “como o risco de degradação do ambiente natural, relacionada à erosão do solo, perda de biodiversidade, assoreamento, contaminação do recurso solo - água, etc”. Neste contexto, Santos (2007) compreende que a vulnerabilidade ambiental compõe o grau de sensibilidade de um ambiente a influencia de diversos fatores (dentre eles os impactos e riscos ocasionados pelas atividades socioeconômicas), gerando uma resposta: a degradação ambiental.

Assim, vulnerabilidade ambiental está ligada a noção de risco, na geomorfologia ela assume um caráter mais voltado para os riscos de degradação ambiental. Sendo aqui entendida como a maior ou menor susceptibilidade de um ambiente a um impacto potencial provocado por um uso humano qualquer. Para sua avaliação é necessário conhecer uma série de aspectos físicos e sociais, seguidos de suas respectivas dinâmicas, a fim de obter uma visão mais holística da realidade.

A Compartimentação Geomorfológica da SBRG: riscos e vulnerabilidades

A geomorfologia de uma área é uma característica muito importante para avaliar a vulnerabilidade do ambiente a degradação ambiental e também as potencialidades ambientais. A compartimentação atual do relevo é resultado da atuação da geodinâmica interna e externa

ao longo de milhares de anos e se mantém em constante evolução. Para Santos (2007, p. 78), “a análise do relevo permite sintetizar a história das interações dinâmicas que ocorreram entre o substrato litológico, a tectônica e as variações climáticas”.

Neste sentido, a compartimentação geomorfológica da SBRG é composta por duas unidades: o Planalto dos Geraizinhos e o Piemonte Oriental do Planalto de Vitória da Conquista. O Planalto dos Geraizinhos (também conhecido como Planalto da Conquista), de modo geral, está situado a altitudes entre 600 e 1.000 m, com exceção de áreas residuais que podem atingir altitudes acima de 1.000 m, como é o caso da Serra do Periperi em Vitória da Conquista. Segundo Lester King, a parte aplainada foi esculpida durante o ciclo Sul-Americano, no Terciário em torno de 30 a 60 milhões de anos, formando uma superfície tabular coberta por depósitos detríticos. Esta unidade recobre grande porção da superfície da área de estudo, preenchendo praticamente toda a parte central e Norte. De acordo com o Lima (2012, p. 94), “o escoamento superficial concentrado sobre as estruturas cristalinas resulta em forte incisão da drenagem, modelando um relevo dissecado em colinas e em cristas, com a formação de vales em V”.

Logo, a ocorrência de chuvas torrenciais e a degradação da vegetação natural, associados ao substrato geológico oferecem condições propícias a atuação do intemperismo químico e de processos erosivos. Principalmente, no contato com outras unidades geomorfológicas que ocorre de maneira abrupta com desnível de até 200 m, por isso as bordas do Planalto da Conquista são festonadas, como observa-se na figura 01. Esta unidade geomorfológica é um divisor de águas entre a Bacia do Rio Pardo e a Bacia do Rio de Contas, os cursos d’água são agentes importantes na morfogênese, contribuindo para a dissecação através do entalhamento do talvegue e transporte de sedimentos, alguns vales chegam de 60 a 80 m de profundidade.

Figura 1: Transição entre o Planalto dos Geraizinhos e o Piemonte Oriental do Planalto de Vitória da Conquista na SBRG. Foto: Rafael C. Santos. Fonte: Pesquisa de campo, 2013.

A outra unidade presente na área de estudo é o Piemonte Oriental do Planalto da Conquista, que ocupa um relevo intermediário entre o Planalto e a Depressão de Itabuna-Itapetinga, e por se tratar de uma unidade de transição, a vertente possui uma forte inclinação de 30° a 45°. Recobre uma porção Sul/Sudeste, avançando em uma estreita faixa para o Norte. A altitude varia na área de estudo entre 600 e 880 m, logo apresenta uma grande irregularidade no

terreno com desníveis de até 280 m, contribuindo para o aumento do potencial erosivo dos cursos d'água, cuja variação entre o topo do relevo e o talvegue atinge de 100 a 280 m.

Neste sentido, o relevo é bem dissecado com presença de morros e colinas, como visto na figura 01, devido às transformações ambientais geradas pelos diversos usos econômicos esta unidade se encontra fortemente vulnerável a ocorrência de movimentos de massa e outros impactos negativos. Com isto, surgem afloramentos rochosos cuja cronologia remete ao Pré-Cambriano, formado principalmente por rochas metamorfizadas que exercem resistência ao intemperismo e acabam ficando expostas na paisagem.

O mapa 01 mostra a linha do perfil topográfico ao longo do eixo principal da SBRG apresentada na figura 02, nota-se que a topografia do Planalto da Conquista possui relevo ondulado que vem sendo dissecadas pela ação da rede de drenagem sobre a superfície de coberta por material elúvio-coluvial. À medida que se aproxima da foz do Rio Gaviãozinho, percebe-se um relevo fortemente dissecado com uma alta declividade e presença de morros e vales entalhados pelo leito dos rios, característicos do Piemonte Oriental do Planalto da Conquista. A ocupação desta área que são naturalmente vulneráveis, intensificado a ocorrência de processos morfodinâmicos.

Mapa 1: Linha do Perfil Topográfico na SBRG - BA.

Figura 2: Perfil Topográfico da SBRG - BA. Elaboração: Rafael C. Santos, 2013.

Considerações Finais

Portanto, as unidades geomorfológicas estão em constante evolução devido os processos da geodinâmica interna e externa da Terra, muitas vezes intensificados pelas práticas humanas. Deve-se propor medidas para minimizar a degradação ambiental, haja vista os riscos e vulnerabilidades desencadeadas por este problema e suas consequências socioambientais. A conservação ambiental associada a um manejo adequado do solo são caminhos viáveis para manter o equilíbrio do sistema sociedade-natureza.

Bibliografia

- ACSELRAD, Henri (2006). *Vulnerabilidade Ambiental, Processos e Relações*. II Encontro Nacional de Produtores e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e Territoriais, FIBGE, Rio de Janeiro.
- COSTA, T.C.C. [et al] (2007). Vulnerabilidade ambiental em sub-bacias hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro por meio de integração temática da perda de solo (USLE), variáveis morfométricas e o uso/ cobertura da terra. *Anais XIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto*, Florianópolis, Brasil, 21-26 abril, INPE, p. 2493-2500.
- DAGNINO, Ricardo de Sampaio; CARPI JÚNIOR, Salvador (2007). Risco Ambiental: conceitos e aplicações. *Climatologia e Estudos da Paisagem*, Rio Claro, v. 2, n. 2, p. 50-87.
- LIMA, Espedito Maia (2012). *Interações socioambientais na bacia hidrográfica do rio Catolé - Bahia*. Tese (Doutorado em Geografia) - NPGeo, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão.
- SÁNCHEZ, Luis Enrique (2008). *Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e métodos*. 2 ed. São Paulo: Oficina de Textos.
- SANTOS, Rozely Ferreira dos (Org.) (2007). *Vulnerabilidade Ambiental*. Brasília: MMA.
- VEYRET, Y (2007). *Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente*. São Paulo: Contexto.

SUIVI DU RISQUE DE DÉGRADATION DES SOLS PAR TÉLÉDÉTECTION: APPLICATION AU BASSIN VERSANT D'OUED FERGOUG DANS LES MONTS DES BÉNI-CHOUGRANE EN ALGÉRIE

Souidi Zahira

Faculté des SNV, Laboratoire LR5BG, Université de Mascara
souidi.z@gmail.com

Hamimed Abderrahmane

Laboratoire LR5BG, Université de Mascara
hamimed@dr.com

Donze Frédéric

Laboratoire 3S, Université Joseph Fourier (UJF)
Frederic.Donze@hmg.inpg.fr

RESUMÉ

En Algérie du Nord, le phénomène d'érosion hydrique présente la forme de dégradation physique des sols la plus importante affectant les reliefs, la production du sol et la stabilité des versants. Pour suivre la progression de ce phénomène insidieux et pour évaluer les résultats des actions de lutte, les outils spatiaux, tels que la télédétection et les systèmes d'informations géographiques (SIG), semble être privilégiés, car ils permettent d'élaborer des cartes précises sur la progression de la dégradation à partir des indicateurs écologiques qui mettent en évidence les transformations du milieu. Ces indicateurs sont très corrélés aux paramètres radiométriques de surface, tels que l'albédo, l'indice de végétation (NDVI) et la température de surface.

L'objectif de cette étude est de développer une méthodologie pour la cartographie du risque de dégradation par utilisation combinée de l'information acquise par les capteurs satellitaires et des variables dérivées du modèle numérique de terrain (MNT). Le site pilote retenu est un écosystème montagneux très vulnérable à l'érosion hydrique, situé dans les monts des Béni-chougrane (nord-ouest de l'Algérie). La méthodologie présentée consiste à développer un indice quantitatif de dégradation des sols en fonction de deux paramètres : la fraction d'évaporation (EF), qui discrimine l'état hydrique de surface, et l'indice de végétation standardisé (NDVIs) qui reflète l'activité chlorophyllienne des surfaces.

La synthèse de l'ensemble des informations dans un SIG, ainsi que leurs confrontations avec les données géomorphologiques, ont permis de dresser des cartes de sensibilité à l'érosion hydrique selon cinq degrés souvent corrélé à la densité de végétation. Il ressort que les zones en état dégradé et très dégradé couvrent 29% de la superficie du bassin versant contre 43% des terres à couvert végétal dense ou très dense. Le reste (28%) étant en état critique.

Mots-clés: Erosion hydrique, SIG, Télédétection, Algérie.

Introduction

L'expansion spectaculaire des processus d'érosion des sols est, en Algérie, un indicateur d'aspect inquiétant relié à la dégradation des sols (Heddadj, 1997 ; Roose et al., 2000). Pour suivre la progression de ce phénomène insidieux et pour évaluer les résultats des actions de lutte, les outils spatiaux, tels que la télédétection et les systèmes d'informations géographiques (SIG), semble être privilégiés, (Puech, 1993) car ils permettent d'élaborer des cartes précises sur la progression de la dégradation à partir des indicateurs écologiques qui mettent en évidence les transformations du milieu (Roy et Bouyoussou, 1993). Ces indicateurs sont très corrélés aux paramètres radiométriques de surface (Kustas & Norman, 1996), tels que l'albédo (a), l'indice de végétation (NDVI) et la température de surface (Ts).

Notre travail se base principalement sur les indicateurs du milieu qui sont très corrélés aux paramètres radiométriques de surface, tels que l'albédo (a), l'indice de végétation (NDVI) et la température de surface (Ts). L'objectif de cette étude est de développer une approche méthodologique pour la cartographie du risque d'érosion hydrique par utilisation combinée de l'information acquises par le capteur satellitaire ETM+ et des variables dérivées du modèle numérique de terrain (MNT). La méthodologie utilisée consiste à développer un indice quantitatif de dégradation des sols en fonction de deux paramètres : la fraction d'évaporation (EF), qui discrimine l'état hydrique de surface relatif au fonctionnement de l'écosystème, et l'indice de végétation standardisé (NDVIs) qui reflète l'activité chlorophyllienne des surfaces.

Matériel et méthodes

Le site d'étude

Le site pilote retenu: est un écosystème fragilisé très sensible à l'érosion hydrique, situé dans les monts des Béni-chougrane (nord-ouest de l'Algérie). Il correspond au bassin versant de oued Fergoug (figure 1) d'une superficie d'environ 170 km². La région concernée fait partie du grand bassin-versant de l'Oranie - Chott Chergui. La zone d'étude est caractérisée par une structure tourmentée, des familles lithologiques peu résistantes ou franchement tendres prédominantes (Bouchetata et Bouchetata, 2006). La quasi-totalité des terrains est occupée par des séries marneuses datant du Crétacé ou du Néogène, exception faite des affleurements gréseux qui arment les sommets de certaines unités (Bouchetata et Bouchetata, 2006).

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude.

Données et méthodologie

Le jeu de données est constitué de:

- sept bandes spectrales du capteur ETM+ de Landsat acquises pendant le printemps (production maximale de l'écosystème) de l'année 2002;
- un MNT (Modèle Numérique de Terrain).

La méthodologie présentée consiste à caractériser la dégradation des sols (Fig. 2), en se basant sur la combinaison des deux informations élémentaires de surface (Garcia et al., 2008) :

- l'état hydrique de surface, qui est caractérisé par la fraction d'évaporation (EF) déduite par le modèle METRIC (Mapping Evapotranspiration with Internalized Calibration) (Allen, et al., 2005) ;
- l'activité chlorophyllienne de la surface qui est discriminé par l'indice de végétation (NDVI) et qui est un indicateur biologique de la dégradation ($NDVI = (r_{PIR} - r_{rouge}) / (r_{PIR} + r_{rouge})$ avec r la reflectance).

Figure 2 : Schéma conceptuel de la méthode de combinaison entre la fraction d'évaporation (EF) et l'indice de végétation (NDVI) pour estimer le risque de dégradation des sols (en bas à gauche risque élevé (high risk) et en haut à droite risque faible (low risk) selon la diagonale).

Resultats et Discussion

La synthèse de l'ensemble des informations dans un SIG, ainsi que leurs confrontations avec les données géomorphologiques, ont permis de dresser une carte (figure 3) de sensibilité à l'érosion hydrique selon cinq degrés :

- végétation très dense	(Pas de risque, Indice <0,2),
- végétation dense	(Risque faible, 0,2 ≤ Indice < 0,4)
- état critique	(Risque moyen, 0,4 ≤ Indice <0,6),
- état dégradé	(Risque élevé, 0,6 ≤ Indice <0,8),
- état très dégradé	(Risque très élevé, Indice ≥ 0,8),

Les résultats obtenus montre que , les zones en état dégradé et très dégradé couvrent 34 % de la superficie du bassin versant et sont situées principalement en amont où la végétation est rare et dégradée. Cependant 42 % des terres à couvert végétal dense ou très dense indique une dégradation nulle à faible. Les (24 %) étant en état critique mais relève d'une dégradation modérée. Cette perte constitue une érosion très élevée des sols sous un climat agressif avec des précipitations faibles mais à caractère orageux. D'où apparition des ravinements et des ravins sur des surfaces de terrains nus découpés sur des pentes fortes avec un indice d'érodabilité important. Le manque des ouvrages antiérosifs a permis aussi les sapements des berges qui constituent une menace permanente et la plus importante dans notre zone d'étude.

Figure 3 : Carte du risque de dégradation des sols selon un indice qui varie de 0 (risque nul) à 1 (risque élevé).

Conclusion

Le présent travail fait ressortir les zones les plus exposées à l'érosion. La méthode des pertes de la combinaison de deux indicateurs de surfaces sous SIG permet de mieux identifier les zones à fort risque d'érosion en tenant compte du fonctionnement de l'écosystème et de ses

perturbations. Ces zones occupent les versants de montagne qui sont généralement des zones nues ou de cultures. La carte de risque d'érosion obtenue constitue un document d'aide à la décision qui va contribuer à l'utilisation rationnelle des terres de la région. L'utilisation d'une série d'images pourrait permettre un suivi et une surveillance continue des zones à risque. Cette méthode, permettrait de fournir des informations sur la résilience des écosystèmes ou la dégradation des terres sur une échelle de temps. Mais une étude approfondie de l'érodabilité des sols, de la réserve en eau du sol et de l'érosivité des pluies à travers des mesures régulières de terrain contribuerait à un meilleur suivi de l'érosion des sols dans la région.

Remerciement

Ce travail s'inscrit dans le cadre du programme régional ENVI-Med. Les auteurs tiennent à remercier l'ensemble des organismes de pilotage et de financement.

Bibliography

- Allen, R.G.; A. Morse, M.; Tasumi, W.J.; Kramber, W.; Bastiaanssen, W.G.M. (2005). Computing and Mapping of Evapotranspiration; Chapter 5 in *Advances in Water Science Methodologies*; U. Aswathanarayana, Ed.; A.A. Balkema Publishers; Leiden, The Netherlands, 288 p.
- Bouchetata A., Bouchetata T. (2006). Propositions d'aménagement du sous bassin versant de l'oued Fergoug (Algérie) fragilisé par des épisodes de sécheresse et soumis à l'érosion hydrique. *Sécheresse*, 17 (3), p. 415-424.
- García M., Oyonarte, C., Luis Villagarcía, L.; Sergio Contreras S.; Domingo, F.; Puigdefábregas, J. (2008); Monitoring land degradation risk using ASTER data: The non-evaporative fraction as an indicator of ecosystem function *Remote Sensing of Environment* (112), p. 3720-373
- Heddadj, D. (1997). La lutte contre l'érosion en Algérie. *Bull. Res. Éros.*, 17, p. 168-175.
- Kustas, W. P., and Norman, J. M., 1996. Use of remote sensing for evapotranspiration monitoring over land surfaces. *Hydrological Sciences Journal - Journal des Sciences Hydrologiques*, 41, p. 495-516.
- Puech, C. (1993). Détermination des états de surface par télédétection pour caractériser les écoulements des petits bassins versants. Thèse de doctorat, Université J.Fourier, 202p.
- Roose, E.; Chebbani, R.; Bouragaa, L. (2000). Ravinement en Algérie. Typologie, facteurs de contrôle, quantification et réhabilitation. *Sécheresse*, 11, p.317-26.
- Roy, B. et Bouyoussou, D. (1993). Méthodes multicritères d'aide à la décision. Economica, Paris, 665 p.

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS SOCIALES DE RIESGO POR FENÓMENOS VOLCÁNICOS EN COLOMBIA

Yolanda Hernández Peña

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Distrital Francisco José de Caldas
ythernandezp@udistrital.edu.co

Germán Vargas Cuervo

Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Colombia
gvargasc@unal.edu.co

RESUMEN

Colombia se encuentra en el “Cinturón de fuego del Pacífico”, por tanto, los volcanes existentes a lo largo de su territorio han desempeñado un importante papel en el desarrollo y evolución de su dinámica territorial, dado que importantes asentamientos se encuentran en áreas de influencia volcánica. El objetivo de esta ponencia es presentar los distintos procesos que han realizado las comunidades locales habitantes de zonas de influencia de fenómenos volcánicos como: El Galeras, El Machin, Del Huila y Del Ruiz y que han constituido escenarios diferenciales de riesgo, como también de procesos de adaptación y recuperación, los cuales se constituyen en factores de aprendizaje para las políticas y estrategias de gestión del riesgo. Para la investigación se utilizó una metodología mixta, de análisis basado en imágenes de satélite, y de enfoque etnográfico. Los hallazgos evidencian distintas construcciones culturales y procesos históricos alrededor de los fenómenos volcánicos, lo cual se constituye en importantes elementos para la gestión del riesgo.

Palabras clave: Volcanes, Colombia, Resiliencia, Gestión, Riesgo

Introducción

Los escenarios de riesgo se construyen a partir la presencia de factores de orden histórico y sociocultural, que en ocasiones pueden aumentar la vulnerabilidad de las poblaciones, o también explican las razones no convencionales, para la presencia de comunidades en zonas de influencia volcánica. Los escenarios sociales de riesgo presentados son el resultado de una investigación doctoral en geografía, de la Universidad Nacional de Colombia; acerca de imaginarios y percepciones de las poblaciones sobre los fenómenos amenazantes, en este caso los volcanes. Para realizar la investigación se acudió a un enfoque etnográfico. El trabajo de campo se realizó durante los años 2010 y 2011, con informantes clave, representantes de comunidades indígenas y campesinas. El objetivo de la ponencia es dar a conocer esos factores de orden social, cultural e histórico que inciden en la construcción de escenarios de riesgo. Como resultado se evidencia que no para todas las comunidades el fenómeno volcánico es amenazantes y que esto incide en el éxito de las estrategias de gestión del riesgo; igualmente se encuentra que los factores culturales se entrecruzan con elementos de carácter histórico, como despojo de tierras y desplazamiento, lo cual es un factor explicativo de la presencia de comunidades en zonas volcánicas.

Los escenarios de riesgo volcánico en Colombia

En Colombia, Estudios del Banco Mundial señalan que los eventos generados por las erupciones volcánicas y los sismos generan los índices más altos de pérdidas en viviendas destruidas y de vidas, para el periodo de 1970-2011 las muertes por erupciones llegaron a 24.456 muertos (Campos, Holm-Nielsen, & Diaz, 2012), en concordancia con esto, al realizar una revisión sobre los estudios vinculados con zonas de amenaza volcánica y vulnerabilidad de las poblaciones, se encuentra que aproximadamente 1,9 millones de personas asentadas en zonas de influencia de

estos fenómenos, y de estos 240 se encuentran en la zona de amenaza alta (OSSO, 2011). En la siguiente Tabla 1 se presenta una síntesis de las principales características de los escenarios de riesgo volcánico analizados.

Tabla 1 Descripción general del fenómeno volcánico y factores asociados

Fenómeno volcánico	Condiciones territoriales	Actores sociales asentados en la zona de influencia
Volcán Nevado del Huila: La altura del Pico Central es de 5364 m, corresponde al punto más alto de la cordillera Central y de los Andes en Colombia. Cuenta con un casquete glaciar, que según (Ingeominas, 2000) es drenado por el río Páez, con una red de drenaje radial excéntrica en el edificio volcánico, corriendo por un cañón estrecho hasta el río Magdalena.	Es una amenaza latente para los habitantes del municipio de Páez, población ubicada en los límites entre los departamentos de Cauca y Huila, en el suroeste de Colombia. El nivel de alerta en la región es amarillo, dado que la actividad sísmica en la montaña es constante (Prada, 2013)	Con aproximadamente 33 mil habitantes expuestos a amenaza alta (Campos, Holm-Nielsen, & Díaz, 2012). Páez es el municipio ubicado en su zona de influencia, con una población de 40.643 habitantes, de los cuales 30.923 son indígenas Nasa, el resto de la población es afrocolombiana y mestiza (Dane, 2005). Los Nasa cultivan el maíz y utilizan una forma de cooperación para el trabajo denominado minga.
Volcán Machín: Con 2750 msnm, es el volcán activo, con menor altura sobre el nivel del mar y el único con menos de 4000 metros, tiene un edificio volcánico de varios anillos piroclásticos de 2.4 km de diámetro y alturas de menos 100 m sobre el basamento (Calvache, 2002).	Para (Ingeominas, 2002), la zona de influencia del Volcán comprende parte de los departamentos de Tolima, Cundinamarca y Quindío, con centros urbanos como Ibagué, Armenia, Girardot, y 12 municipios más.	Existen 31 mil habitantes expuestos a amenaza alta, (Campos, Holm-Nielsen, & Díaz, 2012). El 35% de la población vive en la cabecera de Cajamarca y el 65% en el resto, el 99,5% vive en hogares particulares y el 0,5% vive en alojamientos especiales (Vega, 2013).
Volcán Nevado del Ruiz: Posee una forma alargada en dirección NE - SW, algo achatado y con un diámetro mayor en su base de 15 km de longitud, con un cráter activo de 870 x 830 m de diámetro y profundidad de 247 m. (Ingeominas, 2010).	En su zona de influencia están los municipios de Manizales, Villamaria, Palestina, Chinchiná y Neira. 85 familias habitan la zona de alta vulnerabilidad (Giraldo, 2012). -	Cuenta con 26 mil habitantes ubicados en la zona de amenaza, (Campos, Holm-Nielsen, & Díaz, 2012)
Volcán Galeras: Ubicado al sur del país, en el departamento de Nariño a 512 km al suroeste de Bogotá. De acuerdo a (Ingeominas, 2000) tiene una forma cónica, la cima del edificio destruido tiene una altura de 4276m, su drenaje es radial excéntrico.	En la zona de influencia se encuentran siete municipios entre ellos la ciudad capital Pasto y una serie de corregimientos y veredas que albergan aproximadamente 500.000 habitantes	Tiene 10 mil habitantes en su zona de amenaza alta (Campos, Holm-Nielsen, & Díaz, 2012). Parte de la zona está habitado por indígenas Quillasingas y campesinos quienes se dedican a la agricultura de trigo, maíz, ulluco, arveja, cebada, hortalizas, ARD (2003).

Construcción de escenarios sociales de riesgo

En los escenarios sociales de riesgo convergen una serie de factores relacionados con los procesos históricos de apropiación del territorio, y características culturales relacionadas con el conocimiento del territorio y del fenómeno derivado de esta apropiación, las cosmologías asociadas al significado del fenómeno volcánico para la comunidad y las tradiciones correlacionadas con ese significado. Igualmente, en estos escenarios tienen lugar acciones para la gestión del riesgo, las cuales pueden generar incompatibilidades con los procesos locales o por el contrario tener resultados exitosos, dentro de las incompatibilidades se encuentran problemas de comunicación entre autoridades y poblaciones locales y desacuerdos sobre temas legales, administrativos y técnicos, muchas veces generados por distintas concepciones sobre el fenómeno mismo como se ve en la Tabla 2.

Tabla 2 Factores sociales e históricos en la construcción de escenarios de riesgo

Volcán	Imaginario y percepciones sobre el fenómeno	Procesos históricos	Escenarios de gestión del riesgo
Nevado del Huila	Para los indígenas Nasa el Volcán representa el padre preceptor, que a partir de la avalancha de 1994 les hizo reaccionar ante los procesos de aculturación que los estaban afectando y recuperarse como etnia.	Para las personas entrevistadas existe una memoria histórica de larga duración, que les permite reconocerse como pueblo y considerar el fenómeno como una manifestación de la naturaleza en beneficio de su pueblo, para ellos la avalancha generada por el deshielo del Volcán era el presagio del nacimiento de un héroe cultural.	A partir de su cosmovisión, ellos consideran que se encuentran en zona de riesgo y han logrado una convergencia de conocimientos técnicos y locales para la construcción procesos de monitoreo y alerta
Machín	Se encuentra en una zona estratégica, debido a la cercanía a una zona de riqueza aurífera, y porque es un corredor obligado de circulación del país. Para parte de su población dejar la zona de amenaza puede significar perder sus valiosos territorios por el interés de algunos particulares.	No hay experiencias sobre eventos ocurridos en la zona, el conocimiento sobre erupciones es el dado por las investigaciones vulcanológicas, por tanto habitaban sobre el domo, hasta los sismos ocurridos en 1982, los cuales los hicieron reaccionar sobre la peligrosidad del volcán.	Los campesinos han realizado trabajos de concientización sobre el riesgo, han hecho videos sobre rutas de evacuación y esto ha visibilizado y generado mayor conciencia sobre su situación.
Nevado del Ruiz	El volcán es un atractivo turístico, ha traído riqueza a los suelos y es un emblema del territorio	En este escenario de riesgo se evidencia la pérdida de memoria histórica hasta 1985, no tenían conocimiento de eventos anteriores. Mucha gente ignoraba que fuera un Volcán (Cardona, Wilches-Chaux, García, & Mansilla, 2004)	La ocurrencia de la avalancha de 1985 marcó un hito. Surge el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, es el desastre que más víctimas humanas ha producido en Colombia.
Galeras	La estrategia de reubicación de la población generó un movimiento de reacción, a partir de la cual ellos reivindicaron el reconocimiento de su estatus indígena, lo cual implica una relativa autonomía en el manejo de asuntos territoriales	Las comunidades indígenas en la época de colonia fueron despojadas y reducidas a resguardos, pero en 1940 estos fueron diezmos de 88 resguardos a 19 y se procedió a su parcelación, todo ello ha ocasionado problemas de escasez de tierra, López (2000).	Desencuentros en la gestión, las comunidades no se sienten reconocidas frente a las estrategias de reubicación. Para los Quillasingas, el Volcán no es una amenaza y por tanto allí no hay riesgo.

Conclusiones

Los escenarios sociales de riesgo se construyen a partir de las diferentes concepciones y percepciones sobre el fenómeno volcánico, así para los quillasingas el Volcán Galeras no es una amenaza; para los indígenas Nasa el volcán del Huila es un importante elemento cultural, al constituirse en un preceptor sobre sus acciones cotidianas; para las comunidades asentadas en la zona del V. Machín y del V. Ruiz estos fenómenos si son amenazantes, para los primeros por los temblores de la década del 80 y para los segundos por lo ocurrido con la desaparición de Armero en 1985. Estas concepciones sobre el fenómeno natural inciden en la estrategia de gestión del riesgo, dado que en ocasiones puede ayudar a fortalecerla como ocurre con los Nasa o por el contrario obstaculizar acciones como reubicaciones temporales, o reasentamientos. Para las comunidades indígenas y campesinas es difícil pensar en cambios en sus asentamientos, por el temor a la pérdida del tejido social y a la relación establecida con el territorio. Para la gestión del riesgo, es importante repensar la experiencia de los Nasa e Ingeominas acerca de la

construcción de conocimiento emergente y corresponsabilidad para monitorear el fenómeno, con la mediación del conocimiento técnico-científico y el de las poblaciones.

Bibliografía

- Ard. (2003). Código Periferia Urbana. Pasto: UDENAR.
- Calvache, M. (2002). Análisis integral de riesgo volcánico en Colombia. Cátedra Ambiental. 17 Conferencia (pág. 20). Quindío: Corporación Autónoma Regional del Quindío.
- Campos, A., Holm-Nielsen, N., & Diaz, C. (2012). *Análisis de la gestión de riesgo de desastres en Colombia*. Bogotá: Banco Mundial.
- Cardona, O., Wilches-Chaux, G., García, X., & Mansilla, E. (2004). *Estudio sobre desastres ocurridos en Colombia: Estimación de pérdidas y cuantificación de costos*. Bogotá: Banco Mundial, Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, Planeación Nacional.
- Giraldo, R. (11 de 03 de 2012). *Vanguardia.com*. Recuperado el 06 de 2014, de Continúa la alerta naranja en el Volcán Nevado del Ruiz: <http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/151881-continua-alerta-naranja-en-volcan-nevado-del-ruiz>
- Ingeominas. (2000). Servicio geológico colombiano. Recuperado el 30 de 10 de 2012, de http://seisan.ingeo-minas.gov.co/RSNC/index.php?option=com_jevents&task=icalrepeat.d.etail&evid=368&Itemid=0&year=2010&month=06&day=06&uid=17e42b5308c8bd85c954f62d946ac9bf
- Ingeominas. (2002). *Evaluación de la Amenaza volcánica potencial del cerro Machín (Departamento del Tolima, Colombia). Memoria explicativa del mapa de amenaza*. Manizales: Ministerio de Minas y Energía, Instituto de Investigación e Información Geocientífica Minero, ambiental y Nuclear, Subdirección de Amenazas Geoambientales.
- Ingeominas. (2010). Instituto Colombiano de Geología y Minería. Recuperado el 4 de Diciembre de 2010, de <http://www.ingeo-minas.gov.co/content/view/229/250/>
- OSSO, C. (2011). *Comportamiento del riesgo en Colombia. Proyecto Análisis de la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia*. Bogotá: Banco Mundial.
- Prada, E. (24 de 05 de 2013). *Agendapropia. com*. Recuperado el 09 de 2014, de <http://www.agendapropia.com/index.php/agenda-propia/informe-especial/1932-pobladores-de-las-faldas-del-volcan-nevado-del-huila-expertos-en-la-prevencion-del-riesgo>
- Vega, L. (2013). *Evaluación integral del riesgo volcánico. Estudio de caso: El Cerro Machín Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional.

OS FLUXOS DE ESCOAMENTO SUB-SUPERFICIAIS E SUA RELAÇÃO COM OS PROCESSOS DE VOÇORACAMENTO: UM PROCESSO DINÂMICO DE CAPTURAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS.

Kátia Gisele de Oliveira Pereira

Curso de Geografia/RISCOS

katia_gisele@hotmail.com

Antônio de Sousa Pedrosa

Instituto de Geografia da UFU, CEGOT, RISCOS

aspedros@gmail.com

Introdução

Esse trabalho foi desenvolvido na área que corresponde às bacias dos ribeirões Doudinho, Panga e Estiva, afluentes do rio Tijuco, delimitadas pelas seguintes coordenadas geográficas: 19°00' e 48°10' de latitude sul e 19°20' e 48°50' de longitude oeste do meridiano de Greenwich, correspondendo a uma área de 1.301,95 km². Essa área corresponde ao contato da chapada com o relevo dissecado da bacia do rio Tijuco (MG). A origem paleogeográfica da área de pesquisa conta com a evidência tanto de soerguimentos, como de movimentação de subsidência de blocos. Segundo Batezelli (2003) tais processos são consequências dos esforços impostos às placas sul-americanas durante a separação Brasil-África. Figura 1.

As subsidências descritas ocorreu em função da instalação de intrusões alcalinas que deram origem aos *plugs* vulcânicos de Tapira, em Araxá-MG, Salitre, Serra Negra e Catalão, o chamado Soerguimento Alto Paranaíba (SAP). Ao mesmo tempo, as tais subsidências deram origem a uma nova depressão, alongada segundo a direção aproximada de Nordeste - Sudoeste, que se estendiam do Sul de Goiás até o Sudoeste do Estado de São Paulo, denominando esse embaciamento como Bacia Bauru. Essa abordagem tectono-sedimentar para evolução da Bacia Bauru já se encontra bastante difundida na literatura geológica presente nos trabalhos de Hasui et al (1975), Riccomini (1997), Milani et al (2007), Pereira et al (2012). Figura 2.

O desenvolvimento das formas do relevo foram submetidas as combinações de atividades da tectônicas, das características litológicas, das práticas antrópicas e da dinâmica do clima, obedecendo ao arranjo as escalas que compreendem a bacia do Paraná, até as formas locais como o caso do contato da chapada com o relevo dissecado da bacia do rio Tijuco (MG).

Figura 1 - Localização da Área de Estudo.

Fonte: Cartas topográficas do Exército, (DSG, 1983), escala 1:25.000

A análise do comportamento das formas do relevo, dos padrões e da dinâmica das drenagens superficiais e subsuperficiais, podem ser compreendida por esse aspecto como aponta Facincani (2000).

As descontinuidades estruturais associadas aos regimes tectônicos têm relevante função na origem e evolução das formas de relevo, visto que determinam as vias de percolação da água e aceleram os processos intempéricos (morfogênese e pedogênese). (FACINCANI, (2000 p.11)

A origem das voçorocas que ocorrem no município de Uberlândia foi atribuída aos elevados índices de erodibilidade dos solos; a intensidade das primeiras chuvas de verão - por seu caráter torrencial - seguidas de um período de estiagem, típicos do planalto central brasileiro e ao desmatamento, Baccaro (1990) e Guerra e Botelho (1998). Assim, o estudo da geomorfologia estrutural, presente nesse artigo, remete-se, com ênfase, ao estudo da origem e evolução das formas do relevo relativas derivadas direta e indiretamente dos movimentos tectônicos verticais e horizontais, Facincani (2000). Espera-se apontar de que forma a atuação da tectônica tem contribuído para a dinâmica de capturas de cabeceiras de drenagem, para a ocorrência de erosão acelerada associadas as voçorocas, no intuito de explicar a dinâmica de evolução de algumas formas de relevo e das redes de drenagem subsuperficiais.

Figura 2 - Compartimentação Estrutural do Triângulo Mineiro (MG).

Fonte: Batezelli (2003).

As evidências morfotectônicas no contato da chapada com o relevo dissecado da Bacia do rio Tijuco (MG).

De acordo com Batezelli (2003), desde o Permiano Superior a Bacia do Paraná deixou de ser uma unidade autônoma de sedimentação, de forma que a deposição Juro-Triássica excedeu os limites da Bacia Paraná, estendendo-se para as áreas vizinhas sobre rochas pré-cambrianas e paleozoicas. Dessa forma, a Flexura Goiânia teria sido palco de movimentação de falhas, fruto de tectônica tangencial durante a reativação tectonomagmática Wealdeniana. Sobre essa estrutura então foram depositadas rochas dos Grupos São Bento, os basaltos e os arenitos do Grupo Bauru, condicionadas por falhas com orientação NW - NNW.

A porção norte e nordeste da bacia do Paraná, na qual está inserida a área de pesquisa tornou-se ambiente de deposição, no período neocretáceo, preenchido por sequência arenosa siliciclástica em clima semiárido, com sedimentos provenientes de alterações e erosão de rochas paleozóicas e pré-cambrianas de área fonte das bordas da bacia. O Grupo Bauru é representado nesta área por: i) arenitos da Formação Marília que foi gerada em sistemas de leques aluviais marginais; ii) a Formação Adamantina que está relacionada com sistemas fluviais de rios anastomosados e planícies com lagoas efêmeras nas porções centro e nordeste da bacia; iii) a Formação Uberaba, restrita ao extremo nordeste da bacia do Paraná, com contribuição de material vulcânico piroclástico.

O embasamento litológico compõe-se de rochas basálticas oriundas do intenso vulcanismo fissural de ocorrência no Mesozóico. Segundo Nishiyama (1989), o basalto aflora no vale dos principais rios e ribeirões em que suas camadas são expostas pela ação erosiva da água. Os

arenitos da Formação Adamantina são arenitos marrom-avermelhados apresentando cimentação carbonática e intercalados por arenitos argilosos e leques de argilitos. Os arenitos da Formação Uberaba são reconhecidos pela contribuição vulcanoclástica de coloração esverdeada e acinzentada. Segundo Batezelli (2003), Almeida e Barbosa (1953), Fernandes (2004) a designação Formação Marília foi empregada para os sedimentos clásticos grossos da parte superior do Grupo Bauru, caracterizados por presença de nódulos e de cimentação carbonática.

Os arenitos da Formação Marília são divididos em Membro Serra da Galga contendo arenitos imaturos, com fácies conglomeráticas de cimentação carbonática (CaCO_3). variada e conglomerados. O Membro Ponte Alta contendo lentes de calcário silicoso e conglomerado basal e os conglomerados carbonáticos. A área foi classificada por Baccaro (1991), como sendo de relevo medianamente dissecado em que os topos são nivelados entre 620 e 930 metros, englobando vertentes convexas e suaves, com declives compreendidos entre os 3° nos topos e 15°, no entalhamentodas cabeceiras de drenagem. Isso implica em dizer que exceto no sobressalto que há entre alguns pontos da chapada com o dissecado, a área como um todo é relativamente plana e pouco dissecada.

No topo da chapada os vales são do tipo vereda, representado por vales rasos (baixa dissecação) e na área do relevo dissecado o grau de entalhamento é bastante expressivo. O contato dessa área apresenta características de movimentação tectônica, podendo ser a causa do intenso voçorocamento nela instalado. A suavidade do contato da chapada é rompida por fortes e abruptas declividades. Ora ocorre o avanço da voçoroca, como apresenta na figura 3, ora esse avanço se encontra um rebordo erosivo sustentado por arenitos da Formação Marília, com forte cimentação carbonática. Figura 4. O afloramento do nível freático nas áreas de contato podem demonstrar como ocorre a captura da drenagem demonstrado pela ocorrência de extensas e profundas voçorocas, que variam de 300 - 400 de extensão, em que o desnível varia de 30 a 50 metros.

Os aspectos mais expressivos de voçorocamento pode ser relacionado a atividade da tectônica, pois foram encontrados preferencialmente, nas bordas Norte e Leste da área. Essa área tem uma forte presença de falhas no sentido N-S, E-W ao norte, N-S e NW-SE, a Leste. As voçorocas encontradas possuem esse alinhamento, o que evidencia a presença de levantamento da chapada e subsidência da área dissecada.

Figura 3 - Voçoroca do Tatu no Contato com a Chapada.

Fonte: Pereira e Pedrosa (2014).

Nota: localização de 19°06'21"S e 48°18'33"W.

Figura 4 - Contato da chapada com o relevo dissecado e a direção dos fluxos superficiais (vereda) e subsuperficiais (rebordo erosivo) .

Fonte: Pereira e pedrosa (2014).

Nota: localização: 19°10'38.86"S, 48°15'8.39"W

Considerações Finais

Nas cabeceiras dos principais cursos de água ocorrem a captura de drenagem por recuo das cabeceiras, com captura do fluxo sub-superficial. Neste compartimento são encontrados intensos voçorocamentos alinhados com as rupturas nas vertentes e também, com o rebaixamento do nível de base. Os fatores que estão na base da gênese deste processo são diversos: *i)* forte concentração da precipitação no período chuvoso (outubro-março) desta região; *ii)* ocupação humana pouco ordenada associada ao forte desmatamento que se verificou pós década de setenta do século passado; *iii)* a alta susceptibilidade dos solos; *iv)* a importância dos fluxos sub-superficiais; *v)* a tectônica ativa pode ter levado a rearranjos morfológicos e, consequentemente a alterações nos fluxos de drenagem sub-superficiais, com consequências na dinâmica dos voçorocamentos. Este último aspecto pode ter levado que a forte dinâmica sub-superficial associada às voçorocas tenha contribuído para a ocorrência de capturas recentes no sistema de rede de drenagem.

Agradecimentos

Agradecemos o apoio dado a esse trabalho pela FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais.

Bibliografia

- ALMEIDA, F. F. M.; BARBOSA, O. (1953) - **Geologia das quadriculas de Piracicaba e Rio Claro, Estado de São Paulo**. Rio de Janeiro, DNPM/DGM.
- BACCARO, C. A. D. As Unidades Geomorfológicas e a Erosão nos Chapadões do Município de Uberlândia. **Sociedade & Natureza**, n. 11 e 12, p. 19-34, 1994.
- BACCARO, C. A. D. (1990) - **Estudos dos Processos Geomorfológicos de Escoamento Pluvial em Área de Cerrado. Uberlândia - MG**. 1990. (Tese de Doutorado). Instituto de Geografia (IG), Departamento de Geografia (DEGEO), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), USP, São Paulo.
- BATEZELLI, A. (2003) - **Análise da sedimentação cretácea no Triângulo Mineiro e sua correlação com áreas adjacentes**. Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Rio Claro, Universidade Estadual Paulista - UNESP. Doutorado em Geociências.
- FACINCANI, E. M. (2000) - **Morfotectônica da Depressão Periférica Paulista e Cuesta Basáltica: regiões de São Carlos, Rio Claro e Piracicaba, SP**. 249 p. (Tese de Doutorado). Rio Claro, Instituto de Geociências, Universidade Estadual Paulista - UNESP.
- FERNANDES, L. A. (2004) - Mapa Litoestratigráfico da Parte Oriental da Bacia Bauru (PR, SP, MG), Escala 1:1.000.000 **Boletim Paranaense de Geociências**, v. 55, p. 53-66.
- GUERRA, A. J. T.; BOTELHO, R. G. M. (1998) - Erosão dos Solos. In: CUNHA, S. B. E. G., A. J. T. (Ed.). **Geomorfologia do Brasil**. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil. p.181 - 227.
- HASUI, Y. et al. (1995) - The Phanerozoic Tectonic Evolution of the Minas Gerais. **Anais da Academia Brasileira de Ciência**, v. 47, n. 314, p. 431-438.
- MILANI, E. J. et al. (2007) - Bacia do Paraná. **Boletim de Geociências Petrobras**, v. 15, n. 2, p. 265-287.
- PEREIRA, E. et al. (2012) - A Evolução das Sinéclises Paleozóicas: Província Solimões, Amazonas, Parnaíba e Paraná. In: HASUI, Y.; CARNEIRO, C. D. R., et al (Ed.). **Geologia do Brasil**. São Paulo, Becca. p.374-394.
- RICCOMINI, C. (1997) - Arcabouço Estrutural e Aspectos do Tectonismo Gerador e Deformador da Bacia Bauru no Estado de São Paulo. **Revista Brasileira de Geociências** v. 27, n. 2, p. 153-162.

AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DOS PROCESSOS EROSIVOS NA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DE ÁGUA DE GATO - CONCELHO DE SÃO DOMINGOS, CABO VERDE

Filipe Gomes Sanches

Universidade de Cabo Verde

filipegsanches@gmail.com

Ineida Romi Tavares Varela De Carvalho

Doutoranda em Geografia, Universidade de Cabo Verde

ineidac@yahoo.com.br

António Vieira

Departamento de Geografia e CEGOT, Universidade do Minho

vieira@geografia.uminho.pt

RESUMO

A investigação apresentada neste trabalho foi realizada na Sub-Bacia Hidrográfica de Água de Gato-Concelho de São Domingos, e teve como objetivo diagnosticar e avaliar o risco de desencadeamento de processos erosivos nessa Sub-Bacia hidrográfica. Foi desenvolvida uma análise em função das características geoambientais da área e posteriormente a identificação dos processos superficiais que ocorrem nessa Sub-Bacia. Os resultados do estudo apontaram para o facto de que a deflagração dos processos erosivos na área de estudo não ocorre unicamente por processos exclusivamente naturais, mas também pelas práticas tradicionais de uso e gestão do solo que é feita nessa área, que ocorre, em muitos casos, nas encostas de declives acentuados, com ausência de práticas de conservação de solo. A partir de observação direta no terreno identificaram-se vários aspetos de degradação de solos associada à prática agrícola.

Palavras-chave: Sub-bacia hidrográfica de Água de Gato, risco, erosão de solos.

Introdução

O risco de erosão dos solos depende quer das condições naturais existentes, quer das formas de uso da terra. O clima (especialmente as características da chuva), as características das encostas, a cobertura vegetal e a natureza do solo também são importantes (Araújo, Almeida & Guerra, 2005). Para o caso de Cabo Verde, segundo Costa e Nunes (2008), a estes fatores associam-se a fraca cobertura vegetal, o remeximento do solo para fins agrícolas e as condições de clima semiárido saheliano, com chuvas concentradas e intensas, que acentuam ainda mais aquela dinâmica. Como apontam alguns estudos já efetuados, a problemática da erosão em Cabo Verde é algo preocupante. Estima-se em 7,8 ton/ha a perda anual de solo, em regime de agricultura tradicional (milho e feijões). Para além disso, estudos mais recentes feitos por Tavares e Amiotte-Suchet (2012) apontam que na ilha Santiago (onde encontra a área de estudo) mais de 90% dos solos estão sob risco de erosão grave.

Metodologia

Este trabalho desenvolveu-se, numa primeira fase, através de pesquisa bibliográfica, com a análise de documentos relativos à problemática de erosão dos solos, bem como o levantamento de dados sobre a área de estudo. Numa segunda fase procedeu-se a um aturado trabalho campo, que privilegiou a observação direta do território, de modo a fazer o enquadramento da área de estudo e o levantamento de dados ambientais (nomeadamente a amostragem de solos), tendo-se também procedido à identificação de diversos tipos de feições erosivas e observação

de alguns fatores atuantes nos processos erosivos. Na terceira fase procedeu-se à realização de análises laboratoriais.

Caracterização da área de estudo

A Sub-bacia hidrográfica de Água de Gato (SBHAG), com uma superfície de drenagem de 3,54 km² e 9,07 km de perímetro, fica localizada na região noroeste do Concelho de São Domingos, um dos concelhos da Ilha de Santiago - Cabo Verde (Figura 1), mais concretamente na cabeceira da bacia hidrográfica de São Domingos.

Figura 1 - Localização geográfica da Sub-bacia hidrográfica de Água de Gato no contexto de Ilha de Santiago e Concelho de São Domingos. Fonte: DGHOT.

No que respeito à geomorfologia, a SBHAG apresenta uma diversidade de formas de relevo, desde os mais acentuados constituídos por picos, na parte sul e noroeste da mesma, e encostas onduladas um pouco por toda a sub-bacia, até as superfícies planas na zona central e foz da sub-bacia (Sanches, 2012). Á semelhança do país, na ilha de Santiago, onde fica localizada a área de estudo, a precipitação ocorre normalmente de modo intenso e concentrado num curto período de tempo (Agosto a Outubro), provocando grande escorrência. Em muitos casos traduz-se num factor fortemente atuante no desencadeamento da erosão dos solos.

Diagnóstico do risco de erosão de solos na sub-bacia hidrográfica de Água de Gato

Uso, Gestão do Solo na SBHAG e efeitos na erosão dos solos

Verifica-se na área em estudo que o risco de erosão dos solos está associado, em muito casos, aos usos inadequados dos solos que se faz em áreas de declive mais acentuado. De facto, a própria morfologia dessas encostas não permite certos tipos de utilizações, como por exemplo cultura em camalhões e “monda” (capina) (Fotografia 1A, B).

Fotografia 1 (A e B) - (A) Prática de monda numa encosta declivosa na zona de Réma-Réma (noroeste da sub-bacia). (B) Cultura em forma de camalhões nas encostas de Pinha (nordeste). Fonte: Autor, 2012.

Conforme referem Tavares *et al.*, (2012), as práticas de capina com enxada podem mobilizar o solo até 7 cm de profundidade (a mais rica em matéria orgânica), de cima para baixo das encostas, reduzindo a estabilidade do solo. O cultivo em forma de camalhões é bastante comum nas encostas da área de estudo, pelo que os solos que se encontram sob essa forma de cultivo sofrem alterações significativas (Fotografia 1B). Perante uma forte precipitação, gera-se com muita facilidade fluxo de lama e detritos. Ainda segundo Carvalho (2009), essa forma de cultivo traz impactes graves para o ambiente, porque depois da colheita do amendoim o solo permanece desprotegido. Quando chove, dá-se o impacto direto das gotas de água sobre o solo, levando à desagregação e movimentação de partículas do solo.

Os declives como factor potenciador do risco de erosão de solos na SBHAG

As com declives de 0 a 6%, representam uma pequena parte da sub-bacia, totalizando 0,18 km² (5,1%). Declives entre 6 a 12% abrangem 0,59 Km² (16,76%) da área total, e são indicadas para plantio de culturas anuais, sendo recomendadas práticas de conservação do solo (Costa *et al.*, 2009). Áreas com declives de 12 a 20%, classificadas como apresentando relevo forte ondulado, representam 38,35% (1,35 Km²) da área total. São áreas com predomínio de problemas relacionados com erosão, impróprias para ocupação com culturas anuais e indicadas para culturas perenes, para proporcionar uma proteção maior ao solo (Op. cit.). Na área de estudo essas áreas são, na sua maioria, utilizadas na agricultura de sequeiro, ou seja, cultivos anuais. A classe de declives entre 20 e 45%, classificada como relevo montanhoso, também abrange grande parte da sub-bacia, constituindo cerca de 36,93% (1,3 Km²) da área, e encontram-se sujeitas a erosão. As áreas com declives superiores a 45%, classificadas como relevo escarpado, abarcam apenas 0,1 Km² (2,84%) da área. No conjunto da área em estudo, podemos identificar uma percentagem bastante significativa de território com declives que favorecem o desencadeamento dos processos erosivos.

Propriedades dos solos amostrados

Os solos possuem propriedades físicas e químicas que interagem e podem proporcionar maior ou menor resistência aos processos erosivos (Guerra & Botelho, 1996). Nesse estudo foram analisadas propriedades como a textura e a matéria orgânica dos solos. No que diz respeito à

textura, dos 46 solos analisados, segundo a classificação feita pelo Laboratório de Análise de Solos Água e Planta do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário (INIDA), 22 apresentaram textura limoso, 21 franco limoso e 3 apresentaram textura franco-argila-limoso. Segundo Guerra (2007) os solos com maior erodibilidade são aqueles com maior teor de limo, à semelhança da área de estudo. São frações granulométricas que apresentam maior facilidade de serem erodidas, pois não possuem muita coesão, nem peso suficiente que dificulte a ação da água, tanto no processo de splash, como no escoamento superficial (Farmer, 1973; De Ploey, 1985, citado por Guerra *et al.*, 1996). Tendo em conta o conteúdo de matéria orgânica, De Ploey e Poesen (1985, citado por Guerra, 2007) apontam que solos com menos de 2% de matéria orgânica possuem baixa estabilidade de agregados, enquanto Greenland *et al.* (1975, citado por Guerra, 2007) afirmam que solos com menos 3,5% de matéria orgânica são instáveis, e que valores entre os percentuais apontados são preocupantes, no que diz respeito à capacidade dos solos de resistirem ao impacto das gotas de chuva. No caso de SBHAG, o teor de matéria orgânica dos solos na sua maioria é inferior a 2 e 3%, uma vez que apenas uma amostra de solo teve matéria orgânica igual a 3%. Registaram-se ainda casos preocupantes de solos com matéria orgânica igual a 0,4%, apresentando-se como solos suscetíveis à erosão.

Efeito das Chuvas e identificação de feições erosivas na SBHAG

É importante realçar que os processos erosivos desencadeados na área de estudo ocorrem com maior frequência no período húmido (Agosto à Outubro), por ação do escoamento superficial, especialmente onde se verifica uma intensa atividade agrícola, deixando os solos mais suscetíveis a esses processos.

Numa primeira fase da erosão, regista-se o aumento do escoamento superficial decorrente de escoamento em lençol ou laminar, promovendo o transporte de sedimentos, e posteriormente passagem para erosão linear, nomeadamente em sulco, ravina e “barranco” (Fotografia 2A, B, C e D), que são estágios mais avançados da erosão. No caso da ravina ilustrada na figura 3C, ela está associada a corte de estrada, e se formou apenas num evento chuvoso, resultando nessa feição erosiva.

Considerações finais

Os solos amostrados nesta pesquisa indicaram ser vulneráveis aos processos erosivos, por terem na sua maioria alto percentagem de limo e apresentarem também baixo teor de matéria orgânica. Por seu lado, os declives constituíram um elemento relevante na análise do risco de erosão de solos, isto porque em função deles, mais de 90% da área apresenta condições para a ocorrência de processos erosivos. Percebe-se que o risco erosão na área de estudo é muito influenciado pelas atividades humanas, desenvolvidas sobretudo nas encostas com declives acentuados onde o risco da erosão de solos é eminente. Assim, os resultados demonstram a necessidade de conhecer a dinâmica dessas encostas face aos processos erosivos, de modo a prevenir impactes ambientais decorrentes da ação antrópica.

Fotografia 2 (A, B, C e D) - (A) Erosão laminar seguido de erosão em sulcos, causada por concentração das linhas de fluxo das águas de escoamento superficial na zona de Pinha. (B) Erosão em sulco associada a cultura em camalhões na zona de Figueira Branca. (C) Erosão por ravinamento na zona Pinha. (D) Presença de “barrancos” na zona de Pinha.

Referências bibliográficas

- Araujo, G. H., Almeida, J. R., & Guerra, A. J. (2005). *Gestão Ambiental de Áreas Degradadas*. Rio de Janeiro, Brasil: Bertrand Brasil.
- Carvalho, I. R. (2009). *Monitoramento Ambiental da Estrada São Domingos-Assomada, Ilha de Santiago, Cabo Verde, Com Ênfase na Compartimentação Geomorfológica*. Universidade federal de Pernambuco, Recife.
- Costa, C. D., Temóteo, A. d., & Zimback, R. C. (2009). Caracterização de uma bacia hidrográfica quanto a suscetibilidade a erosão, utilizando técnicas de geoprocessamento. *Anais XIV de Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto*, pp. 3689-3695.
- Costa, F. L., & Nunes, M. C. (2008). Susceptibilidade à erosão hídrica na Bacia de Ribeira seca (Santiago, Cabo Verde).
- Guerra, A. J., & Botelho, R. G. (1996). Características e Propriedades dos Solos Relevantes Para os Estudos Pedológicos e Análise dos Processos Erosivos. *Anuário de Instituto de Geociências*, 19, pp. 93-114.
- Guerra, A. J. T. (2007). O Início do Processo erosivo. In A. J. Guerra, A. S. Silva, & R. G. Botelho, *Erosão e Conservação dos Solos: conceitos, temas e aplicações*, 3ª ed.. Rio de Janeiro, Brasil: Bertrand Brasil.
- Tavares, J. P., & Amiotte-Suchet, P. (2012). Erosão Hídrica e Degradação de Terras em Cabo Verde. In V. P. Oliveira, I. G. Gomes, I. Baptista, & L. S. Rabelo, *Cabo Verde: Análise Socioambiental e Perspectivas para o Desenvolvimento Sustentável em Áreas Semiáridas*. Fortaleza, Brasil
- Sanches, F. G. (2012). *Avaliação e Diagnósticos dos Processos Erosivos na Sub-Bacia Hidrográfica de Água Gato - Concelho de São Domingos*. Monografia, Universidade de Cabo Verde, Ciências e Tecnologia, Praia.

MAPEAMENTO GEOMORFOLÓGICO DA ÁREA URBANA DE ILHÉUS, BAHIA

Hogana Sibilla Soares Póvoas

Bolsista do PET Solos
Universidade Estadual de Santa Cruz
hogana_sibila@hotmail.com

Ednice de Oliveira Fontes

Universidade Estadual de Santa Cruz.
ednice@uesc.br

Ana Maria dos Santos Moreau

Universidade Estadual de Santa Cruz
amoreau@uesc.br

RESUMO

Os estudos geomorfológicos dão importante subsídio para a compreensão da dinâmica da paisagem e contribuem no entendimento da forma de apropriação do espaço pela sociedade. Pois, devido à grande densidade populacional, essas áreas são fortemente alteradas e necessitam de um planejamento adequado para que possam recuperar ou manter o equilíbrio de suas funções (naturais e sociais) visando a mitigação dos riscos geomorfológicos a elas associados. Devido à grande densidade populacional, nas áreas urbanas a modificação da natureza é intensa, tornando-se fundamental a análise das características físico-ambientais do território para fins de planejamento. Neste contexto, a presente pesquisa objetivou o mapeamento geomorfológico da cidade de Ilhéus, na escala de 1:10.000, visando caracterizar as principais formas de relevo, bem como sua origem, processos e riscos. Foram gerados com a utilização do ArcGis 10.0®, o Modelo Digital de Elevação do Terreno (MDT) contendo cotas de altitude e o MDT em 3D; o Mapa de Declividade, com as classes propostas por Lepschet *al.* (1991); o Mapa dos Modelados do Relevo e o mapa de riscos. A elaboração deste mapeamento auxiliará futuras pesquisas científicas, além de subsidiar o planejamento urbano-ambiental na identificação de áreas de risco a enchentes e escorregamentos, identificação e controle de processos erosivos, projetos de conservação e manejo de solo, entre outros.

Palavras-chave: Cartografia geomorfológica, Planejamento urbano-ambiental, Sul da Bahia.

Introdução

A análise geomorfológica é uma importante ferramenta para a compreensão racional da forma de apropriação do espaço pela sociedade, sendo o estudo do relevo uma abordagem essencial no planejamento do território, pois além de caracterizar a morfologia da paisagem, alerta sobre os problemas da influência antrópica.

Nas áreas urbanas, a modificação da natureza pela sociedade se torna intensamente perceptível. Pois, devido à grande densidade populacional, essas áreas são fortemente alteradas e necessitam de um planejamento adequado para que possam recuperar ou manter o equilíbrio de suas funções (naturais e sociais).

A cidade de Ilhéus possui algumas particularidades, de ordens distintas, mas que se relacionam e apontaram para a necessidade de uma pesquisa geomorfológica na área. Uma é de ordem física, gerada por processos e dinâmicas naturais; outra é como essas características naturais condicionaram sua expansão e; a terceira trata-se dos crescentes problemas socioambientais que a cidade enfrenta.

Ilhéus possui uma paisagem com características peculiares no que se refere à compartimentação do relevo. De forma geral, o município apresenta em seu recorte territorial o Domínio Morfoclimático dos Mares de Morros (AB'SÁBER, 1969), Planalto Pré-Litorâneo, Planalto

Costeiro, Tabuleiros Costeiros e Planície Costeira. Na área urbana, o relevo de Ilhéus apresenta como feições morros, colinas, outeiros e fundos de vale.

A cidade tem um antigo histórico de ocupação e retrata o tipo de urbanização sem planejamento adequado. Apesar da grande importância no contexto histórico da região, a quantidade de estudos detalhados na área, em escala de detalhe compatível, no tocante aos seus atributos físicos ainda é insuficiente. Isso contribui para a dificuldade em propor formas de ocupação apropriadas à cidade.

Como ferramenta para a análise do modelado terrestre destacam-se os mapas geomorfológicos que são importantes instrumentos na análise do relevo, de modo a auxiliar na verificação da forma com que a urbanização se relaciona com a morfologia da paisagem e, a depender da escala, eles mostram claramente como o espaço urbano está assentado sobre os diferentes compartimentos e feições geomorfológicas.

Tendo em vista a ausência de pesquisas com ênfase na geomorfologia da cidade de Ilhéus em escala de detalhe compatível (1:10.000) e reconhecendo a importância desses estudos para a análise ambiental e urbana, a presente pesquisa propõe o mapeamento geomorfológico da área urbana de Ilhéus, BA. Após ser concluída, a pesquisa poderá servir de base tanto para trabalhos acadêmicos como para fins de administração pública, facilitando uma proposta de planejamento urbano/ambiental para a cidade.

Metodologia

O referencial teórico básico para a pesquisa foram os trabalhos de BRASIL (1981), IBGE (1995), Ross (1996), Andrade (2003), Cassetti (2005), Araujo (2012), além de artigos e trabalhos científicos publicados em revistas e eventos.

Para a confecção dos mapas e modelos digitais foi utilizado o *software ArcGIS 10.0®*. O primeiro procedimento metodológico consistiu na delimitação da área urbana de Ilhéus, através do aplicativo *ArcMap*, do referido *software*. O mapa de localização foi gerado a partir de dados disponibilizados no ano de 2010 pela prefeitura municipal de Ilhéus e pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI Bahia).

Posteriormente foi elaborado o Modelo Digital de Elevação do Terreno (MDT) no *ArcMap*, com base nas curvas de nível igualmente disponibilizadas pela prefeitura de Ilhéus. E o MDT em 3 dimensões (3D) com o aplicativo *ArcScene*, para visualização das feições, no sentido de aprimorar a interpretação para a classificação das diferentes formas do modelado.

Em seguida, no *ArcMap* foi gerado o mapa de declividade, seguindo a metodologia proposta no Manual para Levantamento Utilitário do Meio Físico e Classificação de Terras no Sistema de Capacidade de Uso, de Lepsch *et al.* (1991), cujas classes estão expostas no Quadro I.

Quadro I - Classes de declividade segundo o Manual para Levantamento Utilitário do Meio Físico e Classificação de Terras no Sistema de Capacidade de Uso (LEPSCH *et al.*, 1991).

Classes de declividade	Limites
A	> 2%
B	2 - 5%
C	5 - 10%
D	10 - 15%
E	15 - 45%
F	45 - 70%
G	< 70%

O mapa dos Modelados do Relevo foi gerado através do *ArcMap*, tendo por base o MDT. Após a elaboração do Modelo foi utilizada a metodologia do Manual Técnico de Geomorfologia (IBGE, 1995) para a classificação e caracterização dos Domínios, Regiões, Unidades Geomorfológicas e Modelados. Esta classificação possibilita um bom entendimento do mapa das formas tanto para especialistas na área - pesquisadores, planejadores - como para a comunidade, em geral.

A escala de análise utilizada é de 1:10.000 a fim de obter-se um mapa com escala de detalhe compatível à área de estudo, para fins de pesquisa e planejamento. A confecção dos mapas irá auxiliar em uma análise sistemática da paisagem e dar subsídios para o planejamento e gestão da cidade de Ilhéus, no que diz respeito às áreas afins dos processos contemplados nesse mapeamento.

Resultados e Discussão

A partir do levantamento bibliográfico e das curvas de nível disponibilizadas pela prefeitura municipal de Ilhéus, foi possível utilizar o método mais viável para servir de base ao Mapeamento Geomorfológico da cidade, o Modelo Digital de Elevação do Terreno (MDT).

Reproduzir graficamente a sensação do relevo terrestre, representado espacialmente é um processo prático e acessível, devido aos recursos computacionais atualmente disponíveis, além disso, o desenho panorâmico busca representar as formas tais quais se apresentam (ASPIAZÚ; ALVES; VALENTE, 1990).

As curvas de nível da área urbana de Ilhéus, com 1:1 m de equidistância possibilitaram a elaboração de um MDT com riqueza de detalhes, facilitando a visualização das formas do relevo, além dos valores de altitude (Figura 01). As cotas altimétricas variam de 1m nas áreas mais baixas, até 106m nos pontos mais altos.

Nas áreas com altitude de até 42m, concentradas na parte central e a Leste da cidade, localizam-se os Depósitos do Quaternário. De acordo com Brasil (1981), o material encontrado neste local corresponde a sedimentos não consolidados ou pouco consolidados, tendo profundidade de alguns metros até mais de uma centena de metros, sendo essa a faixa mais representativa em relação à área/superfície. Há predomínio de topografia plana, com baixa energia. São encontradas formas meândricas, geradas pela dinâmica fluvial, apresentando planícies de inundação e manguezais nas margens dos rios e próximos ao oceano.

Figura 1 - Mapa de relevo da área urbana de Ilhéus -Ba 2013

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

Entre as altitudes de 42 a 106 m, situadas na parte central, a Norte e a Oeste, está localizado o Planalto Costeiro. As rochas encontradas nessas áreas são de origem muito antiga, com alto grau de metamorfismo - datam dos ciclos orogenéticos Guriense e Transamazônico (BRASIL, 1981). O relevo apresenta-se plano e suavemente ondulado cortado por vales de baixa energia. Na Figura 2, é apresentado o MDT em 3 dimensões (3D), com enfoque no Centro e Zona Norte de Ilhéus. O modelo em 3D permite a análise visual através da identificação de modo claro das formas côncavo-convexas e angulosas dos morros e as côncavas dos vales, além do relevo plano da faixa costeira.

Estas áreas da cidade concentram maior densidade de Colinas e Morros em relação às outras Zonas (Sul e Oeste). A altitude mais elevada de toda a cidade é encontrada na Zona Norte, área correspondente à Bacia Hidrográfica do Almada. No Centro, o relevo se apresenta bastante movimentado, com a maior amplitude altimétrica dentre as outras zonas da cidade. O modelo em 3D, proporciona a compreensão dos fenômenos espaciais por representar de forma semelhante à realidade a sensação das formas do relevo.

Figura 2 - MDT em 3 Dimensões. Centro e Zona Norte de Ilhéus

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013.

Conclusões

Destaca-se a importância da elaboração do presente mapeamento geomorfológico para a cidade de Ilhéus, por ser um documento inédito na escala de 1:10.000. Outro aspecto refere-se à utilização do mapa, para realização de projetos na área de planejamento urbano/ambiental. Devido a sua escala de detalhe, é possível identificar formas de relevo que não eram representadas em escalas menores, bem como seus aspectos (altitude e declividade). Desta forma, o presente trabalho pode fornecer a comunidade acadêmica, bem como a administração pública da cidade um importante embasamento para a compreensão da geomorfologia local.

Referências

- AB`SÁBER, A.N. Um Conceito de Geomorfologia a Serviço das Pesquisas sobre oQuaternário. São Paulo, *Geomorfologia*, n. 18, p.1-23, 1969.
- ANDRADE, M. P. *Ilhéus: passado e presente*. 2. ed. Ilhéus, Bahia. Editus: 2003.
- ARAUJO, I. C. B. *Zoneamento Ambiental do município de Ilhéus - BA: uma análise sistêmica*. 2012. n. 167, 99 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2012.
- ASPIAZÚ, C; ALVES, L.M; VALENTE, O.F. *Modelos digitais de terrenos:conceituação e importância*.Boletim de Pesquisa Florestal, Colombo, n. 21, p.27-36, dez. 1990.
- BRASIL. Ministério das Minas e Energia. Secretaria Geral. *Projeto RADAMBRASIL Folha SD. 24 Salvador: geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra*. Rio de Janeiro: MME/SG/ Projeto RADAM BRASIL, 1981. (Levantamento de Recursos Naturais, 24).
- CASSETI, V. *Geomorfologia*.2005. Disponível em <<http://www.funape.org.br/geomorfologia/>>. Acesso em: 03 out. 2012.
- IBGE. Manual técnico de Geomorfologia. *Manuais Técnicos em Geociências*. Rio de Janeiro: IBGE, 1995. nº. 5.
- LEPSCH, I. F. *et al.**Manual para levantamento utilitário do meio físico e classificação de terras no sistema de capacidade de uso*.4 ed. Campinas, São Paulo. Sociedade Brasileira de Ciência do Solo: 1991.
- ROSS, J. L. S. *Geomorfologia: ambiente e planejamento*. 3. ed. São Paulo: Contexto, 1996.

CAPÍTULO 3.2

RISCOS CLIMÁTICOS E HIDROLÓGICOS

IMPACTOS DE EVENTOS PLUVIAIS EXTREMOS NO ESTADO DO PARANÁ - BRASIL

Lindberg Nascimento Júnior

Grupo de Pesquisa GAIA, UNESP, Presidente Prudente, Brasil
juniohr@gmail.com

João Lima Sant'Anna Neto

Departamento de Geografia, Grupo de Pesquisa GAIA, UNESP, Presidente Prudente, Brasil
joaolima@fct.unesp.br

RESUMO

A vulnerabilidade da população às chuvas nas regiões de transição climática (entre as zonas tropical e temperada) soma-se o contexto de climas bastante irregulares com baixa previsibilidade, e a estrutura desigual dos sistemas socioespaciais. Desta forma, períodos de chuvas extremas se destacam como elemento deflagrador de impactos e desastres com diferentes intensidades e muitas consequências. Nessa perspectiva, este trabalho apresenta e analisa a espacialização dos desastres ocasionados pelas chuvas, e notificados pela defesa civil no Estado do Paraná - Brasil em dois períodos sazonais distintos e na série histórica de 1980 a 2011. O intuito é regionalizar a ocorrência destes eventos, tratados como risco climático, e entendê-los como um atributo na análise geográfica do clima, e da vulnerabilidade socioespacial. Os resultados mostram que os eventos relacionados às chuvas intensas se destacam para os municípios com áreas urbanas populosas, gerando problemas de enchentes e inundações, com perdas materiais (principalmente residências danificadas e/ou destruídas), e na região sul do estado, onde há predomínio de climas subtropicais e regiões socialmente mais vulneráveis.

Palavras-chave: Precipitação; Vulnerabilidade; Estado do Paraná.

Introdução

Enriquecida pela conflitualidade de sistemas atmosféricos de climas de diferentes gêneses, a dinâmica pluviométrica do Estado do Paraná (Figura 1) se configura como de regime subtropical de monções de verão e de transição climática (GRIMM, 2009; SANT'ANNA NETO, 1990; 1994; 2005).

Essa característica faz com que o clima se apresente de forma extremamente dinâmica, com variabilidade que proporciona baixo e médios níveis de previsibilidade e modelização, e faz com que o Estado seja constantemente impactado por eventos relacionados à redução expressiva das precipitações e/ou pela intensificação das mesmas.

Figura 1 - Localização do estado do Paraná e regionalização de seus tipos climáticos.

Neste contexto, os períodos de eventos pluviiais extremos, quando somados às estruturas dos sistemas socioespaciais paranaenses, destacam-se como elementos deflagradores de impactos e desastres com diferentes intensidades e muitas consequências.

Nessa perspectiva, o trabalho apresenta e analisa a espacialização dos impactos de eventos extremos ocasionados pelas chuvas intensas, e notificados pela defesa civil no Estado do Paraná - Brasil, a partir de um processo de regionalização da ocorrência destes eventos em períodos sazonais distintos e na série de histórica de 1980 a 2011.

Material e procedimentos

Os impactos dos eventos extremos pluviiais estão representados aqui pelas informações de desastres segundo os dados de 1980 a 2010 do Sistema de Defesa Civil do Estado do Paraná, Brasil - SISDC (2012) de alagamentos, de enchentes ou inundações graduais e de enxurradas ou inundações bruscas.

Esses eventos acontecem geralmente no período da estação chuvosa (outubro a março), principalmente no mês de janeiro, seguido pelos meses de fevereiro e outubro, além de abril. No entanto, neste trabalho, além do agrupamento das informações segundo a temporalidade da estação mais úmida, denominada Estação Chuvosa, que mostra que no período de outubro a março há maior pluviosidade considera-se, também, os dados de informação para o período de abril a setembro, apresentado como uma estação menos chuvosa, neste caso, denominada Estação Seca.

Os dados foram organizados em planilhas eletrônicas (Excel®) com o número total de ocorrências. Estes valores foram submetidos ao processo de relativização através de um índice numérico,

baseados na razão dos totais de ocorrência e abrangeram a escala de classes de 0 a 1, processada a partir do seguinte modelo:

$$D = X. 100 / X_t$$

Onde, X é a variável observada, X_t é o total numérico da variável observada em cada município; D é o valor a ser mapeado. Com esse índice foi possível elaborar as análises espaciais comparativas na escala regional e municipal, segundo a ocorrência de desastres.

As informações foram classificadas em: números de notificação e índices sob o total do de pessoas atingidas, conforme a ocorrência por município. Os resultados foram inseridos no Sistema de Informações Geográficas - SIG ArcGIS® e, cartografadas de acordo com os limites territoriais dos municípios de observação.

Resultados e discussão

O numero de notificações e repercussão de desastres relacionados aos eventos extremos pluviais no Paraná indica que as enchentes ou inundações graduais, como as principais notificações obtidas pela Defesa Civil do Estado, e as enxurradas são as mais violentas no que tange a destruição e danificação de moradias (Tabela I).

Tabela I - Caracterização das ocorrências e repercussões dos desastres no Paraná - 1980 a 2011

Tipo de evento	Notificações	Casas Destruidas	Casas Danificadas	Pessoas Afetadas
Enchentes ou inundações graduais	646	597	15199	146167
Enxurradas ou inundações bruscas	420	1180	25434	884315
Alagamentos	168	64	15516	114695

Fonte: SISDC (2012). Org. Nascimento Júnior, L.

A regionalização dos três tipos de eventos mostra que esses impactam o Estado do Paraná como um todo no que tange ao número de notificações, e de forma mais difusa, para o número de pessoas atingidas. Observa-se que estas ocorrências são maiores nas Mesorregiões Sudoeste, Centro-sul e, nas regiões metropolitanas. Esta situação aponta que os impactos das chuvas, segundo a vulnerabilidade e o contexto regional, estão mais associados às áreas de urbanização mais intensa.

Figura 2 - Desastres notificados e pessoas atingidas para eventos pluviiais extremos- 1980 a 2011

A distribuição espacial dos desastres no Paraná na estação seca de abril a setembro, de 1980 a 2011, apresentado pelo número de notificações e pessoas atingidas (Figura 3) mostra que os impactos desses eventos são seletivos, e por esse caráter são mais severos na porção sul do estado, especialmente as meso- regiões Oeste e Sudoeste.

Figura 3 - Desastres notificados e pessoas atingidas nos meses equivalentes à Estação Seca - 1980 a 2011

Essa seletividade remete ao nível de vulnerabilidade ligado à variabilidade das chuvas e do clima nessas regiões, que apresentam climas notadamente subtropicais, cujas chuvas frontais são as mais habituais neste período do ano.

Diferentemente, a porção norte - onde predominam os climas tropicais, com estações secas melhor definidas e marcadas, não apresenta grandes números de notificação e pessoas atingidas.

Os desastres na Estação Chuvosa (outubro a março) estão distribuídos por todo o estado e, concentram-se em número de notificações nas mesorregiões: Metropolitana de Curitiba e Noroeste Paranaense (Figura 4). Esse padrão espacial mostra um aspecto interessante da distribuição, em que os municípios mais populosos são os que abrangem os maiores índices de pessoas atingidas.

Figura 4 - Desastres notificados e pessoas atingidas no meses equivalentes à Estação Chuvosa - 1980 a 2011

Geograficamente, os impactos destes eventos são uma fusão de sistemas atmosféricos locais e regionais e a produção do espaço.

Dentre os atmosféricos, os que mais se destacam são os sistemas frontais, e o escoamento na baixa e média troposfera. Os ENOS também são destacados, principalmente em quando em fases extremas, como salientam CEPED (2011) e Grimm *et al.* (2007).

Considerações Finais

Os desastres mapeados sazonalmente (estações chuvosa e seca) e, na série histórica (1984 a 2011), evidenciam a relação entre o tipo climático, os sistemas atmosféricos locais e regionais e, a vulnerabilidade das áreas atingidas.

A urbanização em regiões litorâneas e em áreas densamente construídas, com altos índices demográficos e, o sistemas pouco adequados para minimização destes impactos dão a qualidade da ocorrência dos eventos na apresentação de vulnerabilidades, conforme o CEPED (2011).

Desta forma, essas repercussões refletem a realidade de um debate promovido no âmbito da produção da cidade e também na produção de um modo de vida urbano.

Tais questões perpassam a relação entre a sociedade e a natureza e, une-se através da apropriação do território, num processo orientado, preferencialmente, pelas ordens de mercado e consumo e, consequentemente, de ocupação de áreas suscetíveis a desastres nas áreas urbanas e nas cidades.

Bibliografia

- Berezuk, A. G. (2007) - *Análise das adversidades climáticas no Oeste Paulista e Norte do Paraná*. Tese (Doutorado em Geografia). Universidade Estadual Paulista. Presidente Prudente.
- Bryant, E. A. (1993) - *Natural hazards*. New York, Cambridge. 294 p.
- Catelan, M. J. (2006) - *Expansão territorial urbana e enchentes em Bauru : os limites da "Cidade Sem Limites"*. Presidente Prudente. Trabalho de conclusão de Curso (Geografia). Faculdade de Ciências e Tecnologia. Universidade Estadual Paulista.
- CEPED. Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (2011) - *Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 1991 a 2010: Volume Paraná..* Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis.
- Climate Change. Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (2009) - *Climate change and extreme events in Brazil*. Disponível em: <http://www.lloyds.com/-/media/f032df0f232f44be81c5b0827c4d91fd.ashx>. Acesso: 20 abr. 2011.
- Instituto das Águas do Paraná (2011) - *Dados pluviométricos*. Disponível em: <http://www.aguasparana.pr.gov.br/>
- Mendonça, M. (2010) - A vulnerabilidade da urbanização do Centro-Sul do Brasil frente à variabilidade climática. *Mercator*. V. 9, Número especial (1), dez/2010, p.135 a 151.
- Meteo France (2012) - Pluies extrêmes en France Metropolitaine. *Glossarie*. Disponível em : http://pluiesextremes.meteo.fr/glossaire_r18.html. Acesso: 20 nov. 2012
- Monteiro, C. A. (1991) - *Clima e excepcionalismo: conjecturas sobre o desempenho da atmosfera como fenômeno geográfico*. Florianópolis: Editora da UFSC, 1991.
- Santos, M. (1998) - *A Natureza do Espaço: Técnica e tempo, razão e emoção*. 3ed. São Paulo: EDUSP, 1998.
- Sant'Anna Neto, J. L.; (2001) - Por uma geografia do clima: Antecedente históricos; paradigmas contemporâneos e uma nova razão para um novo conhecimento. *Terra Livre*. São Paulo, n. 17, 2º semestre/2001b, p. 49-62
- Sant'Anna Neto, J. L. (2008) - Da climatologia geográfica a geografia do Clima: Gênese, paradigmas e aplicação do clima como fenômeno geográfico. In: *Anpege*, v. 4, 2008, p. 61 - 88.
- Sarewitz, D; Pielke, Jr, R.; (2012) - Extreme Events: A Research and Policy Framework for Disasters in Context. *International Geology Review*. Disponível em: <http://www.cspo.org/products/articles/xepaperfinal.pdf>. Acesso 20 maio 2012.

RISCOS ASSOCIADOS ÀS CHUVAS INTENSAS EM INDAIATUBA, SÃO PAULO, BRASIL

Marina Sória Castellano

Doutoranda, Departamento de Geografia, Universidade Estadual de Campinas, Brasil
nina_soria@yahoo.com.br

Luci Hidalgo Nunes

Departamento de Geografia, Universidade Estadual de Campinas, Brasil
luci@ige.unicamp.br

RESUMO

O objetivo do trabalho é verificar os dias em que ocorreram chuvas extremas no município de Indaiatuba (Brasil) e observar os impactos mais frequentes de 1970 a 2010. Foram levantados dados diários de 11 postos pluviométricos, os dias com chuvas intensas identificados pela técnica dos quantis e o levantamento de impactos foi feito em jornais. A análise mostra que os casos de alagamento de imóveis, vias e desabamento foram os que tiveram registros em todos os períodos e que houve tendência de aumento na quantidade de registros (de 66 para 1233) ao longo do tempo, fato relacionado à vulnerabilidade da população residente.

Palavras-chave: evento extremo, impactos, Indaiatuba, Brasil

Introdução e objetivo

Os eventos extremos atmosféricos têm sido alvo de preocupação da sociedade pelo potencial que apresentam em deflagrar danos significativos às cidades e às populações urbanas (Penney e Wieditz, 2007). Dentro dessa linha, este estudo associou as chuvas extremas e seus impactos em Indaiatuba, um município brasileiro de médio porte, observando os tipos de impactos mais frequentes e suas evoluções em 41 anos.

Metodologia

Foram levantados dados diários de chuva de 11 postos pluviométricos localizados em 9 cidades. Os dias em que ocorreram chuvas intensas foram identificados pela técnica dos quantis, também utilizada para esse propósito por Xavier *et al* (2007), Nunes (2008) e Castellano (2010). De posse dos dias em que ocorreram tais eventos, fez-se o levantamento dos impactos em 10 diferentes jornais locais, entre 1970 e 2010, de forma a observar se houve relação direta entre registro de chuvas extremas e os impactos no município.

Área de estudo

Situada a cerca de 108 km da capital do estado de São Paulo, a população de Indaiatuba é de 201.619 habitantes (IBGE, 2010) e seu IDH é 0,788 (PNUD, 2010), índice superior ao do estado e do Brasil (0,783 e 0,699 respectivamente, para o mesmo período). É uma das 20 cidades que faz parte da Região Metropolitana de Campinas (RMC) (Figura 1), que conta com 2 milhões de habitantes, sendo um centro de grande importância no cenário brasileiro, por sua expressiva concentração industrial de setores de alta tecnologia, centros de pesquisa e universidades de projeção internacional.

Figura 1: Localização do município de Indaiatuba na RMC, no estado de São Paulo no Brasil. Fonte: IBGE (2010). Adaptado por Marina S. Castellano

Lombardo (1985) assinala que nas áreas urbanas os problemas de ordem ambiental se cristalizam de maneira mais intensa, atingindo maior amplitude. Isso ocorreria porque modificações no uso da terra, na vegetação, na fauna, na hidrografia e no clima são intrínsecas à questão urbana (Braga, 2003), além da presença de uma população mais vulnerável e exposta a riscos de diversas naturezas. Tal fato confere importância ao estudo, visto que praticamente 99% da população de Indaiatuba é urbana, o que faz com que, em tese, todos os seus habitantes estejam propensos a serem afetados por problemas associados às chuvas intensas. O fato de Indaiatuba ter uma população média mas estar sob constante pressão, ao compor uma área economicamente muito dinâmica, confere originalidade ao estudo, de maneira a observar como centros menores podem apresentar padrões de desestruturação semelhante a cidades maiores.

Resultados

As ocorrências que causaram problemas no município ao longo do período avaliado (1970 a 2010) estão na Tabela I:

Tabela I: Impactos e quantidade de casos em Indaiatuba de 1970 a 2010

Impactos	Quantidade de casos
Alagamento de vias	363
Desabrigados	257
Alagamento de imóveis	215
Falta de energia	163
Queda de árvores	138
Danos em imóveis e automóveis	113
Problemas no Trânsito	58
Destelhamento	56
Desabamento	51
Queda de postes	44
Danos em vias	32
Problemas no abastecimento de água	23
Risco de desabamento	23
Queda de painéis e placas	13
Risco de alagamento	13
Feridos	12
Assoreamento de lagos	10
Serviços suspensos	10
Danos em galerias	7
Queda de galho	6
Problemas no sistema telefônico	5
Deslizamento	5
Acidente	4
Problemas na rede de esgoto	4
Impacto em animais	3
Mortos	3
Prejuízos na agricultura	3
Queda de antenas de tv	3
Queda de fios	3
Incêndio	2
Queda de torre de televisão	2
Problemas no sistema ferroviário	1
Risco de deslizamento	1
Vazamento de gás	1
Total	1647

Organizado por Marina S. Castellano

Nos 41 anos analisados houve 34 tipos de eventos que causaram transtornos no município, sendo que apenas três deles (alagamento de imóveis, vias e desabrigados) responderam por mais de 50% do total de registros.

A análise decenal permitiu perceber que apenas 3 tipos de impactos apresentaram registros em todas as décadas: alagamentos de imóveis, de vias e desabamentos de imóveis. Nota-se um aumento substancial de casos com o passar dos anos, com destaque para a última década (2000 a 2010), quando os registros para os 3 tipos chegaram a ser o dobro das outras 3 décadas juntas, como mostra a Figura 2 (a-c):

Figura 2: a) Número de casos de alagamento de imóveis; b) Número de casos de alagamento de vias; c) Número de casos de desabamento de imóveis para Indaiatuba de 1970 a 2010. Elaborada por Marina S. Castellano

A mesma tendência se vê no período total (1970 a 2010), conforme a Figura 3:

Figura 3: Número de casos registrados por décadas em Indaiatuba (1970 a 2010). Elaborada por Marina S. Castellano

Nota-se incremento considerável de ocorrências ao longo do tempo, evidenciando crescimento na quantidade de pessoas atingidas pelas chuvas. Tal fato pode ter ocorrido por duas razões: a primeira diz respeito às fontes de dados, uma vez que os jornais apresentaram, em anos mais recentes, conteúdos mais catastróficos, incluindo reportagens com imagens e linguagem sensacionalistas. A segunda relaciona-se às características da população, que aumentou cerca de 37% nos últimos 10 anos (IBGE, 2010), mostrando que, juntamente a este aumento, pode ter havido um crescimento da vulnerabilidade populacional na década de 2000.

A Figura 4 mostra a quantidade de dias em que ocorreram chuvas intensas e de casos registrados por ano para Indaiatuba:

Figura 4: Número de dias com eventos extremos e quantidade de ocorrências por ano em Indaiatuba. Elaborada por Marina S. Castellano

Como se vê, não houve tendência de aumento nos dias em que choveu intensamente no período, porém há incremento bastante significativo de impactos registrados, mostrando que os problemas cristalizados no espaço urbano de Indaiatuba independem da quantidade de dias com registros excepcionais, evidenciando o forte cunho deflagrador e não causador de problemas que a chuva apresenta no município, além da desestruturação urbana em anos mais recentes.

Considerações Finais

Os dados apresentados permitiram perceber que os problemas relacionados às chuvas em Indaiatuba devem ser amplamente discutidos e analisados pelo poder público municipal, devido a dois fatores: os impactos têm sido frequentes, com registros desde a década de 1970; há aumento substancial de registros em décadas mais recentes, tendência também encontrada em outros municípios da RMC, como Campinas (Castellano, 2010), Americana e Jaguariúna (Castellano e Nunes, inédito). Esse quadro sublinha maior vulnerabilidade e exposição da população ao risco aos eventos desencadeados por precipitações no futuro e que transformações no meio físico estão se processando em velocidades maiores do que as medidas tomadas pelo poder público, contribuindo para desarticulações socioespaciais que podem ser exacerbadas no município. Além disso, os dados demonstram que mesmo cidades de porte médio e com alto desenvolvimento econômico, como é o caso de Indaiatuba, podem apresentar grande desestruturação urbana, mostrando que estes fatores não necessariamente estão relacionados a um ambiente menos perigoso no que diz respeito às chuvas.

Agradecimento

As autoras agradecem a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) pelo financiamento dado à pesquisa (Processos 2008/58161-1 e 2012/00883-7).

Referências

- Braga, R. (2003) - Planejamento Urbano e Recursos Hídricos. In: Braga, R; Carvalho, P. F. de (orgs). *Recursos Hídricos e Planejamento Urbano e Regional*. Rio Claro, Laboratório de Planejamento Municipal - Deplan/IGCE - UNESP, 131p.
- Castellano, M.S. (2010) - *Inundações em Campinas (SP) entre 1958 e 2007: tendências sócioespaciais e as ações do poder público*. Campinas: Instituto de Geociências, Dissertação (Mestrado) - Departamento de Geografia, Universidade Estadual de Campinas
- Castellano, M. S.; Nunes, L. H.; Extremos de chuva e seus impactos: os casos de Americana e Jaguariúna (SP). A ser apresentado no *XI Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica* em outubro de 2014.
- Lombardo, M.A. (1985) - *Ilha de Calor nas Metrópoles - O Exemplo de São Paulo*. São Paulo, Hucitec, 244p.
- Nunes, L.H.; Critérios para a definição de eventos extremos - estudo de caso para o litoral central paulista. In: *VIII Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica*, 2008, Alto Caparaó, MG, p. 295-311 (CD ROM)
- Penney, J.; Wieditz, I. (2007) - *Cities Preparing for climate change. A Study of six urban region*. The Clean Air Partnership, 74p.
- Xavier, T. de M.B.S.; Xavier, A. F. S.; Alves, J.M.B. (2007) - *Quantis e eventos extremos. Aplicações em Ciências da Terra e Ambientais*. Fortaleza, RDS, 277p.

INVESTIGATION OF THE TRENDS IN RAINFALL DATA IN SLOVAKIA, PORTUGAL AND LIBYA

Martina Zeleňáková

Department of Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering of the Technical University of Košice
martina.zelenakova@tuke.sk

Pavol Purcz

Department of Mathematics, Faculty of Civil Engineering of the Technical University of Košice
pavol.purcz@tuke.sk

Maria Manuela Portela

Department of Civil Engineering, Architecture and Geo Resources, Technical University of Lisbon
maria.manuela.portela@ist.utl.pt

Helena Hlavatá

Slovak Hydrometeorological Institute
helena.hlavata@shmu.sk

Ibrahim Gargar

Department of Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering of the Technical University of Košice

ABSTRACT

One of the goals of the hydrological risk assessment is to reduce the impacts of droughts and floods. The objective of study is to investigate rainfall trends in climatic stations in Slovakia, Portugal and Libya. Annual and seasonal precipitation trends were detected by the Mann-Kendall non-parametric statistical test. The annual rainfall series at the Portuguese and Libyan climatic stations show mostly downwards trends (decreasing rainfall) while the series at the Slovak climatic stations show upwards trends (increasing rainfall). The results are in accordance with the IPCC forecasts. They also indicate that the variability of extreme rainfall and the climate uncertainty are greater in recent times.

Keywords: precipitation; trend; Mann-Kendall; climatic change.

Introduction

Observations show that changes are occurring in the amount, intensity, frequency and type of precipitation. These aspects of precipitation generally exhibit large natural variability, and El Niño and changes in atmospheric circulation patterns such as the North Atlantic Oscillation have a substantial influence. Pronounced long-term trends from 1900 to 2005 have been observed in precipitation amount in some places: significantly wetter in eastern North and South America, northern Europe and northern and central Asia, but drier in the Sahel, southern Africa, the Mediterranean and southern Asia. More precipitation now falls as rain rather than snow in northern regions. Widespread increases in heavy precipitation events have been observed, even in places where total amounts have decreased. These changes are associated with increased water vapour in the atmosphere arising from the warming of the world's oceans, especially at lower latitudes. There are also increases in some regions in the occurrences of both droughts and floods (IPCC, 2007).

In recent years, a number of studies have been published focusing on the evolution of precipitation, drought conditions and moisture availability in the Mediterranean during the 20th century (e.g., Paulig and Paeth, 2006; Lopez-Moreno *et al.*, 2009; Sousa *et al.*, 2011). El Kenawy *et al.* (2009) investigated spatial variability of temperature trends over Libya in the second half of the 20th century. One of the most extensive analyses of the spatial and temporal patterns of precipitation in Portugal was developed by Portela *et al.* (2013), Santos *et al.*

(2010), Santos and Portela (2008). Trends in precipitation in Libya were studied in Zeleňáková *et al.* (2013), Zeleňáková *et al.* (2014).

The detection of trends in meteorological data, in particular rainfall is essential for the assessment of the impacts of climate variability and change on the water resources of a region. This paper deals with the research of monthly precipitation trends in climatic stations in Libya and Slovakia in different time series - annual, half year, seasons. The Mann-Kendall test is example of non-parametric tests and was applied to detect trends and to assess the significance of the trends in the time series in presented paper.

Material and methods

Monthly rainfall data recorded at four stations in eastern Slovakia provided by Slovak Hydrometeorological Institute with length from 1980 to 2010 were collected for this study. In Portugal monthly rainfall data from 1910 to 2004 at four stations were used for statistical trend analysis. In Libya four stations and 40 years of data observation operated by Libya's Meteorological Service from 1970 to 2010 were set up to study precipitation trends. The evaluation was done for the time period from November to October in Slovakia and Libya and from October to September in Portugal. We have selected four stations in each country exactly with the altitude around 400 m asl. to exclude the effect of altitude to precipitation trends. In Libya: Ghadames, Sabha, Al Kufrah are situated in the desert (in the south) and Shahat is situated near the seaside.

The Mann-Kendall (MK) test (Kendall, 1975; Mann 1945) is a rank-based nonparametric test for assessing the significance of a trend, and has been widely used in hydroclimatological trend detection in many studies (Burn and Elnur, 2002). The significance level is chosen as $\alpha = 0.05$ and $Z_{\alpha/2}$ is the value of normal distribution function, in this case $Z_{\alpha/2} = 1.95996$. Hypothesis H_0 - no trend is if ($Z < Z_{\alpha/2}$) and H_1 - there is a trend if $Z > Z_{\alpha/2}$. The magnitude of the trend was determined using Sen's estimator (Sen, 1968). A positive value indicates an upward (increasing) trend and a negative value indicates a downward (decreasing) trend in the time series.

Results

The results of trend analysis for the precipitation data are discussed in the following. Results of precipitation analysis are presented for annual, half year, seasons in Table I for climatic stations in Slovakia, in Table II for stations in Portugal and in Table III for climatic stations in Libya. Two signs (++ or --) indicate statistical significance at 95% confidence level as per the Mann-Kendall test (+ for increasing and - for decreasing).

Table I Sen's estimator for annual, half year and seasons trends in precipitation in Slovakia

Station	Altitude	Annual	Half year		Seasons			
		XI-X	XI-IV	V-X	XI-I	II-IV	V-VII	VIII-X
Spišská Nová Ves	456	++	+	+	+	+	++	+
Spišské Vlachy	380	+	+	++	+	+	++	+
Mníšek nad Hnilcom	410	++	++	++	+	+	++	+
Jakubovany	410	+	+	+	-	+	+	+

Table II Sen's estimator for annual, half year and seasons trends in precipitation in Portugal

Station	Altitude	Annual	Half year		Seasons			
		X-IX	X-III	IV-IX	X-XII	I-III	IV-VI	VII-IX
Chaves	350	-	-	0	+	--	-	+
Sao Miguel da Acha	376	--	--	0	-	--	-	0
Mosteiro de Cabril	389	-	--	+	-	--	-	0
Torre de Dona Chama	359	0	-	+	+	--	-	+

Table III Sen's estimator for annual, half year and seasons trends in precipitation in Libya

Station		Annual	Half year		Seasons			
		XI-X	XI-IV	V-X	XI-I	II-IV	V-VII	VIII-X
Ghadames	330	--	--	-0	-0	--	-0	-0
Sabha	420	+0	+0	+0	-0	-0	+0	+0
Shahat	531	++	++	++	++	++	+0	++
Al Kufrah	436	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0

Trend analysis of rainfall series in Slovakia shows the mainly positive values. Significant positive trends are mainly in station Mníšek nad Hnilcom which is situated in southern part of study area. The trend slope is increase of annual precipitation e.g. in Mníšek nad Hnilcom it is 0.057 mm/year (Zeleňáková *et al.*, 2014). Significant positive trend is in stations - Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Mníšek nad Hnilcom mainly in summer, in winter the trend is slightly decreasing. The trend is opposite in Portugal climatic stations. All evaluated stations present mainly decreasing trend in rainfall amount, significant in spring. Slightly positive trend is detected in station Torre de Dona Chama.

Rainfall data series did not show any clear trend for the Libya's stations. Rainfall trends show large variability. It depends upon many factors, as was said, namely latitude, altitude, and distance from the sea. Declining trend in rainfall presents desert stations: Ghadames and Al Kufrah. The Shahat station presents increasing trend.

Conclusion

The objective of this study was to investigate precipitation trends in chosen climatic stations in Slovakia, Portugal and Libya. We investigated 4 climatic stations in different time series.

Almost all the gauging stations in Slovakia show positive trend of annual precipitation. Annual, half year and seasons trends in precipitation in Portugal show decreasing trend. It proved pronounced long-term trends from Intergovernmental Panel for Climatic Changes from 1900 to 2005 that have been observed in precipitation amount in some places: wetter in northern Europe (Slovakia), but drier in the Mediterranean. The exception is Shahat station in Libya in which the precipitation trends are positive. The influence of other factor such as exposition of the station etc. is probable. The high risk of drought is presented in western and southern part of Libya.

Acknowledgments

This work has been supported by the Slovak Research and Development Agency SK-PT-0001-12.

Bibliography

- Burn, D. H., Hag Elnur, M. A. (2002) - Detection of hydrologic trends and variability. *Journal of Hydrology*, 255, p. 107-122.
- El Kenawy, A. M., López-Moreno, J. I., Vicente-Serrano, S. M., Mekld, M. S. (2009) -Temperature trends in Libya over the second half of the 20th century. *Theoretical and Applied Climatology*. 98 (1-2).
- Climate Change: Working Group I. (2007) - The Physical Science Basis. How is Precipitation Changing? http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/faq-3-2.html
- Kendall, M.G. (1975) - *Rank Correlation Measures*. Charles Griffin, London.
- Mann, H.B. (1945) - Non-parametric tests against trend. *Econometrica* 13, p. 245-259.
- Lopez-Moreno, J., Vicente-Serrano, S., Gimeno, L., Nieto, R. (2009) - Stability of the seasonal distribution of precipitation in the Mediterranean region: Observations since 1950 and projections for the 21st century, *Geophys. Res. Lett.*, 36, 10703.
- Pauling, A., Paeth, H. (2006) - On the variability of return periods of European winter precipitation extremes over the last five centuries. *Clim. Past Discuss.*, 2, p. 157-189.
- Portela, M. M., Santos, J. F., Quintela, A.C., Vaz C. (2009) - Trends in hydrologic time series In: *River Basin Management 5*: Southampton: Wessex Institute of Technology. p. 185-195.
- Santos, J. F., Pulido-Calvo I., Portela M. M. (2010) - Spatial and temporal variability of droughts in Portugal, *Water Resour. Res.*, 46.
- Santos J. F., Portela M. M. (2008) - Quantificação de tendências em séries de precipitação mensal e anual em Portugal Continental, paper presented at *Seminário Ibero-Americano sobre Sistemas de Abastecimento Urbano SEREA*, Lisbon, Portugal, 2008
- Sen, P. K. (1968) - Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. *Journal of the American Statistical Association* 63, p. 1379-1389.
- Sousa, P. M., Trigo, R. M., Aizpurua, P., Nieto, R., Gimeno, L., Garcia-Herrera, R. (2011) - Trends and extremes of drought indices throughout the 20th century in the Mediterranean. *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, 11, p. 33-51.
- Zeľeňáková, M., Purcz, P., Gargar, I., Hlavatá, H. (2013) - Comparison of precipitation trends in Libya and Slovakia In: *River Basin Management 6*, Southampton: Wessex Institute of Technology. p. 365-374.
- Zeľeňáková, M., Purcz, P., Gargar, I., Hlavatá, H. (2014) - Research of monthly precipitation trends in Libya and Slovakia, In: *Recent Advances in Environmental Science and Geoscience*, Sofia: EUROPEMENT, 2014, p. 46-50.

AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE EVENTOS DE CHUVAS EXTREMAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB

Francisco de Assis Salviano de Sousa

Unidade Acadêmica de Ciências Atmosféricas, Universidade Federal de Campina Grande,
fassis@dca.ufcg.edu.br

Valmir Rocha

Unidade Acadêmica de Ciências Atmosféricas, Universidade Federal de Campina Grande,
valmirrocha2005@yahoo.com.br

Carmem Terezinha Becker

Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba,
carmem@aesa.pb.gov.br

RESUMO

Os desastres naturais mais comuns no Brasil são as secas, os deslizamentos, os desabamentos e as inundações. Os três últimos são consequências em parte dos eventos extremos de chuvas. Os deslizamentos quando ocorrem em áreas urbanas no período das chuvas causam danos materiais e mortes. Não por acaso, são consequências também da ineficiência do sistema de drenagem e da remoção indiscriminada da cobertura vegetal. Essas ações combinadas com as chuvas aumentam a saturação de água no solo, reduz sua resistência e provoca sua ruptura. Os desmoronamentos são devidos ao mau uso do solo, má distribuição de renda, falta de moradia digna e má qualidade da educação pública. As inundações são geralmente acumulações de lâminas de água que podem invadir o interior das edificações e causar transtornos para a mobilidade urbana de pedestres e veículos. Esses eventos dependem de medidas estruturais, mas não prescindem da boa educação dos habitantes urbanos e de medidas não estruturais. O objetivo deste trabalho foi utilizar as precipitações máximas diárias entre o período de 1912 a 2013 e metodologia estatística para avaliar os riscos de eventos de chuvas extremas na cidade de João Pessoa - PB. Como resultados se verificaram tendências positivas no número de dias com chuvas e nas magnitudes das precipitações máximas diárias. O ajuste dos eventos extremos de chuvas à função distribuição de probabilidade de Gumbel possibilitou as estimativas dos riscos para uma específica magnitude de chuva.

Palavras-chave: Eventos extremos, precipitação máxima, deslizamentos, desabamentos e inundações

ABSTRACT

The most common natural disasters in Brazil are droughts, landslip, landslide and floods. The last three are partly consequences of extreme rainfall events. When landslides occur in urban areas during the rainy season cause material damage and deaths. Not coincidentally, are also consequences of the inefficiency of the drainage system and of the indiscriminate removal of the vegetation cover. These actions combined with the rainfalls can to increase the water saturation in the soil, reduce their resistance and to cause rupture. Landslides are due to misuse of land, poor income distribution, lack of decent housing and poor quality of public education. Floods are usually accumulations of water slides that can invade the interior of the buildings and cause inconvenience to urban mobility of pedestrians and vehicles. These events depend on structural and non-structural measures but can not dispense the proper education of urban residents. The aim of this study was to use the maximum daily precipitation in the period 1912 - 2013 and statistical methodology to assess the risk of extreme rainfall events in João Pessoa city, Paraíba state, Brazil. The results shows there have been positive trends in the number of days with rainfall and in the magnitudes of the maximum daily precipitation. With adjustment of generalized extreme values of Gumbel was possible risk estimate for a specific magnitude of rainfall.

Key-words: Extreme events of maximum rainfall, landslip, landslides and floods

Introdução

Os fatores desencadeadores de desastres nas áreas urbanas são: impermeabilização do solo e adensamento das edificações. Adicionalmente, a falta de planejamento urbano e de modo geral o mau gerenciamento das bacias hidrográficas vem intensificando esses desastres.

Há dois tipos de medidas preventivas básicas: as estruturais e as não-estruturais. As medidas estruturais envolvem obras de engenharia complexas e de alto custo. As medidas não-estruturais envolvem modelagem, previsão e ações de planejamento e gerenciamento, como sistemas de alerta e zoneamento ambiental.

A precipitação máxima diária é caracterizada como um evento que apresenta intensidade, duração e distribuição espaço-temporal críticas em dado local. O estudo da frequência de ocorrência de eventos extremos é fundamental para a compreensão de seus efeitos na superfície da bacia hidrográfica rural e/ou urbana. Além disso, os projetos de obras hidráulicas no âmbito da bacia dependem diretamente desse estudo.

O estudo dos desastres naturais causados por eventos extremos de precipitação é um tema bastante atual no mundo, principalmente nos países em desenvolvimento. Diferentes eventos extremos de precipitação foram explicados com base em 90, 95 e percentis 99 (Sen Roy & Balling, 2004 e Wan Zin et al., 2010). Khan et al. (2007) investigaram a variabilidade temporal das precipitações extremas diárias na América do Sul e encontraram fortes inclinações na linha de tendências de longo prazo.

A variação das chuvas extremas na Índia têm sido estudadas por muitos pesquisadores (Rajeevan et al., 2008, Ghosh et al., 2011 e Patra et al., 2012). Recentemente, Jena et al. (2014) concluíram que as recentes e crescentes incidências de inundação na bacia do rio Mahanadi, leste da Índia se deve ao aumento de chuvas extremas no curso médio do rio. Por sua vez, Ahammed et al. (2014) realizaram um estudo das chuvas máximas diárias de Dhaka, capital de Bangladesh, no período de 1953 a 2009. Com base na função de distribuição Gumbel estimaram períodos de retorno de eventos extremos de chuva e descobriram que a precipitação máxima diária e anual igual ou superior a 425 mm tem um período de retorno de 100 anos.

O objetivo deste trabalho foi ajustar os dados de precipitação máxima diária e anual, no período de 1912 a 2013, à função distribuição do Valor Extremo Generalizado acumulado (GEV) para avaliar os riscos de eventos de chuvas extremas na cidade de João Pessoa - PB.

Material e Métodos

Área de estudo

A cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba, está localizada na região Nordeste do Brasil, na porção mais oriental das Américas, com longitude de 34° 53' W, latitude de 7° 07' S e altitude de 37 m. A área urbana é predominantemente plana. O clima é tropical úmido (tipo *Am* na classificação climática de Köppen-Geiger), com alta umidade do ar e temperatura do ar média anual de 26 °C. As chuvas ocorrem no período de março a agosto. Fora desse período o clima é de muito sol.

O processo de expansão de João Pessoa, similar ao de outras cidades brasileiras, ocorre desordenadamente. As ocupações em espaços impróprios (fundos de vales e encostas) à construção de moradia aceleram a degradação ambiental e aumenta o grau de vulnerabilidade aos riscos ambientais como deslizamentos e inundações que estão diretamente associados à eventos de chuvas extremas.

Em 2007 a Fundação de Ação Comunitária (FAC), órgão ligado ao Governo do Estado da Paraíba, totalizou no município de João Pessoa 108 favelas com 24.363 domicílios. A Figura 1 - destaque em marrom - exibe as aglomerações subnormais (favelas expostas a riscos) do município de João Pessoa.

Figura 1 - Município de João Pessoa - PB. Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN. (áreas de riscos=marrom)

Os dados de precipitação máxima diária e anual da cidade de João Pessoa (Estação Meteorológica, código: 3940225) utilizados neste estudo foram obtidos junto ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET. Por motivo de falhas nos dados observados os períodos utilizados neste estudo foram: 1913 a 1970, com falhas entre 1932 e 1936) e 1994 a 2013. Foram considerados apenas os valores de precipitação máxima superiores a 30 mm/dia.

Função distribuição de probabilidade de Gumbel

Segundo Carvalho et al. (2013) a função distribuição do Valor Extremo Generalizado acumulado (GEV) é dada por:

$$F(x) = \exp \left\{ - \left(1 + \xi \cdot \frac{x - \mu}{\sigma} \right)^{-1/\xi} \right\} \quad (1)$$

para $1 + \xi (x - \mu)/\sigma > 0$, em que ξ , μ e σ são os parâmetros de forma, localização e escala, respectivamente. A Eq. (1) é denominada distribuição de Gumbel quando $\xi \rightarrow 0$; a função

distribuição do GEV pode ser expressa pela a Eq. (2). A probabilidade de excedência e o período de retorno da precipitação máxima diária e anual podem ser estimadas usando as Eqs. (3) e (4), respectivamente.

$$F(x) = \exp \left[-\exp \left\{ -\left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right) \right\} \right] \quad (2)$$

$$P(x) = 1 - F(x) \quad (3)$$

$$T_r = \frac{1}{P(x)} \quad (4)$$

Em que X é a precipitação máxima diária e anual; μ e σ é a média e o desvio-padrão da precipitação máxima diária e anual, respectivamente; F(x) é a distribuição acumulada de probabilidade; P(x) é a distribuição de probabilidade e T_r o período de retorno.

Risco

O risco (R) de um evento ser igualado ou superado pelo menos uma vez em N anos é:

$$R = 1 - [1 - P(x)]^N \quad (5)$$

Em que P(x) é probabilidade de excedência. Estimando-se a média e desvio-padrão amostrais dos valores da precipitação máxima diária e anual e utilizando a Eq(2) pode-se estimar o período de retorno (T_r) desses eventos extremos de precipitação por:

$$T_r = \left[1 - \exp \left[-\exp \left\{ -\left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right) \right\} \right] \right]^{-1} \quad (6)$$

Resultados e Discussão

Com base nos dados de precipitação máxima diária e anual da cidade de João Pessoa (Estação Meteorológica, código: 3940225) para os períodos de 1913 a 1970 e 1994 a 2013, um total de 73 anos, foram selecionados 391 valores de chuvas máximas superiores a 30 mm/dia. O valor médio de eventos máximos foi 5,36/ano. A tendência da série temporal do número de dias com chuva foi positiva, mas, por falhas nas observações, foi feita apenas no período de 1913 a 1970. De acordo com climatologia pluvial da cidade nos períodos de 1913 a 1970 e 1994 a 2013, o período mais chuvoso inicia em março e finda em julho. São nesses meses, principalmente, nos meses de pico de chuvas (abril, maio e junho) que se observaram chuvas máximas superiores a 30 mm/dia. As chuvas máximas entre 30 e 90 mm/dia apresentam as maiores frequências.

A Figura 2 exibe a probabilidade (%) dos riscos de eventos máximos de chuvas para os próximos cinco anos, de 2014 à 2018, para a cidade de João Pessoa - PB. Nessa Figura nota-se que o risco de chuva máxima acima de 150 mm/dia é de 25% em 2014, mas eleva-se para 77% em 2018. À medida que o tempo passa o risco aumenta.

Figura 2 - Probabilidade (%) dos riscos de chuvas máximas diárias para a cidade de João Pessoa - PB.

De acordo com os resultados obtidos as chuvas máximas iguais ou inferiores a 36 mm/dia ocorrem com 100 % de probabilidade em qualquer um dos cinco anos, nos meses de pico de chuvas (abril, maio e junho). O risco de uma chuva máxima de 88,0 mm/dia ocorrer varia de 45,3% no primeiro ano a 95,1% no quinto ano. Já a chuva máxima de 70,3 mm/dia tem risco associado de 61,4% no primeiro ano a 99,1% no quinto ano. Esses fatos explicam, em parte, as agruras da população carente que ocupa as áreas de médio e alto riscos de inundação e de deslizamento de terra.

Conclusão

A probabilidade do risco de chuvas extremas, na cidade de João Pessoa - PB, iguais ou inferiores a 36 mm/dia é de 100 % em qualquer um dos cinco anos, nos meses de pico de chuvas (abril, maio e junho).

Os maiores problemas de riscos ambientais na cidade resultam da ocupação das várzeas pela população carente. Neste caso, as ações e inações antrópicas são responsáveis diretas pelas consequências dos desastres naturais.

A ocorrência de chuvas com magnitudes entre 70,3 e 88 mm/dia, causa sérios transtornos à população da cidade de João Pessoa, principalmente à população excluída dos serviços básicos de infraestrutura.

Bibliografias

- Ahamed, F, Hewa, G. A., Argue, J. R., 2014. Variability of annual daily maximum rainfall of Dhaka, Bangladesh. Atmospheric Research. 137, 176 - 182.
- Carvalho, J.R.P., Assad, E.D., Evangelista, S.R.M., Pinto, H.D.S. 2013. Estimations of dry spells in three Brazilian regions – Analysis of extremes. Atmospheric Research. 132 - 133, 12 - 21.

- Ghosh, S., Das, D., Kao, S. C., Ganguly, A. R. 2011. Lack of uniform trends but increasing spatial variability in observed Indian rainfall extremes. *Nature Climate Change*, 02, 86 - 91.
- Jena, P. P., Chatterjee, C., Pradhan, G., Mishra, A. 2014. Are recent frequent high floods in Mahanadi basin in eastern India due to increase in extreme rainfalls? *Journal of Hydrology*. 517, 847-862.
- Khan, S., Kuhn, G., Ganguly, A.R., Erickson III, D. J., Ostrouchov, G. 2007. Spatio-temporal variability of daily and weekly precipitation extremes in South America. *Water Resources Research*. 43, p.W11424.
- Patra, J. P., Mishra, A., Singh, R., Raghuwanshi, N. S. 2012. Detecting rainfall trends in twentieth century (1871-2006) over Orissa State, India. *Climatic Change*, 111, 801 -817.
- Rajeevan, M., Bhate, J., Jaswal, A. K. 2008. Analysis of variability and trends of extreme rainfall events over India using 104 years of gridded daily rainfall data. *Geophysical Research Letters*. 35, p. L18707.
- Sen Roy, S., Balling, R.C. 2004. Trends in extreme daily precipitation indices in India. *International Journal of Climatology*. 24, 457-466.
- Wan Zin, W. Z., Jamaludin, S., Deni, S.M., Jemain, A. A. 2010. Recent changes in extreme rainfall events in Peninsular Malaysia: 1971-2005. *Theoretical and Applied Climatology*. 99, 303-314.

EXTREME CLIMATIC PERIODS IN EASTERN SLOVAKIA LOWLANDS

Vlasta Ondrejka Harbuláková

Department of Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering of the Technical University of Košice
vlasta.harbulakova@tuke.sk

Martina Zelenáková

Department of Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering of the Technical University of Košice
martina.zelenakova@tuke.sk

Pavol Purcz

Department of Mathematics, Faculty of Civil Engineering of the Technical University of Košice
pavol.purcz@tuke.sk

Maria Manuela Portela

Department of Civil Engineering, Architecture and Geo Resources, Technical University of Lisbon
maria.manuela.portela@ist.utl.pt

Helena Hlavatá

Slovak Hydrometeorological Institute
helena.hlavata@shmu.sk

Michaela Stračarová

Department of Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering of the Technical University of Košice
michaela.stracarova@tuke.sk

ABSTRACT

The climate-induced natural disasters and occurrence of extraordinary weather events caused serious problems in many countries of the world. Changes in precipitation lead to changes in runoff and water availability. Intergovernmental panel on climate change states that runoff is projected with high confidence to increase by 10 to 40% by mid-century at higher latitudes and decrease by 10 to 30% over some dry regions at mid-latitudes due to decrease in rainfall and higher rates of evapotranspiration. The objective of this paper is to analyze variability of long-term precipitation data series over the last 30 years for climatic stations in Slovakia lowlands situated in the east of the country. Statistics of precipitation extremes, extraordinary summer rainfall event, and occurrence of wet and dry periods in different zones of special altitudinal profile in approximately 110 meters above the sea level are presented in this work.

Keywords: dry period, wet period, hydrological extremes.

Introduction

Interactions between land and atmosphere are of fundamental importance for hydrological cycle. Climate and weather drive precipitation development in the atmosphere, while the landscape features determine distribution of water on the land surface. There are evidences of the impact of human activities and climate on changing hydrological cycle, including the observed large-scale patterns of precipitation changes over the 20th century (e.g. IPCC, 2012). Variability of weather causes different substitution of dry and wet periods, e.g. groups of days, months, seasons or years (Paulson *et al.*, 1985). Knowing the probability of occurrence of each period has extraordinary economic importance, especially in relation to other climatic factors, e.g. the temperatures. Data on the incidence and duration of dry and wet periods are expressed usually by statistical methods and the results are subjected to analysis. Scientists are trying to discover in substitution of dry and wet periods the regularity or periodicity (Parajka *et al.*, 2009). Most often they are looking for relationship with 11-year period of sunspots (Pekárová *et*

al., 2008). Other times the shorter periods - 3, 7, 8 years are used. Find regularity of these changes and use it successfully is still the task of research.

The paper is devoted to analysis of extreme climatic periods in south eastern part of Slovakia particularly to analysis of wet and dry period's occurrence in two climatic stations Humenné and Michalovce.

Material and methods

Climatic data series - daily amount of precipitation were provided by the Slovak Hydrometeorological Institute (SHMI). We evaluated the data during 31 years from 1980 to 2011, separately for five periods: 1980; 1981-1990; 1991-2000; 2001-2010; 2011. The aim of the study was to analyse precipitation data with result to determine the duration of dry and wet periods in the evaluated climatic stations.

Drought is considered for purposes of this study as the number of consecutive days without precipitation. Wet is the number of consecutive days with precipitation greater than 0.1 mm. Duration of dry and wet periods is divided into the following categories:

- KD - short-term wet / dry period of a length in the range 1 to 5 days,
- SD - medium-term wet / dry period with duration of between 6-10 days,
- DD - long-term wet / dry period with duration of 11 days or more.

For each climatic station we have subsequently processed analysis of dry and wet periods, which contain the sum of the individual categories KD, SD or DD and graphs of the absolute value of dry and wet periods.

Results

In climatic station Humenné (in 148 m asl.) we observed the longest dry period in 2005 which lasted 37 days. The decade from 2001 to 2010 was the driest - totally 34 long-term dry periods occurred in that time. The longest wet period lasted 17 days and occurred in 1991. The wettest was the decade from 1991 to 2000 and four long-term periods occurred in that decade in Humenné.

Figure 1 presents course of absolute dry periods and Figure 2 presents course of absolute wet short-term, medium-term, long-term periods for duration from 1980-2011 separately for five temporal (decadal) periods in climatic station Humenné.

Figure 1 Ten-year courses of absolute frequency of dry periods in Humenné

Total sum of short-term drought was 1613 periods, medium-term drought was 272 periods, and long-term dry periods occurred 83 times. Figure 1 also shows the absolute number of dry periods observed at this station from 1980 to 2011 was 1968.

Figure 2 Ten-year courses of absolute frequency of wet periods in Humenné

The total sum of the short wet period was 1925, the number of medium-term wet periods was 145 and long-term wet periods occurred 9 times. The Figure 2 also shows that the absolute number 2079 of wet terms was observed at this station.

Figure 3 presents course of absolute dry periods and Figure 4 presents course of absolute wet periods for duration from 1980-2011 separately for five temporal (decadal) periods in climatic station Michalovce.

Figure 3 Ten-year courses of absolute frequency of dry periods in Michalovce

Total sum of short-term drought was 1598 days, medium-term drought was 302 days and the long-term drought occurred in 84 days. The Figure 3 shows that the absolute number of dry days measured at Michalovce climatic station over the evaluated period was 1984.

Figure 4 Ten-year courses of absolute frequency of wet periods in Michalovce

The total sum of the short-term wet period was 1971, medium-term wet periods occurred 124 times and long-term wet period occurred 8 times. The Figure 4 also shows that the absolute number of wet periods observed at this station during evaluated years was 2104.

In climatic station Michalovce (111 m asl.) the longest drought lasted for 36 consecutive days and this value was observed in 2011. Totally 28 long-term dry periods occurred in decade from 2001 to 2010, 24 long-term dry periods occurred in 1981-1990 as well as in 1991-2000. The longest wet period lasted 16 days and occurred in 1991. The wettest was the decade from 2001 to 2010 and four long-term wet periods occurred in that decade in Michalovce station.

Conclusion

The aim of our study is to emphasize the need for understanding and measuring precipitation, which most affect the level change in watercourses and following this the hydrological conditions in river basins. As we know from knowledge of the amount of precipitation that falls on a certain area for a certain period of time, we can determine for example the most likely area of occurrence of floods, and also the drought vulnerable areas that is concern mainly of agriculture. Reasonable rainwater management is inevitable for economy of the country.

The aim of presented analysis was to determine the course of dry and wet periods in evaluated climatic stations. It can be clearly seen that the medium and long term period with precipitation is very rare in Humenné station when we compare the results from evaluation of dry periods. The usual frequency of continuous wet period is one to three consecutive days with precipitation, which represents only a short-term wet. The frequency of long-term dry periods occurs more often than that of wet periods.

The driest years were 2005 and 2011 and the wettest was 1991 in the evaluated period and study area.

Acknowledgments

This work has been supported by the Slovak Research and Development Agency SK-PT-0001-12.

Bibliography

- IPCC Working Group II: *Impacts, Adaptation and Vulnerability. Extreme high temperature and precipitation events*. (2012) - Available at: <http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=625>
- Parajka, J., Kohnová, S., Merz, R., Szolgay, J., Hlavčová, K., Blöschl, G. (2009) - *Comparative analysis of the seasonality of hydrological characteristics in Slovakia and Austria*. Bratislava: SAV
- Paulson, E., Sadeghipour, J., Dracup, J. A. (1985) - Regional frequency analysis of multiyear droughts using watershed and climatic information. *Journal of Hydrology* 77, p. 57-76.
- Pekárová, P., Halmová, D., Miklánek, P., Pekár, J. (2008) - *Analýza zmien N-ročných minimálnych prietokov rieky Dunaj v profile Bratislava za obdobie rokov 1876/77-2005/06*. Bratislava: SAV.
- Stračarová, M. (2014) - *Hydrological extremes - dry and wet periods*. Thesis. Košice: FCE.

QUANDO NÃO SE APRENDE COM A CATÁSTROFE: A NEGLIGÊNCIA COM AS ESTRATÉGIAS DE RESILIÊNCIA URBANA NUMA CIDADE AFETADA POR DESASTRE NATURAL

Emerson de Oliveira Muniz

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), Brasil
muni.2002@uol.com.br

Franciele de Oliveira Pimentel

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Brasil
tiele_pimentel@yahoo.com.br

RESUMO

A presente comunicação faz uma interpretação geográfica do desastre deflagrado por inundação na cidade de Areal no contexto da maior catástrofe socioambiental da história brasileira, que se processou na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro no dia 12 de janeiro de 2011. O trabalho expõe como as dinâmicas físicas e sociais interagiram e geraram/amplificaram o desastre natural na localidade. A partir do mapeamento da área atingida pela inundação e do desastre natural ocorrido, de seus fatores geradores aos seus impactos, o trabalho discute a recuperação da cidade sem a devida consideração de medidas de resiliência urbana que possam aumentar o nível de preparo da comunidade local caso ocorra no futuro uma repetição daquela conjuntura estabelecida em janeiro de 2011. Numa contemporaneidade na qual as estatísticas apontam o incremento dos desastres naturais em todo o mundo, sobretudo em nações emergentes como o Brasil, o trabalho busca contribuir no debate acadêmico sobre as ações de prevenção, preparo e resposta em comunidades ameaçadas por inundação.

Palavras-chave: Inundação. Desastre natural. Resiliência urbana.

Introdução

O trabalho faz uma interpretação geográfica das dinâmicas físicas e sócio-institucionais que, ao interagirem, condicionaram o desastre deflagrado por inundação brusca na cidade de Areal, localizada na Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, no contexto da catástrofe socioambiental que impactou diversas localidades da referida região no dia 12 de janeiro de 2011.

O trabalho apresenta dois objetivos bem definidos, respectivamente vinculados a cada uma das duas etapas de consecução estabelecidas. A primeira etapa, já concluída, objetivou analisar as causas, o desenvolvimento espaço-temporal da inundação brusca e as consequências do desastre na cidade de Areal. Como os processos hidroclimatológicos são cíclicos, gerando inundações de menor ou maior porte, e como a quase totalidade da população arealense reside nas estreitas planícies inundáveis dos rios que correm pela cidade, ao procedermos à análise e ao mapeamento das características do evento ocorrido buscamos subsidiar possíveis - e necessárias - ações de Redução dos Riscos de Desastres (RRD) no município. Na segunda etapa, atualmente em desenvolvimento, decorridos mais de três anos do desastre em Areal, analisa-se no decurso desse período a recuperação da cidade e se esta é feita adotando ações que reforcem a resiliência urbana local, entendida aqui como a competência da cidade em aprender com o desastre sofrido e tornar-se menos vulnerável através da adoção de medidas de mitigação de riscos e de pronta resposta em caso de recorrência do evento impactante nas suas possibilidades de variação temporal e de intensidade.

Metodologia

O trabalho é um estudo de caso que tem como recorte espacial de análise a área urbana do município de Areal, no estado do Rio de Janeiro, Brasil, compreendendo o intervalo de tempo entre 12 de janeiro de 2011, dia em que a cidade foi impactada por um evento de inundação brusca de grande porte, até o fim de 2014. Foi adotada no trabalho a metodologia proposta por Libaut (1971), na qual quatro rotinas de procedimentos sequenciados estruturam a investigação. Na rotina 1 (Compilatória), que se refere ao levantamento de dados e seleção das informações significativas para a pesquisa, além da organização de registros jornalísticos sobre o evento danoso na cidade, fez-se a revisão da literatura, emoldurada nos vieses geográfico e sociológico, sobre um conjunto de noções importantes no balizamento do objeto em estudo, como os conceitos de risco (Beck, 1999; Aneas de Castro, 2000; Veyret e Richemond, 2007; e Almeida, 2010), *hazard* (White, 1974; e Burton et al., 1978), vulnerabilidade (Wilches-Chaux, 1989; e Cutter, 2003), desastre natural (Romero e Maskrey, 1993), tipologia das inundações (Goerl e Kobiyama, 2005; e Sausen et al., 2012) e resiliência urbana (ONU, 2012; e Gonçalves, 2012) com a finalidade de subsidiar a fundamentação teórica do trabalho; ainda nessa fase foram feitos os trabalhos de campo para registro fotográfico do cenário de destruição e das marcas do nível da inundação gravadas na fachada de imóveis e em árvores, além do georreferenciamento de um total de 100 pontos ao longo do perímetro inundado (Sausen et al., 2012) e das entrevistas com moradores afetados, gestores municipais e operadores da barragem Morro Grande (localizada a montante da cidade) com o intuito de uma melhor compreensão da dinâmica da inundação ocorrida.

Na rotina 2 (Correlativa) foram feitos o cruzamento das informações anteriormente levantadas e a elaboração do mapeamento do perímetro máximo de inundação na cidade no dia 12 de janeiro de 2011. Na rotina 3 (Semântica) fez-se a interpretação da causalidade da inundação ocorrida e a explicação de como a mesma evoluiu e impactou cada um dos dez setores urbanos definidos na cidade de Areal. Enfim, na rotina 4 (Normativa, ainda em curso), compreendidas as causas e consequências do desastre ocorrido na localidade, averigua-se como se dá a adoção dos princípios da resiliência urbana na recuperação da cidade e se esta se tornou mais capacitada em reagir e administrar crises causadas por inundação. Guiados pelos 10 passos essenciais para construir cidades resilientes propostos pela Estratégia Internacional para Redução de Desastres das Nações Unidas (UNISDR, na sigla em inglês) e sintetizados no Quadro I, o trabalho busca analisar as medidas que foram implementadas na cidade e discutir a eficiência das mesmas na diminuição da vulnerabilidade urbana local.

Quadro I: Dez passos essenciais para construir cidades resilientes (ONU, 2012).

1	Coloque em prática ações de organização e coordenação para compreender e aplicar ferramentas de redução de riscos de desastres, com base na participação de grupos de cidadãos e da sociedade civil, assegurando que todos compreendam o seu papel na redução de risco de desastres e preparação .
2	Atribua um orçamento para a redução de riscos de desastres e forneça incentivos para proprietários em áreas de risco, famílias de baixa renda, comunidades, empresas e setor público para investir na redução dos riscos que enfrentam.
3	Mantenha os dados sobre os riscos e vulnerabilidades atualizados. Prepare as avaliações de risco e utilize-as como base para planos de desenvolvimento urbano e tomadas de decisão. Certifique-se de que esta informação e os planos para a resiliência da sua cidade estejam prontamente disponíveis ao público e totalmente discutido com eles.
4	Invista e mantenha uma infraestrutura para redução de risco , com enfoque estrutural, como por exemplo, obras de drenagens para evitar inundações; e, conforme necessário, invista em ações de adaptação às mudanças climáticas.
5	Avalie a segurança de todas as escolas e centros de saúde e atualize tais avaliações conforme necessário.
6	Aplique e imponha regulamentos realistas, compatíveis com o risco de construção e princípios de planejamento do uso do solo . Identifique áreas seguras para cidadãos de baixa renda e desenvolva a urbanização dos assentamentos informais, sempre que possível.
7	Certifique-se de que programas de educação e treinamento sobre a redução de riscos de desastres estejam em vigor nas escolas e comunidades.
8	Proteja os ecossistemas e barreiras naturais para mitigar inundações, tempestades e outros perigos a que sua cidade seja vulnerável. Adapte-se a mudança climática por meio da construção de boas práticas de redução de risco.
9	Instale sistemas de alerta e alarme , e capacidades de gestão de emergências em seu município, e realize regularmente exercícios públicos de preparação.
10	Apos qualquer desastre, assegure que as necessidades dos sobreviventes estejam no centro da reconstrução, por meio do apoio direto e por suas organizações comunitárias, de modo a projetar e ajudar a implementar ações de resposta e recuperação, incluindo a reconstrução de casas e de meios de subsistência.

Conclusões

Com a primeira etapa do trabalho concluída, classifica-se o desastre ocorrido como uma inundação brusca em função das características por ela assumidas, com o transbordamento súbito dos rios Preto e Piabanha, provocados por níveis extremos de precipitação, com tempo de recorrência estimado em 500 anos (Canedo et al., 2011), na área a montante da cidade, nos divisores da bacia hidrográfica do rio Piabanha, principalmente nos municípios de Petrópolis e de Teresópolis. De 6 a 8 horas depois dos picos de precipitação ocorridos na Região Serrana, e de forma repentina, sem muitas chances de resposta por parte da população arealense, o rio Preto defluiu uma vazão excessiva, que provocou o represamento e o transbordamento dele próprio e do rio Piabanha, no qual aflui no centro da cidade. Além da proximidade de Areal com essas cidades, os expressivos padrões de declividade de ambos os rios favoreceram a brusca defluência geradora do fenômeno destrutivo no município (Fotografia 1).

Fotografia 1: Panorâmica do ápice na inundaço em Areal em 12/01/2011.

Fonte: Foto cedida pelo morador Alexandre Gumury, 2013.

Essenciais tambm na realizao e sobretudo na amplificao do desastre foram as vrias condies locais de vulnerabilidade scio-institucionais pr-existentes e desveladas pelo evento inundatrio, sendo as principais em nossa anlise: as autoridades municipais no foram avisadas pela Defesa Civil estadual da ameaa que se desenvolvia desde a noite anterior, o que comprova grave falha no processo de comunicao de risco; a disposio da rea urbana municipal, toda ela margeando os dois rios principais e os seus tributrios de menor ordem; a inexistncia de um plano previamente estabelecido de ao e preveno pelas autoridades municipais, sendo que o realizado em carter emergencial at surtiu bons efeitos, permitindo a retirada de moradores de reas muito impactadas posteriormente, mas j se processou com a cidade sendo inundada, portanto, sem uma antecipao que permitisse tambm a reduo dos prejuzos; a no previso, na verdade, a surpresa por parte da administradora da barragem Morro Grande, da vazo que afluiria no reservatrio oriunda dos extremos de pluviosidade em Terespolis na noite anterior, o que suscitou uma operao em nvel crtico do equipamento, apresentando inclusive problemas no sistema extravasor da represa.

Como a segunda e ltima etapa do trabalho ainda est em desenvolvimento, apenas resultados parciais da relao entre a recuperao da cidade ps-desastre e a adoo de estratgias de resilincia em Areal sero apresentados. Ainda que inconclusas, as anlises sinalizam a negligncia por parte das autoridades governamentais e da sociedade civil com a maioria das referidas estratgias, j que passados trs anos do desastre apenas um dos dez passos propostos

pela UNISDR - instalação de sistemas de alerta e alarme - foi implementado na cidade. No entanto, como não foi feito nenhum treinamento público de preparação até aqui, até mesmo essa medida pode resultar numa ação inócua.

Bibliografia

- ALMEIDA, L. (2010) - *Vulnerabilidades socioambientais de rios urbanos*: bacia hidrográfica do rio Maranguapinho, região metropolitana de Fortaleza, Ceará. 2010. 278 f. Tese (Doutorado em Geografia) - Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, 2010.
- ANEAS DE CASTRO, S. D. (2011) - Riesgos y peligros: una visión desde lá Geografía. *Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*. Barcelona, n.60, 15 de mar. 2000.
- BECK, U. (1999) - *World risk society*. Cambridge: Polity Press.
- BURTON, I.; KATES, R. W.; WHITE, G. F. (1978) - *The Environment as Hazard*. New York: Oxford University Press.
- CANEDO, P.; EHRlich, M.; LACERDA, W. A. (2011) - *Chuvras na Região Serrana do Rio de Janeiro* / sugestões para ações de engenharia e planejamento. Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ.
- CUTTER, S. L. (2003) - The vulnerability of science and the science of vulnerability. *Annals of the Association of American Geographers*, v.93, n.1, p.1-12.
- GOERL, R. F.; KOBAYAMA, M. (2005) - Considerações sobre as inundações no Brasil. In: *Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos* (16: 2005: João Pessoa) Porto Alegre: ABRH, anais 2005. CD ROOM.
- GONÇALVES, C. D. (2012) - “Desastres naturais”. Algumas considerações: vulnerabilidade, risco e resiliência. *Territorium*, Revista da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 19, Lousã, p. 5-14.
- LIBAUT, A. (1971) - Os Quatro Níveis da pesquisa geográfica. *Métodos em Questão*, São Paulo, p. 1-13.
- ONU. (2012) - *Como construir cidades mais resilientes*: um guia para gestores públicos locais. Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres, Genebra, Suíça, nov., 2012.
- ROMERO, G.; MASKREY, A. (1993) - Como entender los desastres naturales. In: MASKREY, A. (Org.). *Los desastres no son naturales*. Colômbia: Red de Estudios Sociales em Prevención de Desastres en América Latina (LA RED), Intermediate Technology Development Group (ITDG), p. 06-10.
- SAUSEN, T. M.; LACRUZ, M. S. P.; SAITO, S. M.; PEREIRA, R. da S. (2012) - *Análise do evento de inundação brusca em São Lourenço do Sul, RS, em 10 de março de 2011*. São José dos Campos: INPE.
- VEYRET, Y.; RICHEMOND, N. M. de. (2007) - O risco, os riscos. In: VEYRET, Y. (Org.). *Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente*. São Paulo: Contexto, p. 23-79.
- WHITE, G. F. (ed.) (1974) - *Natural hazards: local, national, global*. New York: Oxford University Press.
- WILCHES CHAUX, G. (1989) - *Desastres, ecologismo y formación profesional*: Herramientas para la Crisis. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Popayán.

MEDIDAS PREVENTIVAS NA GESTÃO INTEGRADA DO RISCO DE INUNDAÇÃO EM PORTUGAL: O PLANEAMENTO PARTICIPATIVO E O PAPEL DAS COMUNIDADES LOCAIS

Francisco da Silva Costa

Departamento de Geografia e CEGOT, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho
costafs@geografia.uminho.pt

Luciano Lourenço

Departamento de Geografia e CEGOT, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
luciano@uc.pt

Carmen Ferreira

Departamento de Geografia e CEGOT, Faculdade de Letras da Universidade do Porto
dra.carmenferreira@gmail.com

Maria Gouveia

Doutoranda, CEGOT, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
mmalgouveia@gmail.com

RESUMO

A falta de políticas que promovam a gestão integrada de inundações em Portugal é uma realidade, sendo que o investimento de recursos financeiros é essencialmente concentrado na resolução das crises, em detrimento de medidas técnico-administrativas de prevenção. Neste contexto, destaca-se o planeamento participativo já que implica todos os interessados no desenvolvimento de políticas de gestão do risco de inundações e permite aos habitantes das regiões vulneráveis escolher o nível de risco que estão prontos para assumir. Com esta comunicação, pretende-se contribuir para a discussão do modelo de gestão do risco de inundações em Portugal, refletindo sobre a falta de planeamento participativo e da intervenção das comunidades locais, como ferramenta para a prevenção e enfrentamento de cenários de catástrofe.

Palavras-chave: Prevenção, Gestão integrada, Proteção civil.

Introdução

Foi, exatamente há um século, nos começos do Inverno de 1909, que no rio Douro se verificou uma das maiores cheias de sempre. O Boletim da Associação Comercial do Porto daquele mês chamava a atenção dos seus associados que operavam na zona ribeirinha para o facto de as águas do Douro estarem a subir gradualmente. Dias mais tarde, o guarda municipal que ali fazia giro contactou os moradores, avisando-os de que deviam tomar precauções porque a cheia vinha a caminho (Jornal de Notícias online, 2014).

Um século depois, a Associação de Técnicos de Segurança e Proteção Civil (ASPROCIVIL) alertava para a necessidade de se tomarem medidas preventivas tendo emitido um comunicado em que afirmava que “...Não temos uma cultura de prevenção nem de planeamento, o ordenamento do território não é feito tendo em conta a tipologia de riscos...” (Público online, 2014).

A própria União Europeia, através da resolução do Parlamento Europeu sobre inundações de 3 de Julho de 2013, recomendou a aplicação dos programas de prevenção das inundações, através de medidas abrangentes, designadamente uma participação mais estreita das regiões, cidades e comunidades locais.

Falando da gestão de risco de inundações... Algumas pistas

A proteção absoluta de inundações é um mito. Existirão sempre alguns riscos residuais. É neste contexto que surge o conceito de “Risco aceitável” (UNISDR, 2009). Ora, o risco aceitável

implica a necessidade de uma gestão integrada do risco de inundação, em vez de uma abordagem fragmentada, difícil de atingir onde as gestões municipais sofrem de falta de capacidade técnica, financiamento ou recursos.

Por isso, a gestão integrada do risco de inundação exige uma mudança de paradigma, de base proactiva, por forma a assegurar uma efetiva integração das preocupações de redução do risco nas políticas relacionadas com o desenvolvimento sustentável (Shrestha, 2008).

De facto, a redução do risco é uma das principais metas na gestão do risco de inundação e pode ser tratada através de estratégias de prevenção que alguns autores enquadram no âmbito da “cultura de prevenção” ou mesmo do “direito da prevenção das inundações” (Aragão, 2009; CEDOUA, 2007).

O Planeamento participativo como processo para a prevenção do risco de inundação

Atualmente, aceitamos que a gestão de inundações pode beneficiar muito com a participação dos envolvidos. Para esse feito, a ação de reduzir o risco de inundação deve ser elaborada por meio de um processo participativo, pelo que uma exigência fundamental passa por identificar as informações, experiências e métodos que diferentes atores podem fornecer, e, depois, projetar medidas concretas, usando tal experiência e conhecimento (APFM, 2006).

Por outro lado, também é importante estar consciente do contexto em que a gestão de risco de inundação opera, pois é essencial compreender as capacidades e incentivos dos atores e agentes implicados, inclusive o modo como eles alocam ou são capazes de usar os seus limitados recursos num quadro de futura incerteza (Sayers et al., 2013).

Frequentemente deparamo-nos com o argumento das dificuldades que as autoridades locais ou serviços de proteção civil referem as dificuldades no ato de planear ou intervir em áreas de risco de inundação. No entanto, outros argumentos devem ser ponderados:

- a possibilidade de limitar o perigo para a vida das pessoas e de proteger as suas propriedades enquadra-se na categoria de atividades de prevenção.
- a capacidade de responder corretamente a um fenómeno rápido depende do conhecimento e da consciência do risco, por parte dos moradores, usuários do terreno e serviços de proteção civil locais, o que requer planeamento e atividades educacionais.
- a eficácia na operacionalização das atividades desenvolvidas pelas comunidades locais requer uma análise cuidadosa por parte da proteção civil (APFM, 2007).

A importância da comunidade local para a gestão de risco de inundação

O envolvimento da comunidade é fundamental em todas as etapas da gestão do risco de inundação, incluindo a identificação de riscos, priorização, formulação de plano, implementação, monitorização e avaliação (Shrestha, Chapagain e Thapa, 2011).

Na preparação para a inundação, a maioria das instituições tende a favorecer um conhecimento científico especializado que, frequentemente, não pode ser assimilado em contextos e realidades locais, onde predomina o “conhecimento local” (Local Knowledge) com base na vivência e experiências das pessoas que lidam com as diferentes situações de risco (Jha, Bloch e Lemon, 2012).

Numa estrutura simples, que descreva a forma como o conhecimento local poderá estar relacionado com a preparação para uma catástrofe, devemos considerar a capacidade das pessoas para observarem o seu ambiente local, para identificarem e monitorarem indicadores ambientais (neste caso, de uma inundação iminente), para desenvolverem estratégias de

adaptação para inundações recorrentes e para a compreensão das cheias passadas e das presentes (Shrestha, Chapagain e Thapa, 2011).

A gestão risco de inundação e proteção civil em Portugal - Problemas e desafios

Portugal, ao assinar a Declaração de Hyogo comprometeu-se em desenvolver, uma cultura de prevenção para a mitigação dos riscos (EIRD/ONU, 2007) com base em abordagens inovadoras que contemplem, nomeadamente: o desenvolvimento de estratégias locais e comunitárias (GPDRR/UN, 2009).

À escala europeia, a adoção da Directiva 2007/60/CE, de 23 de Outubro de 2007, relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações veio assegurar um tratamento jurídico autónomo deste tipo de risco. Portugal apresenta no seu quadro legislativo nacional vários Decretos-Lei que versam sobre a temática das inundações, sendo de destacar o Decreto-Lei nº 115/2010, de 22 de Outubro, que transpõe para o ordenamento jurídico nacional a Directiva referida anteriormente.

Pelo exposto, podemos afirmar que há, atualmente, um dever do Estado de prevenir riscos, resultante do Direito Europeu, e que esta obrigação está expressamente prevista para a prevenção e gestão de um risco específico, as inundações (Aragão, 2011).

De acordo com o Decreto-Lei n.º 75/2007, de 29 de Março, a Autoridade Nacional de Proteção Civil é responsável pela segurança das populações e pela salvaguarda do património, com vista a prevenir acidentes graves e catástrofes. Embora a preocupação pela prevenção esteja expressa nos domínios sobre os quais a atividade da proteção civil deverá ser exercida, as políticas e as operações de proteção civil são praticamente omissas sobre o assunto, preocupando-se mais com medidas reativas que culminam com a criação dos Planos de Emergência (Zêzere, 2007). Sendo a proteção civil uma atividade que envolve todos os cidadãos, coletiva e individualmente considerados, levanta-se a interrogação de saber como se promove o exercício de uma cidadania ativa com capacidade participativa nas decisões e opções relativas às políticas a prosseguir neste domínio. Uma das formas de prevenção que parece mais adequada e mais eficaz para agir sobre as populações mais frágeis, passa por desenvolver a consciência cívica, difundindo técnicas de proteção civil, criando, na sociedade civil, capacidades de resistência onde elas não existiam e injetando a tendência para a passividade e a inércia, resultantes da delegação no Estado de todas as responsabilidades relativas à proteção civil (Ribeiro, 2012).

Conclusões

A gestão do risco de inundação deve ser caracterizada como participativa, partilhada, continuada e fortemente solidária, para a sua aplicação na comunidade, com o objetivo de melhorar o ambiente e o bem-estar do ser humano - algo que alguns autores referem como “hidrossolidariedade” (Blenkner, 2001; Falkenmark, 2002; Ribeiro, 2007).

Para o futuro, será vital ligar a gestão de risco de inundações com questões mais específicas do planeamento participativo, as comunidades locais e a gestão urbana. Soluções robustas podem contribuir para a redução de risco de inundações, enquanto, ao mesmo tempo, criam oportunidades de promover um desenvolvimento mais sustentável e resiliente.

Bibliografia

APFM (2007) - Guidance on Flash Flood Management. Recent Experiences from Central and Eastern Europe. Associated Programme on Flood Management, Genebra, 66 p.

- APFM (2006) - Legal and Institutional Aspects of Integrated Flood Management. Flood management policy series, WMO-No. 997, Associated Programme on Flood Management, Genebra, 103 p.
- Aragão, A. (2011) - Prevenção de riscos na União Europeia: o dever de tomar em consideração a vulnerabilidade social para uma protecção civil eficaz e justa. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 93, Junho 2011, p.71-93.
- Aragão, A. (2009) - A prevenção de riscos em Estados de direito ambiental na União Europeia. *Observatório do Risco*, Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra. Coimbra, 39 p.
- Blenkner, S. (2001) - Turning the page for Hydrosolidarity in Spain: Inherited paradigms favor Well-off framees. *Stockholm International Water Institute. Report Series. Report 13*, Stockholm.
- CEDOUA (2007) - O risco de inundação em Portugal. Dossier. *Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente*, 2.2007, Coimbra, p. 167-179.
- Decreto-Lei n.º 75/2007. D.R. n.º 63, Série I de 2007-03-29. Ministério da Administração Interna.
- EIRD/ONU (2007) - Marco de Ação de Hyogo 2005-2015: Aumento da resiliência das nações e das comunidades frente aos desastres. *Estratégia Internacional para Redução de Desastres/Organizações das Nações Unidas*. Protocolo disponível: http://www.integracao.gov.br/cidadesresilientes/pdf/mah_ptb_brochura.pdf [12 jul. 2014].
- Falkenmark, M. (2002) - Socio-hydroecologic catchment Management - Towards Hydrosolidarity. *Stockholm International Water Institute*, Stockholm.
- GPDRR/UN (2009) - Proceedings Creating Linkages for a Safer Tomorrow, *Global Platform for Disaster Risk Reduction, 2nd session, United Nations International Strategy for Disaster Reduction*, Geneve, 44 p.
- Jha, K. A., Bloch, R., Lemon, J. (2012) - Cities and Flooding. A Guide to Integrated Urban Flood Risk Management for the 21st Century. *Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, International Bank for Reconstruction and Development*, Washington DC, 638 p.
- Jornal de Notícias (online) de 27 de dezembro de 2009, acedido em 17 de julho 2014.
- Jornal Oficial da União Europeia (2007) - Directiva 2007/60/CE do parlamento europeu e do conselho de 23 de Outubro de 2007 relativa à avaliação e gestão dos riscos de inundações. *Parlamento Europeu e Comissão Europeia*, Bruxelas, p. 27-34.
- Parlamento Europeu (2013) - Resolução do Parlamento Europeu, de 3 de julho de 2013, sobre as inundações na Europa (2013/2683 (RSP)).
- Público (online) de 24 de outubro de 2013, acedido em 27 de julho de 2014.
- Ribeiro, C. A. G. R. (2007) - Hidrossolidariedade como princípio de gestão participativa de risco de inundações por associação de bacia. *Dissertação apresentada à Universidade de São Paulo-Escola de Engenharia de São Carlos-Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada, Programa de pós-graduação das ciências da engenharia ambiental*, São Paulo, 212 p.
- Ribeiro, M. J. (2012) - Proteção Civil. *Revista Atena* Nº 28, Imprensa Nacional Casa da Moeda, Lisboa, p. 109-119.
- Sayers, Y. L.i, G. Galloway, E. Penning-Rowell, F. Shen, K. Wen, Y. Chen, and T. Le Quesne (2013) - *Flood Risk Management: A Strategic Approach*. Paris, UNESCO, 202 p.
- Shrestha, A. B. (2008) *Resource Manual on Flash Flood Risk Management. Module 2: Non-structural Measures*. International Centre for Integrated Mountain Development, Kathmandu, 103 p.
- Shrestha, A. B., Chapagain, P. S, e Thapa, R. (2011) - *Flash Flood Risk Management. A Training of Trainers Manual*. International Centre for Integrated Mountain Development, Kathmandu, 160 p.
- UNISDR (2009) - *Terminology on Disaster Risk Reduction*. United Nations International Strategy for Disaster Reduction, Geneva, 35 p.
- Zêzere, J. L. (2007) - “Riscos e ordenamento do território”, *Inforgeo 20/21*, Ordenamento territorial, Associação Portuguesa de Geógrafos, Lisboa, p. 59-63.

NOVAS MEDIDAS ESTRUTURAIS PARA DIMINUIÇÃO DO RISCO HIDROLÓGICO NO FUNCHAL

A. Betâmio de Almeida

Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e Georrecursos (DECivil), I.S.T
betamio.almeida@ist.utl.pt

Sérgio Lopes

Gabinete de Estudos e Serviços de Hidráulica/
Direção Regional de Infraestruturas e Equipamentos
sergiolopes.vp@gov-madeira.pt

RESUMO

A área do Funchal é ocupada maioritariamente por três bacias hidrográficas, orientadas no sentido norte-sul: as ribeiras de São João, de Santa Luzia e de João Gomes. As suas características biofísicas, designadamente área, rede de drenagem e relevo, assim como a disponibilidade de material sólido, concorrem para explicar o elevado grau de perigosidade natural das cheias (aluviões), desencadeadas por episódios de precipitação intensa e de curta duração, nalguns casos associados a antecedentes de precipitação continuada. O risco hidrológico é elevado na medida em que o sector inferior das três bacias hidrográficas coincide com o centro urbano do Funchal, por onde os seus cursos de água principais correm até ao mar. Nestas bacias a cheia é um fenómeno complexo, em que, ao escoamento de água se junta uma mistura de detritos variados, desde partículas muito pequenas, até blocos rochosos de grandes dimensões, daí a designação local de aluvião. Na tentativa de reduzir a perigosidade natural das ribeiras, em particular depois do evento catastrófico de

20 Fevereiro de 2010 e no âmbito do estudo de avaliação do risco de aluvião, que lhe sucedeu¹, foram propostas medidas estruturais de redução do risco para diferentes troços fluviais. Para controlar o transporte de material sólido no troço intermédio dos cursos de água principais, a montante das áreas urbanizadas, propôs-se a implementação de estruturas transversais ao leito das ribeiras de retenção de material sólido, prevenindo-se desta maneira, a redução do transporte de carga de fundo a jusante, bem como a minimização da ação hidráulica erosiva, resultante da passagem do caudal sólido nos troços urbanos regularizados. Por seu lado, para o troço terminal das ribeiras do Funchal, as soluções alcançadas foram balizadas pelo objetivo de fazer aumentar a velocidade do escoamento, de modo a promover o transporte fluvial da carga sólida.

Palavras-chave: ribeiras do Funchal, aluvião, soluções hidráulicas estruturais.

Introdução

Os fatores de escoamento das bacias hidrográficas do Funchal são determinantes para explicar o seu elevado grau de perigosidade hidrológica, salientando-se o relevo vigoroso, marcado pela profunda incisão dos vales, de fundo estreito, a pequena dimensão das bacias hidrográficas (13/14 km²), de forma alongada, com cursos de água principais de comprimentos curtos (10/11 km) e tempo de concentração baixo (< 2 horas). Tendo presente estes fatores e as causas das cheias de natureza climática e geomorfológica, foram estudadas e propostas (SRES, 2010a) novas soluções estruturais, cuja fundamentação e características aqui se descrevem sucintamente.

As cheias rápidas ou aluviões correspondem a eventos de escoamento fluvial turbulento, desencadeados por episódios de precipitação intensa e de curta duração, nalguns casos associados a antecedentes de precipitação continuada. Da análise das aluviões ocorridas nas últimas décadas verifica-se que os respetivos valores de precipitação apresentam períodos de

¹ Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões na Ilha da Madeira (2010), elaborado por uma equipa do IST, Universidade da Madeira e Laboratório Regional de Engenharia Civil (SRES, 2010a).

retorno relativamente baixos. A ocorrência duma chuva diária de cerca de 200 mm nas zonas montanhosas, suscetível de originar uma aluvião, corresponde a um período de retorno de apenas 5 anos, o que demonstra que a sua probabilidade de ocorrência é relativamente alta. Uma das características do escoamento misto nos cursos de água de montanha, como é o caso, relaciona-se com a existência de pesadas cargas sólidas transportadas por tração/arrastamento e/ou por escoada detritica (debris flow), que faz deste tipo de cheias um fenómeno de grande complexidade e perigosidade, cujo controlo pressupõe uma abordagem mais integrada de prevenção à escala da bacia hidrográfica.

As ações que reduzem ou eliminam o risco de aluvião para pessoas, bens e propriedades podem ser do tipo não estruturais e estruturais, sendo que as duas devem ser implementadas de forma integrada. As primeiras englobam medidas de conservação e uso do solo, o ordenamento do território, e a implementação de sistemas de prevenção e alerta e de seguros (Ramos, 2009), ao passo que as medidas estruturais correspondem a intervenções de engenharia de controlo dos processos de produção, transporte e deposição da carga sólida transportada pelos cursos de água, de entre as quais se destacam as de retenção de material sólido, em particular no curso de água principal. Soluções deste tipo já foram aplicadas em diversas regiões, com características geológicas e geomorfológicas semelhantes às da ilha da Madeira, das quais se refere os estrados de drenagem inferior, as redes deformáveis e as barreiras de retenção (Takahashi, 2007; Mizuyama, 2008).

As soluções propostas para as ribeiras do Funchal

As soluções propostas para as ribeiras do Funchal assentam numa estratégia integrada que visa, por um lado reduzir o volume e a dimensão do material sólido mobilizado até ao troço terminal das linhas de água e, por outro, minimizar os efeitos da ação hidráulica resultante da passagem dos caudais de cheia nos troços urbanos regularizados.

As barreiras de retenção de material sólido

No que se refere às soluções para a travagem das aluviões foi proposta a implantação no leito das ribeiras de barreiras fendidas ou açudes, que correspondem a estruturas descontínuas, constituídas por pilares igualmente espaçados, que se apoiam sobre um maciço de fundação assente no leito rochoso, ou na ausência deste, em estacas, cuja profundidade depende da maior ou menor espessura das aluviões nos locais de implantação. Em cada uma das três ribeiras principais do Funchal foi projetado construir 4 barreiras de retenção, o que no conjunto perfaz um total de 12 estruturas. As suas características encontram-se resumidas no **quadro i**.

Tendo por base o princípio da retenção seletiva da componente sólida do escoamento fluvial, o afastamento entre pilares diminui dos açudes de montante para os de jusante, de modo a assegurar a retenção progressiva do caudal sólido em função da sua dimensão, com os blocos com maior potencialidade destrutiva a ficarem retidos logo no primeiro açude de montante. Nas ribeiras de João Gomes e de Santa Luzia o afastamento é de 2 m no açude de montante, diminuindo para 1 m no último de jusante, enquanto na ribeira de São João o afastamento é maior no primeiro açude de montante (quadro i). Na **figura i** apresenta-se o exemplo de umas das barreiras fendidas construída na ribeira de Santa Luzia. O volume de retenção depende principalmente da sua localização, da tipologia adotada e do dimensionamento estrutural. A capacidade máxima de retenção das respetivas bacias de retenção dos 4 açudes é de 66 700 m³ na ribeira de João Gomes, 68 250 m³ na ribeira de Santa Luzia e 94 000 m³ na ribeira de São João

(quadro i). A manutenção destas infraestruturas inclui a remoção dos materiais detriticos acumulados nas respetivas bacias de retenção, principalmente na sequência da ocorrência de cheias rápidas de grande magnitude, de modo a preparar a estrutura para a próxima aluvião, garantindo assim a sua operacionalidade.

As intervenções na foz das três ribeiras

As intervenções na foz das três ribeiras do Funchal têm por objetivo melhorar as condições de vazão de desembocadura. Para o efeito, e tendo em conta as condicionantes urbanísticas nas margens fluviais, os cursos de água foram aprofundados alargados e reposicionados, procurando suavizar o traçado curvilíneo de alguns troços.

A junção das fozes das ribeiras de João Gomes e Santa Luzia

O troço terminal da ribeira de Santa Luzia, de traçado curvilíneo, tem sido particularmente afetado por várias aluviões nas últimas décadas, sendo que as situações de transbordo são mais frequentes na margem esquerda côncava. Esta configuração contribui para a diminuição da velocidade do escoamento, que também é influenciada pela diminuição do declive do leito, tal como acontece no troço final da ribeira de João Gomes, condicionantes que, conjugadas com a limitação da altura máxima do canal de escoamento (quadro ii), tendem a promover o assoreamento e o consequente transbordo.

Admitindo a coincidência temporal dos caudais de ponta de cheia e tempos de concentração de ambas as bacias semelhantes, a solução proposta para resolver os problemas atrás mencionados consiste no prolongamento dos alinhamentos dos dois leitos provenientes de montante, com a suavização das mudanças de direção, até ao ponto de encontro desses alinhamentos, a partir do qual é criado um leito único, que é prolongado pelo mar dentro, numa extensão de 75 m a partir do passeio pedonal da Avenida do Mar. No **quadro ii** são indicadas as características das diferentes seções de vazão antes e depois da intervenção. A intervenção inclui a construção de uma rampa de acesso junto ao ponto de encontro das duas linhas de água, de modo a facilitar as operações de limpeza da foz.

Regularização do troço terminal da ribeira de São João

O troço final da ribeira de São João ficou totalmente obstruído na cheia de 20 de Fevereiro de 2010. A cobertura da ribeira, o seu afunilamento e o fraco declive longitudinal, associado a um fundo irregular foram os principais fatores responsáveis pelo entupimento e assoreamento total do troço terminal da ribeira, causando o levantamento e destruição da laje vigada, por pressão hidráulica, à entrada do segmento coberto. A solução de regularização proposta procura minimizar os segmentos cobertos, aprofundar o canal de escoamento para assegurar níveis máximos de escoamento e aumentar a capacidade de transporte de material sólido. A intervenção de reabilitação abrange o troço terminal numa extensão de 240 m, no qual foram uniformizadas as dimensões da seção de vazão, garantindo uma largura de 11 metros. Parte deste troço foi reposicionado, com novo alinhamento de 90 m de comprimento. A ribeira é prolongada em 30 m pelo mar dentro, com o objetivo manter a velocidade do escoamento por confinamento lateral.

Conclusão

As medidas estruturais que conduzam a uma atenuação da produção e a uma retenção significativa da fração mais perigosa do material sólido das aluviões, a montante de zonas

sensíveis ou vulneráveis, são particularmente importantes no âmbito da gestão do risco de inundações num território de elevada suscetibilidade às cheias rápidas como o da Madeira.

Quadro I - Características gerais das barreiras de retenção de material sólido, construídas nas ribeiras do Funchal.

	Código	Altitude do leito do c.a. (m)	Largura do açude (m)*	N.º pilares/aberturas	Altura / espessura dos pilares (m)	Afastamento entre pilares (m)	Capacidade máxima de retenção da bacia (m³)
Ribeira de João Gomes	JG4	210	51,15	5 / 6	8 / 1,5	2	13 400
	JG3	195	58,90	10 / 11	8 / 1,5	2	23 050
	JG2	177	49,55	5 / 6	8 / 1,5	1,6	14 800
	JG1	157	44,45	5 / 6	8 / 1,5	1	15 450
Ribeira de Santa Luzia	SL4	736	60,30	10 / 11	10 / 1,75	2	11 150
	SL3	698	50,00	9 / 10	10 / 1,75	2	11 150
	SL2	639	62,25	10 / 11	10 / 1,75	1,6	24 150
	SL1	612	66,05	15 / 16	10 / 1,75	1	21 800
Ribeira de São João	SJ4	788,50	81,3	15 / 16	10 / 1,10	3,7	17 500
	SJ3	710	97,7	14 / 15	10 / 1,10	2,1	35 000
	SJ2	661	94,2	28 / 29	10 / 0,90	1,5	33 500
	SJ1	529	43,9	10 / 11	8 / 0,90	1,0	8 000

* à cota do coroamento, incluindo a largura da seção aberta e dos encontros.

Fonte: DRIE-GESH.

Quadro II - Parâmetros das seções de vazão antes e depois da intervenção de junção das fozes das ribeiras de Santa Luzia e João Gomes.

	Seção de vazão	
	Altura (metros)	Largura (metros)
Ribeira de Santa Luzia a montante da Avenida do Mar	Antes: 5,5 a 4 Depois: 7	Antes: topo (14), base (12) Depois: 14
Ribeira de João Gomes a montante da Avenida do Mar	Antes: 5,5 a 4 Depois: 7	Topo (10), base (9) Depois: 10
Ribeira de Santa Luzia sob Avenida do Mar	3	12
Ribeira de João Gomes sob Avenida do Mar	3	9
Segmento terminal leito comum	7	24

Figura 1 - Exemplo de uma das barreiras fendidas construídas na ribeira de Santa Luzia, identificada no quadro i com a sigla SL1.

Fonte: DRIE-GESH.

Bibliografia

- Mizuyama T (2008) Structural Countermeasures for Debris Flow Disasters. International Journal of Erosion Control Engineering, Volume Vol. 1, No. 2, pp. 38-43.
- Ramos C (2009) Dinâmica Fluvial e Ordenamento do Território (Programa de Unidade Curricular do 2º ciclo). SLIF- 6, Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, Lisboa, 96p. ISBN: 978-972-636-195-4.
- SRES (2010a) Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões da Ilha da Madeira - Relatório Síntese, Instituto Superior Técnico, a Universidade da Madeira e o Laboratório Regional de Engenharia Civil.
- Takahashi T (2007) Debris Flow. Mechanics, Prediction and Countermeasures. Taylor & Francis Group. London, UK.

AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO HIDROMORFOLÓGICA DE CANAIS COMO SUBSÍDIO À GESTÃO DO RISCO DE INUNDAÇÕES URBANAS: BACIA DOS RIOS GUAXINDIBA/ ALCÂNTARA (RIO DE JANEIRO, BRASIL)

Fernando Souza Damasco

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal Fluminense
(UFF, Brasil) - fernandodamasco@id.uff.br

Sandra Baptista da Cunha

Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal Fluminense
(UFF, Brasil)
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
sandracunha@openlink.com.br

RESUMO

Esse trabalho se propõe a relacionar a degradação dos canais à ocorrência de inundações (*flashfloods*) na bacia dos rios Guaxindiba/Alcântara (Rio de Janeiro, Brasil). A mensuração da degradação dos canais abrangeu as estruturas do leito (desenvolvimento do canal e curso longitudinal); das margens (seções transversais); e da planície aluvial (uso da terra e faixa ciliar). A avaliação foi visual e consistiu na análise de trechos de 250 m a jusante e a montante de 7 pontes. Os dados colhidos foram quantificados e transformados em índices, que classificam os estágios de degradação em crítico, avançado, intermediário, inicial e natural. Concluiu-se que a bacia encontra-se em um estágio avançado de degradação hidromorfológica, marcada pela alteração brusca dos traçados dos canais, do leito, das margens, da faixa ciliar e da planície. Os índices, comparados aos dados de enchentes da Defesa Civil, sugerem que as áreas onde os canais estão mais degradados estejam também mais suscetíveis às inundações.

Palavras-chave: Inundações urbanas, degradação ambiental, ajustes nos canais, geomorfologia fluvial antrópica.

Introdução

Desde os anos 1960, muitos investigadores têm estudado as alterações nos rios por ações antrópicas, sobretudo na tentativa de elucidar as causas, características, localização e temporalidade dos efeitos ambientais concernentes às mudanças nos canais (Chin & Gregory, 2005; Gregory, 2006; Rodrigues, 2010; Cunha, 2012, entre outros).

Localizada na borda leste da Baía de Guanabara e drenando uma superfície de 168,37 km², a bacia em estudo é formada pela sub-bacia do rio Alcântara e pela sub-bacia do rio Guaxindiba e engloba grande parte do município de São Gonçalo e pequenos trechos dos municípios de Niterói e Itaboraí (figura 1).

Figura 1: Localização da área de estudo.

Elaboração: Fernando Damasco, 2013.

Materiais e métodos

A mensuração da degradação do hidromorfológica dos canais pela ação antrópica abrangerá as três principais feições fluviais: 1) leito fluvial (desenvolvimento do canal fluvial, curso longitudinal, estruturas do leito fluvial); 2) margem fluvial (perfil transversal e estrutura das margens); 3) planície aluvial (uso da terra e faixa ciliar).

A avaliação foi realizada através de trabalhos de campo com base em metodologias desenvolvidas por agências ambientais de países referenciais em gestão de cursos d'água (Meier *et al.*, 2012; Environment Agency, 2003; Barbour *et al.*, 1999; Parsons *et al.*, 2001) com as adaptações necessárias ao ambiente tropical. A avaliação foi visual e consistiu na análise, a partir de pontes, de 7 trechos de 250 metros do rio a jusante e a montante. O formulário de análise é composto por 21 parâmetros que são quantificáveis de 0 a 4, sendo que quanto mais próximo de 4, mais o canal se aproxima de suas condições naturais, quanto mais próximo de zero, mais degradado ele se encontra. Esses valores de referência foram definidos a partir da análise da bibliografia nacional e internacional sobre degradação de canais. A partir da média entre os parâmetros, chega-se a uma nota para o trecho, estabelecendo-se cinco classes de degradação hidromorfológica, conforme propõe Meier *et al.* (2012): crítico (0,0-0,4), avançado (0,5-1,4), intermediário (1,5-2,4), inicial (2,5-3,4) e natural (3,5-4,0).

Resultados e discussão

Os resultados da análise hidromorfológica dos trechos selecionados indicam que a bacia do Guaxindiba/Alcântara apresenta 4 trechos caracterizados com estágio avançado de degradação

hidromorfológica e dois trechos com estágio crítico. Os dados compilados encontram-se sumarizados na **tabela I** e espacializados na **figura 2**. Os trechos 1 e 2 foram considerados os mais degradados, apresentando estágio crítico de degradação. O trecho 4, por sua vez, localizado mais a montante da bacia, é o trecho mais preservado, muito embora esteja classificado como intermediário. A média final por feição geomorfológica indica que as margens e a planície estão em estágio avançado de degradação.

Na sub-bacia do rio Alcântara, o leito vai se tornando mais degradado, quanto mais se aproxima da foz. O rio principal apresenta-se sinuoso no alto curso. No médio e baixo curso, devido às inúmeras retificações realizadas, o rio apresenta majoritariamente padrão reto. Ao longo dos rios, ocorrem diversas passagens chamadas *pinguelas*, por onde a população pode cruzar o curso fluvial. Muitas vezes, as *pinguelas* funcionam como caminhos em meio à mata ciliar, por onde a população consegue acessar o leito do rio, depositando todo tipo de lixo, desde sacolas com resto de alimentos até móveis e eletrodomésticos de dimensões consideráveis.

As soleiras (*riffles*) e depressões (*pools*) são observáveis apenas no alto curso dos rios. De acordo com Cunha (2003), nos rios naturais, as seções tendem a apresentar essas soleiras e depressões devido à sinuosidade do canal. Como nos rios desnaturalizados a sinuosidade desaparece, não ocorrem tais formações.

No baixo curso, o fluxo tende a se homogeneizar, apresentando-se normalmente laminar em toda a extensão do leito. Devido à quase ausência de fluxo observada no Canal Isaura Santana, desenvolveram-se muitas gigogas (*Eichhornia crassipes*) e tifas (*Typha domingensis*).

Tabela I: Resultados finais da análise hidromorfológica

Feição	Médias parciais por trecho							Média	Estágio
	1	2	3	4	5	6	7		
Leito	0,7	0,9	2,0	2,5	2,3	1,7	0,7	1,5	Intermediário
Margens	0,9	0,3	1,7	3,1	1,3	2,0	0,7	1,4	Avançado
Planície	0,0	0,0	0,7	1,3	0,6	0,7	0,0	0,5	Avançado
Média final	0,4	0,4	1,5	2,3	1,4	1,4	0,5	1,1	Avançado
Estágio	Crítico	Crítico	Avançado	Intermediário	Avançado	Avançado	Avançado	X	X

Elaboração: Fernando Damasco, 2014.

Figura 2: Degradação hidromorfológica dos canais e ocorrência de enchentes. Observe-se o caráter concêntrico dos graus de degradação em relação à Baía de Guanabara.

Elaboração: Fernando Damasco, 2013.

Em toda a rede hidrográfica, pode-se verificar a presença de muitos materiais que não fazem parte da dinâmica natural do leito fluvial, entre elas blocos de concreto, pedaços de tijolos, visivelmente sobras de construções. No canal principal, os sedimentos de fundo apresentam-se, na maioria dos pontos analisados, homogêneos, formados predominantemente por sedimentos finos.

A análise hidromorfológica das margens dos rios evidenciou a intensidade com a qual as estruturas antrópicas modificam o sistema fluvial, desequilibrando-o. Os resultados evidenciam em todos os pontos coletados a presença de pontes e tubulações que desestabilizam as margens e corroboram os processos erosivos. A pouca variabilidade da largura também é uma expressão de alteração da dinâmica natural de erosão e deposição do rio.

Os resultados revelam ainda o alto grau de comprometimento das planícies de inundação. Além de o uso da terra predominante ser urbano, a presença de estruturas negativas foi uma constante em todos os trechos observados. Essas estruturas podem ser fábricas poluidoras, lixões, tubulações, represas e barragens, estradas etc.

Em uma articulação com os dados espaciais de ocorrências de enchentes da Defesa Civil do Município de São Gonçalo (**figura 2**), pode-se inferir que as inundações concentram-se nas proximidades dos trechos com morfologia mais degradada.

Conclusão

Os rios da bacia do Guaxindiba/Alcântara encontram-se em um estágio crítico/avançado de degradação hidromorfológica, marcada pela alteração brusca nos traçados dos canais fluviais, das estruturas do leito, das margens, da faixa ciliar e de impermeabilização da planície adjacente.

A espacialização da degradação sugere uma lógica concêntrica em relação à Baía de Guanabara, o que traduz a própria diversificação morfológica da bacia. O alto curso, ainda bem preservado, com situação intermediária. Um médio curso bastante alterado e com estágio avançado de degradação. O quadro completa-se pelo baixo curso, completamente modificado, com os canais retificados e sem sinais da dinâmica natural do rio, onde a metodologia classifica a degradação como em estágio crítico.

Os resultados da análise hidromorfológica sugerem que o avanço do grau de degradação dos canais seja diretamente proporcional ao aumento da ordem hierárquica. Desse modo, as políticas de planejamento, gestão e manejo dos canais, que visassem a despoluição e a recuperação, deveriam partir dos canais de primeira ordem, até os de ordens mais elevadas.

O fato de as áreas mais suscetíveis às inundações estarem localizadas em áreas muito degradadas permite inferir que há uma relação direta entre a degradação e a suscetibilidade às inundações. Essa informação pode ser fundamental, de modo que as políticas de planejamento e prevenção de inundações deveriam considerar o conceito de degradação, dando especial ênfase à recuperação das áreas degradadas, de forma a devolver ao rio a sua dinâmica natural.

Bibliografia

- Barbour, M. T.; Gerritsen, J.; Snyder, B.; Stribling, J. *et al.* (1999) - *Rapid Bioassessment Protocols for Use in Streams and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates, and Fish*. U.S. Washington, D.C.: Environmental Protection Agency; Office of Water.
- Chin, A.; Gregory, K. J. (2005) - Managing urban river channel adjustments. *Geomorphology*, 69: 28-45.

- Cunha, S. B. (2003) - Canais fluviais e a questão ambiental. In: Cunha, S. B.; Guerra, A. J. T. (orgs.). *A questão ambiental: diferentes abordagens*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
- Cunha, S. B. (2012) - Rios desnaturalizados. In: Barbosa, J. L. & Limonad, E. (orgs.) *Ordenamento territorial e ambiental*. Niterói: Editora da UFF.
- Environment Agency (2003) - *River Habitat Survey Manual: 2003 version*. Disponível em: <http://www.environment-agency.gov.uk/>, acesso em 16/07/2013.
- Gregory, K. J. (2006) - The human role in changing fluvial systems: retrospect, inventory and prospect. *Geomorphology*, v. 79, 172-191.
- Meier, G.; Zumbroich, T.; Roehrig, J.; Souvignet, M. (2012) - Application of the radiating effect concept to implement measures stipulated by the European Water Framework Directive. *Water Science & Technology*, 66: 2793-2799.
- Parsons, M.; Thoms, M.; Norris, R. (2001) - *Australian River Assessment System: AusRivAS Physical Assessment Protocol*. Camberra, Australia: Environment Austrália.
- Rodrigues, C. (2010) - Avaliação do impacto humano da urbanização em sistemas hidro-geomorfológicos. Desenvolvimento e aplicação da metodologia na Grande São Paulo. *Revista do Departamento de Geografia*, Universidade de São Paulo, 20: 111-125, 2010.

FONTES DE ABASTECIMENTO POR ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO MUNICÍPIO DE BARRAS/PIAUI - BRASIL

Francisca Cardoso da Silva Lima

Centro de Ciências Humanas e Letras, Universidade Estadual do Piauí - Brasil
Franlima55@hotmail.com

RESUMO

A ocorrência cíclica das estiagens e seus efeitos catastróficos são por demais conhecidos e remontam aos primórdios da história do Brasil. A pesquisa tem como objetivo conhecer a oferta hídrica subterrânea do município de Barras Piauí, analisando a qualidade das fontes: poço tubular e poço escavado. Realizou-se o cadastramento das fontes de abastecimento por água subterrânea, uso do GPS, e obtenção das informações passíveis de serem coletadas por meio de visita técnica. A análise dos dados permitiu as seguintes conclusões: em termos de domínio hidrogeológico, predominam as rochas da Bacia Sedimentar do Parnaíba, que possuem porosidade primária, condições de armazenamento e fornecimento de água; em termos de qualidade das águas subterrâneas, cerca de 88% dos poços apresentam água doce, 11% são salobras e 1% são salgadas; todos os poços necessitam de manutenção periódica para assegurar seu funcionamento, principalmente, em tempos de estiagens prolongada.

Palavras Chaves: Estiagem, Águas subterrâneas, Subsistência.

Introdução

A região Nordeste do Brasil é tradicionalmente conhecida pela escassez de água superficial e dependência de água subterrânea, bem como pelos baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico. O Estado do Piauí está dividido em duas províncias hidro geológicas: Bacia Sedimentar e Embasamento Cristalino (IBGE, 2002).

Esta pesquisa tem como objetivo conhecer a oferta hídrica subterrânea no município de Barras-PI, analisando as condições dos poços tubulares e fontes subterrâneas ali existentes, contribuindo assim, para o melhor aproveitamento e uso desses poços de forma responsável com vistas a garantir melhor qualidade de vida à população urbana e rural, especialmente no período de estiagem.

Localização

O município de Barras está localizado na microrregião do Baixo Parnaíba Piauiense, com área de 1.767,9 km², e tendo como limites ao norte os municípios de Batalha, Esperantina e Campo Largo do Piauí, ao sul Boa Hora, Cabeceiras do Piauí e Miguel Alves, a leste Piripiri e Batalha, e a oeste Miguel Alves, Nossa Senhora dos Remédios e Campo Largo do Piauí. A sede municipal tem as coordenadas geográficas de 04°14'49" de latitude sul e 42°17'45" de longitude. (BASTOS, 2000). Ver Figura 01.

Figura 1: Fonte CPRM, 2004

Aspectos fisiográficos

As condições climáticas do município de Barras (com altitude da sede a 70m acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 25°C e máximas de 35°C, com clima quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual (com registro de 1.400mm, na sede do município) é definida no Regime Equatorial Marítimo, com isoietas anuais entre 800 a 1.600mm, cerca de 5 a 6 meses como os mais chuvosos e período restante do ano de estação seca. O trimestre mais úmido é o formado pelos meses de fevereiro, março e abril. (IBGE, 2010).

As formas de relevo, da região em apreço, compreendem, principalmente, superfícies tabulares reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes variando de 150 a 250 metros. Dados obtidos a partir do Levantamento Exploratório - Reconhecimento de Solos do Estado do Piauí e Geografia do Brasil - Região Nordeste (IBGE - 2004).

Geologia

As unidades geológicas com exposições na totalidade da área do município fazem parte das coberturas sedimentares a seguir relacionadas: os sedimentos mais recentes do pacote pertencem ao Grupo Barreiras, agrupando arenito, conglomerado, intercalações de siltito e argilitos; Logo após, ocorre a Formação Sardinha, com basalto e diabásio; A Formação Poti encerra arenito, folhelho e siltito; A Formação Longá reúne arenito, siltito, folhelho e calcário; Repousando na base da sequência encontra-se a Formação Cabeças que engloba arenito, conglomerado e siltito.

Recursos Hídricos

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um dos seis instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil, estabelecidos no inciso III, do art. 5º da Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, ANA (2004). Esse instrumento assegura o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso aos recursos hídricos. No Estado do Piauí, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, (2006) através da Lei nº 5165/2010, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, instituiu o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cuja outorga de água superficial e subterrânea difere em relação aos valores de isenção, aos valores máximos outorgáveis, como também aos critérios adotados para sua avaliação.

Quanto às águas superficiais, dados da CEPRO (2005) mostram que, os principais cursos d'água que drenam o município de Barras são: os rios Longá e Marataoan, além dos riachos Santo Antônio, Porção, Baixa Grande e D'anta. Apesar de inserido no "Polígono das Secas", o Piauí não possui grande quantidade de açudes.

Águas Subterrâneas

Conforme dados do Projeto RADAM, MME (1974), no município de Barras distinguem-se dois domínios hidrogeológicos: rochas sedimentares da Bacia do Parnaíba, do Grupo Barreiras e basaltos da Formação Sardinha, onde as rochas sedimentares pertencentes à Bacia do Parnaíba englobam as formações Cabeças, Longá e Poti.

As características litológicas da Formação Cabeças indicam boas condições de permeabilidade e porosidade, favorecendo, assim, o processo de recarga por infiltração direta das águas de chuvas.

Metodologia

Este trabalho apresenta o diagnóstico de 233 poços tubulares cadastrados, no município de Barras, no Estado do Piauí. Constitui parte dos resultados obtidos através do Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea no Semiárido, realizado pela CPRM (2004), associado à pesquisa de gabinete e de campo, cuja análise final utilizou-se a amostra de 200 poços, percorrendo as seguintes fases:

Levantamento bibliográfico; Seleção dos planos de informações contendo as condições demográficas, socioeconômicas, naturais e ambientais do município; Sobreposicionamento e cruzamento dos referidos planos de informação a fim de selecionar os locais que apresentam uma maior vulnerabilidade de contaminação ambiental; Seleção dos poços cadastrados; Técnicas de: GPS, sensoriamento remoto, representações cartográficas, fotografias aéreas e imagens de satélite;

Resultados E Discussão

O levantamento realizado no município registrou a presença de 233 pontos d'água, sendo 03 poços escavados e 230 poços tubulares e foram classificados em: públicos, e particulares.

Quatro situações distintas foram identificadas na data da visita de campo: poços em operação, paralisados, não instalados e abandonados conforme Quadro I.

Quadro I - Situação atual dos poços cadastrados com relação à finalidade de uso da água.

Fonte: CPRM, 2014.

NATUREZA DOS POÇOS	ABANDONADOS	EM OPERAÇÃO	NÃO INSTALADOS	PARALISADOS
Público	3	46	20	19
Particular	4	95	31	15
Total	7	141	51	34

Com relação à fonte de energia utilizada nos sistemas de bombeamento dos poços, foi identificado o seguinte resultado como consta na Figura 02.

Figura 2: Tipo de energia utilizada nos sistemas de bombeamento de água

Fonte: CPRM, 2014.

A relação entre os poços atualmente em operação e os poços desativados (paralisados e não instalados), mas passíveis de entrarem em funcionamento, verificou-se que 46 poços particulares estão desativados. Com relação aos poços públicos, 39 encontram-se desativados, podendo, entretanto vir a operar, somando suas descargas àquelas dos 46 poços que estão em uso.

Foram coletadas amostras de água e analisados os sólidos totais dissolvidos de 200 poços, tendo como resultados valores variando de 18,2 a 2.047,5 mg/L e valor médio de 255,2 mg/L. a

classificação das águas subterrâneas no município em 177 poços foram classificadas como doce, ou seja, os sólidos totais dissolvidos nessas águas estão abaixo de 500 mg/L, 21 poços são salobras e em 2 são salgadas. Figura 03.

Figura 3: Qualidade das águas subterrâneas dos poços analisados

Fonte: CPRM, 2014.

Conclusões

A pesquisa concluiu que em termos de domínio hidrogeológico, predominam as rochas da Bacia Sedimentar do Parnaíba, aproximadamente 64% dos poços são atendidos por rede de energia elétrica, o restante utiliza-se de fontes alternativas.

Dos 233 poços cadastrados se encontram na seguinte situação: 07 Abandonados, 141 em operação, 51 não instalados e 34 paralisados.

Em termos de qualidade das águas subterrâneas, as amostras analisadas identificaram que cerca de 88% dos poços apresentam água doce, 11% são salobras e 1% são salgadas. Todos os poços necessitam de manutenção periódica para assegurar seu funcionamento, principalmente, em tempos de estiagens prolongadas.

Referências

- Bastos, C. A. (2000). *Atlas Histórico e Geográfico do Piauí*. FCMC/PMT, Teresina.
- IBGE. (2002). *Região Nordeste*. Rio de Janeiro, p. 28.
- IBGE. (2004). *Região Nordeste*. Rio de Janeiro.
- _____. (2010). *Recursos Hídricos*. Brasília.
- ANA, (2004). MMA, Agência Nacional das Águas. *Resolução 707/2004*. Brasília.
- CPRM. (2004). *Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, Estado do Piauí: Diagnóstico do Município de Barras*. Fortaleza.
- MME. Departamento Nacional de Produção Mineral. (1974). *Projeto RADAM. Folha SB.21, geologia, geomorfologia, solos, vegetação e uso potencial da terra*. Rio de Janeiro.
- CEPRO. (2005). *Diagnóstico e Diretrizes Para o Setor Mineral do Piauí. Parte II - Diagnóstico do Setor Mineral do Estado do Piauí*. Teresina, 150 p.
- SEMAR, (2006). *Legislação de Recursos Hídricos do Estado do Piauí*. Teresina. 136 p.

ANALYSE DU RISQUE ALIMENTAIRE AU NIVEAU DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE DE LA VILLE D'ORAN DE L'OUEST ALGERIEN

Chafika Hebbar

Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle/Université d'Oran .Algérie.
racha_hebbar@hotmail.fr

Dounia Merzoug

Laboratoire Réseau de Surveillance Environnementale/Université d'Oran, Algérie.
d_merzoug@hotmail.com

Sid Ahmed Kerfouf

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie/Université Djillali Liabès, Algérie.
kerfoufahmed@yahoo.fr

Zitouni Boutiba

Laboratoire Réseau de Surveillance Environnementale/Université d'Oran. Algérie.
zitouniboutiba@yahoo.fr

RESUMÉ

Le risque résulte de deux éléments: environnement néfaste pour la santé et population soumise au risque. Le risque alimentaire entre dans les risques majeurs pour l'homme. Les aliments sont vecteurs de dangers (biologiques et chimiques) compromettant leur sécurité. L'analyse du risque alimentaire, réalisée par la méthode HACCP, oriente sur le choix d'équipements, de conception et de méthodes d'installation qui apporteront la sécurité des personnes travaillant dans l'usine, de l'environnement et du public. Les aliments contiennent diverses substances qui, lorsqu'elles sont fortement ingérées peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. L'étude des moyens d'actions fait appel aux compétences de toxicologues et biologistes.

Mots clés : Aliment, consommateur, risque alimentaire, Oran, Algérie.

Introduction

La maîtrise de la qualité est un souci majeur et permanent dans les industries agroalimentaires. La mauvaise qualité d'un aliment peut avoir des conséquences, allant d'une simple altération, lui faisant perdre ses qualités organoleptiques, à des toxi-infections dangereuses pour la santé humaine. Les maladies d'origine alimentaire sont des affections provoquées par des agents, de nature biologique, chimique ou toxique, capables de contaminer l'organisme. Les industries agroalimentaires doivent répondre à deux types d'enjeux : sociaux et commerciaux. Les premiers ciblent la santé du consommateur et impliquent la nécessité de garantir en permanence la qualité du produit et au moment de sa consommation, alors que les seconds ciblent l'image de marque, la productivité et la compétitivité des entreprises (Soubra, 2008). Selon Hamza (2012), chaque année, environ 1,5 milliards de personnes à travers le monde sont touchées par des épidémies d'origine alimentaire entraînant 3 millions de décès.

Le système HACCP est une démarche qui vise, la production d'une denrée alimentaire sûre, et ce par la maîtrise des dangers qui peuvent nuire à la santé du consommateur. Pour cela il faut former le personnel des entreprises, des services publics et sensibiliser les consommateurs, à ses principes et à ses applications.

L'objectif de notre travail se résume en l'application du système HACCP pour protéger la santé du consommateur, garantir en permanence la salubrité de l'huile.

Description de l'entreprise

SAVOLA est une entreprise familiale créée en 1979, appartenant à la famille FAQIEH, originaire de la Mecque, spécialisée dans la production d'huile de table.

L'huilerie **AFIA** (Figure 1) est une entreprise de droit Algérien, filiale du groupe SAVOLA, située dans la zone industrielle Hassi Ameur à 15km d'Oran Est, dont l'activité est le raffinage et le conditionnement de l'huile de table et l'instauration de qualités conformes à la norme ISO 9001 (2008). Elle produit l'huile AFIA (95% d'huile de Soja et 5% d'huile de Maïs) et Huile OLEOR (100% d'huile de Soja).

Processus de raffinage de l'huile brute

Le raffinage chimique de l'huile brute de soja consiste à éliminer les acides gras libres, les produits d'oxydation, les arômes désagréables, les colorants, les produits toxiques (pesticides), les phospholipides et les métaux (fer et cuivre) pour la transformer en un produit commercialisable salubre, et cela suivant différentes étapes (Lhoutellier, 1995).

Dégommage : En vue d'obtenir une huile brute dégommée et dépourvue de phospholipides, sa température sera augmentée à 70 °C avec un temps de rétention environ 20 min, façon à hydrater presque la totalité des phospholipides.

Acidification qui se réalise par la diminution du pH avec l'ajout de l'acide citrique à 30 % demandant un dosage entre 0,1 et 0,2 et l'huile sera chauffée à 90 °C.

Figure 1 - L'entreprise AFIA Internationale Algérie

Neutralisation par les bases élimine les acides gras libres sous forme de savons appelés pâtes de neutralisation.

Séparation de la patte savonneuse, de l'huile grâce à une force centrifuge dans le séparateur à une vitesse de 7200 tours/min et à une température de 85 à 90 °C.

Lavage d'huile se fait par le dosage à 10% d'eau chaude à une température de 85 °C. Puis on procède à l'ajout de l'acide citrique à 17% en présence d'un mixeur et d'un réacteur avec un temps de contact entre 10 à 15 min.

Séchage (drayer) : Après élimination de l'eau par force centrifuge au séparateur, l'huile passe au sécheur sous vide et acheminée vers le bac de réception puis pompée vers la section de décoloration.

Décoloration qui va éliminer les pigments colorés. La quantité d'huile lavée et séchée est divisée en deux parties : 25% pour liquéfier la terre décolorante et 75% seront mélangés au tout après un traitement physico-chimique. On peut utiliser le charbon actif pour aider la terre décolorante à éliminer les pigments de couleur (les chlorophylles).

Filtration qui utilise des filtres de Niagara, composés de 22 plaques filtrantes ayant pour rôle une semi perméabilité avec des mayens de diamètre inférieur à 5µ qui ne laisse passer que les molécules d'huile et empêche la terre décolorante de passer.

Désodorisation réalisée par distillation, élimine les substances volatiles (aldéhydes et cétones), qui donnent à l'huile une odeur et une saveur désagréables, et les acides gras libres encore présents dont certains sont très sensibles à l'oxydation.

Principes et Etapes d'application de HACCP

Avant de mettre en place le système HACCP, il est nécessaire de répondre aux bonnes pratiques d'hygiène et aux programmes prés requis (**Benzouai, 2005**). On procède à une mise à niveau de l'entreprise à travers un diagnostic et une évaluation de l'existant selon les règles édictées par le programme des préalables, relatif au système HACCP qui repose sur 07 principes, qui constituent les étapes de 6 à 12.

Constitution de l'équipe HACCP (étape 1): Le personnel retenu pour constituer l'équipe HACCP, est choisi selon les critères de formation de base, d'expérience professionnelle et du poste occupé. L'entreprise devrait s'assurer qu'elle dispose d'experts et de techniciens spécialisés dans le produit en cause pour mettre au point un plan HACCP efficace. En principe, elle devrait constituer à cet effet une équipe multidisciplinaire. Si de tels spécialistes ne sont pas disponibles sur place, il faudrait s'adresser ailleurs.

Description du produit (étape 2): Procéder à une description complète de la matière première et du produit fini (l'huile AFIA) notamment de donner des instructions concernant sa sécurité d'emploi telles que composition, structure physique/chimique (pH, indices d'acide, de peroxyde, de saponification), traitements thermiques, emballage, durabilité, conditions d'entreposage et méthodes de distribution.

Détermination de l'utilisation prévue du produit (étape 3) : L'huile alimentaire (AFIA ou OLEOR) est prête à la consommation par toute la population. Elle est livrée à des dépositaires, grossistes et des détaillants et vendue dans les restaurants, transportée dans des camions, entreposées dans un endroit tempéré.

Établissement d'un diagramme des opérations (étape 4): C'est l'équipe HACCP qui doit établir un tel diagramme, qui comprendra toutes les étapes des opérations.

Vérification sur place le diagramme des opérations (étape 5): L'équipe HACCP devrait vérifier sur place le déroulement des différentes opérations de la production par rapport au diagramme à toutes les étapes et à tout moment du processus.

Analyse des dangers (étape 6/principe 1) : L'équipe HACCP devrait énumérer tous les dangers attendus à chacune des étapes : production primaire, transformation, fabrication, distribution et consommation. Les dangers peuvent être microbiologiques (mouches et moustiques), chimiques (pesticides, métaux lourds, produits chimiques) ou physiques (verre, cheveux).

Détermination des points critiques à maîtriser (étape 7/ principe 2) : La détermination d'un CCP dans le cadre du système HACCP peut être facilitée par l'application d'un arbre de décision (Tableau I).

Tableau I - Arbre de décision pour CCP1, CCP2 et CCP3.

CCP	Application de l'arbre de décision pour		
	CCP1	CCP2	CCP3
Etape	Neutralisation de l'huile brute	Décoloration de l'huile brute	Désodorisation de l'huile brute
Danger	Taux de savon formé lors de la neutralisation est élevé (1250 ppm)	couleur de l'huile est hors norme (8,5 Red)	Acidité élevée dans l'huile désodorisée (FFA= 0,085%)
Origine (5M)	Méthode de travail inadaptée, non respect des PBH et négligence)		
	Dosage de soude insuffisant	Qualité de la terre décolorante est hors norme).	Dosage de l'acide citrique en excès

Fixation des seuils critiques pour chaque CCP (étape 8/principe3) : Il faut fixer des seuils correspondants à chacun des points critiques pour la maîtrise des dangers tels que la température, taux humidité, le pH, le chlore disponible, l'aspect à l'œil nu et la consistance. Les seuils critiques pour le CCP1 (taux de savon doit être inférieur à 700 ppm) ; pour le CCP2 (couleur de l'huile brute doit être inférieure à 4,5 Red) et pour le CCP3 : acidité (FFA) de l'huile désodorisée doit être inférieure à 0,06%).

Mise en place un système de surveillance pour chaque CCP (étape 9/principe 4) Un tel système de surveillance permet de mesurer ou d'observer les seuils critiques correspondants à un CCP en adoptant certaines questions (Quoi, Comment, Quand, Qui et Où ?). Les procédures appliquées détectent toute perte de maîtrise. En outre, les renseignements seront communiqués en temps utile, de façon à éviter le dépassement des seuils critiques.

Mise en place des mesures correctives (étape 10/principe 5) qui doivent être spécifiques pour chaque CCP, dans le cadre du système HACCP, afin de pouvoir rectifier les écarts, s'ils se produisent. Ces mesures doivent garantir que le CCP a été maîtrisé, prévoir le sort réservé au produit en cause et consignées dans les registres.

Prévoir des procédures de vérification (étape 11/principe 6) : Recours à des méthodes, des procédures et des tests de vérification et d'audit, pour déterminer si le système HACCP fonctionne correctement, par exemple il faut: passer en revue le système HACCP et les dossiers; prendre connaissance des écarts constatés et du sort réservé au produit et enfin vérifier que les CCP sont bien maîtrisés.

Constitution des dossiers et registres (étape12/principe7) : La tenue de registres (activités de surveillance des CCP, écarts et mesures correctives) et des dossiers (analyse des dangers, détermination des CCP et des seuils critiques) est indispensable à l'application du système HACCP.

Conclusion

Certains dangers identifiés lors des étapes du raffinage de l'huile brute sont maîtrisés par l'entreprise dans le cas des BPH et BPF et d'autres présentent des points critiques nécessitant la mise en place de procédures de contrôle, de surveillance et de vérification, traduites par un

plan HACCP. L'unité AFIA adopte quotidiennement la maîtrise des risques et incite le personnel à veiller à l'instauration des pratiques qualités conformes à la norme ISO 9001 (2008) ;

Bibliographie

- Benzouai, M. (2005) - Mise en place d'un système de gestion pour l'amélioration de la qualité par la maîtrise des procédés dans l'industrie agroalimentaire. Thèse de magister. Université Hadj Lakhdar Batna-Alegria, 112 pages.
- Hamza, O. (2012) - Sécurité sanitaire des aliments, commerce et développement : approche par l'Economie Industrielle. Université Panthéon-Affas. Thèse de doctorat, 250 p.
- Lhoutellier, P. (1995) - La méthode HACCP : Principes et mise en œuvre.
- Soubra, L. (2008) - Evaluation scientifiques des risques toxiques liés à certaines substances chimiques et contaminants. Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement (agro paris tech). Thèse de doctorat. 198 p.

ANALYSIS OF FLOODS IN 2010 IN THE EASTERN SLOVAKIA

Martina Zeleňáková

Department of Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering of the Technical University of Košice
martina.zelenakova@tuke.sk

Maria Manuela Portela

Department of Civil Engineering, Architecture and Geo Resources, Technical University of Lisbon
maria.manuela.portela@ist.utl.pt

Lenka Gaňová

Department of Environmental Engineering, Faculty of Civil Engineering of the Technical University of Košice
lenka.ganova@tuke.sk

ABSTRACT

The main cause of flood events that has occurred during May and early June 2010 in the Slovak republic and culminated in a historic flood situation was not only day of rich and intense rainfall, but high saturation of basins affected by the previous rainy season. The flood situation in May and June 2010 at river basins of the eastern Slovakia has brought great damage to property, such as landslides, damaged houses, gardens, cottages, damaged highways and local roads, bridges, cemeteries, flooded buildings, wells and mosquito strikes after floods. The paper is focused on the analysis of the flood situation in the spring of 2010 at the eastern Slovakia.

Keywords: floods, damages, eastern Slovakia.

Introduction

Spring and summer weather brings an increased risk of a range of extreme weather events, from heat to severe storms, often accompanied by torrential rain, storms, lightning or even hail or tornado. Intense rainfall can lead to the formation of local floods. Extensive regional flooding together with local torrential rains and storm are probably the biggest natural hazard associated with extreme summer precipitation. With relatively high certainty we now know that the ongoing climate change, extreme summer precipitation and hence flooding is even more amplified [1].

The main cause of flood events that occurred during May and early June 2010 and culminated in a historic flood events were not only long lasting and intense rainfall, but also high saturation of the basin, influenced by previous rainy period (Kyselova *et al.*, 2010). In Slovakia spring 2010 was a temperature just above the normal and had an average air temperature above the long-term average from the period 1951 to 1980 by 0.8 to 1.5°C. Precipitation totals in Slovakia were very high, averaging about 200 mm (from 203 stations), it is about 300% of the long-term average period 1901-1990 (hence record since at least 1881) (Pecho *et al.*, 2010).

Flood situation

Eastern Slovakia was hit by the floods from mid May 2010. Upper sub-basins of Hornád river and its tributaries have been affected by the floods with moderate significance, while the middle and lower sub-basin have been significantly affected, as well as tributaries in the south-east of Slovakia, with disastrous consequences. In early June, extreme precipitation finally hit supersaturated water basins and caused flooding in many parts with flows of return periods of 50 to 100 (Simonová *et al.*, 2010). Courses of water levels (Zeleňáková and Gaňová, 2011) at river stations in the river basin Bodrog and Hornád for May and June are shown in Figures 1 - 4. The data were provided from Slovak Water Management Enterprise, state company, branch office Košice.

Figure 1 Courses of water levels at river stations in the river basin Bodrog in May 2010

Height of water level in cm

Figure 2 Courses of water levels at river stations in the river basin Bodrog in June 2010

Height of water level in cm

Figure 3 Courses of water levels at river stations in the basin Hornád in May 2010

Figure 4 Courses of water levels at river stations in the basin Hornád in June 2010

It is possible to see the course of floods from Figures 1 to 4 in separate river stations during the flood period in May and June 2010.

Figure 5 presents number of flood days during period 1990-2011 in Slovakia in comparison with number of flood days in eastern Slovakia according the data of Slovak Hydrometeorological Institute.

Figure 5 Number of flood days during the period 1990-2011

The floods in 2010 brought for region of eastern Slovakia in short time many extended floods with disastrous consequences with the high costs (Figure 6).

Figure 6 Flood damage during the period 1997-2011 (Zeleňáková, 2011)

Figure 6 presents the costs of flood damages at property of Slovak Water Management Enterprise, s.c. branch office Košice in eastern Slovakia during period 1997-2010. As is shown in figure 6 a downward trend exists in flood damage (without extreme year 2010), it can be causes of the construction of flood protection in the study area.

Conclusion

Flood situation in May and June 2010 on the flows of eastern Slovakia has brought great damages. After intense rains 300,000 hectares of agricultural land were flooded, this is 15 percent of the total arable soil. Farmers estimated that rains damaged 150,000 hectares. Damages in agriculture exceeded 100 million euro in whole Slovakia. Damages on forests in Slovakia were about 5,7 million euro, where repair of forest road network required investment of € 3,250,000 and another investment of 600 thousand euro. The government calculated the total damage at approximately 650 million euro. This damage represents 250 million euro to government property, and citizens quantify damage to 325.8 million euro and the municipalities for € 51,2 million.

For flood mitigation of damage to property of individuals was released 25 million euro from the state budget. Nearly 5,75 million euro was used for an immediate solution to repair infrastructure of state companies in the water and forestry industry.

Acknowledgments

This work has been supported by the Slovak Research and Development Agency SK-PT-0001-12.

Bibliography

- Kyselová, D., Hrušková, K., Slivka, M., Jarošová, M., Borsányi, P. (2010) - *Povodňová situácia v povodiach Hrona, Ipl'a a Slanej, máj- jún 2010*. Banská Bystrica. Slovak Hydrometeorological Institute. Júl 2010. [online]. http://www.shmu.sk/File/Povodnova_situacia_na_tokoch_stredneho_Slovenska_v_maji_a_juni_2010.pdf
- Pecho, J., Faško, P., Lapin, M., Kajaba, P., Mikulová, K., Šťastný, P. (2010) - *Extrémne atmosférické zrážky na jar a na začiatku leta 2010 na Slovensku*. Bratislava. Slovak Hydrometeorological Institute. Climatology division.

- Simonová, D., Holubecká, M., Jarošová, M., Smrtník, M. (2010) - *Povodňová situácia ba východnom Slovensku v máji a júni 2010*. Košice. Máj - jún 2010. [online]. http://www.shmu.sk/File/Povodnova_situacia_na_tokoch_vychodneho_Slovenska_v_maji_a_juni_2010.pdf
- Zeleňáková, M., Gaňová, L. (2011) - Povodne na východnom Slovensku - máj, jún In: *Woda i surowce odnawialne a ich oddziaływanie na srodowisko naturalne*. Brzozow: Muzeum regionalne im. Adana Fastnachta w Brzozowie, p. 121-136.
- Zeleňáková M. (2011) - Flood risk assessment and management in Slovak republic, e-GFOS, 2(3), p. 113-119.

SUSCEPTIBILIDADE DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VEZ AO RISCO DE CHEIA

Maria Augusta Fernández Moreno

CITTA/FEUP/FCTUC

mariaaugusta_fernandez@yahoo.com

Glória Gonçalves

CEG - Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa

Doutoranda da Universidade Aberta

goncalves.gloria@gmail.com

RESUMO

O uso sustentado da bacia hidrográfica do rio Vez (BHRVez) depende, entre outros fatores, da gestão do risco associado as inundações que afetam as áreas rurais e perímetros urbanos com registos históricos de pelo menos um século. Numa fase inicial da determinação do risco estamos a priorizar os sujeitos em risco e consequentemente, os fatores e as principais variáveis para cada cenário de risco. Conforme a metodologia TRUE de Fernández Moreno, existem vários tipos de suscetibilidades que se conjugam para criar o risco de cheia. A suscetibilidade natural será calculada com os modelos de E. Reis (aproximação automática) e M. Leal (modelo robusto). Para a suscetibilidade social, além dos censos e de registos históricos, verificamos a possibilidade de testemunho para os vários eventos ocorridos durante os séculos XX e XXI, de forma a caracterizar as dinâmicas demográficas e socioeconómicas contribuintes ao risco. O inventário de perdas ocorridas durante eventos de cheia será utilizado para validação.

Palavras-chave: precipitação; escoamento; cheias, risco; vulnerabilidade; bacia; TRUE

Introdução

A precipitação, além de condicionar os recursos hídricos de uma região e a erosão do solo, é considerada o fator principal desencadeante das. A gestão do risco de cheias tem vindo a ser controlada pelos diques construídos ou outras obras de proteção, a partir do conhecimento da probabilidade de inundação. A compreensão refinada da sensibilidade da resposta hidrológica para o uso do solo é considerada importante para a tomada de decisão sobre a gestão dos riscos de inundação. Contudo, esta abordagem para o controlo de risco de inundações tornou-se cada vez mais contestada, sendo que na atualidade a água está (re)ligada a outros valores, como a natureza, a preservação da paisagem e das atividades económicas (Correljé & Broekmans, 2014). O controlo do canal de uma bacia hidrográfica ou as perdas de espaço de armazenamento e retenção natural através da intervenção humana na natureza são muitas vezes vistos como a causa de inundações. Ainda mais, está em aberto a discussão sobre as incertezas nos modelos de precipitação escoamento na predição dos efeitos hidrológicos causados pelas mudanças de uso de solo (Lane 2014) e pelas mudanças climáticas (Hegger et al., 2014).

Doutra parte, o risco desde uma perspetiva territorial, compreendido como a construção socio-natural espaço-temporal, resulta da acumulação de relações desequilibradas entre os fatores de origem natural e antrópico que compõem o território (Fernández Moreno 2013). Está determinado por uma diversidade de fatores, onde a precipitação tem o mesmo peso que os outros. É dinâmico e cambiante no tempo e no espaço, pelo que uma cheia para a sociedade em 2014 poderá não ter sido para a população do início do século e vice-versa. Por tanto, o risco de um território poderá ser melhor compreendido através da observação de uma sucessão de cenários espaço-temporais tendo em conta, entre outros indicadores, a perceção da população (Becker, Aerts, & Huitema, 2014).

No caso da BHRVez, que tem sofrido poucas alterações ao longo do tempo, onde as obras de controlo de grande dimensão, como barragens, não existem, apenas pequenas obras de proteção contra as cheias, adquirem um significado mais próximo do pensamento de Correljé & Broekmans (2014). Portanto, o objetivo desta pesquisa ainda em desenvolvimento, é determinar o conjunto de variáveis que compõem cada cenário de risco da bacia ao nível local ao longo do tempo, para cada sujeito em risco. Trata-se da reconstrução de vários puzzles em vários momentos da sua história de cheias.

Caraterização da área de estudo

A BHRVez localiza-se no noroeste de Portugal. Forma parte da bacia hidrográfica do rio Lima, sendo o Vez o seu principal afluente, inserido na sua totalidade no concelho de Arcos de Valdevez (fig.1). O rio Vez nasce na Serra da Peneda por cima dos 1300 m de altitude e tem um comprimento aproximado de 36 km percorrendo uma fratura de alinhamento N-S perpendicular ao rio Lima até aos 15 m de altitude (freguesia de São Paio de Jolda) onde desagua no rio Lima. Mostra um declive muito acentuado na parte montanhosa sendo que em 1000 m de desnível percorre 15,6 Km, desde a Serra da Peneda até Sistelo (PMDFCI AVV, 2007). Tem uma área de bacia arredondada de 263,3 km² (Atlas de Agua).

Figura 1 - Rede hidrográfica da BHRVez. Adaptado de Atlas do Ambiente, 1998.

Da nascente no norte para a foz no sul, os afluentes mais importantes do rio Vez são o rio Cabreiro que drena uma área de 34,8 Km², o ribeiro de Frades que drena uma área de 18,3 Km², fundamentalmente em zona urbana, o ribeiro de São Mamede que drena uma área de 13,0 Km², o rio Azere que drena uma área de 52,4 Km² e o rio Frio que drena uma área de 17,8Km² (fig. 1). A parte superior da BHRVez está inserida na margem da Serra do Soajo no Parque Nacional da Peneda Gerês e foi classificada como Sítio de Importância Comunitária para a conservação devido à diversidade de habitats e espécies que albergam as margens do rio.

O clima está fundamentalmente determinado pela altitude e pela influência atlântica. A temperatura média anual é de cerca de 10°C, variando aproximadamente entre 9,5°C nas terras de alta montanha (1300-1400 m de altitude) e 16° nas zonas baixas (altitude inferior a

250 m) (Moreira Santos 2009). Verificam-se os valores de precipitação mais elevados de Portugal, com uma precipitação média anual entre 2000 mm e 2400 mm (PMDFCI AVV, 2007) e regista os maiores quantitativos de precipitação diária (Ferreira, 2005). Segundo Ribeiro (1987), nas montanhas do noroeste, nenhum mês pode ser considerado seco, sendo a única área de Portugal Continental que foge à típica *secura* do verão mediterrâneo.

A população em Arcos de Valdevez entre 1864 a 1911 teve um aumento de cerca de 135%. De 1911 e 1920 a população quase não aumentou devido às epidemias e à Primeira Grande Guerra. A partir de 1940, assiste-se ao declínio do crescimento da população pela emigração, diminuição da natalidade, com interrupções devidas aos períodos de decrescimento da emigração. Na atualidade, prevalece uma população envelhecida (INE, 2011) com nível de educação maioritariamente baixo, embora com um valor percentual muito reduzido de residentes com grau de instrução superior. Segundo Medeiros (2000), o envelhecimento da população está em parte relacionada com as melhorias das condições de existência dos habitantes, que condiciona o aumento da duração média da vida e o decréscimo da fecundidade.

A ocupação do território retrata o sintoma do nível de vida das populações, limitados pelos condicionalismos financeiros e económicos existentes. Após o 25 de Abril de 1974 pretendeu-se apoiar a construção social para populações mais desfavorecidas em termos económicos e ocorreram iniciativas de acesso ao crédito para aquisição de habitação própria o que facilitou o aumento da construção de novas habitações (Medeiros, 2000). Na atualidade, a principal atividade económica continua a ser a agricultura, complementada com alguma atividade turística.

Enquadramento teórico

O risco é o resultado da acumulação desequilibrada de fatores antrópicos e naturais no território. Portanto, o território é apreendido como um sistema onde tanto os fatores antrópicos como os naturais fazem igualmente parte do sistema, mesmo tendo ambos uma natureza instável. Sendo que o risco materializa-se em pontos específicos do território, a escala de observação é fundamental. A proximidade revela que o território é um espaço não contínuo de risco intercalado por *hot spots*. Por tanto, a escala local será necessária para compreender os processos de construção do risco. O território será dividido em Unidades Territoriais de Risco (TRUE). O risco do território será a acumulação do risco das TRUEs. Neste enfoque considera-se a vulnerabilidade de cada TRUE como um todo (Fernández Moreno 2013).

Proposta de modelização do risco de cheias da BHVez

Nesta primeira fase, pretende-se definir os componentes das TRUEBHRVez.

Sujeito em risco: Existem vários tipos de sujeitos em risco numa bacia e por tanto, podem identificar-se vários tipos de TRUEs, sendo necessário prioriza-los porque o que é risco para um Sujeito, pode ser oportunidade para outro. O território terá uma valoração de risco por cada tipo de TRUE definida;

Unidade territorial: Trata da mínima área considerada para a análise. Para cada TRUE, corresponde uma unidade territorial.

Fator Suscetibilidade natural às cheias: Trata de um fator comum para todos os sujeitos em risco identificados. Além dos fatores atmosféricos, as cheias são consequência de uma diversidade de outros fatores. Leal (2013) propõe uma metodologia que conjuga os fatores que condicionam as cheias: rede de drenagem, relevo, substrato geológico e geometria da bacia.

Esta metodologia impõe a necessidade de contar com dados ao nível sub-bacia, sendo que, como explica Leal, é capaz de dotar à análise de grande robustez. Eusébio propõe um método de avaliação automática que efetua um diagnóstico das condições da bacia, de uma forma simplificada e expedita a partir das potencialidades do SIG. No modelo mais simples utiliza a área acumulada, a permeabilidade e o declive e podem acrescentar-se outras variáveis como distribuição espacial das chuvas, permeabilidade, influência da ocupação do solo, tempo de concentração, entre outros. Para a validação do modelo utiliza a concordância espacial com os registos históricos (Reis 2011).

Fator demográfico e socioeconómico: Por enquanto, como indicadores de suscetibilidade à perda da saúde têm sido considerados principalmente, idade, elementos da família e trabalhadores do setor primário. Para a suscetibilidade à perda dos postos de trabalho e, danos aos edifícios e a rede viária, os indicadores principais serão de exposição: declive, altura sobre o nível do leito do rio e distância ao leito. No que diz respeito à produção agrícola, além das variáveis de exposição, será desenvolvida uma pesquisa entre os agricultores com o objetivo de introduzir um vetor económico neste tipo de suscetibilidade.

Conclusões

Esta é uma pesquisa em curso sobre a BHRVez, que busca encontrar nos cenários de risco pistas para a gestão sustentável evitando custos elevados, sejam de proteção ou de recuperação. Estamos na fase de caracterização da bacia, e de identificação dos tipos de suscetibilidade e das variáveis que lhes definem, tarefas que ainda estão em curso.

Bibliografia

- Atlas da Água SNIRH Classificação Decimal das Linhas de Água. Página visitada em 12 de fevereiro de 2010.
- Becker, G, Aerts, JCJH, & Huitema, D. (2014). Influence of flood risk perception and other factors on risk-reducing behaviour: a survey of municipalities along the Rhine. *Journal of Flood Risk Management*, 7(1), 16-30.
- Correljé, Aad, & Broekmans, Bertien. (2014). Flood risk management in the Netherlands after the 1953 flood: a competition between the public value (s) of water. *Journal of Flood Risk Management*.
- Fernández Moreno, M.A. 2013. “De Los Riesgos Naturales a Los Riesgos Del Territorio: Las Unidades Territoriales Como Medio Para Comprender Los Escenarios de Riesgo”. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- Ferreira, D. d.B (2005) O ambiente climático. Em C.A. Medeiros (Ed.), *Geografia de Portugal* (Vol. 1- Ambiente Físico). Lisboa_ Círculo de Leitores.
- Hegger, Dries LT, Driessen, Peter PJ, Dieperink, Carel, Wiering, Mark, Raadgever, GT Tom, & van Rijswijk, Helena FMW. (2014). Assessing Stability and Dynamics in Flood Risk Governance. *Water Resources Management*, 1-16.
- INE, 2011. 1801 a 2011: Anuário Estatístico da Região Norte. Instituto Nacional de Estatística.
- Lane, S. N. 2014. “Acting, Predicting and Intervening in a Socio-Hydrological World.” *Hydrology and Earth System Sciences* 18 (3): 927-52.
- Leal, M. 2013. “Proposta de Um Método de Avaliação Da Suscetibilidade Natural Às Cheias Em Pequenas Bacias Hidrográficas.” *VI Congresso Nacional de Geomorfologia Atlas/Proceedings*: 156-59.
- Medeiros, C. A., 2000. Atividades rurais. *Geografia de Portugal. Ambiente Natural e ocupação Humana. Uma introdução*. Editorial Estampa, 163-202, p.195.

- Moreira Santos, M. 2009. "Precipitações Extremas Na Área de Arcos de Valdevez: Análise Estatística E Contastes Espaciais". Universidade do Porto.
- PMDFCI ARCOS DE VALDEVEZ. 2007. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios Concelho de Arcos de Valdevez. Município de Arcos de Valdevez, Gabinete Técnico Florestal e Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
- Reis, e. 2011. "Análise de Bacias Hidrográficas, Suscetibilidade À Ocorrência de Cheias E Sistemas de Informação Geográfica: Da Definição Do Quadro Conceptual Até À Proposta de Um Modelo de Avaliação". presented at the VII Congresso da Geografia Portuguesa, Lisboa.
- Ribeiro, O. Lautensach, H. & Daveau S. (1987) Geografia de Portugal, o ritmo climático e a paisagem (Edições João Sá da Costa ed. Vol. 2) Lisboa.

CARACTERIZAÇÃO E MEDIDAS MITIGADORAS DAS INUNDAÇÕES EM VILAMOURA, ALGARVE

Rui Lança

Instituto Superior de Engenharia / Universidade do Algarve
rlanca@ualg.pt

Vera Rocheta

Instituto Superior de Engenharia / Universidade do Algarve
vrocheta@ualg.pt

Fernando Martins

Instituto Superior de Engenharia / Universidade do Algarve
fmmartin@ualg.pt

Helena Fernandez

Instituto Superior de Engenharia / Universidade do Algarve
hfernand@ualg.pt

Celestina Pedras

Faculdade de Ciências e Tecnologia / Universidade do Algarve
cpedras@ualg.pt

RESUMO

Este artigo visa analisar as inundações da Ribeira do Vale Tesnado, zona poente de Vilamoura (Algarve), e as soluções integradas que geram a diminuição da probabilidade e da magnitude das mesmas.

Para tal, esta análise foi dividida em quatro etapas: i) estudo hidrológico da bacia hidrográfica a montante, com vista à determinação de caudais de cheia; ii) estudo hidrodinâmico, no qual se efetua a modelação numérica do escoamento na zona com risco potencial significativo, considerando o efeito das diversas estruturas hidráulicas existentes; iii) identificação dos níveis atingidos pela inundação associada a períodos de retorno de 10 e 100 anos e mapeamento das áreas inundáveis; iv) análise de resultados e identificação de soluções integradas com vista à minimização da frequência e da magnitude das inundações. A aferição do modelo foi realizada através da comparação dos níveis de cheia observados a 8 de novembro de 2012 (com base em testemunhos locais, marcas de cheia, fotografias e vídeos) com os obtidos da modelação numérica.

Palavras-chave: Cheias, modelação hidrológica, modelação hidrodinâmica.

Introdução

As inundações são um problema recorrente em muitas áreas urbanas. Desde há muito tempo, que a pressão antrópica conduz a que as populações se fixem junto a cursos de água construindo habitações nos leitos de cheia das mesmas. Nas últimas décadas, viveu-se um período de expansão/pressão urbanística em que, apesar de todo o conhecimento adquirido, se continuou a construir em leito de cheia (Debo *et al.* 1995).

A elaboração dos estudos de mapeamento e minimização das áreas inundáveis dividem-se essencialmente em quatro fases: i) estudo hidrológico ii) estudo hidrodinâmico; iii) identificação dos níveis atingidos pela inundação e mapeamento das áreas inundáveis; iv) análise de resultados e identificação de soluções integradas com vista à minimização da frequência e magnitude das inundações.

Cheias anteriores

A 8 de novembro de 2012 ocorreu um fenómeno de precipitação intensa em Vilamoura. A Figura 1 apresenta os dados registados em duas estações meteorológicas: estação VITÓRIA, localizada nos campos de golfe oceânico; e estação IFAROVILE2 da rede *weather underground*. O pico

máximo registrado foi de 33 mm/hora na estação VITÓRIA. Nesta figura observa-se ainda as curvas de intensidade duração frequência (IDF) do Decreto Regulamentar 23/95, para os períodos de retorno de 100, 50 e 10 anos, considerando uma chuva com intensidade constante e duração de 4 horas (duração aproximada do período de tempo em que se observaram valores elevados de precipitação). O valor máximo instantâneo de 33 mm/hora é assim superior ao valor obtido pela curva IDF para o período de retorno de 100 anos, mas quando se observa a precipitação total em 4 horas (duração aproximada do evento), os valores registrados são próximos dos obtidos pela curva IDF para o período de retorno de 50 anos.

O evento meteorológico causou inundações severas em todo o vale da Ribeira do Vale Tesnado, dando origem a danos em moradias, infraestruturas e campos de golfe. A Figura 2a mostra a inundação no parque de máquinas do Grupo Oceânico e a Figura 2b no viaduto da Avenida Vilamoura XXI.

Figura 1 - Precipitação horária observada na estação VITÓRIA e estação IFAROVILE2 em Vilamoura

Limite do estudo

Área inundável, T_r10

Área inundável, T_r100

Figura 2 - Efeito da cheia ocorrida a 8 de novembro de 2012 na zona urbana de Vilamoura:

a) parque de máquinas do Grupo Oceânico; b) viaduto da Avenida Vilamoura XXI

Estudo hidrológico

A Ribeira do Vale Tesnado a montante da Aldeia do Golfe apresenta uma bacia hidrográfica com 35.0 km². A linha de água principal tem 9.85 km de comprimento e apresenta uma declividade equivalente constante de 1.84%.

Os solos são predominantemente: mediterrânicos vermelhos ou amarelos de materiais calcários normais, de calcários compactos ou dolomia; afloramentos rochosos de calcário; calcários vermelhos dos climas de regime xérico normais (Kopp *et al.* 1989). Nesta área de estudo, o uso do solo compreende um misto de pomares; vegetação arbustiva alta e floresta degradada ou de transição; culturas anuais.

De acordo com as características da bacia hidrográfica obteve-se: curva número, $CN = 86$; tempo de concentração, $T_c = 1,80$ horas, com base no método de Kirpich (Lencastre 1992). Os caudais de ponta de cheia para períodos de retorno foram determinados pelo método do hidrograma unitário triangular (HUT), ver Chow *et al.* (1988). Na análise foram consideradas as curvas de intensidade duração frequência (IDF) do DR 23/95. Para $T_r = [2; 5; 10; 50; 100 \text{ anos}]$, obteve-se $Q = [22; 46; 66; 116; 142 \text{ m}^3\text{s}^{-1}]$.

Estudo hidrodinâmico

Para simular o escoamento superficial em regime permanente na linha de água e margens inundáveis utilizou-se o programa *Hydraulic Engineering Center - River Analysis System* (HEC-RAS) desenvolvido pelo *United States Army Corps of Engineers* (Brunner, G. 2002). O domínio espacial do estudo hidrodinâmico corresponde a 2250 m da linha de água principal e 940 m de um afluente secundário. Existem diversas estruturas, como passagens hidráulicas e pontes que devido às suas dimensões causam obstrução do escoamento e sobrelevação do nível da inundação a montante.

Análise de resultados

As áreas inundáveis para $T_r = [10, 100 \text{ anos}]$ são apresentadas na Figura 3.

Figura 3 - Áreas inundáveis para $Tr = [10, 100 \text{ anos}]$ para a situação atual

A secção transversal do leito menor da Ribeira de Vale Tesnado é insuficiente para encaixar os caudais associados a $Tr = 100$ e de 10 anos, observando-se que as moradias e equipamentos ficam vulneráveis nas zonas z1, z2 e z3 (ver Figura 3). Esta situação é devida à insuficiente capacidade de vazão e galgamento das passagens hidráulicas (PH's) localizadas em B e C e à reduzida dimensão e falta de limpeza do troço de leito compreendido entre A e B. Como consequência do fraco declive, $i = 0.5\%$, o leito para encaixar os caudais Q_{100} e Q_{10} requer uma largura, $L_{100} = 50 \text{ m}$ e $L_{50} = 20 \text{ m}$.

Num ordenamento fluvial adequado deverá existir um leito menor para caudais frequentes ($Tr = 2$ a 5 anos) e um leito de cheia em que a subida esporádica do nível da água não coloque em risco pessoas e bens (Debo *et al.*, 1995). Devido aos constrangimentos existentes, as medidas de minimização da ocorrência das inundações passam assim, por substituir as PH's existentes entre os pontos A e D por passagens com perfil transversal que minimizem a obstrução ao escoamento (um único vão; encontros embutidos na margem; guarda corpos em tubo metálico com aberturas de grande dimensão) e promover a limpeza e retificação do troço entre os pontos A e B. As áreas inundáveis após as alterações propostas são apresentadas na Figura 4.

Figura 4 - Áreas inundáveis para $Tr = [10, 100 \text{ anos}]$ para a situação após intervenção

Da análise após implementação das medidas propostas, verifica-se uma redução significativa da área inundável e consequente diminuição do número de edificações vulneráveis a inundações frequentes ($Tr \leq 10 \text{ anos}$).

Conclusões

Este estudo apresenta uma metodologia para o mapeamento das áreas inundáveis e o conjunto de medidas mitigadoras que atendendo à disponibilidade de espaço, enquadramento paisagístico, biofísico e orçamento disponível, se consideram viáveis para a minimização das áreas inundáveis. Com base no caso de estudo da Ribeira do Vale Tesnado, Vilamoura (Algarve), as principais conclusões são:

- i) A dimensão do leito menor e consequente capacidade de vazão das secções transversais, passagens hidráulicas e pontes é francamente insuficiente face aos caudais produzidos pela bacia hidrográfica a montante.
- ii) Os leitos de cheia devem ter usos em que a subida do nível da água não provoque prejuízos significativos nem coloque em risco vidas humanas.
- iii) As soluções propostas permitirão melhorar o desempenho hidrodinâmico da linha de água através da substituição das passagens hidráulicas por pontes com desenho que não cause obstrução significativa ao escoamento e a limpeza e uniformização da secção transversal mínima do leito menor.

Bibliografia

- Brunner, G. (2010) - *HEC-RAS, River Analysis System Hydraulic Reference Manual*. Davis, US Army Corps of Engineers, 411 p.
- Chow, V.; Mays, L. e Maidment, D. (1988) - *Applied Hydrology*. New York, McGraw-Hill, 572 p.
- Debo, T. e Reese, A. (2003) - *Municipal Storm Water Management*. Boca Raton, CRC Press, 1142 p.
- Koop, E.; Sobral, M.; Soares, T. e Woerner, M. (1989) - *Os Solos do Algarve e Suas Características*, Faro, Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação - DGHEA. Direcção Regional de Agricultura do Algarve, DRAA. Sociedade Alemã de Cooperação Técnica, 179 p.
- Lencastre, A. e Franco, F. M. (1992) - *Lições de Hidrologia*, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 453 p.

SISTEMAS DE AVISO METEOROLÓGICO - ESTUDO COMPARATIVO DE AVISOS EMITIDOS, CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS REGISTRADAS E REGISTO DE OCORRÊNCIAS

Ricardo Gomes

Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM
ricardo.gomes@procivmadeira.pt

Válter Ferreira

Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM
valter.ferreira@procivmadeira.pt

Rafael Brites

Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM
rafael.brites@procivmadeira.pt

RESUMO

O Sistema de Avisos Meteorológicos (SAM) assegurado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera procede ao aviso da população em geral e, em particular, dos organismos e entidades com responsabilidade em matéria de segurança e proteção civil, para a possibilidade de ocorrência de situações meteorológicas adversas. O SAM depende da fiabilidade das previsões meteorológicas e é de extrema importância pois permite adequar as estratégias e procedimentos associados ao planeamento de emergência e atividades de prevenção, informação e socorro.

Com o objetivo de otimizar a utilização do SAM, procedeu-se a uma análise comparativa entre o registo de avisos meteorológicos emitidos diariamente entre 2011 e 2013, as condições meteorológicas e o registo de ocorrências de proteção civil nos mesmos dias. Analisou-se a quantidade e tipologia de ocorrências em dias normais e em dias com Aviso Vermelho e comparou-se o número de dias com aviso emitido com o número de dias com condições reais registadas que justificariam essa emissão.

Palavras-chave: Sistema de Avisos Meteorológicos, Ocorrências, Proteção Civil

Introdução

O Sistema de Avisos Meteorológicos (SAM) é assegurado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que conta a nível regional com colaboração do Observatório Meteorológico do Funchal (OMF). O IPMA, com base nas previsões meteorológicas efetuadas e num conjunto de critérios pré-definidos, emite avisos com o objetivo de alertar as autoridades de proteção civil e a população em geral para a possível ocorrência de situações meteorológicas extremas. Relativamente à ilha da Madeira, a emissão de avisos é, desde agosto de 2012, feita para três áreas geográficas: ‘Costa Norte’, ‘Costa Sul’ e ‘Regiões Montanhosas’. A emissão de avisos para Precipitação e Vento, entre outros, segue um critério regional comum, enquanto no caso da Temperatura o critério varia por área geográfica (IPMA, 2014).

Com este trabalho pretende-se contribuir para otimizar a utilização operacional do SAM, comparando os avisos emitidos com os registos meteorológicos nos mesmos dias, e explorando a possibilidade de a situações meteorológicas extremas corresponder um acréscimo de ocorrências de proteção civil.

Metodologia

Foram recolhidos junto do OMF dados relativos a avisos do SAM emitidos entre 2011 e 2013 para as situações de Vento, Precipitação e Temperatura elevada bem como registos para o mesmo período de 6 estações meteorológicas tomadas por referência: S. Jorge e S. Vicente (Costa

Norte); Observatório e Ponta do Sol (Costa Sul); Areeiro e Bica da Cana (Regiões Montanhosas). Junto do Comando Regional das Operações e Socorro (CROS) recolheu-se o registo de ocorrências diárias para o mesmo período.

Analisaram-se os dados relativos à ilha da Madeira, que concentra a maioria das ocorrências da RAM, e utilizaram-se as tipologias de Aviso mais relevantes do ponto de vista operacional - Precipitação, Vento e Temperatura, e três níveis de Aviso: Amarelo, Laranja e, sobretudo, Vermelho. Analisou-se a evolução da frequência, tipologia, nível e distribuição de avisos emitidos e confrontaram-se os registos de avisos emitidos com as condições meteorológicas registadas nos mesmos dias, nas estações meteorológicas consideradas, nomeadamente nos dias em que efetivamente se atingiram os limiares definidos pelos critérios de emissão de Aviso. Identificados os dias em que registos de pelo menos uma estação correspondem aos critérios para emissão de Aviso Vermelho relativo a Precipitação, Vento ou Temperatura elevada, analisou-se o número de ocorrências do CROS para os mesmos dias e comparou-se com a média diária de cada mês, para o período 2011-2013, desse tipo de ocorrências. Para cada tipo de condição meteorológica selecionou-se um conjunto de tipologias de ocorrência que, com base na experiência operacional se considerou mais pertinente e que habitualmente implica acréscimo na mobilização de meios. A significância da correlação entre a existência ou não de situações meteorológicas equivalentes a critérios de emissão de Aviso Vermelho e o aumento de ocorrências foi estatisticamente validada.

Resultados

Entre 2011 e 2013 houve um aumento muito significativo dos avisos do SAM emitidos para a RAM, e para a Ilha da Madeira em particular, onde aumentou de 137 em 2011 para 495 em 2013. O número de dias sujeito a aviso também aumentou, ainda que menos significativamente, de 153 dias em 2011 para 215 em 2013.

Considerando os avisos para situações de Vento, Precipitação e Temperatura, a tipologia com maior aumento relativo de número de avisos foi o Vento e a que teve maior aumento relativo de dias com emissão de avisos foi a Temperatura. Em 2011 as situações de Vento coincidiam quer como as que tinham suscitado mais avisos (39%) quer com mais dias com aviso emitido (38%). Em 2012 e em 2013 a Precipitação concentrou a maioria dos avisos emitidos (41% e 39%). A Temperatura representou em 2012 e 2013 o maior peso no número de dias com aviso emitido (54% e 50%).

Considerando os avisos emitidos e o número de dias sujeitos a aviso para as três tipologias referidas, o rácio passou de 0,8 avisos por dia sob aviso em 2011, para 1,3 em 2012 e 2 em 2013, o que significa que a atualização dos avisos se tornou mais frequente. A Precipitação teve o rácio mais alto em 2011 e 2012 (2,1). Em 2013 o rácio da Precipitação foi também elevado (2,6) mas ultrapassado pelo relativo a Vento (3,1).

Entre 2011 e 2013 houve um agravamento no que se refere aos níveis de aviso. Os avisos de nível Amarelo desceram de 91% para 76%, enquanto os de nível Laranja passaram de 9% para 19% e os de nível Vermelho passaram de 0% em 2011 para 5% em 2013.

Avisos emitidos e condições meteorológicas registadas

Foram identificados os dias para os quais houve avisos emitidos relativamente a Vento, Precipitação ou Temperatura elevada na ilha da Madeira, que posteriormente se confrontaram com o registo para esses dias das 6 estações meteorológicas tidas em consideração, de forma a

verificar se aos avisos correspondeu ou não a concretização de condições meteorológicas equivalentes, de acordo com regras de emissão do IPMA, em pelo menos uma das estações. Consideram-se dois critérios de análise: um que inclui apenas dias em que o aviso emitido e o registo meteorológico foram do mesmo nível (Critério A) e outro que inclui também dias com até 1 nível de diferença (Critério B).

Em 2011, em 35% dos dias com aviso emitido para estas tipologias os registos das estações selecionadas registaram, em pelo menos uma delas, valores máximos equivalentes ao aviso emitido (se considerado o Critério B, 68%). Os avisos relativos a Vento são os que registam maior coincidência (52%) seguidos de Precipitação (36%). Considerando o Critério B, a correspondência foi de 68% para Vento, 50% para Precipitação e 100% para Temperatura elevada.

Em 2012 houve 23% de níveis coincidentes (Critério B, 73%). Os avisos relativos a Precipitação registaram a maior coincidência (48%), seguidos de Vento (36%) e Temperatura (5%). Considerando o Critério B, a correspondência foi de 78%, 44% e 84% respetivamente. Em 2013 houve uma coincidência entre emissão de aviso e registos meteorológicos em 45% dos dias (Critério B, 77%). Os avisos relativos a Vento registaram maior coincidência (58%), seguidos de Precipitação (43%) e Temperatura (38%). Considerando o Critério B, a correspondência foi de 91%, 56% e 80% respetivamente.

Condições meteorológicas registadas e avisos emitidos

Contabilizando os dias em que as condições de Vento, Precipitação ou Temperatura máxima justificariam a emissão de um aviso SAM, reportando-se às estações meteorológicas tomadas por referência, contabilizaram-se os dias em que tinha sido emitido um aviso para o mesmo fenómeno.

Em 2011, considerando os dias com registo meteorológico equivalente a aviso, a emissão de avisos do mesmo nível ocorreu em 43% e 42% dos dias, relativamente a Precipitação e Vento (Critério B, 57% e 55% respetivamente). As situações relativas a Temperatura elevada, pelo contrário, ainda que maioritariamente de nível Amarelo e representando maioria de registos, foram significativamente subestimadas. Em 2012, a coincidência entre dias com condições registadas equivalentes a aviso e dias com aviso emitido do mesmo nível foi de 45% para a Precipitação e 29% para Vento (Critério B, 73% e 35%). Relativamente a situações de Temperatura elevada, a correspondência foi de 2% (Critério B, 26%). Em 2013, a coincidência entre dias com condições registadas equivalentes a aviso e aviso emitido do mesmo nível foi de 43% para a Precipitação e 37% para Vento (Critério B, 56% e 58%). A percentagem de dias com emissão de avisos do mesmo nível relativamente a Temperatura foi de 9% (Critério B, 19%).

Condições meteorológicas adversas e registo de ocorrências

Considerando as estações meteorológicas utilizadas como referência, identificaram-se os dias em que as condições meteorológicas registadas corresponderam aos critérios de emissão de Aviso Vermelho e contabilizou-se o número de ocorrências registadas no CROS. Este número de ocorrências foi confrontado com a média diária de ocorrências para esse mês, nas mesmas tipologias, no período 2011-2013.

Em 2011 houve 2 dias com registo de condições meteorológicas equivalentes a Aviso Vermelho relativo a Temperatura. No primeiro caso o número de ocorrências foi ligeiramente inferior e no segundo foi ligeiramente superior à média. Em 2012 houve 10 dias nas mesmas condições e

em 2013 14 dias, não havendo uma tendência definida - em alguns casos o registo de ocorrências foi superior à média, nos outros inferior.

Relativamente à Precipitação, em 2012 houve 3 dias com registos equivalente a Aviso Vermelho, e nos 3 o aumento de ocorrências foi muito significativo - no mínimo 5 vezes mais. Em 2013 houve 2 dias com condições equivalentes a Aviso Vermelho, ambos com aumento significativo de ocorrências comparativamente à média - 41 e 15 ocorrências para um valor médio diário mensal para essas ocorrências de 3.

Relativamente ao Vento, em 2011 houve um dia com registo equivalente a Aviso Vermelho, sendo que o número de ocorrências (20) foi significativamente superior à média (0.42). Em 2013 houve 3 dias com registos equivalentes a Aviso Vermelho, um em março com 27 ocorrências (média é de 2,54) e dois em dezembro com 15 e 8 ocorrências (média é de 0,43).

Conclusão

Nos últimos anos, o número de avisos emitidos aumentou bastante, com atualizações mais frequentes ao longo do mesmo dia. Este aumento não foi tão expressivo no que se refere a dias com aviso emitido pelo que o rácio aviso/dia aumentou significativamente.

A comparação entre avisos emitidos e condições meteorológicas registadas revela que é significativa a correspondência entre dias com aviso emitido e a concretização de situações meteorológicas adversas registadas em pelo menos uma das estações consideradas. O aumento do número de dias com aviso emitido foi acompanhado por um aumento na fiabilidade dos mesmos. Refira-se ainda que as situações relativas a Vento e Precipitação são as que apresentam maior correspondência.

Verificou-se que as situações com maior correspondência entre dias com registos equivalentes a emissão de aviso e a existência de avisos emitidos nesses mesmos dias, referem-se a Vento e Precipitação, frequentemente ultrapassando os 50%, enquanto as situações relativas a Temperatura são mais subestimadas.

Já no que se refere à variação de ocorrências e mobilização de meios pelo CROS, verificou-se que relativamente a situações de Temperatura elevada, e para as tipologias de ocorrência correspondentes, não existe uma tendência definida. Já no que se refere a situações de Vento ou Precipitação intensa, verifica-se que os dias com condições equivalentes a Aviso Vermelho implicaram um número substancialmente mais elevado de ocorrências relacionadas com esses eventos - e a consequente mobilização de meios.

Considera-se pertinente alargar este estudo a um período mais extenso e a um maior número de estações meteorológicas, para uma análise mais detalhada e estatisticamente mais significativa.

Bibliografia

INE (2002-2013) - *Registo de óbitos diários*.

IPMA. (junho de 2014). *Crítérios de Emissão de Avisos*. Obtido de IPMA: <http://www.ipma.pt/pt/enciclopedia/otempo/sam/index.html?page=criterios.xml>

Serviço de Estatística Hospital Dr. Nélcio Mendonça (2003-2013) - *Registo de admissões no serviço de urgências*.

Serviço Regional de Proteção Civil, IP - RAM (2011-213) - *Ifprotect* [base de dados]. Funchal.

MARINE STORMS AND COASTAL RISK ALONG THE GULF OF BISCAY AREA: WINTER 2014

Domingo F. Rasilla

Departamento de Geografía, Urbanismo y OT, Universidad de Cantabria
domingo.rasilla@unican.es

Carolina Garmendia

Departamento de Geografía, Urbanismo y OT, Universidad de Cantabria
carolina.garmendia@unican.es

Juan Carlos García-Codron

Departamento de Geografía, Urbanismo y OT, Universidad de Cantabria
garciaj@unican.es

Victoria Rivas

Departamento de Geografía, Urbanismo y OT, Universidad de Cantabria rivasv@unican.es

ABSTRACT

Coastal storms are one of the most remarkable natural risk affecting coastal areas, and climate change might enhanced the intensity and frequency of those extreme events. The Gulf of Biscay area show evidences of historical episodes of storminess which remarkable consequences upon natural environment and human activities. The use of coastal spaces has increased during the last decades worldwide, and the Northern coast of the Iberian Peninsula has followed the same trend, increasing the amount of elements at risk.

An outstanding episode of coastal storminess was suffered by the northern coast of the Iberian Peninsula experienced during the January-February period of 2014. Impacts on the coastal environment were spread. A comprehensive analysis of oceanographic and meteorological data has been carried out to characterize the event and to place it in relation with the recent climate evolution of the Gulf of Biscay area.

Key words: marine storms, coastal risk, Gulf of Biscay.

Introduction

The coastal regions of Western Europe experienced, during the 2013-2014 winter, an outstanding episode of coastal storminess. The magnitude and extension of the impacts in countries like Ireland or the UK raised the interest of public, as reflected by the numerous Media entries. However, the effects of such stormy weather spread out through other regions, such as the northern coast of the Iberian Peninsula.

The objective of this contribution is to characterize the event through the analysis of the impacts on the coastal environment and its oceanography and meteorological background, placing it in relation with the recent climate evolution of the area. For such purposes, a comprehensive analysis of oceanographic (tide gauges, buoys) and meteorological data (synoptic reports, a circulation pattern catalogue and a cyclone track database, both derived from NCEP/REANALYSIS data), plus an analysis of the damages through newspapers, insurance reports and official statistics was carried out.

Oceanographic and atmospheric background

The analysis of significant wave height from two bouys offshore the western and northern coast of Spain shows three episodes of severe storminess (Figure 1). An earlier period, from mid-December 2013 to early January 2014, affected specially to the galician coast. A second episode, encompassing the end of January and the beginning of February, was equally severe in both sectors. A final storm, during the night of March 3th-4th, was specially severe along the northern coast.

Figure 1: Maximum daily Significant Wave height from two buoys from December 1st 2013 to March 5th 2014. The 8 m SWH equals the long-term daily 95th percentile.

However, no previous wave records were broken during the winter, since SWH values, although close to 12 m, did not exceeded the record wave heights during storm Klaus (24/02/2009). Consequently, the excepcionality of the event resulted by the persistence of a high energetic, but not extreme, climate wave (Figure 2). It displays the seasonally (DJF) accumulated values of H_s^2 , a comon measure of wave energy, derived from two wave models (Dodet et al, 2010), at the closest grid points to the city of Santander.

Besides waves, storm surges can help to rise sea beyond the normal levels. Nevertheless, as shown by figure 3, the surge values where moderated in comparison with examples from nearby coasts, where surges in excess of 1 m are common. Only when a coincidence exists between a large surge and a high tide a remarkable sea level rise can be possible, enhancing the probability of damages on the coast.

Figure 2: Wave energy evolution from two wave models (<http://www.sonel.org/> and <http://www.windguru.cz/>).

Figure 3: Sea level (upper panel) and non tidal residuals (surges, lower panel) measured in the tide gauge of Bilbao from January 1st to March 5th.

The analysis of the atmospheric conditions conducive to both wave storms and surges reveals subtle differences between both phenomena (Figure 4). Wave storms result from strong westerly winds blowing through a long fetch, developed around the equator side of deep lows crossing the British Islands. Conversely, anomalous surges coincide with lows crossing the Bay of Biscay.

Figure 4: Sea level pressure maps corresponding to a severe wave storm (Christine, 03/03/2014) and an elevated surge (Stephanie, 18/02/2014). Source: www.wetterzentrale.de

Temporal and spatial pattern of damage

The impact of these stormy episodes on the coastal environment was remarkable since they affect both public and private property. Urban promenade seafronts and other coastal infrastructures were flooded and sediment remobilization ending into huge beach erosion.

Moreover, urban furniture, dwellings, commerces, and vehicles suffered generalized damages. In a first approach, a rough procedure to quantify the damage is to evaluate economical investment in rehabilitation of original conditions, beach nourishment and compensation of losses. The provisional budget was estimated in 40 million euros; by now, the investment undertaken by Public Insurance Office (CCS) and Spanish Coastal Authority (MAGRAMA) is reaching more than 70 million euros.

The monetary impact of storms has an unequal temporal and spatial distribution. The major amount corresponds to the one produced in February (figure 5), in all the regions of the studied area, and it is concentrate on the eastern end of the Cantabrian zone (figure 6) (63,5% only in the Basque Country littoral). Therefore, this analysis reveals that damage produced by coastal storms do not only depend on the intensity of natural process (hazard) but also on the type of coast and the existing goods, that is, the elements at risk (exposition) and their vulnerability.

Figure 5.- Temporal distribution of investment in compensation of private losses (Public Insurance Office (CCS))

Figure 6.- Spatial pattern of economic losses (Public Insurance Office (CCS) and Spanish Coastal Authority (MAGRAMA))

A further, more precise analysis should have to consider the relationships between the magnitude of the storms with the main features of the shoreline: backshore land-use, number of potential beach visitors, population of the surroundings, and so on, and finally take into account the environmental non-market value of coastal areas.

Conclusion

The analysis of the oceanographic and atmospheric conditions associated with the 2013-2014 winter, as well as the impacts observed into the coast, shows that the whole episode was, indeed, remarkable. However, no extreme wind, wave or surge records were broken; instead, its exceptionality derived from the accumulation of energy during the whole period, characterized by the succession of storms. High seas (e.g. significant wave heights above 3 m) were persistent (almost 50 % of the time), pushed by strong westerly and northwesterly winds, conditions embedded into a long term trend of sea level rise in the Gulf of Biscay area.

More relevant for the future evolution of coastal landscapes is the long term trend rise of sea level. Analysis of tide gauges around our study area offers different values, depending on the area and period of analysis, but most of them coincide into an approximate value of 2 mm/yr (Marcos et al, 2005). Applying the well known Bruun rule (1962), such trend would result into an approximate beach retreat of 12 m.

Bibliografía

- Bruun, P. (1962) - Sea level rise as a cause of shore erosion. *Journal of Waterways and Harbors Division*, ASCE 88, 117-130.
- Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) (2014) - *Notas informativas sobre los embates de mar producidos en los primeros días del mes de febrero de 2014 en la costa cantábrica y Galicia*. Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España, 4 de febrero y 3 de marzo de 2014. Consultado entre marzo y julio de 2014 en: http://www.consorseguros.es/web/le_n
- Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. MAGRAMA. (2014) - *Plan Litoral. Obras de reparación por temporales*. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Gobierno de España. Consultado entre marzo y julio de 2014 en: <http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/plan-litoral-obras-emergencia-temporales/default.aspx>
- Dodet, G.; Bertin, X. and Taborda, R. (2010) - Wave climate variability in the North-East Atlantic Ocean over the last six decades. *Ocean Modelling*, 31, p. 120-131.
- Marcos, M.; Gomis, D.; Monserrat, S.; Álvarez-Fanjul, E.; Pérez, B. and García-Lafuente, J. (2005) - Consistency of long sealevel time series in the northern coast of Spain, *J. Geophys. Res.*, 110, C03008, doi:10.1029/2004JC002522.

DESIGUALDADE NO CAMPO E O RISCO CLIMÁTICO EM ÁREAS DE PRODUÇÃO DA SOJA NO SUL DO BRASIL

Vinicius Carmello

Grupo de Pesquisa GAIA; UNESP/FCT - Presidente Prudente, São Paulo, Brasil
viniciuscarmello@gmail.com

Miriam Rodrigues Silvestre

Grupo de Pesquisa GAIA; UNESP/FCT - Presidente Prudente, São Paulo, Brasil
miriam@fct.unesp.br

João Lima Sant'Anna Neto

joaolima@fct.unesp.br
Departamento de Geografia, Grupo de Pesquisa GAIA
UNESP/FCT - Presidente Prudente, São Paulo, Brasil
jlsn57@uol.com.br

RESUMO

Esta pesquisa parte da relação entre o clima e a agricultura em uma região de transição climática no sul do Brasil referente à vertente sul da bacia do rio Paranapanema, com área de cerca de 55 mil km². Os dados analisados referem-se aos de produtividade da soja (kg/ha), e aos de precipitação (mm) de 03 postos pluviométricos. Estes dados foram tratados com técnicas estatísticas convencionais com o uso dos programas Excel e Minitab. Os resultados mostraram variações espacial da produtividade de soja (entre os municípios). Essa relação está associada ao padrão tecnológico, às formas de manejo e ao perfil agrícola dos municípios. Isso permite uma análise geográfica do território, demonstrando que os diferentes níveis de vulnerabilidade dos municípios, relacionam-se com estruturas agrárias distintas, refletindo o risco social no campo.

Palavras-chave: chuva; soja; variabilidade; risco, bacia do Rio Paranapanema, Brasil.

Introdução

A relação de dependência da agricultura ao clima nos dias atuais vem diminuindo, sobretudo pela grande inserção da técnica no campo, originárias de investimentos em ciência e tecnologia. Entre os municípios, por exemplo, existem ordenamentos políticos/socioterritoriais que definem os tipos de cultura, as formas de manejo etc, refletindo em uma maior ou menor relação com os ritmos e padrões atmosféricos. O objetivo deste artigo é analisar as desigualdades socioespaciais entre os municípios produtores de soja em uma região do Sul do Brasil, e o risco frente aos períodos de estiagem durante a safra agrícola. Esta região do Brasil apresenta a pluviosidade anual e sazonal concentrada entre outubro e março e esta inserida no estado do Paraná, segundo maior produtor de soja no Brasil.

Área de estudo, dados e procedimentos

Os dados de produção e de área plantada correspondem ao período de 1999-2010. Os dados de produtividade para cada município são definidos através da divisão entre a quantidade produzida e área destinada à cultura. Foi utilizada a técnica de agrupamento (*ward*) para dividir os 132 municípios em 3 Grupos de produtividade (P1, P2 e P3) e representados pelo gráfico Boxplot, em que se divide cada série em quartis. Os dados de precipitação foram coletados de 03 postos pluviométricos representativos e instalados nos municípios de Santo Inácio, Ibaiti e Ponta Grossa (FIG. 1). Estes postos derivam-se de uma rede de 89 postos pluviométricos. Os dados de precipitação foram representados na escala decendial para comparação com os períodos

fenológicos da soja entre os meses de outubro a abril (ano agrícola). Essa organização auxiliou a avaliação dos níveis de dependência do grão à variabilidade pluviométrica.

Figura 1 - Localização dos 03 postos pluviométricos representativos das diferentes áreas agrícolas.

Agrupamento da produtividade média anual entre 1999-2000 a 2009-2010

Os municípios do Grupo P1 são aqueles cuja produtividade média anual variou entre 2.011 kg/ha e 3.128 kg/ha. Os do segundo Grupo P2 com a produtividade média anual entre 1.520 kg/ha e 2.796 kg/ha. No Grupo P3 a variação é alta, com a produtividade média inferior a 1.953 kg/ha (FIG. 2).

Figura 2 - Agrupamento da produtividade (kg/ha) média anual de 1999-2000 a 2009-2010

Existem 106 municípios com produtividade alta, entre eles Londrina, Maringá e Ponta Grossa. No Grupo P2, estão 14 municípios e; no Grupo P3, com menor produtividade, 12 municípios. Os municípios do Grupo P2 se concentram na porção leste e noroeste da bacia. O Grupo P3 agrupou-se no noroeste da região, nas proximidades de Paranavaí (Loanda, Diamante do Norte e Santo Inácio, etc) (FIG 3).

Figura 3 - Distribuição espacial da produtividade média anual de 1999-2000 a 2009-2010

As propriedades que possuem tradição no cultivo da soja podem ser medidas pela relação da área destinada ao seu cultivo em relação ao total destinado a agricultura. A pequena propriedade é tida como reduto da baixa produtividade e da incapacidade de produzir na escala do mercado (MORO, 1995; IBGE, 2006; PAULINO, 2011). Quando se incorpora insumos agrícolas à produção ocorre um rápido incremento de produtividade, e uma destruição da economia natural, ou seja, a técnica passa a controlar a natureza (CAMPOS, 2011). Ibaiti possui 1566 propriedades agropecuárias e Ponta Grossa, 1522 e apesar do maior número de propriedades agrícolas, em Ibaiti apenas 11% delas utilizam tratores, enquanto que em Ponta Grossa e em Santo Inácio, respectivamente 35% e 26% possuem esse maquinário (FIG. 4).

Figura 4 - a: número de estabelecimentos agropecuários com tratores. b: número de estabelecimentos agropecuários que realizaram construções e benfeitorias no ano de 2006

Histórico recente da produção de soja e a relação com a variabilidade das chuvas.

Em média, as melhores safras de soja foram: 2009-2010, 2006-2007 e 2002-2003. O ano de 2009-2010 foi um ano excepcional em termos de rendimento e variação da produtividade. Todos os municípios produziram acima de 2.500 kg/ha. Relação com os registros de chuvas abundantes em todo o estado do Paraná neste ano. Em contraste, os anos mais secos apresentaram reflexo no rendimento final da soja, como são os casos de 1999-2000 e 2005-2006 (Fig. 5).

Figura 5 - Variação da produtividade (kg/ha) de soja entre os 132 municípios da vertente paranaense da bacia do rio Paranapanema entre os anos de 1999-2000 a 2009-2010

Um caso emblemático ocorreu em 2003-2004, cuja variação de produtividade de soja foi expressiva. Estiagens nos meses de janeiro a março são frequentes no estado do Paraná e, geralmente, coincidem com o período de desenvolvimento considerado crítico das culturas de verão (floração e enchimento de grãos). Esse período tem sido apontado como fator limitante ao rendimento da soja (BERLATO e FONTANA, 1999; MATZENAUER et al. 2003). Os decêndios do ano agrícola de 1999-2000 mostram registros de chuvas considerados secos e extremamente secos nos meses de outubro, novembro, março e abril dos três postos. Os decêndios chuvosos foram nos meses de janeiro e fevereiro, nos três pontos. Os dados de chuva do ano agrícola padrão de 2009-2010 mostram períodos secos e extremamente secos nos meses de fevereiro, março e abril nos postos de Ponta Grossa e Santo Inácio. Foram registrados em 2004, um

decêndio extremamente chuvoso em Janeiro e dois secos em fevereiro em Santo Inácio, e o segundo decêndio de janeiro de 2003 foi extremamente seco, intercalado por dois chuvosos em Ponta Grossa (TAB.I).

Apesar do período de estiagem registrado em janeiro e fevereiro de 2004, houve municípios que apresentaram alta produtividade na safra de 2003-2004, que reflete o perfil agrícola desigual das propriedades rurais. Por exemplo, a soja plantada em municípios como Santo Inácio e Ibaiti é mais vulnerável frente a episódios de seca/estiagem, pois as propriedades rurais utilizam menos tecnologia, diferente de Ponta Grossa, em que grande parte das propriedades rurais utilizam recursos técnicos.

Tabela I - Variação decendial das chuvas em período de safra de soja e a relação com o estágio fenológico crítico da cultura frente a períodos de déficit hídrico, nos 3 municípios do Estado do Paraná.

Meses		Out			Nov			Dez			Jan			Fev			Mar			Abr		
Decêndios		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Período crítico											1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ponta Grossa	1999-2000																					
	2003-2004																					
	2009-2010																					
Ibaiti	1999-2000																					
	2003-2004																					
	2009-2010																					
Santo Inácio	1999-2000																					
	2003-2004																					
	2009-2010																					

Ext.Seco Seco Habitual Chuvoso Ext. Chuvoso Estágio Crítico

Conclusão

O ano de 2009-2010, extremamente chuvoso, apresentou a maior produtividade e menor variação observada para todo o período. O ano de 1999-2000 foi um ano com registros de chuva padrão seco, e em relação aos dados de produtividade, apresentaram baixas. Porém, o ano de 2003-2004 foi emblemático e registrou forte variação nos dados de produtividade, resultado do déficit hídrico/estiagem nos meses de janeiro e fevereiro de 2004, sobretudo nos municípios do Grupo P3. O território agrícola da bacia do Paranapanema apresenta pequenos, médios e grandes produtores rurais que conduzem as atividades no campo com acesso desigual à técnica e ao manejo. Observam-se três regiões homogêneas, com grupos de produtividade divididos por alta, média e baixa, com características agrícolas distintas, definidas a partir de variáveis obtidas junto ao censo agropecuário.

Em anos chuvosos, o Grupo P1, representado por Ponta Grossa, apresentou menores variações e maior produtividade do que o Grupo P3. Isso ocorreu também no ano seco, consequência do padrão tecnológico, do manejo, do perfil agrícola dos municípios etc, demonstrando que os diferentes níveis de vulnerabilidade dos municípios, relacionam-se com estruturas agrárias distintas, refletindo o risco social no campo.

Bibliografia

- Berlato, M. A.; Fontana, D. C (1999) - Variabilidade interanual da precipitação pluvial e rendimento da soja no Estado do Rio Grande do Sul. *Revista Brasileira de Agrometeorologia*. vol. (7). Santa Maria.
- Campos, Margarida. (2011) - *Embrapa/Soja em Londrina-PR a pesquisa agrícola de um país moderno*. Florianópolis. Tese (Doutorado em Geografia), 120 p.
- Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística (IBGE).(2010) - Censo agropecuário 2006. Disponível em: < www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=t&o=1&i=P&e=l&c=816>. Acesso em: 24 de nov. de 2012.
- Matzenauer, R; Berni, N. A; Maluf, J. R. T. (2003) - Estimativa do consumo relativo de água para a cultura da soja no Estado do Rio Grande do Sul. *Revista Ciência Rural*, vol. (33). Santa Maria.
- Moro, D. A. (1995) - Aspectos geográficos da modernização agrícola no norte do Paraná. *Boletim de Geografia*. vol. (13). Maringá.
- Paulino, Eliane Tomiasi. (2011) - Estrutura Fundiária e Dinâmica Socioterritorial no Campo Brasileiro. *Revista Mercator*. vol. (10). Fortaleza.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS: ESTUDO DE CASO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO INDAIÁ - UBATUBA - SP- BRASIL

Débora Olivato

Secretaria Estadual de Educação - SP, Brasil
debora.olivato@gmail.com

Humberto Gallo Junior

Instituto Florestal - SMA/SP, Brasil
hgallojr@gmail.com

Magda Adelaide Lombardo

Instituto de Geociências e Ciências Exatas, UNESP, Rio Claro, Brasil
lombardo@rc.unesp.br

RESUMO

No gerenciamento de riscos a desastres naturais, como em qualquer outro processo democrático de planejamento e implantação de políticas públicas, deve-se ter a participação social como elemento chave para garantir a legitimidade e a governabilidade. No Brasil há muito que se caminhar para alcançar uma gestão participativa de riscos ambientais. A fim de verificar as potencialidades e fragilidades deste processo realizou-se um estudo de caso nos 05 bairros da bacia hidrográfica do rio Indaiá - Ubatuba, São Paulo - Brasil. Conforme o mapeamento técnico existente (SÃO PAULO, 2006), esta bacia possui extensas áreas com riscos de inundações, escorregamentos de terra, bem como de erosão costeira (SOUZA e LUNA, 2009). Foi efetuado no presente trabalho o mapeamento da percepção ambiental e de riscos de 209 residentes (10% das residências), desenvolvendo-se uma metodologia de espacialização homogênea dos dados na área desta bacia hidrográfica. Realizou-se a correlação entre as áreas de riscos identificadas nos mapeamentos técnicos e aquelas percebidas pela população. As informações levantadas evidenciam a falta de gestão participativa de riscos e suas consequências, oferecendo subsídios para um programa preventivo junto às comunidades locais, em especial nos setores de comunicação, educação e implantação de infra-estrutura para evitar riscos potencializados pelos eventos extremos do tempo.

Palavras-chave: participação social, gestão participativa dos riscos, mapeamento da percepção de riscos, bacia hidrográfica.

Introdução e Objetivos

Nos últimos anos tem-se observado um crescimento da ocorrência de desastres naturais ligados aos eventos de inundações e escorregamentos de terra, vitimando cidadãos e causando danos aos bens materiais privados e públicos.

Conforme destacou Kuhnen (2009) as medidas de mitigação ou prevenção de riscos devem necessariamente levar em conta a percepção, o conhecimento e aceitação do risco pela população. Portanto, se a redução da vulnerabilidade aos riscos é possível, ela não será eficaz se não for apropriada pelos indivíduos ou grupos envolvidos.

No Brasil, os órgãos públicos ligados ao Sistema de Proteção e Defesa Civil ainda encontram muitas dificuldades em fomentar a participação social no processo de gestão de riscos ambientais, conforme destacou Valencio *et al.* (2006), embora tenha ocorrido um avanço da legislação nacional neste sentido (OLIVATO, 2013). Neste contexto, observa-se também uma carência de trabalhos educativos, junto às comunidades escolares em áreas vulneráveis, e à população de forma geral na prevenção dos riscos ambientais.

A ONU vem realizando um conjunto de estratégias para a redução de desastres, com dois grandes marcos: a Década Internacional para Redução de Desastres Naturais (década de 1990); e o Quadro de Ações de Hyogo (período de 2005 a 2015) - estimulando o desenvolvimento de projetos de prevenção e redução de acidentes naturais, e fomentando a promoção da resiliência das nações e comunidades frente aos desastres.

A proposta do presente trabalho foi a demonstrar que as informações levantadas junto aos diversos atores sociais podem colaborar tanto no processo de diagnóstico e mapeamento de risco, quanto no planejamento de projetos de educação preventiva para a área de estudo. Desta forma, pretendeu-se apresentar uma contribuição sobre a questão da participação social na gestão de riscos ambientais.

Para o desenvolvimento da pesquisa foi selecionada a bacia hidrográfica do rio Indaiá, localizada na porção central do município de Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo, compreendendo cinco bairros: Perequê-Açu, Barra Seca, Casanga, Sumidouro e Taquaral (Figura 1).

A escolha desta área se justifica pela existência de uma diversidade de tipos de usos da terra e atividades econômicas, heterogeneidade populacional (caiçaras, migrantes, agricultores, empresários, turistas, veranistas etc.) e por apresentar problemas relacionados à vulnerabilidade social e riscos ambientais, inclusive com histórico de ocorrência de eventos pluviométricos que acarretaram danos para a população residente. É importante frisar também que há locais apontados como de médio a alto risco de escorregamento de terra; alto risco de inundação, e de altíssimo risco de erosão costeira segundo estudos e mapeamentos efetuados pelo Instituto Geológico de São Paulo (2006), conforme Figura 3, e por Souza e Luna (2009).

Figura 1 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Indaiá no município de Ubatuba-SP. Elaboração: Fabio Pincinato, 2012.

Figura 2. Áreas de Risco da bacia hidrográfica do Rio Indaiá, segundo o mapeamento do Instituto Geológico de São Paulo (SÃO PAULO, 2006). Organização: Fábio Pincinato, 2011.

Material e Método

A pesquisa envolveu inicialmente uma revisão bibliográfica e cartográfica, análise do mapeamento das áreas de risco realizado pelo Instituto Geológico de São Paulo, trabalhos de campo com levantamento de dados por meio de entrevistas semiestruturadas com lideranças dos cinco bairros e com representantes de órgãos governamentais - municipais e estaduais. Para o levantamento dos dados da percepção de riscos da comunidade foi utilizado um questionário semiestruturado com questões abertas e fechadas junto a um amplo perfil de moradores e

trabalhadores, com idade mínima de 17 anos, com uma amostragem de 10% das residências ou estabelecimentos comerciais existentes na área da bacia hidrográfica.

Com o objetivo de garantir uma ampla abrangência espacial na área de estudo, foi utilizada uma rede de quadriculas, formada por uma grade amostral de 100 m x 100 m na área de ocupação antrópica, sendo aplicado um questionário por quadricula, de forma aleatória, buscando-se uma distribuição espacial ampla e homogênea (OLIVATO, GALLO JR, PINCINATO, 2013).

Resultados

O mapa síntese gerado apresenta a percepção do residente sobre o perigo na área de sua residência e os tipos de perigos ambientais percebidos (Figura 3). Este mapa possui também as áreas de riscos de inundação e escorregamento de terra, delimitadas pelo Instituto Geológico (SÃO PAULO, 2006) e da pesquisa sobre erosão costeira de Souza e Luna (2009). Propôs-se, desta forma, um exercício de diálogo entre informações técnico-científicas e as empíricas coletadas junto à comunidade sobre a mesma temática.

Figura 3: Representação gráfica dos perigos e riscos ambientais segundo os olhares dos residentes e técnicos. Fonte: OLIVATO (2013)

Observou-se que o perfil dos 209 entrevistados é indicativo de grande vulnerabilidade social, devido ao baixo grau de escolaridade e de renda familiar mensal apresentado por grande parte da amostra. Isto também ficou evidente na análise da percepção sobre a vulnerabilidade socioambiental dos bairros estudados (OLIVATO, 2013).

Verificou-se que a maioria dos entrevistados percebe um conjunto de problemas no bairro em que vivem, sendo que o mais citado foi o risco de inundação/alagamento. É importante destacar que estes problemas estão diretamente relacionados com os corpos d'água dessa bacia hidrográfica, e que muitos córregos são chamados de 'valas' pelos entrevistados, justamente

pelo esgoto ser despejado “*in natura*”. Diversos entrevistados utilizaram o termo “a vala transborda” para referir-se a episódios de inundação ou alagamento.

No geral, diversas áreas citadas pelos entrevistados estão inseridas no mapeamento técnico oficial de risco de inundação (SÃO PAULO, 2006). No entanto, há outras áreas onde o problema é percebido e vivenciado pelos residentes e que não foram identificadas no citado mapeamento. Assim sendo, observaram-se relatos de casos de perigo de inundação e/ou alagamento nas casas dos entrevistados tanto dentro quanto fora das áreas mapeadas pelo Instituto Geológico, como também o oposto, ou seja, casas em área de risco cujos moradores entrevistados não percebem o problema.

Observou-se que a maioria dos entrevistados não se sente orientada e preparada para a prevenção e gestão de riscos. Porém, ficou demonstrado nas entrevistas o grande interesse em dialogar sobre o tema, o que poderia ser realizado por meio da troca de experiências com profissionais da área, tanto técnicos, como gestores públicos.

Considerações Finais

Esta pesquisa demonstrou que é possível propor um diálogo entre informações técnico-científicas e empíricas coletadas junto à comunidade, em prol da gestão compartilhada de riscos ambientais.

Tanto a figura 3 quando nas demais informações levantadas junto à população disponíveis em Olivato (2013) demonstram que a população local não tem uma participação ativa no processo de gestão de riscos ambientais na área de estudo.

A avaliação da percepção da população local sobre os riscos e problemas ambientais, além possibilitar a obtenção de informações relevantes para a gestão a partir do olhar de quem vive no lugar, pode contribuir para o desencadeamento de um processo educativo e preventivo a partir do estreitamento do contato entre os técnicos, gestores públicos e a comunidade.

Sugere-se a adoção de programas educativos diferenciados aos moradores dessa bacia hidrográfica, com base no referencial básico da educação ambiental crítica e emancipatória, e que estimulem a participação ativa da população no Sistema Proteção e Defesa Civil e na gestão compartilhada do território.

Referências Bibliográficas

- KUHNEN, A. Meio Ambiente e Vulnerabilidade: a percepção ambiental de risco e o comportamento humano. Revista Geografia, Londrina: v.18, nº 2, p. 37-52, 2009.
- SÃO PAULO. Secretaria do Meio Ambiente. Instituto Geológico - IG. Mapeamento de áreas de risco a escorregamento e inundação. Relatório: Município de Ubatuba. Volume 1, 2006.
- SOUZA, C.R.G. e LUNA, G.C. Taxas de retrogradação e balanço sedimentar em praias sob risco muito alto de erosão no município de Ubatuba (Litoral Norte de São Paulo). Quaternary and Environmental Geosciences, 01, 1, p.25-41, 2009.
- OLIVATO, D; GALLLOL JR. H.; PINCINATO. F. Proposta metodológica para o diagnóstico e mapeamento de riscos ambientais. In: Anais do 14º Encuentro de Geógrafos de America Latina. Lima-Perú, 2013, p.1-13.
- OLIVATO, D. Análise da participação social no contexto da gestão de riscos ambientais na bacia hidrográfica do rio Indaiá, Ubatuba-SP-Brasil. Tese de Doutorado defendida no Programa de Pós-graduação em Geografia Física da FFLCH - USP. São Paulo, Brasil, 2013.
- VALENCIO, N. *et al.* Implicações éticas e sociopolíticas das práticas da defesa civil diante das chuvas: reflexões sobre grupos vulneráveis e cidadania participativa. São Paulo em Perspectiva, v. 20, n.1, p. 96-108, jan/mar 2006.

APLICAÇÃO DE TÉCNICA MULTIVARIADA À RAZÃO DE MISTURA DO AR EM MINAS GERAIS/BRASIL

Edicarlos Pereira de Sousa

Universidade Federal de Campina Grande - CTRN/UACA
edicarlos.p.sousa@gmail.com

Célia Campos Braga

Universidade Federal de Campina Grande - CTRN/UACA
celia@dca.ufcg.edu.br

Jonathan Castro Amanajás

Universidade Federal de Campina Grande - CTRN/UACA
jonathan.amanajas@hotmail.com

Milena Pereira Dantas

Universidade Federal de Campina Grande - CTRN/UACA
milena@dca.ufcg.edu.br

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo determinar padrões espaço-temporais da razão de mistura, definida como a quantidade de vapor d'água por unidade de massa do ar seco, e associá-los aos sistemas meteorológicos atuantes no Estado de Minas Gerais. Para isso, empregou-se a técnica de ACP aos dados mensais de razão de mistura de 39 estações climatológicas com 30 anos comuns de observações. O emprego da ACP mostrou a existência de dois padrões dominantes da razão de mistura que explicaram aproximadamente 98% da variância total dos dados. O primeiro, relacionado à maior concentração de umidade, mostra a atuação da ZCAS, dos sistemas frontais e influência orográfica. O segundo está associado a ASAS. Neste contexto, os resultados obtidos a partir da ACP evidenciaram que as chuvas de verão e outono são influenciadas pelas ZCAS e pelos sistemas frontais. No inverno, esses sistemas enfraquecem e a intensidade das chuvas diminui na região.

Palavras-chave: umidade, ACP, sistemas meteorológicos

Introdução

O Brasil possui a maior parte de seu território inserido nas latitudes baixas, com extensa costa oceânica, cujo interior está sujeito aos efeitos da continentalidade nos períodos de estiagem. A variabilidade sazonal de algumas variáveis climatológicas na região central do país faz a população passar por longos períodos sem chuva e, nesse caso, são muitos os impactos ocasionados pelo calor e baixa umidade atmosférica.

O vapor d'água tem papel essencial no balanço de energia próximo à superfície e é fundamental no ciclo hidrológico. Sendo um ótimo absorvedor de radiação infravermelha, desempenha papel de agente termorregulador, impedindo que a camada de ar mais próxima ao solo seja resfriada em excesso durante a noite e, além disso, representa a maior fonte de energia latente da atmosfera tropical (Vianello & Alves, 1991).

A variabilidade climática de Minas Gerais é bem diversificada, seja como resposta de seus aspectos topográficos, sua posição geográfica e, principalmente, os aspectos dinâmicos da atmosfera, que incluem os sistemas meteorológicos de micro, meso e grande escalas, que atuam direta ou indiretamente no regime pluvial, como a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e Sistemas Frontais, principais responsáveis pela precipitação pluvial e o Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul e o Vórtice Ciclônico de Ar Superior que, dependendo das suas posições, ocasionam grandes períodos de estiagens. (Minuzzi et al., 2007).

Fragoso & Gomes (2008) aplicaram a Análise Fatorial em Componentes Principais (ACP) a dados de chuva na região Sul de Portugal, para identificar padrões espaciais de precipitação associados a eventos intensos. Os resultados mostraram que na região do Algarve as chuvas de forte caráter torrencial foram mais frequentes. A maior predominância de dias com chuva ocorreu no outono e no início do inverno. Cinco tipos de sistemas de circulação foram identificados, indicando uma considerável diversidade entre as condições de circulação atmosférica de grande escala, favorecendo a ocorrência de chuvas torrenciais.

Stathis & Myronidis (2009) aplicaram ACP a uma série de dados de 35 anos de precipitação em 75 estações meteorológicas na Tessália (Grécia Central). Duas componentes principais foram obtidas e descreveram 87,7% da variância total dos dados. A primeira componente principal relacionou-se com a frequência de ciclones, enquanto a segunda descreveu a ocorrência de anticiclones e tipos de tempo não-gradientes (não teve padrão bem definido ou associado a nenhum sistema de escala sinótica).

Silva & Reboita (2011) ao estudar a passagem de frentes frias na região Sul de Minas Gerais de 2004 a 2010, encontraram 231 frentes frias com média anual de 33 frentes para a área estudada. Segundo os autores, a menor ocorrência de frentes no verão foi devido ao enfraquecimento dos gradientes de temperatura do Hemisfério Sul. Já no inverno, a atuação do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul, que nessa época do ano está mais intenso e deslocado para oeste, impediu a chegada das frentes.

Amanajás & Braga (2012) aplicaram a ACP a dados mensais de precipitação na Amazônia Oriental, relacionando-os com os principais mecanismos climáticos dos oceanos Pacífico e Atlântico tropicais. Os resultados mostraram que o primeiro fator definiu áreas de chuva que são influenciadas pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). No segundo fator, áreas de atuação dos eventos de meso escala tal como Linhas de Instabilidades (LI) foram evidenciadas, favorecendo as chuvas na região nos meses de maio a agosto. E o terceiro padrão espacial indicou a influência da atuação da ZCAS, sistema atuante no final da primavera e início do verão, bem como sistemas de escala local. Recentemente, Santos (2013) utilizou a Análise em Componentes Principais e Agrupamentos para determinar padrões espaciais do Índice de Precipitação Normalizado (SPI) e regiões homogêneas de eventos extremos de chuva no Estado do Pará.

Este estudo objetiva quantificar e analisar a variabilidade espacial e temporal da razão de mistura no Estado de Minas Gerais e associá-las a sistemas meteorológicos de grande e meso escalas que, por ventura, atuam naquela região.

Material e Método

Área de estudo

O Estado de Minas Gerais é uma das 27 unidades da República Federativa do Brasil, na América do Sul. Está localizado na região Sudeste do Brasil, juntamente com os Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo (Figura 1). Seu território fica entre os paralelos 14°13'58" e 22°54'00" de latitude Sul e os meridianos de 39°51'32" e 51°02'35" a Oeste de Greenwich. Ocupa um fuso horário correspondente a -3 horas em relação a Greenwich. O Estado faz divisa com São Paulo (Sul e Sudeste), Rio de Janeiro (Sudeste), Mato Grosso do Sul (Oeste), Goiás e Distrito Federal (Noroeste), Espírito Santo (Leste) e Bahia (Norte e Nordeste) (Minas Gerais, 2014).

Figura 1. Espacialização das estações climatológicas no Estado de Minas Gerais/Brasil.
Adaptado de Simielli (1991).

Método

Utilizaram-se séries mensais de Pressão, Temperatura, Umidade Relativa e Precipitação para um período comum de 30 anos (1961-1990) de 39 estações climatológicas selecionadas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para o Estado de Minas Gerais.

O método da ACP consiste em transformar p variáveis originais correlacionadas em componentes não correlacionadas ou ortogonais, tendo propriedades especiais em termos de variância. As novas componentes são funções lineares das variáveis originais e mostradas em ordem decrescente de importância, ou seja, a primeira componente é a combinação linear de importância máxima (Marques e Mendes Marques, 2005). Utilizou-se o modo de rotação ortogonal Varimax onde os componentes originais passaram a ser rotacionadas através da redistribuição dos pesos entre as CPs. Maiores descrições da metodologia podem ser encontradas em Wilks (2006) e Richman (1986).

Discussão dos Resultados

As Figuras 2a e 2b mostram, respectivamente, a variabilidade média da razão de mistura e o mapa de Bacias Hidrográficas para o Estado de Minas Gerais.

Figura 2. Carta média de razão de mistura (g/Kg) (a) e mapa das Bacias Hidrográficas (b) do Estado de Minas Gerais/Brasil (IBGE, 2014).

A variabilidade espacial média da razão de mistura não é muito acentuada. Três núcleos com maior concentração de vapor d'água podem ser destacados: um deles no sudoeste do Estado, na região do conjunto de represas das Bacias do Rio Grande e Rio Paranaíba, outro na região central, na Bacia do São Francisco, e o terceiro no leste mineiro, sobre a Bacia do Rio Doce, mostrando a importância dessas Bacias (influência local) na disponibilidade de água na atmosfera. Sistemas de curto prazo ocorrem geralmente no final da tarde e início da noite, quando células convectivas se desenvolvem em regiões de condições favoráveis (Novais, 2011). Os resultados mostram que o verão é a época do ano que possui maior disponibilidade de vapor d'água na atmosfera de Minas Gerais. A aplicação da ACP aos dados médios mensais da razão de mistura resultou na retenção de dois fatores que explicaram 97,86% da variância total dos dados. O primeiro fator tem correlações positivas superiores a 0,8 nos meses de dezembro a fevereiro e correlações da ordem de 0,75, nos meses de março, outubro e novembro. O período melhor correlacionado a esse fator (outubro-março) pode estar associado a ZCAS.

As contribuições negativas desse fator podem estar relacionadas com a baixa umidade sobre a Serra do Espinhaço, prolongando-se até o extremo sul, sobre a Serra das Vertentes (Figura 3). Núcleos com contribuições negativas são observados nas Serras da Canastra e da Barçaça. Desse modo, esse fator também mostra a influência da irregularidade topográfica na distribuição da razão de mistura.

Figura 3. Padrão espacial associado ao primeiro (a) e segundo (b) fatores comuns dos totais médios mensais da razão de mistura no Estado de Minas Gerais.

Na porção leste, o primeiro fator associa-se à ocorrência de sistemas frontais, onde se percebe valores positivos (Figura 3a).

O segundo fator comum apresentou fortes correlações (superiores a 0,75) nos meses de maio a agosto. A espacialização deste fator indica contribuições elevadas nas porções leste e nordeste (Figura 3b). Observam-se também contribuições significativas, da ordem de 0,75, no oeste de Minas nos meses de inverno. Este padrão mostra claramente o período mais seco, devido à queda de umidade provocada justamente pelo posicionamento do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), que nessa época do ano está mais intenso e deslocado para oeste, impedindo a chegada das frentes no sul de Minas Gerais. Excetua-se, neste caso, o cinturão leste/oeste influenciado pelos sistemas frontais, principais causadores de chuva no inverno.

Conclusões

A análise temporal e espacial desses fatores permitiu identificar sistemas atmosféricos que influenciaram na quantidade de vapor d'água (umidade) da região, possibilitando compreender melhor os mecanismos físicos geradores das chuvas.

O primeiro fator mostrou altas correlações da razão de mistura nos meses de outubro a março e está associado à atuação da ZCAS, sistemas frontais e aspectos orográficos. O segundo fator mostrou que as maiores contribuições ocorreram no inverno e está relacionado à baixa umidade provocada pelo deslocamento do Anticiclone Tropical na direção do continente.

O conhecimento de alguns aspectos das condições dinâmicas e físicas de Minas Gerais permite o desenvolvimento de políticas públicas com vistas à mitigação de consequências nocivas à sociedade, à agricultura e ao gerenciamento dos recursos hídricos daquela região.

Bibliografia

- Amanajás, J. C.; Braga, C. C. (2012) - Padrões espaço-temporal pluviométricos na Amazônia Oriental utilizando análise multivariada. *Revista Brasileira de Meteorologia*, vol. 27, n. 4, p. 423-434.
- Fragoso, M.; Gomes, P. T. (2008) - Classification of daily abundant rainfall patterns and associated large-scale atmospheric circulation types in Southern Portugal. *International Journal of Climatology*, 28:537-544.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2014) - *Mapas de Biomas e de Vegetação*. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br>>. Acesso em: 11 fev. 2014.

- Marques, J. M.; Mendes Marques, M. A. (2005) - As componentes principais no descarte de variáveis em um modelo de regressão múltipla. *Revista FAE*, vol. 8, n. 1, p. 93-101.
- Minas Gerais (Estado). (2014) - *Portal do Governo de Minas Gerais*. Disponível em: <<http://www.mg.gov.br/governomg/portal/c/governomg/conheca-minas>>. Acesso em: 11 fev. 2014.
- Minuzzi, R. B. et al. (2007) - Climatologia do comportamento do período chuvoso da Região Sudeste do Brasil. *Revista Brasileira de Meteorologia*, vol. 22, n. 3, p. 338-344.
- Novais, G. T. *Caracterização climática da mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e do entorno da Serra da Canastra*. (2011) - Dissertação (Mestrado em Geografia) - Instituto de Geografia, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 175 p.
- Richman, M. B. (1986) - Rotation of principal components. *International Journal of Climatology*, 6:293-335.
- Santos, S. R. Q. *Determinação de regiões homogêneas do índice de precipitação normalizada (SPI) no Estado do Pará por meio da análise multivariada*. (2013) - Dissertação (Mestrado em Meteorologia) - Programa de Pós-Graduação em Meteorologia, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 97 p.
- Silva, L. J.; Reboita, M. S. (2011) - Climatologia de Sistemas Frontais na cidade de Itajubá - MG. In: Jornada de Iniciação Científica, Tecnológica e de Inovação. (2011). Itajubá. Anais... Universidade Federal de Itajubá, 82 p.
- Simielli, M. E. (1991) - *Geoatlas*. São Paulo, Editora Ática, 112 p.
- Stathis, D.; Myronidis, D. (2009) - Principal component analysis of precipitation in Thessaly Region (Central Greece). *Global NEST Journal*, 11:467-476.
- Vianello, R. L.; Alves, A. R. (1991) - *Meteorologia básica e aplicações*. Viçosa, Imprensa Universitária, UFV, 449 p.
- Wilks, D. S. (2006) - *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences*. London, Academic Press, 649 p.

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA EN ESPAÑA Y VULNERABILIDAD FRENTE AL RIESGO DE SEQUÍA

Jesús Vargas Molina

Departamento de Geografía, Historia y Filosofía.

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

jvarmol@upo.es

RESUMEN

La vulnerabilidad frente a los riesgos naturales representa la expresión del desequilibrio entre las dinámicas naturales de un territorio y la sociedad que se asienta sobre él. A diferencia de otros eventos naturales peligrosos donde dichos desequilibrios se expresan como episodios puntuales a los que se asocia gran capacidad de destrucción, la sequía se presenta como un fenómeno de aparición lenta originado por la combinación de una serie de condiciones climáticas y socio-económicas con consecuencias territoriales, económicas y sociales especialmente difíciles de determinar en el espacio y el tiempo. Conocer las condiciones que vuelven a las poblaciones vulnerables debe ser el principio de cualquier proceso de gestión que busque garantizar la seguridad. Aunque en esa línea se están orientando importantes investigaciones sobre otros riesgos naturales aún quedan importantes retos que afrontar en lo que a sequías se refiere. En este sentido y debido al origen inducido de este tipo de riesgos, en el que las propias intervenciones humanas relegan en muchas ocasiones a un segundo plano a las condiciones climáticas originarias, se pretende en este trabajo presentar aquellos aspectos de la política y gestión hidrológica en España que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad de las poblaciones al riesgo de sequía.

Palabras clave: sequía, planificación hidrológica, vulnerabilidad

Introducción

Entendiendo riesgo natural como la probabilidad de que un territorio o una sociedad puedan verse afectados por un fenómeno natural peligroso (Olcina Cantos & Ayala-Carcedo, 2002), la concreción de un riesgo natural en catástrofe supone la ruptura o desestabilización de las condiciones consideradas normales entre una determinada sociedad y el medio natural sobre el que se asienta, con consecuencias negativas para las personas, las infraestructuras, la economía, los ecosistemas o en definitiva cualquier cosa que valoremos. Precisamente Allan Lavell (1996) define la vulnerabilidad como la expresión de desequilibrio entre la estructura social y el medio físico y natural que lo rodea. Bajo esta misma idea y en el marco de los Sistemas Socio-ecológicos O' Brian et al. (2004) precisan que la vulnerabilidad es un fenómeno dinámico a menudo en un estado continuo de flujo de los procesos biofísicos y sociales que dan forma a las condiciones locales y la capacidad de adaptación, siendo estas a su vez dinámicas. En la Figura 1 se muestra como la relación sociedad- naturaleza puede generar el riesgo y este puede, o no, tener unas consecuencias catastróficas. Esta doble consideración del riesgo, como la acumulación aditiva de peligro y vulnerabilidad, aunque no proporciona una visión sistémica de los mecanismos de la vulnerabilidad (Adger, 2006) representa muy bien la idea de que "el entorno social, político y económico es tanto una causa de desastres como lo es el medio natural" (Blaikie, Cannon, Davis, & Wisner, 1996).

Figura: Esquema general del riesgo.

Fuente: elaboración propia a partir de EEA (2012) y Sauri, (2003).

Sequía y vulnerabilidad

En su condición de riesgo inducido, la sequía se puede definir como la incoherencia entre la demanda y la oferta de agua, resultado de un desajuste de las relaciones entendidas como “normales” entre el elemento natural, que aporta el recurso y el elemento social que lo regula, administra y/o utiliza.

Atendiendo al esquema de la Figura 1, cabe destacar que los periódicos descensos del nivel de precipitaciones son un hecho natural que se da prácticamente en la totalidad de regiones españolas, debido a que gran parte del territorio peninsular pertenece al dominio climático mediterráneo que se caracteriza precisamente por la aparición de algunos años secos. A esta exposición recurrente y natural a los episodios de sequía, hay que añadir además las pronósticos de los modelos de Cambio Climático que apuntan hacia el aumento de la frecuencia e intensidad de este tipo de períodos en las regiones del sur de Europa (IPCC, 2013). Cuando estos episodios de disminución de precipitaciones se conjugan con la falta de una gestión eficaz de los recursos de agua la situación puede resultar en importantes pérdidas económicas y sociales (Morales et al, 2002). Además, determinadas acciones humanas pueden originar o desencadenar períodos de escasez, pudiéndose dar el caso de tener graves impactos cuando el descenso de precipitaciones no es excesivamente duro o prolongado. También y a diferencia de otros episodios de presentación súbita como los terremotos o los ciclones, las sequías se presentan de forma lenta a lo largo de meses o años, por lo que su evolución está más expuesta a las distintas acciones que se lleven a cabo por parte de la sociedad afectada. De lo anterior se desprende que la importancia de los estudios de vulnerabilidad orientados a comprender y reducir las condiciones que hacen a las poblaciones vulnerables frente al riesgo de sequía se postula como el principal reto de la gestión y mitigación de los efectos de la sequía.

La sequía en la planificación hidrológica española

Pese a que la sequía no se presenta como uno de los puntos prioritarios de la Directiva Marco del Agua (DMA) —buen estado de las masas de aguas, recuperación de costes, unidad de cuenca

y mayor transparencia y participación pública en la gestión del agua—, su trasposición a la legislación española supuso un cambio sustancial en la manera de entender y afrontar la gestión de las sequías. Y es que a lo largo de todo el texto, se desprende la idea de un cambio de paradigma en la gestión de las sequías, de la gestión de crisis a la gestión del riesgo, integrando la gestión de los períodos de escasez en la propia planificación hidrológica mediante la implementación de estrategias prevención, control y mitigación, que normalizan este tipo de episodios.

Esta idea se recoge en la planificación española de varias maneras. Por un lado, la sequía es considerada como uno de los temas importantes en todos los Esquemas de Temas Importantes (ETIs) a partir de los cuales, las distintas Confederaciones establecen los objetivos de la planificación y articulan las bases de los Planes Hidrológicos de Demarcación. También se aprecia este cambio de paradigma en el Plan Hidrológico Nacional que a través de su artículo 27, configura los nuevos instrumentos para la gestión de sequías, concretamente las novedades introducidas son: elaboración de un sistema de indicadores que permita prever este tipo de períodos; redacción de Planes Especiales de Alerta y Eventual Sequía (PES) en el ámbito de los Planes Hidrográficos de Cuenca, que se basan en la elaboración y seguimiento de una serie de indicadores meteorológicos e hidrológicos a partir de los cuales implementar medidas progresivamente; y la necesidad de elaborar por parte de las administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 habitantes de unos Planes de Emergencia, y cuyo objetivo es aportar soluciones claramente resolutivas en situación de afecciones al abastecimiento, sin considerar medidas de carácter preventivo.

Vulnerabilidad frente al riesgo de sequía en la planificación hidrológica

A pesar de las novedades y los avances introducidos en la gestión de la sequía a través de la planificación, resquicios del viejo paradigma siguen estando presentes. Así se advierte en el artículo 58 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), cuando dice que “en circunstancias de sequías extraordinarias...o concurrencia de situaciones anómalas o excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, podrá adoptar, para la superación de dichas situaciones, las medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico, aun cuando hubiese sido objeto de concesión”. Se legitima de esta manera la posición del Estado para resolver los problemas, con el amparo del “interés general” y “con las medidas que sean precisas” de una teórica situación extraordinaria, cuando en realidad como ya se ha señalado en este trabajo, se trata de episodios recurrentes y habituales en España. La aprobación precisamente de un Decreto durante un período de escasez, representa la ineficacia de las herramientas de la planificación para hacer frente a este tipo de episodios, y la consiguiente vulnerabilidad frente al riesgo de sequía. Esto fallos de la planificación se relacionan con, entre otras cosas: 1) Una planificación de los recursos hídricos reticente a la contención de la demanda de agua, sometiendo a unos niveles de estrés hídrico a los sistemas de gestión, que aumentan la sensibilidad de los mismos cuando aparecen períodos de escasez; 2) El retraso o entelequia de alguno de alguno de los documentos orientados precisamente a mejorar la gestión de las sequías, con la consiguiente repercusión negativa en la capacidad de adaptación —los PES se aprueban en 2007, con un retraso considerable y hasta el momento y según el Observatorio Nacional de la Sequía, los Planes de Emergencia sólo se han elaborado en algunos municipios de Madrid (Manual de abastecimiento. CYII. 2003) y algunos

municipios de Málaga (EMASA), Sevilla (EMASESA) y Barcelona (Aguas Ter Llobregat) (<http://www.magrama.gob.es>) —; 3) La falta de tradición participativa en la gestión de los recursos hídricos en España— aunque con pequeños pero importantes avances sobre todo desde la trasposición de la DMA— y concretamente en la gestión de las sequías, que subestima las distintas percepciones y valoraciones del riesgo, provocando una pérdida importante de información y amparando a las administraciones como responsables de la definición de umbrales y medidas; 4) La legitimación social e institucional que tiene el regadío en España y su alta presencia en los distintos órganos de decisión de las Confederaciones, Comisiones de desembalse, y otros órganos decisorios y que alimentan la generación de situaciones de alarma y de crisis proponiendo soluciones alejadas de las ideas de anticipación, prevención o mitigación —demandas de ayudas económicas, construcción de infraestructura, aprobación de Decretos de sequía—.

Conclusiones

A diferencia de otros riesgos, la gestión de las sequías presenta unos desafíos atípicos, pues pese a su origen natural originario, el elemento social se erige como principal protagonista, no sólo por las consecuencias que los períodos de escasez pueden tener sobre las diferentes actividades socioeconómicas sino también, y aquí es donde se presentan los mayores desafíos de investigación, por la capacidad que el elemento social tiene de originar, desencadenar e intervenir en la evolución de este tipo de fenómenos, independientemente de los períodos de descenso de precipitaciones. Los nuevos instrumentos de planificación motivados por la trasposición de la DMA al marco jurídico español, suponen un cambio importante en la percepción de las sequías en España que trata de alejarse de la consideración de este tipo de eventos como extraordinarios, para considerarlos dentro de la normalidad climática peninsular. La planificación hidrológica ha dado desde entonces importantes pasos en esta dirección. Sin embargo, la larga tradición de la gestión del agua basada en el aumento de la oferta del recurso y una percepción de las sequías como eventos ante los que nada se puede hacer siguen estando presentes en la planificación hidrológica y aumentando la sensibilidad de las poblaciones ante este tipo de fenómenos al someter a los diferentes sistemas de gestión a altos niveles de estrés hídrico. Además, el retraso en la elaboración y actualización de los Planes orientados a prevenir y mitigar los efectos de la sequía o incluso la inexistencia de estos —como ocurre con los Planes de Emergencia— suponen un deterioro en la capacidad de adaptación ante períodos de escasez, limitando la capacidad de respuesta y por tanto aumentando la vulnerabilidad de las poblaciones frente al riesgo sequía.

Bibliografía

- Adger, W. N. (2006) — “Vulnerability”, en *Global Environmental Change*, 16 (3), 268-281.
- Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I., & Wisner, B. (1996) — *Vulnerabilidad. El entorno social, político y económico de los desastres* (Primera ed., p. 290). Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina.
- IPCC (2013) — “Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability”. IPCC Working Group II Contribution to AR5.
- Lavell, A. (1996) — “Degradación ambiental, riesgo y desastre urbano. Problemas y conceptos: hacia la definición de una agenda de investigación”, en Augusta Fernández, M. (compiladora): *Ciudades en Riesgo: Degradación ambiental, Riesgos Urbanos y Desastres, La Red*, 2-27.

- Morales Gil, A., Olcina Cantos, J., y Rico Amorós, A.M. (2002) — “Aspectos cualitativos de las sequías”, en Ayala-Carcedo y Olcina Cantos (coord.): *Riesgos Naturales*, Ariel Ciencia, 575-603.
- Olcina Cantos, J. y Ayala-Carcedo, F.J. (2002) — “Riesgos naturales. Conceptos y clasificación”, en Ayala-Carcedo y Olcina Cantos (coord.): *Riesgos Naturales*, Ariel Ciencia, 41-70.
- O’Brien, K.L., Eriksen, S., Schjolden, A., Lygaard, L. (2005) — What’s in a word? Interpretations of vulnerability in *Climate Change research CICERO Working Paper* 2004:04, Oslo.
- Sauri, P. D. (2003) — “Tendencias recientes en el análisis geográfico de los riesgos ambientales”, en *AREAS Revista de Ciencias Sociales*, 23, 17-30.

Agradecimientos

Proyecto de Investigación de Excelencia, Convocatoria 2011. Junta de Andalucía. Desarrollo de un modelo de anticipación a las sequías basado en escenarios dinámicos (GUADALSEQ). P11-HUM-7922 (2013-2016).

A DESERTIFICAÇÃO EM SERGIPE, COMO TERRITÓRIO DE RISCO PASSÍVEL DE REABILITAÇÃO

Alberlene Ribeiro de Oliveira

Doutoranda, Núcleo de Pós- Graduação em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe-UFS, Brasil
alberlenegeo@hotmail.com

Josefa Eliane Santana de Siqueira Pinto

Universidade Federal de Sergipe - Núcleo de Pós Graduação em Geografia
Programa de Pós Graduação em Recursos Hídricos - UFS, Brasil
josefaeliane@ufs.br

RESUMO

A desertificação é um processo dinâmico que está associado à origem natural (climática, geológica, vegetacional, hidrológica) e antrópica a partir das atividades que estão sendo desenvolvidas ao longo dos anos, se constituindo em território de risco. A pecuária, por meio do pisoteio dos animais e a agricultura, pelo uso inadequado do solo, ambos podem desencadear o processo de desertificação. O risco surge em diferentes escalas nos territórios e podem ser afetados de modos distintos, com capacidades e respostas desiguais perante problemas semelhantes. Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo analisar os indicadores ambientais e socioeconômicos que se associam aos processos de desertificação, com risco de degradação, no Alto Sertão de Sergipe, no intuito de prevenir ou sugerir ações de reabilitação. A abordagem é de forma interdisciplinar, dialogando com os olhares da Geografia e entre diferentes campos do conhecimento como a climatologia, a biogeografia, a pedologia, a geologia e a geomorfologia. As alterações na periodicidade da sazonalidade climática e a intensa exploração dos recursos naturais, desmatamento indiscriminado e agropecuária extensiva, vêm ultrapassando o limite de utilização destes recursos, promovendo a degradação física, química e biológica do solo.

Palavras-chave: Riscos; Vulnerabilidade; Degradação; Derivações antropogênicas; Clima.

Introdução

Os processos de Desertificação apresentam cenário preocupante de degradação ambiental no planeta e significa fragilidade e riscos socioambientais que desestabiliza as condições de vida da população e dos ecossistemas.

Esse fenômeno despertou atenção da comunidade científica a partir da década de 30, quando surgiu nos Estados Unidos uma tempestade de areia conhecida como Dust Bowl, causando uma intensa degradação do solo. No entanto, somente quando ocorreram às secas na África, na região de Sahel foi que a população deu mais atenção para a gravidade do fato, pois estava afetando tanto o meio ambiente quanto aos aspectos socioeconômicos.

O estudo proposto considera a delimitação cartográfica das Áreas Susceptíveis à Desertificação (ASD) no Alto Sertão do Estado de Sergipe/Brasil, composto por sete municípios Canindé de São Francisco, Monte Alegre, Gararu, Porto da Folha, Poço Redondo, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora de Lourdes, apresentam-se áreas com fragilidade ambiental, que repercute em todo sistema natural e na qualidade de vida da população.

O território do Alto Sertão de Sergipe/ Brasil mostra cenário desafiador de riscos socioambientais, tendo os elementos físicos e antrópicos como relevantes neste processo. O clima, por apresentar temperatura elevada e constante, regime pluviométrico bem irregular em seus totais e em sua distribuição ao longo dos anos; os solos rasos, propensos à erosão; mudanças de organização e de produção espacial pelas atividades humanas.

Território de risco como cenário de desertificação

O conceito de risco é polissêmico e tem sido abordadas por diversas ciências como as naturais, exatas, saúde, sociais e humanas, sendo adaptados segundo o seu objeto em estudo.

Segundo Spink (2001) a gênese do conceito de risco apresentou na história uma incorporação gradativa, com o uso de fatalidade a fortuna primeiramente, e depois com o surgimento de hazard (século XII), perigo (século XIII), sorte e chance (século XV) e, risco (século XVI). Para Rebelo (2010) nem sempre o perigo consiste no risco, isso porque, por hora a manifestação do perigo pode ser controlado, ou mesmo, o fenômeno que simboliza o perigo pode apresentar um recuo.

Destarte, Mendonça (p. 156, 2010), explicita que:

Uma das principais dimensões dos riscos, e de interesse das sociedades, é sua expressão espacial, ou seja, os riscos são espacial e temporalmente datados, o que os torna um dos temas de maior interesse da geografia atual. Neste aspecto não se trata de abordá-los de um ponto de vista apenas natural ou social, ainda que se possa fazê-lo, mas de buscar evidenciar sua expressão geográfica tendo por base a imbricação direta dos diferentes elementos componentes do espaço geográfico. É esta condição que evidencia a concepção dos riscos socioambientais como problemática complexa, pois, sem o envolvimento do interesse social nos riscos naturais, por exemplo, eles permanecem no campo da dimensão física e da materialidade do universo, cuja dinâmica natural é marcada por alterações e mudanças que se processam tanto de maneira lenta quanto rápida ou catastrófica, na sua quase totalidade fora da percepção humana.

Marandola Jr. e Hogan (2005) quanto Torres (2000) defendem que a vulnerabilidade social está atrelada à situação socioeconômica e à capacidade de resposta diante dos riscos ambientais. Ainda os primeiros autores (2005, p.33), relatam que os “naturais passam a ser vistos como ambientais, implicando que os perigos só podem ser compreendidos levando-se em conta o contexto natural e as formas pelas quais a sociedade tem se apropriado da natureza, produzindo perigos”. Assim, a desertificação, seca, tempestades representam cenários de degradação ambiental. Para Monteiro (1988, p.08), o estudo da desertificação no Nordeste do Brasil é um grande desafio, em virtude das implicações climáticas e antropogênicas nunca darão uma visão compreensiva se elas forem tomadas separadamente.

Nesta perspectiva, Sobrinho (2004) ressalta que a desertificação é um fenômeno permanente que eclode e se agrava pelas ações do Homem e da natureza conjugadas aos efeitos do clima que são somados e agravados mutuamente.

Nesse sentido, os riscos acabam gerando problemas ambientais e consequentemente social e econômico, trazendo consequências tanto para as populações, como para seus bens, pois afeta o funcionamento destas e do ecossistema.

Riscos socioambientais no Alto Sertão de Sergipe

O Estado de Sergipe, segundo a Convenção das Nações Unidas de Combate a Desertificação (UNCCD), foi classificado como área frágil (Figura 1), sendo que do litoral para o interior tem-se uma estreita faixa litorânea, sem risco de desertificação; Uma faixa central, abrangendo todo o Estado, no sentido N-S, considerada subúmida, já com riscos de ocorrência de áreas em processo de desertificação; E uma faixa do sertão considerada semiárida, com riscos elevados de se desertificar.

Figura 1: O Estado de Sergipe e as zonas de riscos de desertificação.

Fonte: Atlas digital, SRH, 2004.

A delimitação foi publicada, em 2004, pelo Ministério do Meio Ambiente/Secretaria de Recursos Hídricos no Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAN-Brasil), e nele consta-se a relação de municípios, por estados da Federação participantes das ASD (BRASIL, 2005).

O clima do Alto Sertão sergipano apresenta temperatura elevada e constante, variando entre 24°C e 26°C, com médias mínimas entre 19°C e 21°C. O regime pluviométrico tipo bem irregular em seus totais e em sua distribuição ao longo do ano, as médias anuais variam entre 368 mm e 630 mm, tendo um período seco de primavera-verão e um período chuvoso de outono-inverno, entre abril e agosto. A estação seca é de sete a oito meses e a chuvosa de cerca de quatro meses.

Apresentam-se áreas com riscos a desertificação (Mapa 1), com formação de sulcos, ravinamentos e voçorocas, provocado pela dinâmica natural dos sistemas e pelas derivações antropogênicas. Os solos descobertos tornam-se mais vulneráveis a degradação do solo, visto que a erosão hídrica e eólica promove uma remoção líquida de nutrientes levando o seu empobrecimento.

Mapa 1- Alto Sertão de Sergipe: Municípios e indicadores de degradação do solo
Fonte: Atlas da SRH (2012) e trabalho de campo (2014).

Os afloramentos rochosos estão presentes em todos os municípios, sendo que um dos fatores está relacionado à geologia da área, formada pelos domínios neoproterozóico a mesoproterozóico da Faixa de Dobramentos Sergipana que interfere na realização dos cultivos agrícolas. Esta erosão é provocada também pelo mau uso do solo, resultante especialmente de atividades antrópicas desordenadas que acabam gerando desequilíbrios nos ecossistemas e reduzindo a fertilidade do solo.

Assim, os processos que desencadeiam a desertificação são dinâmicos, como nós de conexões entre a sociedade e natureza, num sistema de inputs e outputs que interfere na qualidade de vida. Portanto, é necessário conhecer a realidade local para aplicar medidas mitigadoras para amenizar e ou evitar os riscos socioambientais.

Conclusão

A desertificação não está somente relacionada ao clima local, há uma interferência do homem uma vez que é através do processo de organização socioespacial dos sistemas produtivos, das relações de produção existentes que historicamente vêm se delineando a intensa e contínua degradação desse espaço, pois este acontecimento é multidisciplinar, envolve vários aspectos físico, social, econômico, político e antrópico.

Em suma, são importantes estudos individualizados e soluções diferenciadas em áreas susceptíveis à desertificação devido à diversidade dos ambientes naturais e dos fatores socioeconômicos de cada território.

Nesse sentido, as práticas adequadas no solo, reflorestamentos de áreas degradadas para minimizar a erosão, restauração de paisagens degradadas, qualidade da água, habitats para a vida silvestre, conservação da biodiversidade, são ações que podem minimizar o desencadeamento da desertificação nos territórios e propiciar a resiliência e áreas degradadas, associadas ou dissociadas das adversidades climáticas, das intempéries de sua constituição física ou de derivações antropogênicas incidentes e reincidentes.

Bibliografia

- BRASIL.MAPA. MMA. Ministério do Meio Ambiente/Secretaria de Recursos Hídricos. (2005). **PAN-Brasil: Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca** - edição comemorativa 10 anos da CCD. Brasília (DF).
- MENDONÇA, F. A. (2010) **Riscos e vulnerabilidades socioambientais urbanos a Contingência climática.** Mercator - volume 9, número especial (1), p. 153 a 163.
- MONTEIRO, Carlos Augusto de Figueiredo. (1988). **Sobre a desertificação no Nordeste Brasileiro e a participação do homem nesse processo.** Latin American Studies, 9. Na Universidade de Tsukuba Ibaraki, Japão.
- SPINK, M. J. P., (2001). **Os contornos do risco na modernidade reflexiva: Considerações a partir da psicologia social.** Psicologia e Sociedade, 12:156-174.
- REBELO, F. (2010). **Geografia Física e riscos naturais.** Coimbra, IUC. P.215.

LA RÉSILIENCE DES VILLES SAHÉLIENNES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE: ETUDE DU CAS DE LA VILLE DE NOUAKCHOTT (MAURITANIE)

Zeineddine NOUACEUR

UMR IDEES, Université de Rouen, France

zeineddine.nouaceur@univ-rouen.fr

RESUMÉ

Confrontées à une nouvelle donne liée au changement climatique qui touche l'ensemble de notre planète (augmentation des températures et un retour des pluies, mais avec plus d'intensité et une arrivée tardive de la mousson), les villes sahéliennes se trouvent aujourd'hui dans des situations de crise du fait d'une plus grande vulnérabilité au risque d'inondation. Nouakchott, la capitale mauritanienne qui a été édifée sur un site fragile est exposée aujourd'hui à cette nouvelle problématique liée à l'excès d'eau (risque accru d'inondation pluviale, par battance de la nappe subaffleurante et par une submersion). Les quartiers spontanés et les nouveaux lotissements situés dans les zones les plus fragiles de la ville (sebkha et zones inondables de la partie ouest de la ville) sont aujourd'hui les zones les plus touchées. L'analyse de cette nouvelle problématique sahélienne à travers l'étude du cas de Nouakchott vise à montrer cette nouvelle tendance qui touche les plus grandes villes de l'Afrique sahélienne. Elle permet aussi d'évoquer les moyens de lutte pour faire face aux conséquences de ces importantes modifications climatiques.

Mots clés : Sahel, Villes africaines, Nouakchott, Vulnérabilité, inondation.

ABSTRACT

Faced with a new situation due to climate change that affects our entire planet (higher temperatures and rains return, but with more intensity and late arrival of the monsoon), the Sahelian cities are now in a crisis situations caused by a greater vulnerability to flood risk. Nouakchott, Mauritania's capital that was built on a fragile site is now exposed to this new problem related to excess water (a increased risk of flood, a raising of level of the subcropping tablecloth and a submersion). Squatter areas and new subdivisions located in the most sensitive areas of the city (sebkha and the fragiles areas in the western part of the city) are now the most affected areas. The analysis of this new sahelian problematic through the Nouakchott case study of aims to show this new trend affecting the biggest cities in Sahelian Africa. it can also show the ways to fight the consequences of these major climate changes.

Keywords: Sahel African cities, Nouakchott, Vulnerability, Flooding.

Introduction

Vers un retour des pluies en Afrique sahélienne ?

Le changement climatique est maintenant largement reconnu par la communauté scientifique. Dans son dernier rapport, le GIEC (IPCC, 2013) évalue la tendance moyenne de la température mondiale au cours de la période 1880 - 2012 à 0,85 ° C avec une incertitude comprise entre 0,65 ° C et 1,06 ° C. Compte tenu de cette augmentation une hausse probable des précipitations est attendue (accélération du cycle hydrologique sous l'effet des fortes températures). Si à l'échelle globale, la hausse des températures ne fait aucun doute, l'évolution de la pluviométrie mondiale est beaucoup plus contrastée, puisqu'elle soumise à une forte variabilité spatio-temporelle. Les résultats de différentes études portant sur l'évolution des précipitations montrent aussi que le changement climatique se traduit par une intensification des précipitations et une récurrence des événements extrêmes (plus perceptible sur les dernières décennies 1991 - 2010).

Dans l'Afrique de l'Ouest sahélienne on assiste depuis quelques années à un retour des pluies dans presque toute la région. Ces pluies tant attendues causent cependant d'importantes inondations urbaines sévères (parfois meurtrières et souvent occasionnant de lourdes pertes économiques) comme ce fut le cas en 2003, au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Sénégal. Cette situation s'est renouvelée durant les hivernages des années 2005, 2007 2008, 2009, 2012 (durant cette année le fleuve Niger a atteint un record jamais égalé à Niamey et Locoja) et 2013 (Nouakchott a subi de très graves inondations durant cette dernière année). Située à la limite méridionale de la zone saharienne, Nouakchott totalise en moyenne près de 107 mm de pluie par an (période 1951-2013), mais une forte variabilité caractérise ce paramètre climatique, comme le confirme un écart-type de 67,52 pour la même période. L'essentiel des précipitations tombe durant l'hivernage, entre juin et octobre, en relation avec la convergence intertropicale qui subit en cette saison une translation vers le Nord. Au cours des dernières années, un timide « retour à la normale » a été observé dans la région, après une longue phase de sécheresse. Sur le graphique (figure 1), on constate que l'évolution des précipitations à Nouakchott est caractérisée par cinq grandes périodes caractéristiques :

- Une phase humide entre 1950 et 1969 : les indices positifs sont majoritaires.

Figure 1. Évolution de la pluviométrie à Nouakchott (indice centré réduit calculé pour les pluies annuelles et moyenne mobile sur cinq ans, période de mesure -1950-2013) (sources des données, Office National de la Météorologie de Mauritanie) <http://www.onm.mr/>

- Une phase sèche de 1970 à 1992 : une longue sécheresse de 22 ans caractérise cette période et seules deux années sont excédentaires (1975 et 1988).
- Une phase humide entre 1993 et 1998 qui représente un retour de la pluie (les indices sont positifs pour huit années).
- Une phase intermédiaire à tendance sèche entre 1999 et 2008, les années sèches l'emportent, mais quelques années humides persistent (2001, 2005).
- Une phase humide entre 2009 et 2013.

Une urbanisation massive et subie

Les grandes agglomérations ouest-africaines sont confrontées aujourd'hui à une transition urbaine accélérée qui peut être génératrice d'une forte demande sociale insatisfaite. Celle-ci

est souvent associée à une gestion mal maîtrisée de l'espace urbain et de son fonctionnement et parfois, elle est subie, ce qui entraîne de graves problèmes sociaux et environnementaux. En effet, la ville africaine a toujours constitué un lieu de refuge pour les populations rurales dont le système de production a été anéanti par les sécheresses climatiques récurrentes observées dans cette région très vulnérable. Cet exode massif s'est traduit par une occupation forcée et illégale de l'espace urbain plus développée sur des milieux naturels vulnérables et fragiles et peu propices à la colonisation urbaine (lits majeurs d'oueds, zones inondables, anciennes carrières...). Après cinquante années d'existence, (Nouakchott est née le 9 février 1957) l'actuelle capitale de la Mauritanie vit depuis une dizaine d'années un bouleversement urbain, économique et sociologique sans précédent. Ainsi, aujourd'hui, cette capitale est devenue un véritable pôle d'attraction et abrite près d'un quart de la population du pays. La contribution de la capitale dans le total de la population (figure 2) enregistre une envolée remarquable dès 1970, date du début de la première sécheresse climatique (en vingt ans, la progression est fulgurante puisqu'on passe de 3 % à près de 21 % de la population totale). Si l'on considère la part de la population urbaine, la courbe montre une très forte augmentation avec un franchissement du cap des 25 % (un ¼ de la population urbaine) en 1975 (38,38 %). A partir de 1980, près de la moitié de la population urbaine mauritanienne réside dans la capitale. En 2025, ce chiffre atteindra près de 60 %.

Figure 2. Évolution de la population à Nouakchott (part de la population totale, part de la population urbaine, 1950-2010) (Source des données <http://www.un.org/en/development/desa/population/>).

Durant toute son histoire, cette jeune capitale n'a cessé d'être sous la menace de la mouvance des sables dunaires, mais paradoxalement, ces dernières années, elle est confrontée à une menace plus dangereuse liée à l'eau en excès (incursion marine, battance de la nappe phréatique, inondation pluviale).

Les changements climatiques accentuent la vulnérabilité de la capitale mauritanienne

Depuis quelques années, à chaque hivernage, on observe à Nouakchott d'importantes inondations urbaines. Ces perturbations bouleversent la vie des citoyens et causent des dommages matériels et infrastructurels importants, parfois accompagnés de pertes humaines.

Les voies de circulation et de nombreux quartiers se retrouvent alors complètement submergées par les eaux. Si cette nouvelle tendance a été amorcée par une intensification des cycles pluviométriques, elle découle aussi de plusieurs paramètres :

- Dysfonctionnements du réseau d'assainissement et de l'absence d'un réseau fiable de collecte des eaux pluviales.
- Battance de la nappe phréatique subaffleurante, sur laquelle repose une partie de la ville (le retour des pluies, mais aussi le site topographique particulièrement bas favorisent une fluctuation positive de son niveau). Cette situation inédite se traduit parfois par des situations dramatiques, comme celle qui a conduit à l'abandon du quartier « Concorde » à la suite de la remontée des eaux saumâtres de la nappe dont le plafond est situé, dans ce secteur, à seulement 30 centimètres de la surface.
- La capitale mauritanienne a été construite sur un plateau dunaire, séparé du cordon littoral par une dépression (sebkha). Malgré l'arrêté n° R.081 du Ministère des mines, en date du 29 septembre 1992, portant interdiction d'exploiter des carrières de sable le long du cordon dunaire (cet édifice protège la ville de Nouakchott de l'océan Atlantique), l'exploitation de ces sites continue. Une estimation de l'Agence de développement urbain en 2003 donne le chiffre d'un prélèvement de sable équivalent à 300 m³. Cette action destructrice (favorisée par un boom de l'immobilier sans précédent) associée à la hausse probable du niveau de la mer (conséquence du réchauffement climatique) accentuent le risque de submersion marine (depuis 1991 on dénombre à Nouakchott huit incidents liés à une incursion marine).

La résilience de Nouakchott face aux changements climatiques

La Mauritanie fait partie des pays les moins avancés de la planète, elle a donc ratifié le programme d'action nationale d'adaptation aux changements climatiques (Ministère du développement rural et de l'environnement, 2004). Un volet spécial au sein de ces directives prioritaires est consacré à la capitale. Nommé «programme spécial de sauvegarde de la ville de Nouakchott et de ces infrastructures» il préconise d'instituer et de rendre obligatoire l'application des normes d'urbanisme en fonction des changements climatiques et des différents scénarios de hausse du niveau de la mer. Un Plan d'Aménagement du Littoral a été publié en juin 2005 par le Ministère des Pêches et de l'Économie. Ce programme reconnaît la fragilité du trait de côte du littoral de Nouakchott et de son rôle protecteur contre les intrusions marines et dans le même temps, il insiste sur la nécessité de préserver son rôle de barrages qui dépend étroitement des actions d'aménagement et de protection de ce site. Enfin, suite à son adhésion totale au projet de la ceinture verte sahélienne (grande initiative sahélienne qui vise la mise en place d'une barrière d'arbres qui s'étend de Dakar jusqu'à Djibouti), la Mauritanie entreprend en 2010 une action d'envergure «le programme spécial pour la protection de la ville de Nouakchott» (PSPVN) (2010-2014). Ce plan a pour objectif principal la protection contre l'ensablement et les incursions marines (MEDD, 2012).

Conclusion

La vulnérabilité de Nouakchott ne cesse de s'amplifier sous le poids d'une démographie toujours croissante et une urbanisation massive subie. Aujourd'hui, **à chaque hivernage**, cette jeune capitale est confrontée **à une recrudescence d'importantes inondations urbaines**. La résilience affichée par cette ville montre la prise de conscience des autorités locale face la

gravité de la situation. Cependant, ces événements majeurs sont-ils les prémices d'un changement climatique confirmé? Résultent t-ils d'une non-maîtrise des problèmes d'aménagement et d'une colonisation anthropique qui bouleverse l'équilibre des milieux naturels? Il est difficile de répondre aujourd'hui à ces questions, mais il est certain que la lutte pour sauver la capitale mauritanienne va être longue et très difficile.

Bibliographie

Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, (2013) - *Changements climatiques en 2013*, Les éléments scientifiques, résumé à l'intention des décideurs, service d'appui technique du groupe de travail I GTI, https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/docs/WG1AR5_SPM_brochure_fr.pdf,

Ministère du développement rural et de l'environnement, (2004) - *Programme National pour l'Adaptation aux Changements Climatiques*, 72 p.

Ministère délégué auprès du premier ministre chargé de l'environnement et du développement durable, (2012). Fiche résumée du projet : *Programme spécial pour la protection de la ville de Nouakchott*. Nouakchott

THE ROLE OF PHYSICAL ENVIRONMENT IN THE GENESIS AND AMPLIFICATION OF FLOODS IN NADOR (NORTHEAST MOROCCO)

Abdelkader Sbaï

Laboratory of Geomatics, Heritage and Development.
University Mohammed Premier, Oujda, Morocco
sbaï_abdelkader@yahoo.fr

Jose Eduardo Rodríguez-Juan

Laboratory of Geomatics, Heritage and Development.
University Mohammed Premier, Oujda, Morocco
josedurj@gmail.com

Abderrahmane El Harradji

DYMADER Laboratory (Arid Environments Processes and Regional Development). University Mohammed Premier, Oujda, Morocco
elharradji@yahoo.fr

ABSTRACT

Northeast Morocco has experienced significant socio-economic changes that induce dramatic developments of urban areas and massive rural exodus. The urban growth processes are sometimes poorly controlled and occur on vulnerable areas.

Nador is located on the bottom of Gourougou foothills where many streams converge. Flooding is recurrent phenomenon in this site. Several exceptional rainfall events and critical flow rates were recorded in the recent decades. Thus, Nador city located on a base level plain is potentially threatened by storms falling on too close steep slopes.

The purpose of this study is identifying and mapping areas threatened by floods in Nador. The combination of different information layers dealing with land use, drainage network, slopes, lithology/geology and road network, using remote sensing and GIS tools provides vulnerability indicators and allows drawing a flood risk map. The objective is hazard causes understanding, to help early warning and to define the potential extent of flood in threatened urban areas.

Key-words: Flood risk, remote sensing / GIS, urban management, northeast Morocco.

Introduction

In the Northeast Morocco, Nador city experienced recurrent floods during the past 50 years, among them those occurred on 2008 and 2009 as extreme events (Figure 1). This study aims understanding the active processes and stream hydrological behavior, and then focuses on controlling the incurred risks.

A rather constraining natural frame

A rugged terrain with low permeability, favorable to increasingly runoff

Rising at 879 m, the Neocene stratovolcano (8 My) of Gourougou stretches about 25 km from West to East and 15 km from North to South, with steep slopes. In the south, the Beni Bou Ifrouir hills are shaped in Jurassic and Cretaceous rocks (schist, quartzite, limestone-marl and marl-sandstone), while low plain of Nador is an area of recent alluvial spreading (Miocene and Quaternary), (figure 2).

Figure 1. Location of the study area.

Figure 2. The main geomorphologic units of the massif of Gourougou.

A Mediterranean climate with differentiated seasons

The climate of the study area is Mediterranean, arid semi arid, with annual rainfall mean around 360 mm and 18.3 °C as annual temperature mean in Nador (August: 31.1 °C; January: 6.5°C). The 2008 storm recorded 735mm and caused great damage.

A diverse vegetation

The massifs of Gourougou and Beni Bou Ifrou are almost completely deforested. The soil restoration and reforestation works had been undertaken since colonial period (eucalyptus and Aleppo pine). Due to the lack of vegetation, this area is subject to aggressive weathering, rapid flows, hence, accentuating spasmodic runoff regime.

Figure 3. Watersheds.

Hydrographic feature: a disrupted flow network

The eight tributaries of Oued Bousardoune drain a watershed of area of 72.7 km² (Figure 3). The shapes of recorded hydrographs are related to morphological characteristics, besides the nature of the downpour. Several formulas and indices allow decrypting these features (Table I).

Table I. Morphologic characteristics of major watersheds

Bassin-versant	Superficie en km ²	Périmètre en km	Indice de compacité (de Gravelius)	Rectangle L (km)	équivalent l (km)	L / l
O. Tiraqaâ	7,66	11,35	1,16	3,58	2,14	1,67
I.Ouzemmour	5,48	14,62	1,76	6,53	0,84	7,78
O.Berraq	14,46	20,45	1,52	8,63	1,68	5,15
O. Tassadjaya	4,31	12,21	1,66	5,34	0,81	6,62
I. Ila'riyine	1,94	5,97	1,21	2,06	0,94	2,19
I. Azougagh	8,67	14,95	1,43	6,12	1,42	4,32
Ouled Haddou Rahhou	13,80	17,13	1,30	6,51	2,12	3,07
O. Izarzar	10,32	15,34	1,35	6,01	1,72	3,50
I. Ihazzamene	3,52	12,20	1,83	5,50	0,64	8,60
O. Bousardoune	72,70	48,42	1,60	20,92	3,47	6,02

Gravelius compactness index defines the shape of the drainage basins: in this case, it ranges from 1.16 to 1.83, reflecting a relatively elongated watershed. The main course has an index of 1.6. It forms a powered linear valley, especially on the left bank, by a succession of tributaries (Figure 3). This situation favors further flood waves growing downstream, while supported from the tributaries. Irhzer Ouled Haddou, drains the massif of Beni Bou Ifrouf with a steepness of 1%, whilst steepest valleys lie in the Gourougou massif with values of 5 to 10% (O. Berraq, O. Izarzar, I. Ihazzamene).

The seasonal variability of water flows regime is well correlated to the rainfall regime, with high flows in winter and spring, while lowering in summer. The only one perennial river in the province of Nador records in May a flow range between 0.033 and 30 m³/s at Dar Driouch and between 0.033 and 30 m³/s at Tlet Azlef (1969-2009). The maximum instantaneous flow reached 2400 m³/s on 24/10/2008 at 2.30, in a dry period.

Flooding of October 2008

Hydrological conditions

The year 2008-2009 began with very heavy rainfall. On 25 and 26 October 2008, heavy rain fell on the region of Nador. They reached 123 mm in Nador and caused violent and devastating flooding. (Figure 4).

Figure 4. Rainfall in October 2008.

Impact on runoff and sediment load

Due to a great thunderstorm, one of the most deadly and devastating flood occurred on 23-24/10/2008, lasting only 8 hours, but rising barely in 3 hours. The peak value of 2400 m³/s was reached at Dar Driouch on 24/10/2008, at 00:30, mobilizing a runoff volume of 35.5 million m³ (Figure 5).

Figure 5. Qued Kert flood hydrograph.

The hydrograph sharpness highlights the monogenic simple flood with a strong tip, fairly short rise and drop with an extended depletion (Sbaï *et al.* 2010). Qued Bousardoune as well as Qued Tiraqaa cause severe flooding downstream in Nador city, constantly threatened by flow deposits and narrowing due to uncontrolled urbanization.

Socio-economic consequences and preventive measures

Floods that could have serious consequences are quite frequent in Northeast Morocco. They make roads dangerous and unusable (Photos 1, 2 and 3).

Photos 1-2-3. Examples of flood damage in Nador city (2008)

On 26th October 2008, Nador city and suburbs experienced a powerful unexpected brutal flood. According to official report, 4 people died and several buildings and roads were damaged, hundreds of victims relocated, drinking water supply cut, power network damaged, wells and irrigation channels, roads, bridges, all affected.

Preventive measures

Although an emergency plan was adopted earlier in the 1990s to protect Nador, after this disaster event, structures were needed to intercept carried sediment load.

Photos 4-5: A rainwater channel (2009) to reduce flooding; flood in Nador (2008).

Several development works have been completed or are underway: overflow protection system re-establishment within streams, trapezoidal channel structures (bays, coating stairs, falls), bridges building and restoring, riverbed cleaning, landscaping slopes.

Conclusion

Climate and impermeable litho-structural context, steep slopes, give torrential flows and brutal pulses to runoff. Harmful impacts are visible in Nador city and its surroundings. To face amplification and repetition of floods threatening Nador city located on a base level plain, strengthening civil engineering structures is needed, as preventive hydraulic measures, then sensitizing residents to this natural hazards and the danger of uncontrolled urbanization, in order to avoid damages.

References

Sbaï, A.; Ghzal, M.; Benrbia, Kh.; Elhouadi, B.; Lasgaa, H.; Bahkan, M. et Boulehoual, H. (2010) - Rôle du milieu physique dans la genèse et l'amplification des inondations en milieu de montagne : exemple de la ville de Nador (Maroc nord-est). 17e Rencontre des Géomorphologues Marocains. Beni Mellal, 5 et 6 mai 2010.

APLICAÇÃO DO SISTEMA HIDRALERTA NA AVALIAÇÃO DO RISCO ASSOCIADO AO GALGAMENTO NO PORTO DA PRAIA DA VITÓRIA

C. Fortes, R. Reis, M.T. Reis, P. Poseiro, R. Capitão, L. Pinheiro, J. Craveiro

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) jfortes@lnec.pt, rreis@lnec.pt, treis@lnec.pt, pposeiro@lnec.pt, rcapitao@lnec.pt, lpinheiro@lnec.pt, jcraveiro@lnec.pt

J. A. Santos

Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL)
d1486@dec.isel.pt

Silva, J.C. Ferreira, M. Martinho, A. Sabino, A. Rodrigues, P. Raposeiro, C. Silva

Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) da Universidade Nova de Lisboa (UNL) s.silva@campus.fct.unl.pt, jcrf@fct.unl.pt, mf.martinho@campus.fct.unl.pt, andre.sabino@gmail.com, a.rodrigues@fct.unl.pt, praposeiro@fct.unl.pt, cpsilva@fct.unl.pt

Simões, E.B. Azevedo, F. Vieira

Centro de Estudos do Clima, Meteorologia e Mudanças Globais (CMMG) e Laboratório de Ambiente Marinho e Tecnologia (LAMTec) / Universidade dos Açores
anabela@uac.pt; edubrito@uac.pt, fvieira@lnec.pt

M.C. Rodrigues

Sociedade de Gestão Ambiental e Conservação da Natureza - AZORINA, SA
Maria.CS.Rodrigues2@azores.gov.pt

RESUMO

O sistema HIDRALERTA é um sistema de previsão, alerta e avaliação do risco associado ao galgamento e inundação em zonas costeiras e portuárias, tendo como ideia base a utilização de medições/previsões da agitação marítima nessas zonas, para calcular os efeitos dos galgamentos e inundações. Trata-se de um sistema modular que permite: a avaliação, em tempo real, de situações de emergência, a consequente emissão de alertas às entidades competentes, e a produção de mapas de risco para apoio ao processo de tomada de decisão, em particular, e à gestão costeira e portuária, em geral.

Nesta comunicação descrevem-se os principais desenvolvimentos efetuados, até ao presente, na componente avaliação de risco do sistema HIDRALERTA e apresenta-se uma das aplicações do sistema ao porto e baía da Praia da Vitória, ilustrando as potencialidades do mesmo.

Palavras-chave: HIDRALERTA; Agitação marítima; Galgamento; Inundação; Risco.

Introdução

A avaliação do risco de ocorrência de galgamentos/inundações de zonas costeiras e portuárias tem grande relevância para a segurança e gestão destas zonas. Encontra-se em desenvolvimento, desde 2012, o sistema HIDRALERTA (Poseiro *et al.*, 2013a, b, Fortes *et al.*, 2013 e 2014), que é um sistema de previsão, alerta e avaliação de risco associado ao galgamento e inundação em zonas costeiras e portuárias, a partir de medições/previsões da agitação marítima ao largo. O sistema está a ser desenvolvido, por componentes, em linguagem Python e implementado numa plataforma WebGIS.

O sistema consiste em quatro módulos, Figura 1: I - Agitação marítima, para a determinação das características da agitação marítima ao largo e em áreas costeiras e portuárias; II - Galgamento e inundação, para a avaliação dos galgamentos e inundações em zonas costeiras e infraestruturas portuárias; III - Avaliação do risco, para a análise de séries temporais longas

de agitação e galgamentos (ou cenários pré-definidos associados às mudanças climáticas e/ou eventos extremos) e elaboração de mapas de risco para apoio à gestão costeira e portuária; e IV - Sistema de alerta, para a análise, em tempo real, das situações de emergência e envio automático de mensagens de alerta para as autoridades responsáveis. Os protótipos do sistema estão a ser construídos para dois locais da costa portuguesa: o porto da Praia da Vitória, Terceira, Açores e a praia de S. João da Caparica, Almada.

Figura 1. Esquema do sistema HIDRALERTA.

O presente trabalho descreve os desenvolvimentos recentes do sistema HIDRALERTA no que respeita à avaliação do risco (Módulos I a III, Figura 1) e a sua aplicação ao caso de estudo do porto e baía da Praia da Vitória.

Desenvolvimentos do Sistema HIDRALERTA

Os desenvolvimentos recentes para os Módulos I a III, i.e., no âmbito da avaliação do risco, Figura 1, consistiram em:

Módulo I: a) Automatizar o processo de *download* (Poseiro *et al.*, 2013a) dos dados referentes: à agitação marítima provenientes do modelo de previsão WaveWatchIII (FNMOCC - *The Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center*) ou do modelo WAM (ECMWF - *European Centre for Medium-Range Weather Forecasts*); às marés astronómicas, com o modelo WXTide; e aos ventos, fornecidos também pelo FNMOCC ou pelo ECMWF; b) Acoplar os modelos numéricos SWAN e DREAMS (incluindo o forçamento do SWAN com resultados dos modelos referidos em a), Poseiro *et al.*, 2013a) e validar cada modelo, bem como o seu acoplamento, através da comparação com dados *in situ*, obtidos na zona da Costa da Caparica em campanhas de medição de agitação marítima (29-30 outubro 2012) e de levantamento de perfis de praia (29-30 abril 2014); c) Automatizar os processos de criação dos *layouts* gerados por cada um dos modelos numéricos (Poseiro *et al.*, 2013a); d) Desenvolver uma rede neuronal do tipo ARTMAP com lógica Fuzzy (Santos *et al.*, 2014) para determinação de

condições de agitação marítima à entrada e no interior de portos, que tem grande eficiência computacional e poderá substituir a utilização dos modelos SWAN e DREAMS.

Módulo II: a) Realizar programas em FORTRAN para a implementação das fórmulas empíricas (Neves *et al.*, 2013), de modo a efetuar o acoplamento destas fórmulas e da ferramenta neuronal NN_OVERTOPPING2 (Coeveld *et al.*, 2005) com os modelos numéricos de propagação de ondas, bem como a visualização automática dos resultados; b) Considerar novas formulações de espraçamento e galgamento para o caso de estruturas localizadas em zonas de águas pouco profundas ou com o pé da estrutura essencialmente acima do nível de água (Mase *et al.*, 2013); c) Utilizar outra ferramenta neuronal, OVERTOPPING Predictor v1.1 (Verhaeghe, 2005), em alternativa à NN_OVERTOPPING2, com o objetivo de comparar os resultados de galgamentos destas duas ferramentas (Reis *et al.*, 2014).

Módulo III: a) Avaliar o risco de galgamento e inundação com base numa metodologia qualitativa de avaliação das consequências para os dois casos de estudo

(Praia da Vitória e Costa da Caparica); b) Analisar a evolução do risco costeiro na Costa de Caparica através da aplicação do Índice Vulnerabilidade Costeira (CVI), Índice de Perigosidade Costeira (CHI) e Índice do Valor dos Elementos Expostos (VEI); c) Avaliar as consequências (Poseiro *et al.*, 2013b) através da aplicação do Processo de Análise Hierárquica (AHP) que consiste no desenvolvimento de um índice espacial de pressão antrópica (Antunes, 2012; Craveiro, 2014), para o caso da Praia da Vitória. A metodologia AHP baseia-se na ponderação de dimensões e indicadores de vulnerabilidade com recurso a sucessivas avaliações emparelhadas através de uma escala e testes de consistência próprios para a sua aplicação.

Aplicações do Sistema HIDRALERTA ao Porto e Baía da Praia da Vitória

O porto e a baía da Praia da Vitória situam-se na costa Este da ilha Terceira, no arquipélago dos Açores. A baía, limitada a norte pela Ponta da Má Merenda e a sul pela Ponta do Espírito Santo, tem cerca de 2400 m de comprimento e 1100 m de largura máxima. Uma defesa frontal, com 5 esporões, e 2 quebra-mares (norte e sul) à entrada, protegem a baía e as instalações portuárias, Figura 2a.

São várias as aplicações do sistema na sua vertente de avaliação de risco de galgamento (Módulos I, II e III), ao longo do porto e baía da Praia da Vitória, com a construção de mapas de consequências pela metodologia simples (Poseiro *et al.*, 2013a) e pelo método AHP (Poseiro *et al.*, 2013b), Figura 2b, bem como com a definição de mapas risco, Figura 2d, considerando 9 secções-tipo das estruturas marítimas portuárias (quebra- mares, sul e norte, e defesa frontal aderente). Um dos recentes estudos neste porto (Reis *et al.*, 2014) foi a aplicação de duas ferramentas neuronais distintas, NN_OVERTOPPING2 e OVERTOPPING Predictor v1.1, para o cálculo dos galgamentos das várias estruturas portuárias, sendo o período de estudo de 5 anos (2008 a 2012). Avaliou-se comparativamente quais as implicações que a utilização de cada uma destas ferramentas tem em termos de número de eventos de galgamento e magnitude dos caudais médios galgados, bem como o grau de risco associado, para as 9 secções D1 a D9, Figura 2c, d. Dos resultados obtidos, constata-se que NN_OVERTOPPING2 conduz a um grau de risco de galgamento igual ou superior à

da ferramenta OVERTOPPING Predictor v1.1, uma vez que a ferramenta NN_OVERTOPPING2 calcula valores significativamente superiores em termos de caudal médio galgado em relação ao obtido com OVERTOPPING Predictor v1.1, apesar de com esta última a identificação da ocorrência de eventos de galgamento ser muito superior, mas de baixo valor.

Perfil	Probabilidade (%)		Grau de probabilidade		Grau de consequências	Grau de risco	
	NN_OVER	OVER	NN_OVER	OVER		NN_OVER	OVER
Quebra-mar Sul							
D3	0.56	0.10	1	1	2	2	2
D8	7.35	-	2	-	2	4	-
Defesa Frontal							
D1	0.02	0.00	1	1	1	1	1
D2	3.04	0.03	2	1	2	4	2
D4	1.22	0.00	2	1	2	4	2
D5	1.04	0.00	2	1	2	4	2
D6	0.36	0.00	1	1	2	2	2
D7	0.01	0.00	1	1	2	2	2
Quebra-mar Norte							
D9	0.28	0.00	1	1	2	2	2

Figura 2. Porto da Praia da Vitória: a) Secções D1 a D9; b) Mapa de consequências pelo AHP; c) Resultados das duas ferramentas neuronais (categoria pessoas); d) Mapa de risco, com avaliação das consequências pelo método simples e utilizando os resultados em c) de NN_OVERTOPPING2 e de OVERTOPPING Predictor v1.1.

Conclusão

Esta comunicação descreve alguns dos recentes desenvolvimentos do sistema HIDRALERTA, na sua componente de avaliação do risco, que ilustram as suas potencialidades. De entre os resultados obtidos destaca-se a aplicação de duas redes neuronais para cálculo dos galgamentos, a construção de mapas de consequências e de risco. O trabalho futuro passa necessariamente por uma validação de cada componente do sistema e também do sistema como um todo, quer para o caso de estudo aqui referido, quer para outros locais da costa portuguesa.

Agradecimentos

Os autores agradecem o financiamento da FCT através do projeto HIDRALERTA - PTDC/AAC-AMB /120702/2010. A participação de E.B. Azevedo e de F. Vieira foi feita no âmbito do projecto ESTRAMAR (FEDER - MAC/3/C177). Agradecem também à WW, aos Portos dos Açores e à Câmara Municipal de Praia da Vitória pela disponibilização dos dados de base necessários à realização deste trabalho.

Bibliografia

- Antunes, O. (2012). Análise Multicritério em SIG para Determinação de um Índice Especializado de Pressão Antrópica Litoral. Casos de Espinho, Caparica e Faro. Tese de Mestrado, FCSH, Universidade Nova de Lisboa.
- Coeveld, E.M., Van Gent, M.R.A. e Pozueta, B. (2005). Neural Network Manual NN_OVERTOPPING2. CLASH WP8, June.

- Craveiro, J.L. (2014). A percepção do risco de erosão costeira e galgamento oceânico e a produção de um índice de vulnerabilidade social: a metodologia multicritério AHP (Analytic Hierarchy Process), âmbito de aplicação e limitações de análise. Atas do VIII Congresso Português de Sociologia. Évora, Universidade de Évora, 14-16 de abril.
- Fortes, C.J.E.M., Reis, M.T., Poseiro, P., Capitão, R., Santos, J.A., Pinheiro, L.P., Rodrigues, A., Sabino, A., Rodrigues, M.C., Raposeiro, P., Ferreira, J.C., Silva, C., Simões, A. e Azevedo, E.B. (2013). O Projeto HIDRALERTA. Sistema de Previsão e Alerta de Inundações em Zonas Costeiras e Portuárias. 8^o JPECP, LNEC, 10 e 11 de outubro.
- Fortes, C.J.E.M., Reis, M.T., Poseiro, P., Santos, J.A., Capitão, R., Pinheiro, L., Sabino, A., Rodrigues, A., Ferreira, J.C., Martinho, S., Raposeiro, P., Silva, C., Simões, A., Azevedo, E.B., Rodrigues M.C. (2014). Desenvolvimentos recentes do HIDRALERTA - Sistema de previsão e alerta de inundações em zonas costeiras e portuárias. 3as Jor.de Eng. Hidrográfica, IH, 24-26 de junho.
- Mase, H., Tamada, T., Yasuda, T., Hedges, T.S. e Reis, M.T. (2013). Wave runup and overtopping at seawalls built on land and in very shallow water. JWPCOE, Vol. 139(5), pp. 346-357.
- Neves, P., Poseiro, P., Fortes, C.J.E.M., Reis, M.T., Capitão, R., Antunes do Carmo, J.S., Raposeiro, P. e Ferreira, J.C. (2013). Aplicação da metodologia de avaliação do risco de inundação/galgamento na praia de São João da Caparica. 8^o JPECP, LNEC, 10 e 11 de outubro.
- Poseiro, P., Fortes, C.J.E.M., Reis, M.T., Santos, J.A., Simões, A., Rodrigues, C. e Azevedo, E. (2013a). A methodology for overtopping risk assessment in port areas: Application to the Port of Praia da Vitória (Azores, Portugal). Proc. SCACR 2013, LNEC, 4 a 7 de junho.
- Poseiro, P., Fortes, C.J.E.M., Santos, J.A., Reis, M.T. e Craveiro, J. (2013b). Aplicação do processo de análise hierárquica (AHP) à análise das consequências de ocorrência de galgamentos. O caso da baía da Praia da Vitória. 8^o JPECP, LNEC, 10 e 11 de outubro.
- Reis, R., Fortes, C.J.E.M., Reis, M.T., Poseiro, P. e Santos, J.A. (2014). Avaliação comparativa de ferramentas neuronais. Aplicação à Praia da Vitória, Terceira, Açores. VI SEMENGO - Seminário e Workshop em Engenharia Oceânica, Rio Grande, RS-Brasil, 12-14 novembro.
- Santos, F.L., Neves, D.R.C.B., Reis, M.T., Fortes, C.J.E.M., Poseiro, P., Lotufo, A.D. e Maciel, G.F. (2014). Definition of Sines Port Wave Regime Using an ARTMAP Artificial Neural Network With Fuzzy Logic. Proc. 3rd IAHR Europe Congress, 14 a 16 de abril, Porto.
- Verhaeghe, H. (2005). Neural Network Prediction of Wave Overtopping at Coastal Structures. PhD Thesis, Universiteit Gent, Belgium.

DETERMINAÇÃO DE FREQUÊNCIAS DE EVENTOS EXTREMOS DE CHUVA NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL

Célia Campos Braga

Unidade Acadêmica de Ciências Atmosféricas, Universidade Federal de Campina Grande, celia@dca.ufcg.edu.br

Bernardo Barbosa da Silva

Unidade Acadêmica de Ciências Atmosféricas, Universidade Federal de Campina Grande, bernardo@dca.ufcg.edu.br

Francisco das Chagas Nascimento Araújo

Unidade Acadêmica de Ciências Atmosféricas, Universidade Federal de Campina Grande, franciscofisica@ufersa.edu.br

Francisco de Assis Salviano de Sousa

Unidade Acadêmica de Ciências Atmosféricas, Universidade Federal de Campina Grande, fassis@dca.ufcg.edu.br

Milena Pereira Dantas

Unidade Acadêmica de Ciências Atmosféricas, Universidade Federal de Campina Grande, milena@dca.ufcg.edu.br

RESUMO

A seca é um dos fenômenos climáticos que mais causa danos à agricultura de uma determinada região, provocando sérios impactos sociais, econômicos e ambientais. A região Nordeste do Brasil, apesar de chover consideravelmente, a parte semiárida, é periodicamente afetada pela ocorrência de secas comprometendo o abastecimento de água devido, principalmente, à irregularidade da estação chuvosa. O presente trabalho objetiva detectar e analisar eventos de seca e chuva no Maranhão. Determinaram-se regiões de homogêneas do Standardized Precipitation Index (SPI) na escala sazonal (SPI-6) para séries climatológicas de 1987 a 2013. A análise do SPI na escala semestral mostrou que as décadas 1990 a 2000 apresentaram as maiores frequências de eventos secos. Na RH1 as maiores secas ocorreram de set/91 a jun/93, com 22 meses e a RH5 de nov90 a out93 com 36 meses. Os eventos chuvosos em RH1 ocorrem de jan88 a maio90 (29 meses) e na RH5 mar/96 a ago/97 89 (18 meses). Observa-se que no geral a região RH1 possui mais eventos de seca que chuva, porém de pouca duração. É importante salientar que a maioria dos eventos de seca nas regiões está associada ao fenômeno ENOS.

Palavras-chave: SPI, Chuva, eventos extremos e regiões homogêneas

Introdução

O Estado do Maranhão não se encontra no contexto do polígono das secas, pois apresenta condições climáticas bem definidas, apesar da distribuição espacial e temporal da precipitação ser bastante irregular, concentrando-se em poucos meses comprometendo a produção agrícola da região gerando sérios problemas econômicos e sociais. Por estar localizado em uma região de transição recebe influências das características climáticas do semiárido nordestino, da Amazônia quente e úmida, dos chapadões do Brasil central e atuação de sistemas meteorológicos, e ainda da influência das condições dos Oceanos Atlântico e Pacífico Tropical. Outro aspecto relevante é diversidade de ecossistemas que compõem o seu espaço geográfico, onde são encontradas áreas com formações de floresta, várzeas, cerrado, manguezais, dunas, chapadões, etc. (Menezes, 2009). Uma análise da variabilidade das precipitações em diferentes escalas de tempo é importante tanto no ponto de vista hidrológico quanto ecológico, pois nas regiões de florestas a intensidade de frequência das secas não se quantifica simplesmente com os totais médios anuais. McKee et al. (1993) em seus estudos propuseram um índice denominado Standardized Precipitation Index (SPI) que permitisse quantificar a precipitação em diferentes escalas de tempo.

A cada valor de precipitação, corresponde um valor de SPI, que é diretamente proporcional ao déficit de precipitação e está associado a sua probabilidade de ocorrência. Esse índice focaliza

eventos chuvosos/secos severos, extremos e muitos extremos de uma determinada região. Seiler et al. (2002) usaram o SPI para estudar as inundações ocorridas na província de Córdoba, Argentina. Os resultados mostraram que o SPI é eficaz para monitorar risco climático regional. Min et al. (2003) usaram o SPI da precipitação mensal e do CRU (com resolução horizontal de $0,5^\circ \times 0,5^\circ$) para estudar as relações espaciais e temporais da ocorrência e intensidade das secas na Coreia e no leste Asiático. Os autores verificaram que a frequência de ocorrência de secas na Coreia vem aumentando a partir da década 1980. Altamirano (2010) utilizou dados do SPI para região sul da Amazônia e norte do Brasil para definir períodos secos e chuvosos nas referidas regiões. Neste contexto, o presente trabalho visa analisar e determinar frequências de eventos extremos de seca e chuva em regiões homogêneas no estado do Maranhão situado no Nordeste do Brasil.

Dados e metodologia

A partir de séries mensais de 84 estações meteorológicas no período de 1987-2013, calculou-se o SPI-6 e determinaram-se as regiões homogêneas do SPI-6 para o Maranhão, a partir da análise de agrupamento proposta por Ward, em 1963 (Gong e Richman, 1995; Wilks, 2006). Fez-se a média das séries históricas dos SPI-6 de cada uma das regiões homogêneas do Estado conforme (Figura 1). O SPI foi obtido a partir da metodologia desenvolvida por (McKee et al. 1993) que tem por objetivo monitorar e analisar as secas em escalas de tempo, utilizando apenas dados de precipitação. O SPI é determinado a partir das funções de densidade de probabilidade que descreve as séries temporais em diferentes escalas de tempo, por exemplo, 1, 3, 6 e 12 meses. Conhecida a distribuição de probabilidade acumulada, a chance de uma quantidade de precipitação observada é obtida e o SPI é calculado usando a distribuição inversa (McKee et al., 1995). Para fins de ajuste da precipitação, consideraram-se as distribuições de probabilidade gama incompleta e Gaussiana (normal) para distintas escalas de tempo (Edwards e McKee, 1997; Altamirano, 2010; Sansigolo, 2004). Neste estudo utilizou-se a probabilidade das precipitações acumuladas na escala de 6 meses, as quais foram ajustada pela distribuição normal, ou seja:

$$SPI = z_i = (P_i - \bar{P}) / \sigma_i, \text{ em que } P_i \text{ é a precipitação observada, } \bar{P}$$

Precipitação média e σ_i desvio padrão da série ajustada.

A classificação é feita com base nos limites proposto por McKee et al. (1993) indicados na Tabela I. Este método não somente permite caracterizar as secas, mas também os períodos mais úmidos. Também tem a grande vantagem de padronizar a análise, permitindo comparar regiões totalmente distintas, como por exemplo, regiões com climas mais úmidos e chuvosos com regiões mais áridas e secas.

Tabela I. Classificação do Índice de Precipitação Padronizada (SPI) proposto por McKee et al. (1993)

SPI	Classificação
$\geq 2,00$	Extremamente úmido
1,00 a 1,99	Muito úmido
0,50 a 0,99	Moderadamente úmido
0,49 a -0,49	Próximo ao normal
-0,50 a -0,99	Moderadamente seco
-1,00 a -1,99	Muito seco
$\leq -2,00$	Extremamente seco

Resultados e discussão

A seguir serão mostrados apenas os resultados obtidos para duas regiões homogêneas do SPI -6, uma na região norte e outra na região sul do estado do Maranhão - Nordeste do Brasil (Figura 1).

Figura 1. Regiões homogêneas do SPI-6 no estado do Maranhão-Brasil, usando a análise de agrupamento de Ward, em 1963 (Wilks, 2006)

As Figuras 2 e 3 ilustram os histogramas de frequência das categorias dos eventos secos e chuvosos do SPI-6 para a região RH1(norte) e RH5(sul) no Maranhão, respectivamente. Como os dados são ajustados para uma distribuição normal, a distribuição tem um comportamento assimétrico. As Tabelas 2 e 3 mostram os resultados das características (início, fim, duração e índice médio) dos eventos secos e chuvosos que ocorreram nas duas regiões selecionadas do SPI-6. Observa-se que, na Tabela II, correspondente a RH-1(Norte), ocorreram em média 17

eventos de seca e 10 chuvosos. As maiores sequências médias de seca ocorreram nas décadas de 1990 e 2000, perdurando cada uma 22 meses, ou seja, uma de set91 a jun93 e a outra de set05 a jun07. Valores médios do SPI-6 indicaram intensidades de secas moderadas, fraca e normal variando de -0,30 a -1,18. A maior sequência chuvosa de 29 meses ocorreu na década de jan/88 a maio/90 com intensidade média de 1,47 e máximo médio de 1,94. Nos demais meses, os eventos chuvosos foram, de acordo com o SPI-6, classificados em chuva fraca e normal, com média de 0,07 a 0,82. Embora tenham ocorrido mais eventos de seca do que de chuva, as secas foram menos intensa. De acordo com a climatologia da chuva da região Nordeste, as secas que ocorrem na RH1 são influenciadas diretamente pela atuação do fenômeno de El Niño (Hastenrath & Heller 1977; Molion & Bernardo 2002). Como está indicada na Tabela III, a RH5 situada no sul do Estado tem regime climático diferenciado da RH1. Nessa região a maior seca com duração de 36 meses ocorreu nos meses de nov90 a out93 com intensidade média SPI de -1,24 e máxima de -2,30, enquanto que os eventos de chuva ocorreram por 21 meses, de abr10 a dez11 com média de 0,86 e máximo médio de 1,75. Identificaram-se secas fraca, moderada e normal com média de -0,30 a -1,58 e de chuva fraca, moderada e normal de 0,10 a 1,53. Pelo exposto, observa-se que o sul do Estado é bem mais seco que o norte. A análise dos histogramas de frequências mostra claramente que a intensidade das secas na região Sul é maior que na Norte. Por exemplo, em média, na RH1 ocorrem 56 meses muito seco oscilando entre -1,15 a -1,24, enquanto na RH5 registraram-se 76 meses muito seco que variaram entre -1,17 a -1,58. O regime pluviométrico dessa região é mais influenciado pela Zona Convergência do Atlântico Sul e Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs), as maiores das chuvas registradas são de novembro a abril (Kousky e Gan, 1981; Carvalho et al., 2004).

Figura 2. Histograma de frequência do SPI-6 para a região 1

Figura 3. Histograma de frequência do SPI-6 para a região 5

Tabela II. Características dos eventos secos e chuvosos obtidas pelo SPI-6 para região RH-1

SEQUÊNCIA SECA DO SPI - 6					SEQUÊNCIA CHUVOSA DO SPI - 6				
INICIO	FIM	DURAÇÃO	PICO MÁXIMO	MÉDIA	INICIO	FIM	DURAÇÃO	PICO MÁXIMO	MÉDIA
fev/87	jul/87	6	-0,64	-0,47	ago/87	set/87	2	0,12	0,07
out/87	dez/87	3	-0,64	-0,3	jan/88	mai/90	29	1,94	1,47
jun/90	nov/90	6	-1,2	-0,72	dez/90	ago/91	9	1,16	0,76
set/91	jun/93	22	-2,44	-1,24	out/93	out/95	25	1,31	0,82
nov/95	mar/96	5	-0,6	-0,29	mar/97	mai/97	3	0,09	0,04
mai/96	dez/96	8	-1,25	-0,52	mar/98	abr/98	2	0,07	0,04
jun/97	dez/97	7	-1,57	-0,83	dez/99	mar/00	4	0,66	0,48
mai/98	set/99	17	-0,85	-0,28	dez/00	fev/01	3	0,36	0,27
abr/00	nov/00	8	-0,75	-0,29	fev/02	ago/02	7	0,71	0,43
mar/01	out/01	8	-0,67	-0,39	mar/03	ago/03	6	0,69	0,38
dez/01	jan/02	2	-0,75	-0,62					
set/02	fev/03	6	-1,41	-0,79					
set/03	jul/05	23	-1,79	-0,52					
set/05	jun/07	22	-2,45	-0,97					
set/08	mar/09	7	-1,49	-0,68					
nov/09	dez/10	14	-2,1	-1,18					
nov/11	jun/13	20	-2,3	-1,15					

Tabela III. Características dos eventos secos e chuvosos obtidas pelo SPI-6 para região RH-5

SEQUÊNCIA SECA DO SPI - 6					SEQUÊNCIA CHUVOSA DO SPI - 6				
INICIO	FIM	DURAÇÃO	PICO MÁXIMO	MÉDIA	INICIO	FIM	DURAÇÃO	PICO MÁXIMO	MÉDIA
jan/87	fev/87	2	-.56	-.34	mar/88	set/88	7	1.61	1.19
abr/87	fev/88	11	-1.56	-.83	abr/89	mai/89	2	.44	.35
out/88	nov/88	2	-.86	-.77	jul/89	set/89	3	1.05	.85
jan/89	mar/89	3	-1.37	-.89	nov/89	fev/90	4	1.89	.98
mar/90	ago/90	6	-2.14	-1.17	set/90	out/90	2	.19	.10
nov/90	out/93	36	-2.30	-1.24	nov/93	nov/94	13	1.28	.65
nov/95	fev/96	4	-1.08	-.67	fev/95	out/95	9	1.39	.92
set/97	out/98	14	-2.14	-1.58	mar/96	ago/97	18	1.99	1.20
fev/99	set/99	8	-.71	-.34	nov/98	jan/99	3	.48	.34
fev/01	mai/01	4	-0,44	-0,3	out/99	jan/01	16	1.36	.98
jan/03	jun/03	6	-.78	-.50	jun/01	jun/02	13	1.95	1,53
nov/03	dez/03	2	-1.38	-.93	ago/02	dez/02	5	1.46	.78
ago/04	nov/05	16	-1.06	-.64	jan/04	jul/04	7	1.36	.77
jan/06	jun/06	6	-.69	-.32	jul/06	set/06	3	.57	.30
out/06	fev/08	17	-1.81	-.84	mar/08	ago/08	6	.80	.56
set/08	jan/09	5	-2.02	-.92	fev/09	out/09	9	1.61	1.06
nov/09	dez/09	2	-1.04	-.55	jan/10	fev/10	2	.32	.23
jan/12	nov/12	11	-1.97	-1.30	abr/10	dez/11	21	1.75	.86
fev/13	set/13	9	-1.87	-1.23	out/13	dez/13	3	1,2	0,43

Conclusões

A aplicação da técnica de Análise de Agrupamentos aos dados de SPI-6 da precipitação resultou em 5 regiões homogêneas de SPI-6. As duas regiões selecionadas para estudo evidenciam que as mesmas têm características de eventos extremos diferenciadas, ou seja, na região norte RH1 os eventos secos mais intensos variaram em média de -1,15 a -1,24 (56 meses), enquanto que na região sul RH5 variaram de -1,17 a -1,58 (76 meses), ou seja, na região RH5 predominaram os eventos de seca de maior intensidade de duração. Isto pode estar relacionado com a extensão territorial e a atuação de sistemas meteorológicos. Observa-se no geral que a região RH1 possui mais eventos de seca do que de chuva, porém de curta duração. É importante salientar que a maioria dos eventos de seca nas regiões está associada ao fenômeno ENOS.

Bibliografia

- Altamirano R. J. A. (2010) - *Climatologia dos eventos chuvosos e secos severos, extremos e muito extremos usando o Índice de Precipitação Normalizada (SPI) para as regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil*. Dissertação de Mestrado. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 168 p.
- Carvalho, L.; Jones, C.; Liebman B. (2004) - The South Atlantic Convergence Zone: intensity, form, persistence, and relationship with intraseasonal to intrannual Activity and Extreme Rainfall. *Journal of Climate*, v. 17, p. 88-108.

- Edwards, D. C.; McKee, T. B. (1997) - Characteristics of twentieth century drought in the United States at multiple time scales. Colorado State University, Fort Collins, *Climatology Report Number*, n. 2, 155 p.
- Gong, X.; Richman, M. B. (1995) - On the Application of Clusters Analysis to growing season precipitation data in North America East of the Rockies. *Journal of Climate*, v. 8, p. 897-924.
- Hayes, M. J.; Svoboda, M. D.; Wilhite, D. A. & Vanyarkho, O. V. (1999) - Monitoring the 1966 drought index using the standardized precipitation index. *Bulletin of the American Meteorological Society*, Boston, v. 80, n. 3.
- Hastenrath, S.; Heller, L. (1977) - Dynamics of climatic hazards in Northeast Brazil. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 103(435):77-92.
- Kousky, V. E.; Gan, M. A. (1981) - Upper tropospheric cyclonic vortices the tropical South Atlantic. *Tellus*, v. 33, n. 6, p. 538-551.
- Li, W.; Fu, R.; Juarez, N.; Fernandes, K. (2008) - Observed change of the standardized precipitation index, its potential cause and implications to future climate change in the Amazon region. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, v. 363, p. 1767-1772.
- Lloyd-Hughes, B.; Saunders, M. (2002) - A drought climatology for Europe. *International Journal of Climatology*, v. 22, p. 1571-1592.
- McKee, T. B.; Doesken, N. J.; Kleist, J. (1993) - The relationships of drought frequency and duration to time scales. 8th Conference on Applied Climatology, Anaheim, CA. Preprints. Bull. *American Meteorological Society*, p. 179-184.
- McKee, T. B.; Doesken, N. J.; Kleist, J. (1995) - Drought monitoring with multiple time scale: 9th Conference on Applied Climatology. Dallas, TX. Bull. *American Meteorological Society*, Boston, p. 233-236.
- Menezes, R. H. N. (2009) - Caracterização agroclimática e análise do rendimento agrícola do Estado do Maranhão, Brasil. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Campina Grande. 168 p.
- Min, S. K.; Kwon, W. T.; Park, H.; Choi, Y. (2003) - Spatial and temporal comparisons of drought over Korea with east Asia. *International Journal of Climatology*, v. 23, p. 223-233.
- Molion, L. C. B.; Bernardo, S. O. (2002) - Uma Revisão da Dinâmica das Chuvas no Nordeste Brasileiro. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v. 17, p. 1-10.
- Wilks, D. S. (2006) - *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences*. 2.ed. London, Academic Press, 649 p.
- Sansigolo, C. A. (2004) - Análise comparativa do desempenho dos índices de seca de Palmer (PDSI) e da precipitação normalizada (SPI) em Piracicaba, SP (1971-2001). *Revista Brasileira de Meteorologia*, v. 19, n. 3, p. 237-242.
- Seiler, R. A. Hayes, M.; Bressan, L. (2002) - Using the standardized precipitation index for flood risk monitoring. *International Journal of Climatology*, v. 22, p. 1365-1376.
- Sequeira, I. (2006). *Análise do SPI em Portugal Continental e sua comparação com o Palmer Drought Severity Index (PDSI)*. Tese de Licenciatura em Meteorologia. Universidade de Lisboa, Portugal.

ANÁLISE COMPARATIVA DO ALBEDO DA SUPERFÍCIE MEDIDO SOBRE A CULTURA DE BANANA E ESTIMADO ATRAVÉS DE IMAGENS MODIS/TERRA

Célia Campos Braga

Unidade Acadêmica de Ciências Atmosféricas, Universidade Federal de Campina Grande, celia@dca.ufcg.edu.br

Geissa Samira Lima Nascimento

Unidade Acadêmica de Ciências Atmosféricas, Universidade Federal de Campina Grande, geissa.samira@gmail.com

Ramon Campos Braga

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE, Cachoeira Paulista-SP
ramon.braga@cptec.inpe.br

Bernardo Barbosa da Silva

Unidade Acadêmica de Ciências Atmosféricas, Universidade Federal de Campina Grande, bernardo@dca.ufcg.edu.br

Milena Pereira Dantas

Unidade Acadêmica de Ciências Atmosféricas, Universidade Federal de Campina Grande, milena@dca.ufcg.edu.br

RESUMO

O presente estudo visa analisar a variabilidade espacial e temporal do albedo da superfície, assim como encontrar uma relação entre valores do albedo medidos banana e os obtidos a partir do produto MODIS/MYD09GA do satélite Terra, para 22 imagens nos meses de setembro a novembro de 2005. Os dados foram medidos em torre micrometeorológica instalada sobre a cultura irrigada de banana na fazenda experimental Frutacor em Quixeré-Ce-Brasil. Além das áreas de culturas irrigadas o albedo foi estimado também na área de vegetação nativa. O processamento das imagens MODIS foi feito com o ERDAS IMAGINE. Os mapas da variabilidade espacial do albedo de setembro a outubro praticamente não variou, pois seus valores oscilaram entre 10 e 25% na região. Em novembro os valores aumentaram, predominando albedos entre 20 e 25%. A aplicação da técnica estatística dos mínimos quadrados ao conjunto de dados medido na torre e estimado pelo satélite MODIS/Terra apresentaram bons resultados. Ou seja, a calibração proposta apresentou coeficiente de determinação r^2 igual a 0.70 ($r = 0,84$) com erro médio percentual (EPM) de 8,8 % e erro médio padrão (EPADM) de 2,03 respectivamente.

Introdução

Ultimamente os dados de sensoriamento remoto têm sido de fundamental importância em pesquisas direcionadas a estudar o comportamento dinâmico da vegetação, monitoramento de diversos fenômenos meteorológicos e ambientais, obtidos a partir de sensores instalados a bordo de satélites, oferecendo grande suporte às previsões de tempo e clima. É uma ferramenta de grande valia na obtenção de informações necessárias ao manejo, gerenciamento e gestão de recursos naturais, tais como água, solo e vegetação (Batista et al., 1997)), como também na agricultura por oferecer diversas vantagens possibilitando a geração de séries temporais das cenas estudadas.

Dados multitemporais obtidos do sensoriamento remoto de diferentes satélites meteorológicos e ambientais têm sido amplamente utilizados com diferentes finalidades. SILVA et al. (2005) determinaram o albedo da superfície na região do Vale do São Francisco utilizando imagens do satélite LANDSAT. HOUWANG et al. (2007) desenvolveram um método de otimização numérica combinando índices de vegetação e parâmetros biofísicos usando o sensor MODIS Aqua/Terra em região da Dinamarca.

Diante das inúmeras aplicações envolvendo dados obtidos remotamente, o objetivo deste estudo é obter a distribuição espacial do albedo à superfície, bem como encontrar uma relação

funcional entre obtido pelo sensor MODIS/Terra e medido sobre a cultura de banana na Fazenda Frutacor localizadas nas proximidades de Quixeré no estado do Ceará, nos anos de 2005 e 2006, investigando a viabilidade da incorporação dos resultados obtidos em estudos posteriores.

Material e Método

A região de estudo está situada no leste do estado do Ceará-Brasil nas proximidades do município de Quixeré localizado a 212,1 km da capital Fortaleza. A média anual de 28,5°C, e pluviométrica média anual 772 mm, cuja estação chuvosa vai de fevereiro a junho. A área selecionada corresponde ao Campo Experimental da Fazenda Frutacor (área menor) e inclui ainda parte do Distrito Irrigado Jaguarí-Apodi (DIJA) área maior. A cobertura vegetal bastante heterogênea formada por fazendas de agriculturas irrigadas (melão, banana e mamão) e áreas de vegetação nativa (caatinga e outras diversas espécies) Figura 2.

A estimativa do albedo à superfície, definido pela razão entre a radiação solar global refletida radiação solar incidente em cada pixel, no domínio da radiação de onda curta (de 0,3 a 3,0 μm), foi calculado de acordo com Liang (2000) e Tasumi *et al.* (2008). O albedo segundo o método Liang (2000) fundamenta-se na Equação 2:

$$\alpha_{s_L} = 0,160\rho_1 + 0,291\rho_2 + 0,243\rho_3 + 0,116\rho_4 + 0,112\rho_5 + 0,081\rho_7 - 0,0015 \quad (1)$$

e pela metodologia descrita em Tasumi *et al.* (2008) é determinado pela Equação 2:

$$\alpha_{s_T} = 0,215\rho_1 + 0,215\rho_2 + 0,242\rho_3 + 0,129\rho_4 + 0,101\rho_5 + 0,062\rho_6 + 0,036\rho_7 \quad (2)$$

Em ambas as equações, $\rho_1, \rho_2, \dots, \rho_7$ representam as refletâncias da superfície das sete bandas espectrais do MODIS, distribuídas por meio do produto MYMOD09G e pela metodologia descrita em Tasumi *et al.* (2008) é determinado pela Equação 3.

Figura1. Localização da área de estudo nas proximidades de Quixeré-Ce, Brasil

Resultados e discussão

Os resultados do albedo estimado pelo o sensor MODIS/Terra e medido na estação meteorológica instalada na cultura de banana na fazenda Frutacor, em Quixerê-Ce - Brasil são discutidos e analisados a seguir. Os mapas temáticos da variabilidade espacial albedo da superfície (α) para quatro dias selecionado do ano 2005 (fim do período chuvoso e período seco) são mostrados nas Figuras 2 a, b, c e d. Percebe-se que nos dias 05 de setembro (Figura 2a), 10 de outubro (Figura 2b) e 26 de outubro (Figura 2c) o albedo apresenta praticamente a mesma variabilidade espacial, com valores que variam entre 10% a 25% (tons de azul). Já em novembro (Figura 2d) os valores do albedo são os mais elevados, oscilando entre 20 e 25% (azul escuro e claro) em toda a cena e média de 22%. De modo geral o albedo apresentou menores valores para as áreas irrigadas (fazenda), quando comparadas com a vegetação nativa. Na área DIJA (área maior) no mes de novembro esse padrão é um pouco diferenciado, ou seja, se observam valores em torno dos 30%, evidenciando assim uma redução na densidade da vegetal, ocasionado possivelmente pela escassez de chuva. Os valores obtidos neste estudo estão em concordância com encontrados por Dantas et al. (2010), Leivas et al. (2007), Novas (2008), Oliveira & Galvêncio (2009).

Figura 2. Variabilidade espacial do albedo (MODIS/Terra) na região de Quixerê- Ce para quatro dias do ano de 2005 na fazenda Frutacor e vegetação nativa e DIJA

Na Figura 3 e Tabela I são mostrados o diagrama de dispersão e a reta de regressão dos mínimos quadrados para os valores médios do albedo obtido das 22 imagens MODIS/Terra e os medidos na torre micrometeorológica (instalada sobre o cultivo de banana) para o ano 2005 na fazenda Frutacor no município de Quixeré-CE para os diferentes alvos: Frutíferas irrigadas, Caatinga e área mista (Caatinga e agricultura irrigada). Nota-se que a tendência da metodologia usada é superestimar os valores em quase 50% em obtidos pelo satélite Terra. Utilizou-se o método dos mínimos quadrados (Wilks, 2006) para encontrar a relação funcional entre α_{Torre} e α_{Modis} . Mesmo substituído em alguns dias encontrou-se um coeficiente de determinação $r^2 = 0,704$ e $r = 0,84$ com erro médio padrão (EPADM) de 2,03 e o erro percentual médios (EPM%) de 8,8%. Santos et al. (2011) encontrou um erro médio de 22,35% para a cana-de-açúcar, no município de Santa Rita do Passa Quatro (SP), utilizando o satélite Terra e uma metodologia semelhante do presente estudo.

Figura 3. Diagrama de dispersão e reta de regressão entre albedo medido (Torre) e estimado (Modis)

Tabela I. Albedo medido α (Torre) (%), Albedo estimado α (Modis) (%), Erro Relativo Percentual (EP%) e Erro Padrão (EPRAD) para o satélite Terra

DSA	α (Torre)	α (Modis)	EP%	EPRAD
245	16,50	19,5	15,38	0,37
248	16,00	15,0	-6,67	1,47
255	16,40	15,1	-8,61	4,99
261	16,20	19,7	17,77	2,45
273	16,30	15,9	-2,52	1,94
275	16,30	22,3	26,91	9,80
276	15,20	13,9	-9,35	0,04
283	15,30	13,8	-10,87	0,02
286	17,10	20,6	16,99	0,07
289	16,30	18,2	10,44	0,05
293	17,00	20,8	18,27	0,03
296	16,30	16,6	1,81	0,81
298	16,20	21,6	25,00	8,46
299	15,40	14,2	-8,45	0,02
300	17,00	22,0	22,73	1,02
303	16,10	15,3	-5,23	1,62
305	18,00	21,1	14,69	5,56
307	18,50	28,8	35,76	2,96
311	17,50	21,8	19,72	0,25
312	16,20	16,2	0,00	0,83
321	16,40	18,0	8,89	0,03
344	15,90	16,3	2,45	0,00
Media	16,46	18,49	8,82	2,03

Conclusões

Análise espacial da variabilidade do albedo sobre os diferentes alvos na área de cultivo irrigado apresentou valores mais baixos, indicando que neste período do estudo, essas superfícies absorveram maior quantidade de energia. O erro padrão médio (EPADM) e erro percentual médio (EPM) entre os valores do albedo medido do na Torre (banana) e pelo MODIS/Terra foram de 2,03 e 8,8% respectivamente.

Referencias

Batista, G. T.; Shimabukuro, Y. E.; Lawrence, W. T. (1997). The long-term monitoring of vegetation cover in the Amazonian region of northern Brazil using NOAA/AVHRR data. *International Journal of Remote Sensing*, v. 18, n. 15, p. 3195-3210.

- Dantas, F. R. da C.; Braga, C. C.; Souza, E. P., Silva, S. T. A. (2010). Determinação do Albedo da Superfície a partir de dados AVHRR/NOAA e TM/LANDSAT 5. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v. 25, n. 1. p. 25-31.
- Houborg, R.; Soegaard, H.; Boegh, E. (2007). Combining Vegetation Index and Model Inversion Methods for the Extraction of Key Vegetation Biophysical parameters using Terra and Aqua MODIS reflectance Data. *Remote Sensing of Environment*, 106, 39 - 58.
- Leivas, J.; Fontana, D.; Berlato, M.; Cardoso, L. (2007). Variação diária do albedo sobre uma superfície vegetada e sobre um lago na estação experimental da UFRGS-RS. In: *Congresso Brasileiro de Agrometeorologia*, 15, 2007. Aracaju. *Anais...* SP: SBA, p. 1-5.
- Liang, S. (2000). Narrowband to broadband conversions of land surface albedo I Algorithms. *Remote Sensing of Environment*, 76:213- 238.
- Novas, M. F. B. (2008). *Mapeamento das estimativas do saldo de radiação e índices de vegetação em área do estado de Alagoas com base em sensores remotos*. Maceió, 158p. Dissertação (Mestrado em Meteorologia: Processos da Superfície Terrestre). Universidade Federal de Alagoas.
- Oliveira, T.; Galvincto, J. (2009). Caracterização ambiental da bacia hidrográfica do rio Moxotó - PE usando sensoriamento remoto termal. *Revista Brasileira de Geografia Física*, Recife-PE v. 1, n. 2, p. 30-40.
- Santos, C. A. C. dos; Silva, B. B. da; Ramana Rao, T. V.; Satyamurty, P.; Manzi, A. O. (2011). Downward longwave radiation estimates for clear-sky conditions over northeast Brazil. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v. 26, n. 3, p. 443-450.
- Silva, B. B.; Lopes, M. L.; AZevedo, P. V. (2005). Determinação do albedo de áreas irrigadas com base em imagens LANDSAT 5 - TM. *Revista Brasileira de Agrometeorologia*, v. 13, n. 2, p. 201-211.
- Tasumi, M.; Allen, R. G.; Trezza, R. (2008). At-surface reflectance and albedo from satellite for operational calculation of land surface energy balance. *Journal of Hydrologic Engineering*, v.13, p.51-63.
- Wilks, D. S. (2006). Theoretical probability distributions. In: *Statistical methods in the atmospheric sciences*. San Diego: Academic Press.

ANÁLISE DE MAPEAMENTOS DE ÁREAS DE RISCOS HIDROLÓGICOS EM CUIABÁ/MT/BRASIL

Cleusa Aparecida Gonçalves Pereira Zamparoni

Departamento de Geografia, Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil
cazamp@gmail.com

RESUMO

O presente estudo analisa as áreas de riscos hidrológicos em Cuiabá/MT, no âmbito dos desastres naturais, onde a ocupação desordenada e a fragilidade de políticas públicas de preservação da rede hídrica, de investimentos em saneamento básico e coleta de lixo provocam aumento significativo de inundações e enchentes em bairros situados às margens do rio Cuiabá. O entupimento das calhas dos 24 córregos, que cortam a capital e deságuam nos rios Cuiabá e Coxipó, contribui para potencializar esta situação estrutural. Estas áreas encontram-se concentradas às margens do rio Cuiabá onde a ocupação desordenada de Áreas de Proteção Permanentes (APP's) potencializa riscos ligados às enchentes e inundações. Estudos sobre o problema são necessários e urgentes, pois auxiliam a proposição e execução de ações preventivas em detrimentos das curativas, como medida de resiliência e enfrentamento deste problema socioambiental e político.

Palavras-chave: risco, resiliência, enchentes, suscetibilidade, vulnerabilidade.

Introdução

A configuração espacial no meio urbano, que é uma manifestação de processos socioeconômico-ambientais e históricos específicos, está intimamente ligada à ocorrência de desastres naturais em áreas de risco.

Desde a formação dos primeiros agrupamentos humanos até a concepção das cidades modernas, os desastres têm gerado duros impactos na sociedade, inseridos no âmbito das (in) certezas e calcados na técnica e ciência na busca do controle sobre os eventos e domínio da natureza. O desastre natural resulta da combinação entre as características físicas do lugar, que refletem suas suscetibilidades e fragilidades associadas à capacidade de resposta e recuperação da sociedade expressas por sua vulnerabilidade e resiliência.

Vários estudos mostram o conceito de vulnerabilidade e de suscetibilidade como sinônimos face aos eventos dos desastres naturais. Entretanto, a vulnerabilidade está relacionada mais aos aspectos humanos e sócioeconômicos e a susceptibilidade aos aspectos estrutural ou físico (ZAMPARONI e NUNES, 2012).

A United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR 2009) define desastre natural como perturbação do funcionamento de uma sociedade que envolve perdas humanas, materiais, econômicas e ambientais de enorme extensão, com impactos que excedem a capacidade da sociedade afetada de arcar com seus próprios recursos.

Para Annan (2006) os riscos naturais são parte da vida, porém se transformam em catástrofes quando há perdas de vidas humanas e os meios de subsistência são atingidos.

Os efeitos maléficos derivados dos desastres naturais que historicamente tem atingido a população mais pobre, na atualidade, têm sido socializados com áreas habitadas pela população mais abastada economicamente. Entretanto, mesmo frente à intensidade e duração de um mesmo episódio, a população mais pobre apresenta um poder de resposta menos eficiente às perdas e o sofrimento vivenciado.

O espriamento dos episódios de desastres naturais é uma realidade evidente mostrada pelos canais de comunicação e parece estar associado à crescente imobilidade do gestor público, nos diversos níveis, para lidar com a vulnerabilidade da população. Os variados graus de transtornos que os fenômenos naturais causam resultam da lógica social ordenadora do espaço onde ocorrem os embates de interesses, demandas e direitos dos grupos sociais. (VALENCIO, 2009). Assim, este estudo objetivou mostrar situações de riscos hidrológicos na cidade de Cuiabá, localizada no Estado de Mato Grosso/Brasil, nas latitudes tropicais, derivados dos processos de apropriação, produção e (re) produção do uso do solo urbano, que expressam uma combinação de antigas desigualdades socioambientais com novas formas adquiridas nas últimas décadas do século XX.

Localização da Área de Estudos

Com uma população estimada para 2011 de 3.075.936 habitantes (IBGE, 2011) e uma taxa de urbanização em torno de 81,9 (SEPLAN, 2010), o Estado de Mato Grosso vivencia problemas urbanos, acentuados a partir dos anos 60 do século XX, quando passa a desempenhar o papel de fronteira agrícola e, portanto, uma alternativa para a migração de pessoas ligadas ao campo. Neste contexto histórico e socioeconômico, Mato Grosso tem como capital a cidade de Cuiabá (Figura 1) que está localizada na mesorregião Centro-Sul Matogrossense e Microrregião Cuiabá. Possui aproximadamente 556.449 habitantes segundo estimativa do IBGE, 2010 distribuídos nas regiões administrativas Norte, Sul, Leste e Oeste com 118 bairros, com 95% da população residente na zona urbana (IBGE, 2009).

Figura 1 - Localização geográfica de Cuiabá/MT.

Fonte: Mato Grosso e Seus Municípios 2007.

Áreas de Risco a Enchentes em Cuiabá-MT.

Em Cuiabá, a maior parte das áreas de risco a enchentes localizam as margens do rio Cuiabá e adjacências. Esta ocupação é formada por grilos, invasões, propriedades sem documentação legalizada junto aos órgãos de planejamento do município. Grande parte da população de baixa renda vive nestas localidades.

A ocupação desordenada e a falta de políticas públicas de preservação da rede hídrica e de investimentos em saneamento e coleta de lixo provocam aumento significativo de inundações em bairros situados na área de inundação do rio Cuiabá. Diferentemente das enchentes do rio, ocorridas em 1942, 1974, 1995 e 2001 em função de alto índice pluviométrico em todo o planal-

to da Bacia do Rio Cuiabá, as inundações recentes estão mais relacionadas com erosões e entupimento das calhas dos 24 córregos que cortam a capital e deságuam nos rios; Cuiabá e Coxipó. Segundo dados da Defesa Civil de Cuiabá (2009) existem 5,5 mil famílias vivendo em áreas de risco nas margens dos córregos e rios, situadas numa área total de 136 hectares que pelo Código Florestal Brasileiro, deveriam ter sido respeitadas por serem Áreas de Preservação Permanente (APPs). Os dados da instituição apontam que 2001 foi um dos anos em que ocorreram desastres ambientais nos meses de janeiro a março, período de chuvas em toda a Baixada Cuiabana. Naquele ano, as inundações se deram pela dificuldade de vazão dos córregos da cidade. Nos anos subsequentes as inundações ocorridas na capital não tem relação com o nível do rio Cuiabá.

Antes de 2001, as enchentes se deram em função das cheias do rio Cuiabá, como em 1942, 1974 e 1995. Nestas datas, inundações de proporções lastimáveis encheram o Rio afetando toda região da Baixada Cuiabana e o Pantanal.

Os desastres naturais, em especial as enchentes e inundações que ocorrem em Cuiabá/MT podem ser relacionados às políticas públicas de produção e (re) produção do uso do solo urbano. Uma avaliação da legislação que incide sobre as áreas urbanas permitiu evidenciar a desarticulação e contradição entre políticas públicas voltadas à habitação e meio ambiente, acirrando as discussões entre os princípios fundamentados na Constituição Federal, quais sejam, o direito à moradia e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A figura 2 mostra as áreas onde ocorrem os desastres naturais (enchentes e alagamentos) em Cuiabá/MT que mostra as áreas sujeitas à enchente, percebe-se que a maior parte está localizada às margens do rio Cuiabá, o restante está no entorno dos córregos que cortam a área urbana.

Esta configuração cartográfica mostra que as áreas de faixa de domínio do linhão estão em cor lilás e contabilizam 523.056,02 m² (52,3 Hec). Os rios e córregos estão representados na cor verde e correspondem a 5.662.539,98 m² (566,25 hec) e as áreas de Inundações e Alagamentos ocupam um total de 7.592.678,90 m² (759,27 hec).

Neste contexto, em 2011, Cuiabá possuía um total de 13.778.274,90 m² (1.277,83 hec) de áreas de risco a desastres naturais de origem hidrometeorológica. A maior parte destas áreas está concentrada ao longo do Rio Cuiabá e atingem bairros como o Ribeirão da Ponte, Santa Rosa, Barra do Pari, Jardim Santa Izabel, Cidade Verde, Grande Terceiro, Jardim Europa, arredores do Parque de exposição, Bairro do Porto, entre outros.

Figura 2 - Áreas de Riscos às Enchentes em Cuiabá/MT.

Conclusão

Os registros de enchentes e de inundações ocorridas em Cuiabá mostram que estas estão concentradas em áreas de riscos que ficam localizadas às margens do rio Cuiabá. A situação dos córregos e da infraestrutura da rede de drenagem e limpeza de boca de lobo, dos bairros de Cuiabá que são atingidos pelas enchentes da época chuvosa necessita de cuidados e olhares diferenciados pelo poder público, objetivando amenizar ou sanar o problema.

Os órgãos de planejamento e execução das políticas públicas municipal necessitam de instrumentos de análise como os mapeamentos geotécnicos e de áreas de riscos contendo a situação de suscetibilidade física e vulnerabilidade da população e sua utilização no plano diretor do município. Apenas oito municípios em Mato Grosso possuem mapas de riscos múltiplos, ou seja, apenas 6% do total de 141 municípios, o que evidencia dificuldades para ações de prevenção e gerenciamento de tragédias no Estado. O objetivo é conhecer a morfologia da região para contribuir no trabalho de prevenção de acidentes e desastres naturais.

Estudos sobre o problema são necessários e urgentes, pois auxiliam a proposição e execução de ações preventivas em detrimentos das curativas, como medidas para retirar as pessoas que vivem em ocupações irregulares em locais de riscos que envolvem problemas para realocar esta população, além do trabalho de conscientização, pois em geral as pessoas aceitam esta mudança enquanto estão em perigo e voltam quando cessa a turbulência.

Bibliografia

- ANNAN, K. Dia Internacional para a Redução das Catástrofes Naturais. ONU - Centro Regional de Informação da ONU em Bruxelas - RUNIC. 11 de Outubro de 2006 - 2ª. Quarta-Feira. <http://www.nossosaopaulo.com.br/Reg_SP/Barra_Escolha/ONU_CatNaturais.htm> Acesso em 06 mai. 2010.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2009, 2010 e 2011.
- SEPLAN. Secretaria de Planejamento do Estado de Mato Grosso. 2010.
- UNISDR - United Nations International Strategy for Disaster Reduction. 2009.
- VALENCIO, N. et al. Sociologia dos Desastres: Construção, Interfaces e Perspectivas no Brasil. São Carlos: RiMa Editora, 2009.
- ZAMPARONI, C. A. G. P. e NUNES, L. H. Desastres naturais de origem atmosférica e seus impactos em Moçambique in GESTÃO DE ÁREAS DE RISCOS E DESASTRES AMBIENTAIS, Universidade Estadual Paulista - UNESP, campus de Rio Claro (SP) - Brasil, 2012. pg. 375-404.

CARACTERIZAÇÃO DO TEMPORAL DO DIA 19 DE JANEIRO DE 2013, PORTUGAL CONTINENTAL

Cristian Camilo Fernández Lopera

Mestrado em Dinâmicas Sociais- Riscos Naturais e Tecnológicos,
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
ccfernandez@student.uc.pt

RESUMO

No dia 19 de Janeiro de 2013 registou-se em Portugal continental um fenómeno de ventos intensos, precipitação e ondulação marítima forte no litoral Oeste designado como ciclogénese explosiva apresentando uma descida na pressão de 996 hPa para 968.2 hPa.

Com um total de 8.205 registos, a sua distribuição espacial foi: Porto 741 ocorrências, Coimbra 682 ocorrências, Santarém 736, Lisboa 1.994 (24% do total) e Setúbal 691, V. do Castelo 183, Braga 291, Vila Real 89, Bragança 45, Aveiro 486, Viseu 512, Guarda 59, C. Branco 323, Leiria 533, Portalegre 279, Évora 237, Beja 120 e Faro 204.

Os danos foram causados pela queda de árvores sobre linhas de eletricidade, destelhamentos, destruição de estufas e automóveis. O serviço de eletricidade foi o mais afetado seguido do abastecimento de água, telecomunicações e estradas. Em média o tempo de interrupção da eletricidade foi 24 h. Em alguns locais dos concelhos de Pombal, M.-o-Velho e Coimbra a carência de eletricidade foi de cinco dias.

Palavras-chave: temporal, perdas e danos, Portugal continental.

Introdução

O presente estudo enquadrou-se no Mestrado em Dinâmicas Sociais, Riscos Naturais e Tecnológicos, Universidade de Coimbra, disciplina Métodos de Apoio à Decisão- Prevenção de Emergências e procurou uma compreensão integral das causas de uma situação de desastre. Para o efeito, toma-se como caso de estudo o fenómeno de ciclo-génese explosiva acontecida o dia 19 de Janeiro de 2013 em Portugal Continental e sendo a nossa área de estudo um território diverso em termos biofísicos e socioeconómicos, a manifestação dos fenómenos meteorológicos pode-se transformar de um evento natural para um cenário de emergência ou desastres variando as suas consequências de acordo com o grau de vulnerabilidade das populações ou dos seus bens. O objetivo deste estudo foi realizar uma caracterização das perdas, danos e dos processos de recuperação causados durante o evento para o conhecimento do risco meteorológico.

Metodologia

Fontes de informação

A procura de informação foi composta de duas fases, a primeira desenvolveu-se através da consulta de jornais nacionais, regionais e locais com o fim de conhecer em detalhe as zonas afetadas e as características das afetações. A segunda fase centrou-se na procura de relatórios oficiais de entidades governamentais e outros atores sociais. Foram consultados os jornais, Nacional: Correio da Manhã e Diário de Notícias. Regional: Região de Leiria e Público (ed. Norte). Locais: Diário de Coimbra, Diário da Região Setúbal e Jornal das Caldas. Gerou-se uma base de dados com o fim de recolher informação detalhada dos eventos sendo os jornais as fontes de informação.

Processamento da informação

Os campos definidos na base de dados mais importantes foram: Características das ocorrências: Data e hora da ocorrência; localização da ocorrência. Característica do registo: Fonte e características da fonte; data do registo; título da notícia, entidades presentes no local da ocorrência e o tipo de suporte prestado.

Características dos danos: danos pessoais; danos agrícolas e florestais, danos nos edifícios residenciais, industrial, comercial, equipamentos agrícolas, de saúde, educação, sociais, de justiça, e de proteção civil. Em equipamentos turísticos e de lazer, danos em infraestrutura de transporte, de distribuição elétrica e de sinal, telecomunicações; número de elementos móveis afetados e tipologia destes; infraestruturas costeiras afetadas; danos ao património natural e construído. Características das perdas: mortos, desaparecidos, feridos, evacuados e desalojados. Características das interrupções: corte de estrada, ferrovia, fecho de portos/barras e aeroportos; corte na receção de telecomunicações, e no fornecimento de energia; perdas económicas e perdas agrícolas e florestais.

Caracterização física do temporal

O fenómeno foi catalogado como ciclogênese explosiva, este consiste na formação de uma área extratropical de baixa pressão na qual a pressão barométrica central cai menos de 24 milibares em 24 horas (Rodrigues, 2000). Na tarde de 18 de Janeiro “uma depressão centrada às 12 UTC a cerca de 1.200 km a Oeste da Corunha, com um valor mínimo de pressão de cerca 996 hPa, deslocou-se rapidamente para Leste, a cerca de 85 km/h, centrando-se, às 06UTC do dia 19, no litoral junto a Viana do Castelo. Ali, a depressão registou uma descida excepcional da pressão atmosférica (28 hPa em 19 horas)” (Ipma, 2013).

O valor mais baixo de pressão (968.2 hPa) foi registado às 06:50 UTC- (sábado 19) em V. do Castelo. Destacaram-se os seguintes valores de velocidade do vento: 116.3 km/h no Porto, 102.6 km/h em Coimbra e 104.4 km/h em Lisboa; alguns valores da velocidade do vento são apresentados na Figura 1. A precipitação registou valores elevados: 68 mm no Cabril, 40 mm em V. Real e 44 mm em Penhas Douradas. Os valores de precipitação mensal acumulada ultrapassaram as médias normais.

Figura 1. Intensidade máxima do vento superior a 90 Km/h no dia 19 de Janeiro de 2013 (os círculos a branco identificam as estações em que houve falhas nas observações).

Fonte: Tomado de IPMA, 2013.

Danos e perdas causadas pelo temporal

Zonas afetadas

A análise espacial foi limitada aos registos encontrados nos jornais e como indica a Figura 2, considerando um total de 8.205 registos, os distritos com maior número de eventos foram Coimbra 8% do total de eventos, Setúbal 8% do total, Porto 9%, Santarém 9% e Lisboa com o 24% do total. O total de pessoas evacuadas registadas nos jornais foram 137 e 108 realojadas; o maior número destas foram pessoas idosas. Os danos no setor agrícola registaram-se maioritariamente em Vila do Conde onde a horticultura foi o tipo de cultivo mais afetado; o equipamento agrícola afetado foram estufas e sistemas de rega com danos funcionais severos. Foram registadas afetações em matas nacionais/ regionais com queda de árvores centenárias na mata do Buçaco, Choupal e jardim botânico-Coimbra.

Figura 2. Localização espacial por distritos dos eventos registados pelos corpos de bombeiros durante o dia 19 de Janeiro de 2013 em Portugal Continental. Fonte: própria.

Os danos no edificado industrial registaram-se em Serafim-Lourical, Pombal onde a falta de energia por cortes na eletricidade que causaram danos nas máquinas e interrupção na produção metalúrgica. Os danos no equipamento de saúde, educação, social e justiça registaram-se nas Escolas Bordalo Pinheiro e Raul Proença em Caldas da Rainha. Os equipamentos de saúde e educação de Penacova e Pombal foram fechados pela falta de eletricidade e água. Os danos nos equipamentos turísticos e de lazer mais importantes foram registados em, Évora: no campo de futebol da Juventude, no Santuário de Fátima, Ribeira de Frades, mata Nacional do Choupal (Coimbra), na Figueira da Foz (estádio José Bento). Na mata do Buçaco e no estádio da Luz-Lisboa.

Interrupções em serviços básicos e meios de transporte

As interrupções nos serviços de telecomunicações nas zonas mais afetadas foram de 5 dias. As zonas mais afetadas pelo corte de energia foram Assafarge (Coimbra), Lordemão (Coimbra), Carapinheira, Montemor-o-Velho, Penacova e Pombal onde o corte durou de três a cinco dias; a média de horas de corte na eletricidade em todo o país foi de 24 horas. É de salientar que os cortes na eletricidade causaram interrupções no fornecimento de água. Pode-se assumir um tempo de interrupção das vias e ferrovias de quatro horas. As afetações na infraestrutura de

transporte mais significativa foi estrada Nacional 335 que liga Cantanhede a Aveiro; Serra da Boa Viagem- Figueira da Foz; Pombal (Corte nas vias IC2, A1 e linhas do Norte e do Oeste). Algumas zonas da IC20, IP3, A1 e A22 foram encerradas por causa de queda de árvores de grande porte, alguns setores foram encerrados por mais de doze horas.

Perdas financeiras

Para conhecer as perdas financeiras provocadas pelo temporal, foi revisado o relatório do Ministério do Ambiente, Mar, Agricultura e Ordenamento do Território no qual estabelece um valor de 45 milhões de Euros (Farinha, 2013) em prejuízos causados pelos efeitos diretos dos ventos fortes, a precipitação no mesmo dia e as inundações derivadas do período invernal anterior e durante o evento de ciclogénese explosiva. É de sublinhar que o valor estimado de perdas financeiras das seguradoras ultrapassa os 60 milhões de euros (segundo dados da Associação Portuguesa de Seguradoras), a ser 15 milhões mais do estabelecido pelo governo, facto que deixa uma clara incerteza relativa aos apoios que receberam os afetados.

Atenção à emergência e recuperação

Entidades presentes: Os Bombeiros atenderam todas as ocorrências registadas nos jornais, a proteção civil, comandos distritais de operações de socorro e outras secções das câmaras municipais como os departamentos de planeamento, ambiente, agricultura, ordenamento do território, Estradas de Portugal e GNR. A empresa mais visível na emergência foi Energia de Portugal, conheceram-se várias queixas de funcionários de autarquias (Penacova e Pombal) que manifestaram tutelas em contra da EDP por má gestão da crise. O suporte prestado pelos atores de resposta foi remoção de árvores, painéis e sinais luminosos, remoção de escombros e transporte de pessoas evacuadas ou realojadas. Da EDP destaca-se o encaminhamento de 200 geradores de eletricidade para o município de Pombal reconstruir 150 km de rede elétrica afetada.

Conclusões

O fenómeno de meteorológico afetou todo o território de Portugal continental, a serem as zonas mais afetadas o Norte e Centro, situação que não coincide com as maiores velocidades do vento que foram registadas nas zonas Centro-sul e Lisboa. O total de ocorrências registadas foram 8.205 que causaram mais de 60 milhões de euros (dados das seguradoras) de prejuízos; e o tempo de retorno às condições “normais” nas telecomunicações foi de até cinco dias e para a eletricidade e água de uma semana, situação que põe em evidência a necessidade de métodos de redundância no fornecimento destes serviços.

Bibliografia

- Farinha, R. Jornal Público (2013). Temporal de Janeiro causou 30 milhões de euros de prejuízos. Página consultada em 8 de Julho de 2014, <http://www.publico.pt/sociedade/noticia/temporal-de-janeiro-causou-30-milhoes-de-euros-de-prejuizos-1585034>
- Instituto Português do Mar e da Atmosfera-IPMA- (2013) - Boletim climatológico do mês de Janeiro de 2013. P.4. Lisboa.
- IPMA (2013) - Notícias: Temporal no continente no dia 19 de Janeiro de 2013. Página consultada em 15 de Junho de 2014, <http://www.ipma.pt/pt/media/noticias/>

Rodrigues, D. (2000) - Introduction to Physical Geography; Lecture: Storms as an Element of Weather. California State University. Página consultada em 15 de junho de 2014, <http://www.csulb.edu/~rodrigue/geog140/lectures/storms.html>

EXTREMO CLIMÁTICO NO BAIXO CURSO DO RIO AQUIDAUANA-MS-BRASIL: AMEAÇAS, VULNERABILIDADE E RISCOS SOCIOAMBIENTAIS.

Elvira Fátima de Lima Fernandes

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus de Aquidauana.
elvira.ufms.cpaq@gmail.com

Vicentina Socorro da Anunciação

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus de Aquidauana.
vique56@hotmail.com

Flávio Cabreira dos Santos

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus de Aquidauana.
ffcabreira@hotmail.com

RESUMO

O processo de uso e ocupação do espaço nas cidades condiz com os episódios de inundações urbanas, aspecto perceptível em Anastácio e Aquidauana, situadas no baixo curso do rio Aquidauana. Toda variabilidade dos índices de precipitação sobre tudo a distribuição temporal e intensidade, reflete no aumento da vazão das águas na bacia hidrográfica do rio Aquidauana. Este trabalho buscou espacializar a área sujeita a desastres naturais na várzea do rio, dentro da malha urbana, entre os anos de 1976 a 2013. O estudo pautou-se em levantamento de dados do Sistema de Monitoramento Hidrológico da ANA, levantamento *in loco* com os moradores na área. Os resultados apontam que a cidade de Aquidauana, sob impactos de eventos climáticos extremos, apresenta maior grau de vulnerabilidade que Anastácio, visto que a magnitude da inundação está relacionada ao processo de ocupação da várzea do rio Aquidauana e excessos pluviométricos.

Palavras-chave: Excessos pluviométricos. rio Aquidauana. Inundação. Espaço urbano.

Introdução

O rio Aquidauana tem sua cabeça de drenagem na Serra Maracaju-Campo Grande no estado de Mato Grosso do Sul - Brasil - seu alto curso é alimentado por diversos tributários desde os chapadões de São Gabriel do Oeste, centro norte de Mato Grosso do Sul, e em direção a terras dos municípios de Corguinho, Rochedo, Terenos e Dois Irmãos do Buriti.

O baixo curso do rio Aquidauana tem sua gênese a partir do graben na altura do Distrito de Palmeiras (município de Dois Irmãos do Buriti) onde começa a perder sua competência, assim como a capacidade de carga sólida, devida à redução da declividade do terreno.

Conforme, o canal fluvial segue seu perfil longitudinal em direção das cidades de Anastácio e Aquidauana, a hidrologia se ajusta e através do leito móvel modela-se a paisagem, tornando-se um típico rio de planície, enveredando-se pelo seu baixo curso dentro das terras dos municípios de Aquidauana, Anastácio e Miranda, quando então transfere suas águas para o canal do rio Miranda, porém as repercussões dos eventos climáticos extremos materializam-se, com maior intensidade, na cidade de Aquidauana/MS (Fernandes, 2013).

Sua origem está vinculada ao empenho de um grupo de fazendeiros tradicionais do município de Miranda que em 1892 deliberou fundar um povoado em terras mais altas, com o intuito de implantar um “porto”, na entrada da planície pantaneira, com propósito de auxiliar a população dos municípios de Nioaque e Miranda-MS que no “tempo das águas”, como são conhecidos os meses chuvosos na região pantaneira, servisse como escoador da produção local e abastecesse a região, já que, os moradores ficavam ilhados na época das cheias sazonais.

Neves (2007, p.19) atesta que “Na segunda metade do século XIX, quando a planície do Pantanal era inundada - o que ocorria todos os anos - as fazendas da região de Miranda ficavam isoladas [...] Era preciso escapar da armadilha das águas.”

As margens do rio aquidauana delimita o território das cidades de Aquidauana ao Sul e Anastácio ao Norte. Santos (1985) delibera que: “como os homens organizam sua sociedade no espaço, e como a concepção e o uso que o homem faz do espaço sofrem mudanças” (Santos, 1985, p.53).

O espaço socialmente produzido pelos agentes modeladores da cidade de Aquidauana é a principal variável que compõe o quadro de frequentes inundações na área urbana de das duas referidas cidades. Porém, os condicionantes geológico-geomorfológicos da área que margeia o canal influenciam com veemência o processo de inundação da cidade de Aquidauana, pois as cotas altimétricas nesta área são consideradas baixas, encontram-se na média dos 140,00m.

Fator que favorece o espalhamento da água em direção ao leito maior e excepcional durante as grandes cheias, tornando a área suscetível a vulnerabilidade, principalmente quando a região é atingida por circulação atmosférica de ar que desencadeiam os excessos pluviométricos extremos.

Dentro deste contexto o trabalho buscou espacializar a área sujeita a desastres naturais na várzea do rio, dentro da malha urbana, entre os anos de 1976 a 2013. O estudo pautou-se em autores que tratam da temática sobre desastres naturais e riscos; levantamento de dados do Sistema de Monitoramento Hidrológico da ANA, através da *HidroWeb*, levantamento in loco sobre os aspectos histórico e socioeconômico dos moradores na área.

Ameaças, Vulnerabilidade e Riscos Socioambientais

O processo de uso e ocupação do espaço nas cidades está inerente aos episódios de inundações urbanas, aspecto perceptível no contexto urbano de Anastácio e Aquidauana situadas no baixo curso do rio Aquidauana. Porém, a malha urbana de Aquidauana, margem direita, tem registrado um número maior de incidentes referente aos riscos hidrológicos, visto que, o aglomerado populacional nesta área é bem superior ao da área urbana Anastácio, na margem esquerda.

Para melhor entendimento da problemática relacionada aos extremos climáticos que atingem a região e repercutem na área urbana de Aquidauana e Anastácio, recorreu-se ao Glossário da Defesa Civil, no qual CASTRO (2002) conceitua:

Risco: Relação existente entre a probabilidade de que uma ameaça de evento adverso ou acidente determinado se concretize e o grau de vulnerabilidade do sistema receptor a seus efeitos.

Vulnerabilidade: Probabilidade de uma determinada comunidade ou área geográfica ser afetada por uma ameaça ou risco potencial de desastre, estabelecida a partir de estudos técnicos.

Ameaça: Risco imediato do de desastre. Prenúncio ou indício de um evento deasastroso. (CASTRO, 2002, grifo nosso).

Outros autores partem da premissa que “O risco resulta de uma relação entre o processo potencialmente perigoso e a vulnerabilidade” (DAUPHINÉ 2001 *apud* REBELO 2010, p. 177).

Toda variabilidade dos índices de precipitação sobre tudo a distribuição temporal e intensidade, reflete no aumento da vazão das águas na bacia hidrográfica do rio Aquidauana, resultando na elevação da descarga do canal, revertendo a cota normal de 2,96 m para cota superior a 8,00

m, ocorrendo o extravasamento do leito normal para a faixa de inundação da enchente que acontece da margem direita do rio Aquidauana até alguns pontos da rua Cândido Mariano na cidade de Aquidauana e da margem esquerda até algumas setores da rua Bonfim na cidade de Anastácio.

Ao correlacionar a cota do rio Aquidauana, com os excessos pluviométricos decorrentes da variabilidade do clima regional, através das informações da *HidroWeb*, observa-se que as modificações impostas pela variabilidade climática têm influencia nas adversidades e intensifica a vulnerabilidade socioambiental da região, fomentando os riscos e interferindo no cotidiano da população, fato que este que apesar de ocorrer desde a fundação da cidade vem intensificando-se no decorrer da década de 2010.

Considera-se que a sociedade que residi na área de planície de inundação do rio Aquidauana está constantemente exposta a riscos. Conforme Sánchez (2008) os riscos podem ser classificados em: Riscos naturais, tecnológicos e sociais. O referido autor atesta que o risco natural apresenta cinco tipologias, entre elas duas que se adequaram a problemática dos moradores da área urbana das cidades de Aquidauana e Anastácio: Riscos de origem atmosférica e riscos associados aos processos e fenômenos hidrológicos,

Os transbordamentos, que vêm atingindo há décadas, a população estabelecida na faixa de passagem de enchente nas cidades de Aquidauana são fenômenos naturais dos cursos hidrológicos que sazonalmente invadem a várzea dos canais hidrológicos. Observa-se que em função da magnitude e evolução, obtida entre os anos de 1976 e 2013 as inundações na região foram classificadas segundo Castro (2002) em: Inundações excepcionais; inundações de grande magnitude; inundações normais ou regulares; inundações de pequena magnitude, conforme figura 1.

Figura 1 - Espacialização das inundações de Aquidauana/MS

Fonte: Fernandes, 2013.

Os resultados do estudo identificaram os riscos de inundação associados às habitações, sendo estes classificados em R1-Baixo, R2-Médio, R3- Alto. Verificou-se que na área aproximadamente 40% das residências encontra-se em situação de risco alto (R3), conforme quadro I.

Quadro I: Classificação da magnitude das inundações na área urbana da cidade de Aquidauana/MS

Faixa	Magnitude das Inundações	Intervalos em níveis (m)	Quantidade	Risco
01	Magnitude excepcional	> 9,50	5	R3
02	Magnitude grande	9,15 - 9,50	3	R3
03	Magnitude regular	8,51 - 9,14	8	R2
04	Magnitude pequena	< 8,50m	12	R1

Fonte: Adaptado de Fernandes, 2013.

Conclusão

Os resultados apontam que a cidade de Aquidauana, sob o impacto de eventos climáticos extremos, apresenta maior grau de vulnerabilidade que Anastácio, visto que a magnitude da inundação está relacionada ao processo de ocupação da várzea do rio Aquidauana e excessos pluviométricos.

Observa-se que as inundações que atingem a cidade estão vinculadas a vulnerabilidade sócioespacial a qual esta população encontra-se exposta. Deste modo, existe a probabilidade que os excessos pluviométricos possam vir a se transformar em desastres climáticos, visto que, parte da população vive ameaçada pelo aumento do nível do rio Aquidauana, consequência das enchentes sazonais característica na região pantaneira.

Deste modo, os excessos pluviométricos contribuem para que os riscos hidrológicos ameacem a população que vive em situação vulnerável na margem direita rio Aquidauana, consequência das enchentes sazonais característica na região pantaneira.

Bibliografia

- Castro, Antônio. Luiz. Coimbra. de. (2002). *Glossário de defesa civil estudos de riscos e medicina de desastres*, 3. ed. rev. Brasília (DF). Brasil. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Ministério d Integração Nacional. 283 p. [pdf]. Disponível: <http://ebookbrowse.com/glossario-de-defesa-civil-estudos-riscos-e-medicina-de-desastres-pdf-d127565511>. [22.08.2014].
- Fernandes, Elvira Fátima de Lima. (2013). *Análise Socioambiental da Planície de Inundação do Rio Aquidauana: Riscos e Extremos Climáticos Repercutidos na Cidade de Aquidauana/MS*. Dezembro de 2013. Monografia. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Aquidauana, 141p.
- Neves, Joana (2007) - *Um Porto Para o Pantanal: a fundação de Aquidauana: civilização e dependência*. Campo Grande. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 156p.
- Rebelo. F. (2010) - *Geografia física e riscos naturais*. Coimbra, Imprensa da Universidade, 98p.
- Sánchez, Luis. Enrique. (2008) - Análise de riscos. In: Sánchez, Luis Enrique. *Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos*. cap. 12. São Paulo (SP). Oficina de textos. p. 314-330.
- Santos, M. (1985). *Espaço & Método*. São Paulo, Nobel, 88p.

APLICAÇÃO DO PROCESSO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA (AHP) NA AVALIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DE GALGAMENTO EM ZONAS PORTUÁRIAS - CASO DE PONTA DELGADA, AÇORES

Joana Rodrigues

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
ec09154@fe.up.pt

Pedro Poseiro

Laboratório Nacional de Engenharia Civil
pposeiro@lnec.pt

Maria Teresa Reis

Laboratório Nacional de Engenharia Civil
treis@lnec.pt

Conceição Juana Fortes

Laboratório Nacional de Engenharia Civil
jfortes@lnec.pt

Francisco Taveira Pinto

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
fpinto@fe.up.pt

RESUMO

No presente trabalho descreve-se a aplicação de uma metodologia de avaliação do risco de galgamento em zonas costeiras e portuárias ao porto de Ponta Delgada, Açores, dando especial ênfase à avaliação das consequências da ocorrência de galgamentos não admissíveis através de uma análise multicritério (Processo de Análise Hierárquica, AHP).

A metodologia de avaliação do risco é efetuada em três fases: Caracterização da agitação incidente nas estruturas do porto; Cálculo do galgamento; Avaliação do risco de galgamento, que inclui a avaliação da probabilidade de ocorrência de galgamentos (acima de um certo limiar predefinido), assim como a avaliação das consequências dessas ocorrências. Por sua vez, esta avaliação das consequências é efetuada utilizando quer um procedimento simplista de classificação das consequências em termos de graus, quer uma metodologia baseada no AHP.

Os resultados da aplicação desta metodologia da avaliação do risco são apresentados sob a forma de mapas de consequências e de risco, ferramentas importantes para o planeamento de operações e de futuras intervenções no porto de Ponta Delgada.

Palavras-chave: Risco; Galgamento; Inundação; Portos; Estruturas marítimas.

Introdução

O porto de Ponta Delgada encontra-se situado na costa sul da ilha de S. Miguel, Região Autónoma dos Açores, Portugal. É o principal porto dos Açores, construído na cidade mais populosa do arquipélago (cerca de 26% da população açoriana) e tem cerca de 32 ha de área de baía protegida pelo molhe principal sul (Figura 1). A sua importância prende-se com o elevado fluxo de pessoas e mercadorias, bem como com as ligações que proporciona com as restantes ilhas do arquipélago, o continente e o resto do mundo.

Figura 1 - Fotografia aérea do porto de Ponta Delgada (Silva, 2012)

Em situação de tempestade, a ocorrência de galgamentos é frequente neste porto, principalmente na zona do molhe principal, com consequências ao nível da operacionalidade portuária e da segurança de pessoas e bens. Por essa razão, a avaliação do risco de ocorrência de galgamentos/inundações para este porto é fundamental, de modo a dotar as entidades responsáveis da informação necessária para o planeamento e gestão desta zona.

Neste âmbito, os trabalhos de Silva (2012) e Pereira (2013) constituíram estudos pioneiros neste campo para o porto de Ponta Delgada, tendo aplicado a metodologia de avaliação do risco em desenvolvimento no LNEC (Poseiro *et al.*, 2013a,b). Nesses trabalhos, foi efetuada apenas uma avaliação do risco para cinco estruturas do porto, para um período de tempo de 2 anos e utilizando uma metodologia simples de avaliação das consequências de ocorrência de galgamentos, que avalia global e qualitativamente as consequências da ocorrência de galgamentos/inundações excessivos numa dada zona de estudo.

O presente trabalho é uma extensão dos anteriores, Silva (2012) e Pereira (2013), com a avaliação do risco de galgamento de doze estruturas do referido porto (Figura 2), considerando um período de dados de agitação marítima de 34 anos (1979 a 2013) e o nível de maré real. Mais ainda, na avaliação das consequências de ocorrência de galgamentos utiliza-se uma metodologia mais aprofundada, quantitativa e detalhada, desenvolvida por Antunes (2012), baseada numa análise multicritério que permite analisar, classificar e atribuir pesos a diferentes indicadores espaciais que caracterizam uma dada zona de estudo. Esta metodologia para elaboração do mapa de consequências consiste na construção de um índice espacial de pressão antrópica no litoral através da aplicação do Processo de Análise Hierárquica (AHP).

Figura 2 - Estruturas selecionadas para avaliação do risco.

Avaliação do risco no porto de Ponta Delgada

A aplicação da metodologia de avaliação de risco ao caso de estudo do porto de Ponta Delgada foi efetuada para doze estruturas diferentes no interior e exterior do porto. Assim, para cada estrutura efetuou-se:

- o A caracterização da agitação marítima: Com base na série de dados de agitação marítima ao largo do porto, para o período de 1979 a 2013, efetuou-se a propagação dessas ondas até ao interior do porto de Ponta Delgada utilizando os modelos à escala regional e local, SWAN (SWAN Team, 2008) e DREAMS (Fortes, 2002). Obteve-se, assim, o regime de agitação incidente em frente a cada estrutura (i.e., pontos D1 a D12);
- o A determinação do galgamento: Utilizando o regime de agitação marítima determinado anteriormente e as características de cada estrutura, efetuaram-se cálculos com a ferramenta neuronal NN_OVERTOPPING2 (Coeveld *et al.*, 2005), para obter a série temporal de caudal médio galgado por metro linear de estrutura;
- o A avaliação do risco de galgamento: Esta avaliação é realizada de forma qualitativa pela combinação entre o grau de probabilidade de ocorrência de galgamentos (acima de determinados limiares predefinidos) e o grau de consequências dessas ocorrências, permitindo obter mapas de risco. Para a definição destes limiares utilizam-se as recomendações de Pullen *et al.* (2007) e a informação fornecida por entidades locais, tendo em conta o perfil transversal da estrutura galgada, bem como a utilização e as características da zona abrigada pela mesma. Com base nesses valores é assim construído o mapa de risco (Figura 3).

Figura 3 - Mapa de risco.

Verifica-se que o risco de galgamento é reduzido para a maioria das secções analisadas, sendo necessário, no pior dos cenários (risco reduzido), uma investigação detalhada e análise de custo-benefício, bem como a monitorização desse risco.

Avaliação das consequências utilizando o AHP

No capítulo anterior utilizou-se um método simples de análise das consequências. Para a nova metodologia aqui apresentada recorreu-se ao AHP (Craveiro *et al.*, 2012; Poseiro *et al.*, 2013b). Esta metodologia para elaboração do mapa de consequências consiste na construção de um índice espacial de pressão antrópica no litoral através da aplicação do Processo de Análise Hierárquica (AHP). Este processo baseia-se na comparação sucessiva e emparelhada da informação selecionada e quantificada, tendo em vista a sua priorização hierárquica, isto é, atendendo à relevância atribuída a cada indicador considerado (Craveiro *et al.*, 2012). Neste processo foram considerados vários indicadores (Património arquitetónico, Locais especiais, Edifícios, Topografia, Vias de comunicação, Uso dos solos, População). A estes indicadores atribuíram-se diferentes pesos, a partir da aplicação do AHP. Cada um destes indicadores foi integrado num SIG sob a forma de camada (*layer*), cada uma caracterizada por um conjunto de propriedades (também designado por atributos). Neste caso, a classificação dessas propriedades não justificou a aplicação do AHP, pelo que se fizeram corresponder a cada uma dessas propriedades diferentes valores (pesos) numa escala crescente de importância que varia entre 1 e 9.

Finalmente, tal como em Poseiro *et al.* (2013b), utilizou-se a ferramenta *Weighted Overlay* com o intuito de reunir todos os indicadores e respetivas propriedades com os seus pesos, de modo a ser possível obter o mapa de consequências (Figura 4). Para trabalhar os dados indicados recorreu-se ao *software* ArcGIS 10.1™, tendo sido registados com a ferramenta *ModelBuilder* todos os passos efetuados. Esta ferramenta permite obter um fluxograma que mostra as operações necessárias até obter o mapa de consequências, bem como o tratamento dos dados ao longo de todo o processo.

Figura 4 - Mapa de consequências resultante da aplicação do AHP.

Conclusões

O desenvolvimento deste trabalho permitiu construir o mapa de risco para 12 estruturas do porto de Ponta Delgada (S. Miguel, Açores), mapa esse que é uma ferramenta de apoio à tomada de decisão e à gestão eficaz das zonas costeiras e portuárias. Com base nas informações disponibilizadas pelas autoridades portuárias, constatou-se que o risco é insignificante para o molhe da marina nascente, sendo reduzido para todas as restantes secções analisadas, pelo que será apenas necessário selecionar um conjunto de medidas para o seu controlo, de modo que o risco possa ser considerado aceitável. A aplicação do novo método de avaliação das consequências de galgamento baseado no Processo de Análise Hierárquica (AHP) é bastante mais vantajosa do que do método simplista, pois permite obter resultados baseados numa análise espacial dos indicadores que caracterizam o local, no que diz respeito à sua importância relativa. O AHP mostra ser um método multicritério simples de aplicar e que ajuda a definir o peso a atribuir a cada um desses indicadores.

Agradecimentos

Os autores agradecem o financiamento da FCT através do projeto HIDRALERTA - PTDC/AAC-AMB /120702/2010. Agradecem também à CONSULMAR, aos Portos dos Açores, à Câmara Municipal de Ponta Delgada, à Universidade dos Açores e ao Instituto Hidrográfico, a disponibilização dos dados necessários à realização deste trabalho.

Bibliografia

- Antunes, O. (2012). Análise Multicritério em SIG para Determinação de um Índice Especializado de Pressão Antrópica Litoral. Casos de Espinho, Caparica e Faro. Tese de Mestrado, FCSH, UNL.
- Coeveld, E. M., Van Gent, M. R. A., Pozueta, B. (2005). Neural network manual: NN_OVERTOPPING 2. CLASH: WP8, WL/Delft Hydraulics, Delft.
- Craveiro, J.L., Antunes, O., Freire, P., Oliveira, F., Almeida, I.D., Sancho, F. (2012). Comunidades urbanas na orla costeira: a metodologia multicritério AHP (Analytic Hierarchy Process) para a construção de um índice de vulnerabilidade social face à ação marítima. 2º Cong. Ibero Amer. de Responsabilidade Social, ISEG.

- Fortes, C.J.E.M. (2002). Transformações Não Lineares de Ondas em Zonas Portuárias. Análise pelo Método dos Elementos Finitos. Tese de Doutoramento (Engenharia Mecânica), Instituto Superior Técnico, Lisboa.
- Pereira, D.M.F. (2013). Avaliação do risco de galgamento de estruturas portuárias: o caso do porto de Ponta Delgada (Açores, Portugal). Dissertação de Mestrado (Engenharia Civil), Univ. Madeira, Funchal.
- Poseiro, P., Fortes, C.J.E.M., Reis, M.T., Santos, J.A., Simões, A., Rodrigues, C., Azevedo, E. (2013a). A methodology for overtopping risk assessment in port areas: Application to the Port of Praia da Vitória (Azores, Portugal). SCACR 2013, LNEC, 4 a 7 de junho.
- Poseiro, P., Fortes, C.J.E.M., Santos, J.A., Reis, M.T., Craveiro, J. (2013b). Aplicação do processo de análise hierárquica (AHP) à análise das consequências de ocorrência de galgamentos. O caso da baía da Praia da Vitória. 8^o JPECP, LNEC, 10 e 11 de outubro.
- Pullen, T., Allsop, N. W. H., Bruce, T., Kortenhaus, A., Schüttrumpf, H., van der Meer, J. W. (2007). EurOtop – Wave overtopping of sea defences and related structures: Assessment manual. Environment Agency, UK, Exper. Netwerk Waterkeren, NL, Kuratorium für Forschung im Küsteningenieurwesen, DE, August.
- Rodrigues, J. (2014). Avaliação do risco e aplicação do processo de análise hierárquica (AHP) na avaliação das consequências de galgamento em zonas costeiras e portuárias. Aplicação ao porto de Ponta Delgada, Açores. Dissertação de Mestrado (Engenharia Civil), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
- Silva, D.M.F. (2012). Avaliação do galgamento de estruturas portuárias. Dissertação de Mestrado (Engenharia Civil), Faculdade de Ciências e Tecnologia, Univ. Coimbra.
- SWAN Team (2008). Technical Documentation SWAN Cycle III version 40.51. Delft University of Technology, The Netherlands.

A SECA COMO FATOR DE RISCO AMBIENTAL NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

Maria F.J.L. Ramalho

*Departamento de Geografia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte
mfjmaria@gmail.com*

Antonio J. T. Guerra

*Departamento de Geografia, Universidade Federal do Rio de Janeiro
antonioguerra@gmail.com*

RESUMO

As áreas de clima quente e seco como a do Semiárido Brasileiro são vulneráveis às estiagens prolongadas e ao consequente impacto ambiental, com reflexo mais grave para o homem do campo. A maior seca dos últimos trinta anos, como foi noticiado em 2013, causou relevante repercussão nos reservatórios de água, a exemplo do Açude de Poços, localizado no município de Teixeira, no estado da Paraíba.

Este trabalho apresenta algumas considerações sobre o ambiente de impacto da seca onde se insere o referido Açude - um reservatório de água entre outros do Semiárido afetado pela estiagem. O objetivo da pesquisa nessa área é analisar a convivência do homem com a dinâmica natural, tendo em vista a imprevisibilidade do evento e o risco ambiental. Com base no método empírico e utilizando dados bibliográficos, cartográficos, de campo e de laboratório, atenta-se para os fatores de vulnerabilidade e potencialidade da região, tendo em conta a sazonalidade climática.

Palavras-chave: Semiárido Brasileiro; Sazonalidade Climática; Risco Ambiental.

Introdução

O fenômeno da sazonalidade climática do Semiárido Brasileiro, com períodos mais secos e períodos pouco úmidos, revela-se pelos subseqüentes efeitos na fisionomia da paisagem e na vivência da população residente e usuária dos recursos naturais, entre os quais, a água, que se torna insuficiente ou abundante, conforme os respectivos períodos de estiagem e de chuva. Neste último, após as primeiras chuvas torrenciais, maior é a erosão, destacando-se principalmente o estado de degradação da cobertura vegetal. Tem-se aí um fator que pode instaurar uma realidade perversa, pois o risco natural de ocorrência de seca termina por associar-se à vulnerabilidade ambiental do meio afetado por condicionantes climáticos e pela interferência humana na cobertura vegetal e nos solos. Conforme Sá *et al.* (2010), as pesquisas realizadas em áreas do Semiárido Brasileiro “demonstram uma realidade de processos negativos sobre flora e fauna silvestre, bem como sua estreita ligação com a atuação do homem sobre o meio, principalmente sobre os solos, onde os processos erosivos se intensificam e constituem os indícios mais marcantes da desertificação.” Assim, o efeito da dinâmica erosiva no processo de assoreamento dos mananciais tende a comprometer o tempo de permanência da água nos reservatórios, impossibilitando a disponibilidade do recurso hídrico no período crítico da estiagem, sendo exemplo disto o caso do açude de Poços. Com a pesquisa em tal área, espera-se contribuir para o entendimento do significado da sazonalidade climática em ambientes do Semiárido favorecido pela açudagem.

Caracterização geográfica e ambiental

A área de estudo pertence ao sistema de relevo do Planalto da Borborema, onde se insere o maciço residual da Serra do Teixeira, com altitudes em torno de 750 metros, integrando o

município de Teixeira, no qual se encontra a Comunidade de Poços e o Açude homônimo, localizado na interseção aproximada do paralelo $7^{\circ} 14' 42''$, ao sul do Equador, com o meridiano $37^{\circ} 12' 28''$ de longitude, a oeste de Greenwich (Fig. 1). Essa área também se inclui na do Polígono da Seca definida pelo Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 2005).

De acordo com os estudos hidrológicos da CPRM (2005), o clima, conforme a Classificação de Köppen, é do tipo Aw' - quente úmido, com chuvas de verão e outono, e, na Classificação Bioclimática de Gausen, é do tipo 4ath - Tropical quente, de seca acentuada, com 7 a 8 meses secos. O regime pluviométrico é marcado pela distribuição irregular das chuvas, com índice que varia de 420mm a 714 mm, concentrando-se entre os quatro primeiros meses do ano 82% das chuvas. As temperaturas médias anuais estão entre 23°C e 24°C e a umidade relativa do ar em torno de 50%.

Fig. 1 - Localização da área de estudo

O predomínio das rochas cristalinas, a altitude e a localização geográfica explicam em parte a fisionomia da paisagem, onde a vegetação típica da região é representada pelo Bioma da Caatinga. A superfície elevada e as declividades acentuadas, que se diferenciam entre os compartimentos da Serra, favorecem o represamento de água em fundo de vale, como é o caso dos açudes da região, que, além de serem alimentados pelas águas pluviais, são também receptores do aporte de sedimentos levados pelas enxurradas ocasionais do período chuvoso. A drenagem superficial, de caráter intermitente, garante, no período das chuvas, o armazenamento de água nas represas.

A Seca: um fenômeno natural

A Seca no Semiárido Brasileiro tem sido entendida como um fenômeno natural decorrente de condições climáticas que afetam as fontes de água, o solo e a vegetação.

Há cerca de aproximadamente 136 anos, de acordo com Baptista (1933), o Cônego Bernardo, Vigário de Teixeira e Deputado Provincial, comovido com os estragos da Seca de 1877 a 1879, que também atingia o povo de sua terra, dá início em 1878 à obra da represa de Poços, conforme projeto por ele mesmo idealizado.

Esse memorável Açude, de acordo com o mesmo autor, foi construído pelos próprios flagelados do referido evento, que, conforme Almeida (1993), foi uma seca de caráter destruidor, pelo alarmante índice de óbitos, estimado em torno de 500.000 vítimas. O histórico Açude, que se destaca no estado da Paraíba como uma das primeiras obras de combate à seca no Governo Imperial, foi exaurido com o impacto da Seca de 2013 .

Por se tratar de uma obra julgada necessária para as imprevisões das grandes estiagens, principalmente no sentido de manter as culturas, em torno da área, irrigadas, com a Seca dá-se a interrupção das atividades agrícolas, acarretando o aumento das privações econômicas pelas quais passa a população por causa da falta de água.

O ambiente de impacto da Seca

Considerando as condições de sazonalidade climática da região, atenta-se para uma análise empírica que avalia o ambiente de entorno do Açude de Poços, tendo em vista a importância das encostas, da cobertura vegetal e do solo.

As vertentes, que se apresentam como subunidades do sistema de relevo, constituem um dos ambientes de maior atenção nesse contexto. A declividade e a variedade heterométrica dos blocos rochosos que caracterizam o perfil das encostas influenciam no rigor do escoamento e condicionam não só a deposição de detritos em áreas preferenciais do terreno como também a retenção temporária de água, no período da chuva. De acordo com Ramalho (2013), o material que se acumula, conforme sua textura, mantém por mais tempo a umidade, possibilitando, assim, melhores condições para o desenvolvimento da vegetação. As proporções do teor de areia, teor de silte e teor de argila determinadas a partir da análise granulométrica, utilizando-se o Método da Embrapa (2011), confirmam a tendência para a concentração de elementos finos, como silte e argila, nos locais de depósito, enquanto nos locais dos sedimentos em trânsito as proporções desses elementos aparecem com menores percentuais.

Neste aspecto, considerando a relação entre as causas e os efeitos das ações erosivas e deposicionais, tendo em conta a natureza dos fatores físicos da região, convém observar que, após o evento de uma seca prolongada e durante o chuvoso, a drenagem natural das vertentes tanto erode como inunda as baixadas junto com os detritos carregados pela dinâmica das enxurradas sobre a superfície desnuda.

Sendo a vegetação um dos fatores controladores da erosão, conforme muitos autores (Stocking e Elwell 1976; Evans, 1980; Thornes, 1980; Finney, 1984; Morgan, 1984; Guerra, 2009, 2010), entende-se que, conforme Ramalho (2009), com a alteração da cobertura vegetal do período seco e o uso do solo com as práticas de manejo não adequadas às condições de sustentabilidade do ambiente, há maiores tendências para o aumento das taxas erosivas, com efeitos consideráveis tanto para as áreas que perdem quanto para as que ganham sedimentos, tendo em conta a erosão acelerada que degrada o solo e ameaça o desempenho da açudagem, devido ao assoreamento.

Neste sentido, tem-se diminuída a capacidade de o Açude armazenar um volume maior de águas pluviais e, com a escassez da chuva, a água represada apresenta-se insuficiente para atender à demanda hídrica do período da estiagem, à proporção que a evaporação e o cultivo irrigado se intensificam.

Conclusão

Com a Seca, além da evaporação elevada e do déficit hídrico, há naturalmente as mudanças no aspecto da vegetação. Consequentemente, o solo se expõe à insolação e perde umidade, mostrando-se, no período do evento, ineficiente para uso agrícola. Com as alterações da cobertura vegetal, causadas tanto pela seca quanto pela intervenção do homem, acentua-se a vulnerabilidade à erosão, com risco de assoreamento de corpo d'água, como é o caso da represa de Poços. Combater a degradação da vegetação causada pelo homem, tendo em conta os condicionantes bioclimáticos do Semiárido, pode ser a forma mais eficaz para se ter amenizado o efeito da erosão acelerada e se vir a poder conservar por mais tempo a água nas fontes, além de se ter melhorada a qualidade da água dos mananciais afetada por agrotóxicos e fertilizantes químicos. Neste sentido, considera-se a importância de um planejamento ambiental com ações de gestão para o uso da água e também com alternativas de sustentabilidade para o uso do solo.

Bibliografia

- Almeida, J. A. (1994) - *A Paraíba e seus problemas*. Brasília, Senado Federal/Fundação Casa de José Américo, 728 p.
- Baptista, P. (1933) - *O Cônego Bernardo*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 211 p.
- Brasil. Ministério da Integração Nacional. (2005) - *Nova Delimitação do Semi-árido Brasileiro*. Brasília, Secretaria de Políticas e Desenvolvimento Regional.
- CPRM. Serviço Geológico do Brasil. (2005) - Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea. *Diagnóstico do Município de Teixeira, estado da Paraíba*. Recife, CPRM/PRODEEM, 10 p.
- EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. (2011) - *Manual de Métodos de Análise de Solos*. Rio de Janeiro, CNP, 230 p.
- Evans, R. (1980) - Mechanics of water erosion and their spatial and temporal controls: an empirical viewpoint. In: Kirkby, M. J. , Morgan, R. P. C. (Eds.). *Soil erosion*. Cambridge, John Wiley and Sons Ltda., 1980. p. 109-128.
- Finney, H. J. (1984) - The effects of crop cover on rainfall characteristics and splash detachment. *Journal of Agricultural Engineering Research*, 29, p. 337-334.
- Guerra, A. J. T. (2009) - Processo Erosivo nas Encostas. In: A. J. T. Guerra e S. B. Cunha (Orgs.). *Geomorfologia - Uma Atualização de Bases e Conceitos*. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, p. 149 -209.
- Guerra, A. J. T. (2010) - O início do processo erosivo. In: Guerra A. J. T.; Silva, A. S.; Botelho, R. G. M. (Org.). *Erosão e conservação dos solos: conceitos, temas e aplicações*. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil. p.15-55.
- Morgan, R. P. C. (1984) - Soil degradation and erosion as a result of agricultural practice. .In: *Geomorphology and Soils*. Editores: K. S. Richards; R. R. Arnett e S. Ellis. London, George Allen and Unwin, p. 370-395.
- Ramalho, M.F.J. L. (2009) - Considerações sobre o ambiente de rios represados: o caso do rio Piranhas-Açu no Rio Grande do Norte. *Sociedade e Território*, 21, p. 183-196.
- Ramalho, M.F.J. L. (2013) - A fragilidade ambiental do nordeste brasileiro: o clima semiárido e as impreviões das grandes estiagens. *Sociedade e Território*, 25, p. 104-116.
- Sá, I. B. et al. (2010) - *Desertificação no Semiárido brasileiro*. Fortaleza, ICID, 18, p. 16-20.
- Stocking, M. A. and Elwell, H. A. (1976) - Vegetation and erosion: a review. *Scottish Geographical Magazine*, 92, p. 93-101.
- Thornes, J. B. (1980) - Erosional processes of running water and their spatial and temporal controls: a theoretical viewpoint. In: Kirkby, M. J., Morgan, R. P. C. (eds.). *Soil erosion*. New York, John Wiley and Sons, p. 129-182.

AValiação DO RISCO DE GALGAMENTOS E INUNDAÇÃO: INTEGRAÇÃO DE UM MÉTODO EXPEDITO DE INUNDAÇÃO NO SISTEMA HIDRALERTA

P. Poseiro, C. J. E. M. Fortes, M. T. Reis

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)

pposeiro@lnec.pt, jfortes@lnec.pt, treis@lnec.pt

RESUMO

O HIDRALERTA é um sistema de previsão, alerta e avaliação do risco associado aos galgamentos e inundação em zonas portuárias, tendo como ideia-base a utilização de medições/previsões da agitação marítima para calcular o galgamento e a inundação nessas zonas. A avaliação do risco associado a estes fenómenos é efetuada através da definição de limiares para os caudais galgados ou para as cotas de inundação admissíveis, e pelo produto do grau da probabilidade de ocorrência de valores desses caudais pelo grau das consequências desses acontecimentos.

No sistema, o cálculo dos caudais médios galgados sobre uma estrutura é efetuado com recurso a ferramentas neuronais (NN_OVERTOPPING2) e/ou ferramentas empíricas, que são métodos expeditos e que não fornecem indicação sobre a distribuição espacial desse caudal na zona atrás da estrutura.

Nesta comunicação, é apresentada uma metodologia incorporada no HIDRALERTA com o intuito de modelar o galgamento e a inundação na sua distribuição espacial, recorrendo a ferramentas SIG. Essa metodologia consiste na utilização dos resultados da NN_OVERTOPPING2 para o cálculo do caudal médio galgado por metro linear de estrutura, a partir de onde se pode obter o volume de água correspondente e posterior distribuição desse volume no modelo Digital do Terreno da zona em estudo. O caso de estudo localiza-se no porto e baía da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, nos Açores.

Palavras-chave: HIDRALERTA; Agitação marítima; Galgamento; Inundação; Risco.

Zona de estudo - Porto e baía da Praia da Vitória

O porto e a baía da Praia da Vitória localizam-se na costa Este da Ilha Terceira, uma das nove ilhas do arquipélago dos Açores, Portugal (Figura 1a). A Praia da Vitória é limitada a norte pela Ponta da Má Merenda e a sul pela Ponta do Espírito Santo e tem cerca de 2400 m de comprimento e 1100 m de largura máxima. O porto é protegido por dois quebra-mares (sul e norte) e a linha de costa da baía caracteriza-se pela existência de uma defesa frontal aderente com cerca de 1 km de comprimento e de um campo de cinco esporões na zona central que enraízam na defesa frontal.

Figura 1. a) Porto da Praia da Vitória; b) Secções estudadas (D1 a D9)

No âmbito do projeto HIDRLERTA em curso (Fortes *et al.*, 2014), e para este porto, encontra-se em desenvolvimento um protótipo de um sistema de previsão e alerta de risco associado ao galgamento e inundação em zonas costeiras e portuárias, o sistema HIDRALERTA (Poseiro *et al.*, 2013a, Poseiro *et al.*, 2013b; Fortes *et al.*, 2013; Fortes *et al.*, 2014). O sistema está a ser desenvolvido em linguagem de programação *Python* e implementado numa plataforma *WebSIG*. A metodologia do sistema consiste em:

- Definir o regime de agitação marítima incidente nas estruturas portuárias recorrendo a dados obtidos *in situ* e/ou a resultados de modelos numéricos de propagação de ondas;
- Calcular a resposta da estrutura em termos de caudal médio galgado por unidade de comprimento do coroamento da estrutura, com a utilização da ferramenta neuronal NN_OVERTOPPING2 (Coeveld, 2005);
- Calcular o grau de risco associado à ocorrência de galgamentos acima de um determinado caudal médio pré-definido para cada estrutura, em função do tipo de estrutura galgada e das atividades e bens por ela protegidos. A avaliação do risco associado a estes fenómenos é efetuada através da definição de limiares para os caudais galgados ou para as cotas de inundação admissíveis, e pelo produto do grau da probabilidade de ocorrência de valores desses caudais pelo grau das consequências desses acontecimentos.

Em trabalhos anteriores, foi efetuada uma avaliação do risco para nove estruturas do porto (Figura 1b), para um período de tempo de 5 anos (Poseiro *et al.*, 2013a; Reis *et al.* 2014). No entanto, uma vez que se utilizou a ferramenta neuronal NN_OVERTOPPING2 para a determinação do caudal, esta não fornece indicação sobre a distribuição espacial desse caudal atrás da estrutura. Desta forma, o presente trabalho é uma extensão de trabalhos anteriores, e apresenta uma metodologia para modelar o galgamento e a inundação na sua distribuição espacial recorrendo a ferramenta GIS. Para este efeito, pretende-se converter os caudais obtidos pela NN_OVERTOPPING2 em volumes e estabelecer a relação entre os volumes e a cota de inundação obtida para cada secção com a utilização de um Modelo Digital do Terreno (MDT) da zona em estudo. Uma vez conhecidas as áreas inundáveis e juntamente com a metodologia já desenvolvida para obter o mapa de consequências através da aplicação do Processo de Análise Hierárquica (AHP) (Poseiro *et al.*, 2013b), é possível obter o mapa de risco, tendo em conta simultaneamente as áreas mais facilmente galgadas/inundadas e o peso das atividades que se desenvolvem em cada uma dessas áreas.

Metodologia para o cálculo da área inundável

A determinação do regime de agitação incidente no ponto D4 (Figura 1b) é efetuada utilizando os resultados das previsões da agitação marítima ao largo da zona considerada para o período correspondente aos anos de 2008 a 2012, obtidos com o modelo WAVEWATCH III (Tolman, 1999). Esses resultados são transferidos para o interior da baía e do porto com recurso a dois modelos de propagação e deformação da agitação marítima: o modelo SWAN (Booij, 1999) e o modelo DREAMS (Fortes, 1993). Uma vez conhecidos esses valores, e para as características da estrutura selecionada (D4), aplicou-se a ferramenta neuronal NN_OVERTOPPING2 e efetuou-se o cálculo do caudal médio galgado (Figura 2).

Figura 2. Altura Significativa da onda e Caudal médio galgado na secção D4

Para a avaliação da área inundável associada a um dado valor de caudal médio galgado por metro linear de estrutura ($m^3/s/m$), é necessário primeiro converter estas unidades para volumes. Uma vez que a disponibilização dos resultados da agitação marítima é feita de 6 em 6 horas, fez-se o produto entre os resultados da rede neuronal e 21 600s (6h) e desta forma, obtiveram-se os resultados com as seguintes unidades: m^3/m de estrutura. Com vista a fazer a sua distribuição espacial considerou-se o modelo Digital de Terreno da zona onde esse caudal vai atuar (Figura 3a). Na Figura 3b) são apresentadas as características do local atrás da estrutura da secção D4.

Figura 3. a) Modelo Digital do Terreno do porto da Praia da Vitória. b) Fotografia com as características do local atrás da estrutura da secção D4.

Para determinar valores pré-definidos da cota de área inundável, considerou-se uma secção com a largura de 1 metro (Figura 4a) e determinou-se o volume correspondente para diferentes cotas de inundação, com recurso à ferramenta *Surface Volume* do ArcGIS 10.2™. Desta forma, foi possível estabelecer uma função polinomial de 2º grau ajustada aos valores obtidos com um coeficiente de determinação (R^2) de 0.9841 (Figura 4b).

Figura 4. a) Secção considerada para medir a relação entre as cotas de inundação e os volumes. b) Relação entre o volume da área inundável e a altura.

Para os cinco anos de dados (de 2008 a 2012) obtiveram-se os resultados da Tabela I).

Tabela I - Resultados dos galgamentos, volumes e cotas de inundação obtidos para a secção D4 durante 5 anos (2008 a 2012).

	Quant. (6h)	Min	Max	Média
Q (m³/s/m)	320	0.00005	0.00092	0.00016
V(m³/m)		1.07	19.95	3.52
CI (m)		5.42	7.61	5.82

Na Figura 5 está representada (a vermelho) a cota máxima de inundação para a secção D4.

Figura 5. Cota máxima de inundação regista para os 5 anos em análise

É possível verificar na Figura 5 que os resultados máximos registados colocam em causa não só as atividades que decorram atrás da defesa, que incluem as pessoas (passadeira) e as viaturas (estrada), mas também o edifício localizado nas imediações.

Conclusão

Esta comunicação descreve uma metodologia incorporada no sistema HIDRALERTA com o intuito de modelar o galgamento e a inundação na sua distribuição espacial, recorrendo a ferramentas SIG. Essa metodologia consiste na integração dos resultados da NN_OVERTOPPING2 com um modelo Digital do Terreno da zona em estudo.

A aplicação à Praia da Vitória e, mais especificamente, à estrutura aderente entre o 4 e 5 esporão (D4) mostrou que a metodologia é viável e é uma forma expedita de cálculo da área inundável. No entanto, é uma metodologia aplicada por secção linear da estrutura admitindo assim a constância das condições para toda a secção D4.

No futuro a utilização de modelos numéricos de inundação constituirão ferramentas mais poderosas para a definição das áreas inundáveis. Por outro lado, também a disponibilização dos resultados com maior frequência, de 1 em 1 hora, permitirá a obtenção de resultados mais fidedignos. Será necessário proceder também à validação destes resultados e proceder à sua aplicação para as restantes secções para que finalmente se possa fazer o cruzamento desta informação com o mapa de consequências com vista a obter um mapa de risco.

Bibliografia

- Booj, N., Ris, R., Holthuijsen, L., 1999. A third-generation wave model for coastal regions. Part I, Model description and validation. *Journal of Geographical Research*, C4(104), pp. 7649-7666.
- Coeveld, E.M., Van Gent, M.R.A. e Pozueta, B. (2005). *Neural Network Manual NN_OVERTOPPING2.CLASH* WP8, June.
- Fortes, C.J.E.M. (1993). *Modelação matemática da refração e difração combinadas de ondas marítimas (análise pelo método dos elementos finitos)*. Tese de Mestrado em Engenharia Mecânica, IST, Lisboa, Portugal.
- Fortes, C.J.E.M., Reis, M.T., Poseiro, P., Capitão, R., Santos, J.A., Pinheiro, L.P., Rodrigues, A., Sabino, A., Rodrigues, M.C., Raposeiro, P., Ferreira, J.C., Silva, C., Simões, A., Azevedo, E.B. (2013). *O Projeto HIDRALERTA. Sistema de Previsão e Alerta de Inundações em Zonas Costeiras e Portuárias*. 8^{as} JPECP, LNEC, 10 e 11 de outubro.
- Fortes, C.J.E.M., Reis, M.T., Poseiro, P., Santos, J.A., Capitão, R., Pinheiro, L., Sabino, A., Rodrigues, A.; Ferreira, J.C., Martinho, S., Raposeiro, P., SILVA, C., Simões, A., Azevedo, E.B., Rodrigues M.C. (2014) *Desenvolvimentos recentes do HIDRALERTA - Sistema de previsão e alerta de inundações em zonas costeiras e portuárias*. 3as Jornadas de Engenharia Geográfica, IH, 24 a 26 de junho.
- Poseiro, P., Fortes, C.J.E.M., Reis, M.T., Santos, J.A., Simões, A., Rodrigues, C. e Azevedo, E. (2013a). *A methodology for overtopping risk assessment in port areas: Application to the Port of Praia da Vitória (Azores, Portugal)*. Proc. SCACR 2013, 4 a 7 de junho, LNEC, Portugal.
- Poseiro, P., Fortes, C.J.E.M., Santos, J.A., Reis, M.T. e Craveiro, J. (2013b). *Aplicação do processo de análise hierárquica (AHP) à análise das consequências de ocorrência de galgamentos. O caso da baía da Praia da Vitória*. 8^{as} JPECP, 10-11 outubro.
- Reis, R. Fortes, C.J.E.M., Reis, M.T., Poseiro, P., Santos, J.A. (2014). *“Avaliação comparativa de ferramentas neuronais. Aplicação à Praia da Vitória, Terceira, Açores”*. VI SEMENGO - Seminário e Workshop em Engenharia Oceânica, Rio Grande, RS-Brasil, 12-14 novembro (Submetido).
- Tolman, H. (1999). *User Manual and System Documentation of WAVEWATCH-III. version 1.18*, NOAA/NWS/NCEP/OMB Technical Note 166, 110p., Washington, E.U.A.

OCORRÊNCIA DE EVENTOS EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO EM CAMPINA GRANDE - PARAÍBA, BRASIL

Raimundo Mainar de Medeiros

Doutorando em Meteorologia - Universidade Federal de Campina Grande
mainarmedeiros@gmail.com

Edicarlos Pereira de Sousa

Doutorando em Meteorologia - Universidade Federal de Campina Grande
edicarlos.p.sousa@gmail.com

Manoel Francisco Gomes Filho

Departamento de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Campina Grande
mano@dca.ufcg.edu.br

RESUMO

Os eventos extremos de precipitação, como as chuvas fortes e as secas prolongadas, têm sido a causa de vários desastres naturais. Analisaram-se as ocorrências de eventos extremos de precipitação em Campina Grande, com dados diários de precipitação que compreende os anos de 1970-2010 adquiridos da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba. Os eventos extremos analisados foram os de maior intensidade de precipitação diária para os anos estudados. Os resultados mostraram que houve mudança no comportamento das ocorrências de precipitação a partir da década de 70 na área de estudo. Ocorreu intensificação na precipitação máxima apresentando maior número de eventos com valores de precipitação superior a 80 mm. Não houve, de modo geral, relação direta entre a intensificação na precipitação e ocorrências com eventos de ENOS. Eventos extremos foram evidentes entre os meses da estação chuvosa, com 88% das ocorrências e 12% na estação seca.

Palavras-chave: ENOS, análise, mudanças climáticas, eventos extremos.

Introdução

As constantes mudanças no clima estão provocando aumento nas ocorrências de eventos climáticos extremos no mundo inteiro. No Brasil, esses eventos ocorrem, principalmente, como enchentes (fortes chuvas) e secas prolongadas (Marengo *et al.*, 2010). No Nordeste do Brasil (NEB) os impactos são ainda maiores devido à grande variabilidade na ocorrência de precipitação dessa região. Os principais sistemas responsáveis pela ocorrência de precipitação no NEB são: Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), Vórtices Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), Linha de Instabilidade (LI), Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), Brisas (Marítima e Terrestres) e as Perturbações Ondulatórias nos ventos Alísios (POAS) (Molion e Bernardo, 2002). O El Niño - Oscilação Sul (ENOS) é outro modo de variabilidade climática que influencia na ocorrência de precipitação do NEB.

Os eventos extremos são os principais causadores da maioria dos desastres naturais ocorridos nos últimos anos e têm afetado diretamente a população. Como consequências destes desastres ocorrem perdas de vidas humanas e animal, prejuízos na economia, agricultura, transporte, saúde e moradia além de causar impactos graves aos mais variados ecossistemas.

As fortes chuvas provocam inundações, alagamento, cheias em zonas rural e urbanas, e consequentemente mortes por afogamentos, deslizamentos de terras, desabamentos de prédios entre outros desastres.

Secas prolongadas tornam a água um recurso indisponível e até escasso provocando a migração da população para outras regiões em busca de melhores condições de sobrevivência de vida. A falta de precipitação atrapalha o desenvolvimento da agrícola e a agropecuária trazendo

consequências negativas para a economia da região. Nas plantas, a falta de água prejudica o seu desenvolvimento em suas diversas fases de crescimento, principalmente, quando este problema ocorre durante fases fenológicas nas quais elas necessitam de maiores quantidades de água, como, por exemplo, durante a floração e frutificação (Fietz *et al.*, 1998).

A ausência de chuvas provoca baixa disponibilidade de água no solo que limita o desenvolvimento das plantas provocando perdas na produtividade final. As culturas agrícolas também podem ser afetadas pelo excesso de água que mata as plantas por afogamento quando essas estão na fase inicial de crescimento.

De maneira geral, pode-se dizer que o aquecimento global, em um futuro próximo, tende a apresentar um cenário de clima mais extremo, com maiores ocorrências de estiagens e inundações. Logo, é importante saber a frequência e a intensidade com que esse fenômeno meteorológico vem ocorrendo nas últimas décadas.

Material e Métodos

O estudo da variabilidade das ocorrências de eventos extremos de precipitação foi concretizado em Campina Grande - PB. Segundo Thornthwaite o clima é: C₂SW (clima subúmido, moderada deficiência de água no verão, com índice de aridez entre 16,7 e 33,3, mesotérmicos e com vegetação durante o ano todo). Campina Grande situa-se, entre o Litoral e o Sertão da Paraíba, usufruindo assim, de um clima menos árido. Por estar localizado em uma região alta, beneficia-se de temperaturas menores e de uma ótima ventilação, o que proporciona um clima ameno e agradável. A temperatura média anual oscila em torno dos 23,3 °C, a máxima em torno dos 30,9 °C e a mínima em torno de 18,4 °C. A umidade relativa do ar, na área urbana, varia normalmente entre 75 a 83%.

Dados diários de precipitação pluviométrica que compreende os anos de 1970 - 2010 foram fornecidos pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA). As análises estatísticas dos dados foram desenvolvidas por planilhas eletrônicas. Avaliou-se a ocorrência dos eventos extremos de precipitação de maior intensidade em cada ano, como também o dia de sua ocorrência.

A análise das características de eventos extremos com os eventos de ENOS - El Niño Oscilação Sul (Tabela II) foi realizado pela classificação dos anos, em anos de ocorrência de um evento de El Niño e anos de ocorrência de um evento de La Niña, da série de estudo.

Resultados e Discussão

Na análise das ocorrências de eventos extremos de precipitação do período de 1970-2010 (Figura 1) demonstram que na década de 70 ocorreu maior variabilidade com índices de precipitação variando, na sua maioria, entre 50 e 190 mm, com destaque para os anos de 1972, 1981, 1985, 1991 e 2001 que os índices pluviométricos foram maiores que 80 mm, exceto os anos de 1974 (190,8 mm e 1978 com 105 mm.). A partir da década de 80 ocorreu variabilidade na intensificação da precipitação máxima anual apresentando menores números de eventos com índices pluviométricos inferiores a 40 mm nos anos de 1982, 1987, 1995, 1997 e 1998. Nos últimos anos (2000 a 2010) os eventos extremos oscilaram na sua flutuação espaço-temporal com precipitação máxima diária oscilando entre 30,1 a 85,4 mm.

Notou-se também que não houve relação direta entre a intensificação na precipitação e ocorrências com eventos de ENOS (Figura 1). Porém, em alguns anos a relação foi constatada. Em geral, no nordeste os ENOS alteram os totais pluviométricos da região e também a ocorrência

de períodos secos (Carvalho, 2009). Eventos extremos de precipitação são mais evidentes entre os meses da estação chuvosa que se estende de março a julho, (Tabela I), com 18 ocorrências, de um total de 40, representando 88% de chances de ocorrência. Nesse período foram registrados os eventos mais intensos com valores superiores a 80 mm (1972; 1978; 1987; 1991 e 2001) A estação seca (setembro - fevereiro) exibiu 15 ocorrências de eventos extremos de precipitação representando assim 37,2% de chances de ocorrência. Porém, a maioria desses eventos possuiu valores de precipitação pouco menor que 55 mm com exceção dos anos de 1970-1979 que apresentou 17 mm, 1980-1989 com 30 mm, 1990-1999 com 38,3 mm e 2000-2009 com 73,9 mm, respectivamente. Esses eventos apesar de não serem tão frequentes possuem grande quantidade de água que é suficiente para proporcionar grandes estragos e prejuízos locais.

Figura 1. Precipitação máxima anual (mm) durante o período de 1970 a 2010 em Campina Grande, PB.

Tabela I. Dia da ocorrência da máxima precipitação anual durante o período de 1970 a 2010 em Campina Grande, PB.

Ano	Dia/Mês/Índice	Ano	Dia/Mês/Índice	Ano	Dia/Mês/Índice	Ano	Dia/Mês/Índice
1970	27/04 - 50,6	1971	09/04 - 63,0	1972	20/03 - 190,8	1973	29/04 - 50,0
1974	08/07 - 65,0	1975	03/07 - 73,8	1976	11/02 - 36,7	1977	07/04 - 74,3
1978	10/03 - 105,0	1979	20/05 - 44,7	1980	03/03 - 50,0	1981	15/03 - 80,1
1982	26/02 - 37,7	1983	07/04 - 43,8	1984	19/05 - 50,7	1985	13/02 - 93,8
1986	02/04 - 43,7	1987	01/04 - 29,9	1988	10/08 - 68,3	1989	09/07 - 45,0
1990	27/05 - 40,2	1991	28/03 - 97,8	1992	14/02 - 51,8	1993	10/06 - 57,0
1994	15/03 - 47,6	1995	03/07 - 38,1	1996	30/05 - 74,6	1997	15/04 - 33,4
1998	29/03 - 24,5	1999	15/03 - 54,8	2000	20/02 - 74,3	2001	13/03 - 85,4
2002	15/02 - 36,1	2003	05/06 - 43,5	2004	24/01 - 48,8	2005	24/01 - 49,2
2006	21/03 - 59,4	2007	01/03 - 30,1	2008	19/03 - 73,9	2009	20/02 - 52,3
2010	18/06 - 77,6						

Tabela II. Período, Classificação (Classif.) e Intensidade (Intensid.) do El Niño - Oscilação Sul no período de 1970 a 2010.

Período	Classif.	Intensid.	Período	Classif.	Intensid.	Período	Classif.	Intensid.
1972-1973	El Niño	Forte	1973-1976	La Niña	Forte	1976-1977	El Niño	Fraco
1977-1978	El Niño	Fraco	1979-1980	El Niño	Fraco	1982-1983	El Niño	Forte
1983-1984	La Niña	Fraco	1984-1985	La Niña	Fraco	1986-1988	El Niño	Moderado
1988-1989	La Niña	Forte	1990-1993	El Niño	Forte	1990-1993	El Niño	Forte
1994-1995	El Niño	Moderado	1995-1996	La Niña	Fraco	1997-1998	El Niño	Forte
1998-2001	La Niña	Moderado	2002-2003	El Niño	Moderado	2004-2007	El Niño	Forte
2008	La Niña	Forte	2009-2010	El Niño	Fraco			

FONTE: CPTEC

Conclusão

Ocorrência de mudança no comportamento das precipitações a partir do início da década de 70, na região de estudo, variabilidade espaço-temporal na intensificação da precipitação máxima anual apresentando maior número de eventos com valores de precipitação igual ou superior a 80 mm;

Não houve relação direta entre a intensificação na precipitação e ocorrências com eventos de ENOS. Ressaltando que em alguns anos perceberam-se as influências do ENOS;

Eventos extremos de precipitação foram mais evidentes entre os meses da estação chuvosa com 88% das ocorrências e apenas 12% foram observados na estação seca.

Agradecimentos

À CAPES pela concessão da bolsa de estudo e a elaboração da pesquisa.

Bibliografia

- CARVALHO, A. L.; SOUZA, J. L.; LYRA, G. B.; PORFIRIO, A. C. S.; FERREIRA JUNIOR, R. A.; SANTOS, M. A.; WANDERLEY, H. S. Probabilidade de ocorrência de períodos secos para a região de Rio Largo, Alagoas. In: *Congresso Brasileiro de Agrometeorologia*, XVI, Belo Horizonte - MG, *Anais....(CDRom)*, 2009.
- CPTEC/INPE. Disponível em: http://enos.cptec.inpe.br/tab_elnino.shtml e http://enos.cptec.inpe.br/tab_lanina.shtml. Acessado em março. 2009.
- FIETZ, C. R.; FRIZZONE, F. A.; FOLEGATTI, M. V. Probabilidade de ocorrência de períodos secos e chuvosos na região de Dourados, MS. *Irriga (Botucatu)*, Botucatu, v.3, n.1, p. 16-22, 1998.
- MARENGO, J. A.; SCHAEFFER, R.; ZEE, D.; PINTO, H. S. Mudanças climáticas e eventos extremos no Brasil. Disponível em: http://www.fbds.org.br/cop15/FBDS_MudancasClimaticas.pdf. Acessado em outubro de 2010.
- MEDEIROS, R. M. *Estudo agrometeorológico para o estado da Paraíba*. p.128, 2013. Ed. Avulsa.
- MOLION, L. C. B.; BERNARDO, S. Uma revisão da dinâmica das chuvas no Nordeste brasileiro. *Revista Brasileira de Meteorologia*, v.17, p.1-10, 2002.
- STERN, R. D.; RIJKS, D.; DALE, I.; KNOCK, J. *Instat Climatic Guide*. P. 325. Oct. 2005.

CAPÍTULO 3.3

RISCOS AMBIENTAIS E SAÚDE

DETERMINAÇÃO DOS ÓTIMOS TÉRMICOS EM RELAÇÃO À MORTALIDADE ANUAL: ANÁLISE DE PORTO, COIMBRA E LISBOA

Jorge Marques

Instituto Português do Mar e da Atmosfera
jorge.marques@ipma.pt

Sílvia Antunes

Instituto Português do Mar e da Atmosfera
silvia.antunes@ipma.pt

Baltazar Nunes

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge
baltazar.nunes@insa.min-saude.pt

Susana das Neves Pereira da Silva

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge
susana.pereira@insa.min-saude.pt

Liliana Antunes

Instituto Português do Mar e da Atmosfera
liliana.antunes@ipma.pt

Carlos Dias

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge
carlos.dias@insa.min-saude.pt

RESUMO

A análise da variação da mortalidade com as temperaturas máxima e mínima revela um número de óbitos mais elevado para a ocorrência de valores extremos em ambas as temperaturas. O resultado verifica-se tanto para temperaturas mínimas muito baixas como muito elevadas, bem como para temperaturas máximas muito baixas e muito elevadas, em todos os distritos.

A análise conjunta (2003 a 2012) entre a variabilidade da temperatura do ar e do número de óbitos evidencia um intervalo de temperaturas ótimas ou de conforto para a saúde pública definido pelos valores do número de óbitos mais baixos. No caso do Porto, para a temperatura mínima o intervalo de temperatura com valores mais baixos do número de óbitos é ligeiramente inferior (15 a 16 °C) ao de Coimbra (15 a 17 °C) e Lisboa (16 a 19 °C). No caso da temperatura máxima, Coimbra mostra um intervalo com valores mais elevados (25 a 31 °C), do que o Porto (21 a 27 °C) e Lisboa (24 a 28 °C).

Palavras-chave: Temperatura do ar, mortalidade, ótimos térmicos.

Introdução

Portugal, tal como a maioria dos serviços meteorológicos internacionais, possui meios de monitorização da perigosidade do estado do tempo, facultando desta forma o lançamento de avisos em situações de condições meteorológicas adversas. Na grande maioria, os avisos meteorológicos centram-se na divulgação oportuna de informações sobre eventos climáticos extremos e específicos como, por exemplo, ondas de calor e de frio, tempestades de vento e neve, precipitação intensa, etc. Os níveis dos avisos são na sua maioria definidos tendo em conta determinados limites fixos, critérios ou definições climáticas, não considerando a vulnerabilidade. Devido a esse facto os níveis dos avisos meteorológicos podem, por vezes, estar desajustados à realidade do meio ambiente para os quais foram emitidos.

Há, por isso, necessidade de aprofundar o conhecimento das relações entre diferentes elementos climáticos e os seus efeitos diretos na população, principalmente com a temperatura do ar que é uma das variáveis meteorológicas com maior influência nos processos biológicos e das mais

utilizadas para descrever o clima (Sacarrão, 1981; Peixoto, 1987). Já são inúmeros os estudos em Portugal que relacionam a temperatura do ar com a saúde da população portuguesa, nomeadamente com a mortalidade (e.g. Falcão *et al.*, 1988; Pinheiro, 1990; Garcia *et al.*, 1999; Dessai, 2003; Marques, 2007; Marques *et al.*, 2009; Guerreiro, 2011; Marques *et al.*, 2012). O desenvolvimento de modelos de previsão em que a temperatura é o factor de influência na saúde pública, mais especificamente na mortalidade, tendo em consideração o local para onde é elaborada a previsão, é fundamental. Para isso é importante a determinação de limites térmicos que permitam identificar as temperaturas do ar com menor influência na mortalidade e, em consequência, as temperaturas acima ou abaixo das quais a mortalidade tende a aumentar. Este estudo tem como objetivo a determinação dos valores das temperaturas do ar (mínima e máxima) que apresentam menor influência na mortalidade, e que se denominaram ‘ótimos térmicos’. A análise é anual e realizada para os distritos de Porto, Coimbra e Lisboa.

Dados

Os dados de base utilizados são diários e relativos aos distritos de Porto, Coimbra e Lisboa, desde 2003 a 2012.

Os dados relativos à mortalidade são provenientes do Instituto Nacional de Estatística. O número de óbitos utilizado no estudo refere-se a todas as causas o que pode ser considerado um limitador dos resultados obtidos; no entanto, o número de óbitos desagregado por causas é ainda considerado de acesso restrito.

No caso da temperatura do ar utilizou-se uma estação meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera de cada distrito, Aeroporto de Pedras Rubras (Porto), Bencanta (Coimbra) e Gago Coutinho (Lisboa). A utilização de dados da temperatura do ar de apenas uma estação meteorológica para cada um dos distritos poderia ser considerado à partida redutor. No entanto, sendo a escala de trabalho o distrito e não se pretendendo maior resolução, considera-se adequado para o estudo a utilização de uma estação meteorológica por distrito.

Metodologia

Para a análise da variação da mortalidade com a temperatura do ar (mínima e máxima) dos três distritos (Porto, Coimbra e Lisboa) determinaram-se os valores médios da mortalidade por intervalos de classe da temperatura. O facto de se agruparem os dados por intervalos de classe de largura constante apresenta vantagens na análise; no entanto, em séries curtas como é o caso (10 anos) devem ter-se alguns cuidados, pois podem surgir casos de temperaturas do ar extremas (mínima e máxima) pouco frequentes que, devido à sua excecionalidade, se podem afastar significativamente da distribuição média.

O critério utilizado para determinar os ótimos térmicos associados a cada um dos distritos foi o percentil 45 da mortalidade.

Resultados

A análise da variação da mortalidade diária com a temperatura diária do ar (mínima e máxima) para o mesmo período (2003 a 2012) é bastante semelhante nos distritos de Porto, Coimbra e Lisboa, verificando-se que o número de óbitos mais elevado está mais associado aos valores mais altos e mais baixos da temperatura do ar. Este resultado observa-se tanto para temperaturas mínimas muito baixas como muito altas, bem como para temperaturas máximas muito baixas e muito altas (Figura I).

Figura 1 - Variação da mortalidade média diária e da temperatura mínima e máxima do ar nos distritos do Porto, Coimbra e Lisboa, valores médios e percentis 45 (2003-2012).

Nesta variabilidade número de óbitos/temperatura do ar identificam-se intervalos de valores da temperatura do ar (mínima e máxima) para o qual o número de óbitos é menor. No entanto, os valores mais baixos da mortalidade ocorrem para intervalos de temperatura diferentes consoante o distrito em análise. Pode também concluir-se que fora destes limiares se verificam correlações negativas entre a mortalidade e a diminuição da temperatura e correlações positivas entre a mortalidade e o aumento da temperatura, ou seja, o número de óbitos aumenta tanto com a descida como com a subida tanto das temperaturas mínimas como máximas.

Verifica-se que, no distrito do Porto, os valores mais elevados da mortalidade estão mais associados às temperaturas mais baixas (mínima e máxima) do que às mais altas; em Coimbra não se identifica diferença assinalável da mortalidade em relação aos valores mais baixos e mais altos da temperatura do ar; em Lisboa os valores mais elevados da mortalidade estão mais associados às temperaturas do ar mais altas (mínima e máxima) do que às mais baixas. Salienta-se que os valores mais elevados do número de óbitos em Lisboa se deveram a uma situação extrema de calor que ocorreu nos dias 1 e 2 de agosto de 2003, tendo-se registado as temperaturas máximas de 41.8 e 39.5 °C respetivamente, e uma temperatura mínima do ar de 27.1 °C no dia 2. Estes valores extremos fazem parte da variação como ocorrências únicas e não como valores médios.

Na figura I apresentam-se também os valores médios da mortalidade para todo o período. Com o objetivo de determinar intervalos de temperatura em que a ocorrência de mortalidade seja baixa testaram-se vários percentis, tendo-se optado pelo de 45, que se apresenta para cada distrito. Os ótimos térmicos assim estimados são mais baixos no Porto e em Coimbra relativamente à temperatura mínima, e mais elevados em Lisboa relativamente à temperatura máxima (Tabela I). A descida ou subida da temperatura mínima ou máxima para além destes intervalos origina um aumento da mortalidade.

Tabela I - Ótimos térmicos determinados para os distritos de Porto, Coimbra e Lisboa

Distrito	Temperatura mínima do ar (° C)	Temperatura máxima do ar (° C)
Porto	13 a 18	20 a 29
Coimbra	12 a 18	22 a 31
Lisboa	15 a 20	22 a 32

Conclusão

Neste estudo identificou-se que nos distritos de Porto, Coimbra e Lisboa a variação média diária da mortalidade tem um comportamento semelhante com as temperaturas mínima e máxima do ar, com os valores mais elevados de mortalidade associados tanto às temperaturas mais baixas e mais altas, tanto da mínima como da máxima.

Existem valores de temperatura do ar para os quais a mortalidade apresenta valores baixos, que são designados por ótimos térmicos, e que são diferentes para os distritos em análise. A descida ou subida da temperatura mínima ou máxima para além destes intervalos origina aumento da mortalidade. Pode assim concluir-se que a população destes distritos apresenta valências distintas quanto às temperaturas. Em relação à temperatura mínima verifica-se que o limite inferior do ótimo é superior em Lisboa, o que revela que a população do Porto e Coimbra apresenta menor vulnerabilidade às temperaturas mínimas mais baixas. Em relação à temperatura máxima verifica-se que o limite superior do ótimo é superior em

Lisboa, seguida de Coimbra, o que revela que a população do Porto apresenta maior vulnerabilidade às temperaturas máximas mais elevadas do que as populações de Coimbra e Lisboa.

Agradecimentos

Este estudo é financiado pela FCT no âmbito do Projeto FRIESA - “Modelação e previsão do efeito do frio extremo na saúde da população: a base para o desenvolvimento de um sistema de alerta em tempo real” (EXPL/DTP-SAP/1373/2013).

Bibliografia

- Dessai, S. (2003) - Heat stress and mortality in Lisbon Part II. An Assessment of the potential impacts of climate change. *International Journal of Biometeorology*. 48(1), p.37-44.
- Falcão, J.M.; Castro M.J.; Falcão, J.P. (1988) - Efeitos de uma onda de calor na mortalidade da população do distrito de Lisboa. *Saúde em Números*, 3(2), p.9-12.
- Garcia, A.C.; Nogueira, P.J.; Falcão, J.M. (1999). “Onda de Calor de 1981 em Portugal: efeitos na mortalidade”, *Rev. Nacional de Saúde Pública*, Vol. 1, p.67-77.
- Guerreiro, V. (2011) - *Mortalidade e conforto bioclimático em Coimbra: estudo da vulnerabilidade das populações ao frio*. Tese de mestrado, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 183 p.
- Marques J. (2007) - *Condições climáticas de Inverno e a mortalidade diária no distrito de Lisboa*. Tese de mestrado, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 101 p.
- Marques J., Antunes S. (2009) - A perigosidade natural da temperatura do ar em Portugal Continental: A avaliação do risco na mortalidade, *Territorium*, 16, p.49-62.
- Marques J., Antunes S. (2012) - Avaliação da influência do frio no episódio de mortalidade verificado em Portugal no início de 2012, p.313-324.
- Peixoto, J.P. (1987) - *O sistema climático e as bases físicas do clima*. Secretaria de Estado do Ambiente e dos Recursos Naturais, 187 p.
- Pinheiro, C. (1990) - Um frio de morrer ou a variação da mortalidade e clima nos distritos de Viana do Castelo e de Faro. *Arquivos do Instituto Nacional de Saúde*, vol. (n.º15), Lisboa, p.61-112.
- Sacarrão, G.F. (1981) - *A temperatura como factor ecológico*. Secretaria de Estado do Urbanismo e Ambiente, Comissão Nacional do Ambiente, 184 p.

VARIAÇÃO TÉRMICA E A MORTALIDADE POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES NA CIDADE DE LIMEIRA/SP

Aline Pascoalino

Universidade Estadual Paulista, Campus de Rio Claro
alinepascoalino@yahoo.com.br

Sandra Elisa Contri Pitton

Departamento de Geografia, Universidade Estadual Paulista, Campus de Rio Claro
scpitton@rc.br

RESUMO

O estudo teve por objetivo verificar as relações entre a variação térmica no período de frio e a mortalidade por doenças cardiovasculares na cidade de Limeira/SP. Para tal, tratou-se das temperaturas máxima e mínima absolutas e das ocorrências de óbitos diários, no período de 2000 a 2010. Avaliou-se os dias referentes ao percentil 5 e 10 dos dados da temperatura e a respectiva mortalidade, conforme o Índice de Díaz e outros quatro critérios. Verificou-se acréscimo na média diária de óbitos nos dias de temperaturas mais extremas com maior mortalidade para idosos e para o sexo masculino.

Palavras-chave: riscos climáticos, temperaturas extremas, variação térmica, mortalidade, doenças cardiovasculares

Introdução

Desde fins do século XX há indícios de alterações do clima. Com a probabilidade de novas dinâmicas ambientais e do aumento na frequência e intensidade de eventos extremos, o impacto das temperaturas sobre a saúde tem sido estudado com base nos eventos cujas temperaturas excedem as expectativas das condições climáticas locais. Conforme Silva (2012) e Pascoalino (2013), diante da inexistência de uma faixa térmica limiar à saúde que seja universal, busca-se encontrar temperaturas que levam ao aumento da mortalidade ou avaliar a variabilidade ao longo de um ou vários dias.

Apesar da maior recorrência dos estudos que relacionam o estresse térmico ao calor, o estresse ao frio é reconhecido como fator de risco potencial (Mercer, 2003) para algumas enfermidades, dentre elas as do grupo cardiovascular que podem apresentar características de sazonalidade, com acréscimo no período de inverno, existindo maior mortalidade sob efeito temporal de curto prazo e maior sensibilidade das mulheres e idosos de 65 anos ou mais (Näyhä, 2002).

No território brasileiro, Pitton e Domingos (2004); Murara, Coelho e Amorim (2010) e Pascoalino (2013) também sugerem que o desconforto ao frio, mesmo em cidades de clima tropical, pode resultar no aumento da morbidade e/ou mortalidade por este grupo de enfermidades. É neste contexto que o presente estudo teve como objetivo verificar as relações entre a variação térmica no período de frio e a mortalidade por doenças cardiovasculares na cidade de Limeira/SP.

A área de estudo e os procedimentos metodológicos

A área de estudo localiza-se na porção centro-oeste do município de Limeira, que situa-se na porção centro-leste do Estado de São Paulo (Figura 1). Na classificação dos climas regionais e unidades geomorfológicas do Estado de São Paulo (Monteiro, 1973), o município insere-se em área de clima tropical alternadamente seco e úmido, com o período seco de abril a setembro e o úmido de outubro a março.

Para o tratamento dos dados da área de estudo considerou-se a variação térmica e a mortalidade no período de 2000-2010. Os dados das temperaturas máxima e mínima absolutas diárias, foram obtidos junto à estação meteorológica da Unicamp/Limeira; e os das ocorrências diárias de óbitos nos livros de Registros de Óbitos, do Cartório de Registro Civil. Considerou-se 5.387 registros com *pelo menos* uma causa de morte por doença do aparelho circulatório, conforme CID-10 (2012).

Analisou-se a variação das temperaturas diárias dos meses com menor média térmica mensal - maio, junho e julho, em cada ano (11 trimestres), e seus respectivos óbitos. Observou-se a frequência de dias e de óbitos e a relação óbitos/dia para os percentis 5 (P05 - dias com temperaturas máximas e mínimas absolutas inferiores a 20°C e 8,5°C, respectivamente) e 10 (P10 - temperaturas inferiores a 21,1°C e 9,4°C).

A relação entre a frequência de dias com estas características e do número de óbitos foi avaliada segundo: 1) o Índice de Diaz - índice climático relativo que compreende características do extremo térmico em dois dias consecutivos, aplicado aos percentis 5 e 10 dos eventos de frio, conforme Monteiro e Carvalho (2013) e outros quatro critérios segundo Silva (2012): 2) Dias com Tmáx e/ou Tmín < P05 e P10; 3) Dias com Tmáx < P05 e P10; 4) Dias com Tmín < P05 e P10; e 5) Dias com Tmáx e Tmín < P05 e P10. O perfil amostral foi caracterizado conforme sexo e faixa etária estimados para cada dez mil habitantes, proporcionalmente à população existente, no ano de referência.

Figura 1 - Localização da área de estudo no município de Limeira e no Estado de São Paulo.

Fonte: Pascoalino (2013)

Variação térmica e a mortalidade por doenças cardiovasculares na cidade de Limeira/SP

Na frequência mensal do percentil 5 dos dados, nos critérios 1 (Índice de Díaz) e 5 os registros foram mais significativos em junho e julho. Dias que tiveram apenas a temperatura máxima inferior a 20°C, em maio e julho; e apenas com temperatura mínima inferior a 8,5°C, em junho e julho. Julho/2010 registrou a maior média de óbitos diários para o critério 3 (6 óbitos/dia). Houve menor frequência diária para os critérios 1 (10 dias) e 5 (14 dias) em comparação com os demais critérios (Quadro I). O critério 2 incorporou todos os dias com pelo menos uma das temperaturas na faixa térmica, o que justifica maior frequência de dias (83 dias). Dentre os demais critérios, o maior percentual participativo foi encontrado para o critério 4 (42% dos dias, com base no total de 83 dias para o percentil no critério 2), entretanto, o maior percentual dos óbitos foi alcançado nos dias em que apenas a temperatura máxima foi inferior aos 20°C (43% dos óbitos - com base em 129 óbitos verificados pelo critério 2), o que demonstra que a diminuição desse parâmetro pode resultar em maior mortalidade, comparando-se à variação das temperaturas mínimas para o percentil 5. A maior média de óbitos diários (2 óbitos/dia) foi observada no critério 1, conforme o Índice de Díaz.

Quadro I - Síntese da frequência mensal e diária conforme os critérios analíticos dos percentis 5 e 10.

Critério	Características	Percentil	Meses de maior frequência	Dias	Total de óbitos	Média óbitos/dia
1	2 dias Tmáx < 20°C e Tmin < 8,5°C	5 (Índice de Díaz)	junho	10	20	2,00
	2 dias Tmáx < 21,1°C e Tmin < 9,4°C	10 (Índice de Díaz)	junho e julho	29	39	1,34
2	Tmáx < 20°C e/ou Tmin < 8,5°C	5	junho e julho	83	129	1,55
	Tmáx < 21,1°C e/ou Tmin < 9,4°C	10	junho e julho	156	229	1,47
3	Tmáx < 20°C	5	maio e julho	32	55	1,72
	Tmáx < 21,1°C	10	maio e julho	57	95	1,66
4	Tmin < 8,5°C	5	junho e julho	35	43	1,23
	Tmin < 9,4°C	10	junho e julho	55	81	1,47
5	Tmáx < 20°C e Tmin < 8,5°C	5	junho e julho	14	26	1,86
	Tmáx < 21,1°C e Tmin < 9,4°C	10	junho e julho	43	58	1,35

Fonte: Adaptado de Pascoalino (2013)

Na avaliação mensal do percentil 10 dos dados os critérios 1, 2, 4 e 5 foram mais frequentes nos meses de junho e julho e o critério 3 em maio e julho (Quadro I). Os critérios 1 (Índice de Díaz) e 5 tiveram menor frequência diária, com 29 e 43 dias, respectivamente. Os dias só com a temperatura máxima (critério 3 - 57 dias) ou só com a temperatura mínima (critério 4 - 55 dias) foram mais recorrentes. O maior percentual participativo na frequência diária foi encontrado para o critério 3 (37% dos dias, com base no total de 156 dias do critério 2 desse percentil), assim como o maior percentual de óbitos com 42% (com base em 229 óbitos encontrados pelo critério 2). A maior média de óbitos diários também foi registrada conforme o critério 3 (1,66 óbitos/dia).

Em se tratando do perfil da mortalidade no percentil 5 dos dados, os óbitos foram mais frequentes para o sexo masculino nos critérios 1 e 5 e nos demais critérios para o sexo feminino. As maiores estimativas de mortalidade ocorreram para ambos os sexos conforme o critério 2 - todos os dias com pelo menos um parâmetro dentro da faixa térmica - na ordem de 1,23 óbitos por dez mil habitantes (2007) para o sexo masculino e 1,32 óbitos por dez mil habitantes (2007) para o sexo feminino. De acordo com as faixas etárias, estimativas mais elevadas ocorreram para idosos de 70 a 74 anos (no critério 2), na ordem de 20 óbitos por dez mil habitantes (2007). Para os critérios 1 e 2 a mortalidade concentrou-se a partir dos 75 anos ou mais, enquanto para os critérios 3, 4 e 5 a partir dos 70 anos.

No percentil 10 os óbitos foram mais frequentes para o sexo masculino apenas no critério 5; nos demais para o sexo feminino. As estimativas mais elevadas ocorreram no critério 2 para ambos os sexos, com 0,96 óbitos por dez mil habitantes do sexo masculino (2001 e 2006) e 1,76 óbitos para o sexo feminino (2007). De acordo com as faixas etárias, estimativas mais elevadas foram encontradas para o critério 2, na ordem de 26 óbitos/10.000 habitantes com 75 anos ou mais (2007). Para o critério 1 (Índice de Díaz) a mortalidade concentrou-se a partir dos 75 anos ou mais; no critério 2, a partir dos 65 anos e nos critérios 3, 4 e 5 a partir dos 70 anos.

Conclusão

Constatou-se maior média de óbitos diários conforme o Índice de Díaz e conforme o percentil 5 dos dados, ou seja, condições térmicas mais extremas no contexto da série estudada. No que tange apenas às variações das temperaturas máximas ou mínimas, a maior média de óbitos diários ocorreu conforme a primeira, em ambos os percentis 5 e 10. A diferença de 1,1°C para a $T_{\text{máx}}$ e de 0,6°C para a $T_{\text{mín}}$, comparando-se as faixas térmicas do percentil 10 ($T_{\text{máx}} < 21,1$ e $T_{\text{mín}} < 9,4$) para o percentil 5 ($T_{\text{máx}} < 20^{\circ}\text{C}$ e $T_{\text{mín}} < 8,5^{\circ}\text{C}$) representou um acréscimo de 49,25% na média diária dos óbitos verificados pelo Índice de Díaz e de 37,78% para os dias com ambas as temperaturas conforme o percentil (critério 5). Dessa forma, dias com ambas as temperaturas extremas em situação de maior duração da configuração térmica resultou incremento da mortalidade. A mortalidade do sexo masculino foi mais frequente nas condições térmicas mais extremas (critérios 1 e 5). A concentração dos óbitos se deu a partir dos 65 anos ou mais, com maior frequência a partir dos 70 anos.

Bibliografia

- CID-10. (2012) - *Classificação Estatística Internacional de Doenças e problemas relacionados à Saúde*. Retirado de <http://www.datasus.gov.br/cid10/>
- Mercer, J. B. (2003) - Cold - an underrated risk factor for health. *Environmental Research*, (92), p. 8-13.
- Monteiro, A., Carvalho, V. (2013) - Uma abordagem metodológica para eventos climáticos extremos. In M. C. C. T. Amorim, J. L. Sant'Anna Neto, A. Monteiro (Eds.), *Climatologia urbana e regional: questões teóricas e estudos de caso* (pp. 117-142). São Paulo: Outras Expressões.
- Monteiro, C. A. F. (1973) - *A dinâmica climática e as chuvas do Estado de São Paulo: estudo geográfico sob a forma de atlas*. São Paulo: IGEOG/USP, p. 130.
- Murara, P. G., Coelho, M. S. Z. S., Amorim, M. C. T. (2010) - Análise da influência meteorológica nas internações por doenças cardiovasculares. *Caderno Prudentino de Geografia*. 1, (32), p. 53-65.
- Näyhä, S. (2002) - Cold and the risk of cardiovascular diseases. *International Journal of Circumpolar Health*, 61, (4), p. 373-380.
- Pascoalino, A. (2013) - *Variação térmica e a distribuição têmporo-espacial da mortalidade por doenças cardiovasculares na cidade de Limeira/SP*. (Tese de Doutorado). Rio Claro, Universidade Estadual Paulista, p. 283
- Pitton, S. E. C.; Domingos, A. E. (2004) - Tempo e doenças: efeitos dos parâmetros climáticos nas crises hipertensivas nos moradores de Santa Gertrudes - SP. *Estudos Geográficos*, Rio Claro, 2, (1), p. 75-86.
- Silva, V. L. A. (2012) - *O risco de morbidade, com doenças respiratórias, durante episódios de frio intenso na GAMP e no Porto*. (Dissertação de Mestrado). Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p.146.

AMBIENTE TÉRMICO DE SALA DE AULA PODE CONDICIONAR O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS E AVALIAÇÃO DE ALUNOS

Mário Talaia

Departamento de Física, CIDTFF, Universidade de Aveiro
mart@ua.pt

Marta Silva

Departamento de Educação, Universidade de Aveiro
martaacsilva@hotmail.com

RESUMO

Estudos mostram que o ambiente térmico pode influenciar o ensino e aprendizagem diminuindo os resultados de avaliação. Neste trabalho são usados índices térmicos e uma escala de cores de sensação térmica, onde os alunos aquando da realização de questões problema no final de aulas selecionavam a sua zona de conforto/desconforto. Os resultados obtidos mostram que o desenvolvimento de competências e a avaliação registada são condicionados pela performance do ambiente térmico. Para o verão e quando a sensação térmica está na zona de conforto os resultados obtidos, em termos de avaliação, são positivos. Quando os valores da sensação térmica divergem da zona de conforto registam-se resultados negativos, abaixo de 50% numa escala de 0% a 100%. A análise dos resultados obtidos mostra, ainda, que este método é uma ferramenta importante para avaliar o risco quando as condições térmicas do interior de uma sala de aula divergem da zona de conforto, afectando o processo de ensino e aprendizagem.

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem, sensação térmica, avaliação e índices térmicos.

Introdução

No processo de implementação do Desenvolvimento Sustentável a Educação é, de facto, a principal ferramenta que se dispõe para atingir o paradigma do Desenvolvimento Sustentável. A UNESCO ao instituir a Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (2005-2015) revelou preocupações com o desenvolvimento e pretendeu, deste modo, melhorar a qualidade do ensino, facilitar a troca de experiências entre os diversos atores envolvidos e fazer com que haja uma maior atenção pública relativa a este assunto.

Ergonomia sendo um conjunto de disciplinas permite estudar a organização do trabalho no qual existe interações entre seres humanos e os sistemas que os envolvem. O principal objetivo da ergonomia é desenvolver e aplicar técnicas de adaptação do ser humano visando a otimização do seu bem-estar. Com o desenvolvimento de pesquisas em torno da Ergonomia surgiu a necessidade de avaliar o efeito do “clima” no local de trabalho e no ser humano. O estudo do conforto térmico tem uma forte importância económica.

Atualmente, quando se fala do desenvolvimento cognitivo e dos processos de aprendizagem de alunos devem-se considerar aspetos importantes relacionados com a motivação, os estímulos do meio (ambiente envolvente da pessoa), as relações sociais e a educação recebida, entre outros (Coll *et al.*, 1995).

O surgimento de novos ambientes de ensino e a inclusão quase que obrigatória da informática na escola, traz um novo fator que diretamente pode interferir no desempenho, na motivação e na aprendizagem dos alunos, o conforto ambiental (Lula *et al.*, 2002).

É sabido que a preocupação com o desempenho térmico nas escolas públicas tem tido pouca importância. Muitas edificações escolares públicas não satisfazem as necessidades básicas de

conforto. Certamente estas condições interferem negativamente na motivação e concentração dos alunos. Desta forma, é necessário que numa arquitetura escolar se tenha em conta as necessidades de conforto térmico, de forma a proporcionar um ambiente agradável e que favoreça o ensino e aprendizagem (Nogueira & Nogueira, 2003). Wyon (2010) relacionou o conforto térmico com o ensino e aprendizagem de alunos e apresentou dados registados em salas de aula de duas escolas na Dinamarca, envolvendo cerca de 300 alunos, que mostram uma diminuição dos resultados de avaliação de 3,5% dos alunos por cada °C de aumento de temperatura interior da sala de aula.

Métodos

O estudo, realizado em sala de aula, utilizou a metodologia de investigação-ação, de carácter empírico, recorrendo a uma metodologia mista, onde foram utilizados métodos quantitativos e métodos qualitativos de recolha de dados.

Ao longo da implementação em sala de aula, foram propostas aos alunos diferentes atividades, com a utilização de fichas de trabalho/questões-aula. Estas questões-aula tiveram como objetivo avaliar os conteúdos lecionados na aula, e eram aplicadas sempre que se considerava oportuno. Os alunos não tinham conhecimento prévio da sua realização. Nas questões-aula era apresentada uma escala de cores onde os alunos selecionavam a cor correspondente à sua sensação de conforto térmico que sentiam aquando da realização da atividade.

Os parâmetros termohigrométricos foram registados usando um psicrómetro construído pelos alunos. Foi analisada a influência da temperatura e da humidade relativa do ar em diferentes índices térmicos. O estudo foi realizado durante o verão e para avaliar a sensação de conforto foi usado o índice *EsConTer* (Talaia & Simões, 2009).

Resultados e Discussão

A Figura 1 mostra como o índice temperatura e humidade *ITH*, o índice *EsConTer* e o índice de calor *IC* variam com a temperatura interior da sala.

A observação do gráfico da Figura 1 mostra que há uma excelente correlação nos valores obtidos para o índice *ITH*, índice de Calor *IC* e índice *EsConTer* (Sensação Térmica), quando a temperatura

Figura 1 - *ITH*, Sensação Térmica e Índice de Calor “versus” temperatura do ar.

Neste estudo é apresentado um grupo de alunos, que tiveram aulas em turno, e são designados por A_i com $i=10$ a 17.

A Figura 2 mostra como a sensação térmica condiciona a avaliação dos alunos.

Os gráficos da Figura 2 apresentam como ordenada (lado esquerdo) a Avaliação_ j com $j=1$ a 5 indicada por colunas, como ordenada (lado direito) a Sensação Térmica real indicada pela linha quebrada e a linha horizontal a Sensação Térmica prevista.

Figura 2 - Avaliação e Sensação Térmica, por aluno

A Figura 3 mostra os resultados para alguns alunos, em termos de Avaliação_j.

Figura 3 - Sensação térmica versus avaliação do Aluno_A10 ao A13 (exemplos).

A observação dos gráficos da Figura 3 mostra para cada Avaliação_j, os resultados obtidos pelos alunos e de que modo são influenciados pela sensação térmica sentida. Na prática, como seria esperado, quando a sensação térmica se situa na gama de conforto térmico, os resultados são positivos. Quando a sensação térmica sentida pelo aluno suscita um ambiente ligeiramente quente (+1.0) a quente (+2.0) os resultados, no geral, tendem para valores negativos. Os valores da sensação térmica sentidos pelos alunos estão muito próximos da sensação térmica prevista quando se aplica o índice *EsConTer*. Quando se avalia para o valor previsto da sensação térmica o número de insatisfeitos, índice *PPD*, os resultados mostram que para a Avaliação_1 e Avaliação_2 pode registar cerca de 30% de insatisfeitos, para a Avaliação_3 e Avaliação_5 cerca de 40% de insatisfeitos e para a Avaliação_4 cerca de 10%. Nestas circunstâncias os resultados obtidos mostram inequivocamente que o ambiente térmico de uma sala de aula condiciona o desenvolvimento de competências e a aprendizagem.

Conclusão

A avaliação dos alunos mostrou que os resultados obtidos são influenciados pelo ambiente térmico da sala de aula.

Os resultados obtidos permitiram conhecer um patamar de risco que as sensações térmicas sentidas pelos alunos pode condicionar o desenvolvimento de competências e a aprendizagem. Estudos desta natureza parecem ser oportunos quando hoje se vive a problemática do aquecimento global e se debate a problemática energética na vertente da melhoria do bem-estar, fadiga e índices de produtividade intelectual.

Agradecimentos

Um autor agradece o financiamento de subsídio, para este trabalho, realizado pela FCT/MEC através de fundos nacionais (PIDDAC) e cofinanciado pelo FEDER através do COMPETE - Programa Operacional Fatores de Competitividade no âmbito do projeto PEst-C/CED/UI0194/2013.

Bibliografia

- Coll, C., Palácios, J. & Marchesi, A. (1995). *Desenvolvimento psicológico e educação: psicologia evolutiva*. Porto Alegre: Artes Médicas.
- Lula, C.C.M., Silva, L.B. (2002). *O Conforto ambiental e a Motivação: Implicações no Desempenho de Alunos em Ambientes Climatizados*. ABERGO, Recife, ANAIS
- Nogueira, M.C.J.A. & Nogueira, J.S. (2003). Educação, meio ambiente e conforto térmico: caminhos que se cruzam. *Revista Electrónica em Educação Ambiental*, 10, 104-108
- Talaia, M. & Simões, H. (2009). *Índices PMV e PPD na Definição da “performance” de um Ambiente*. In Livro de atas do V Encontro Nacional de Riscos e I Congresso Internacional de Riscos. Coimbra, Portugal.
- Wyon, D. (2010). *Thermal and air quality effects on the performance of schoolwork by children*. http://web1.swegon.com/upload/airacademy/seminars/documentation_2010.

AVALIAÇÃO DE RISCOS DE FADIGA E DE PRODUTIVIDADE EM AMBIENTE TÉRMICO FRIO: CASO DE UMA INDÚSTRIA DE PEIXE

Isabel Tavares

DEGEI, Universidade de Aveiro
isabel.tavares@ua.pt

Mário Talaia

Departamento de Física, CIDTFF, Universidade de Aveiro
mart@ua.pt

Leonor Teixeira

DEGEI-IEETA, Universidade de Aveiro
lteixeira@ua.pt

RESUMO

A relação dos trabalhadores com o seu ambiente de trabalho torna-se cada vez mais importante em tempos de globalização, e de constantes mudanças. O aumento da competitividade, a diminuição de acidentes de trabalho e a diminuição do absentismo por doenças profissionais são objectivos que devem ser considerados pelas empresas, independentemente do setor de atuação. Neste trabalho é avaliado como um ambiente térmico frio numa secção de embalagem de peixe congelado pode condicionar a operacionalidade do trabalhador. Foram considerados 26 pontos de observação. Registaram-se valores da temperatura do ar, da temperatura do termómetro húmido, da humidade relativa do ar, da sensação térmica real do trabalhador numa escala de cores. Aos dados recolhidos aplicaram-se dois índices térmicos, o *ITH* e *EsConTer*, para conhecer o padrão de sensação térmica da secção. Os resultados obtidos mostram que o padrão de sensação térmica depende do tipo de embalagem que influencia a sensação térmica dos trabalhadores.

Palavras-chave: Ambiente térmico frio, sensação térmica, índice *EsConTer*, índice *ITH*.

Introdução

A ergonomia tem um vasto campo de actuação, desde o conforto/desconforto físico, passando pelos processos mentais até aos processos ambientais, sendo igualmente importante na definição de tarefas, para que estas sejam eficazes e tenham em conta as necessidades humanas.

O ambiente térmico pode ser designado como o conjunto de variáveis térmicas que influenciam as trocas de calor entre o ser humano e o meio ambiente envolvente. Dentro do âmbito da arquitectura, foi criada legislação de conforto térmico que considera o conforto térmico como “a satisfação expressa quando um indivíduo é sujeito a um determinado ambiente térmico” (ISO 7730, 2006).

O organismo humano utiliza vários mecanismos para promover o balanço térmico. Durante o frio, o organismo pode acelerar o mecanismo para produzir mais energia sob a forma de calor. O vestuário também ajuda a manter a temperatura corporal. De notar que a sensação térmica é subjetiva, isto é, depende de cada pessoa, sendo que um determinado ambiente pode ser termicamente confortável para uma pessoa e ser frio ou quente para outra.

Um ambiente térmico é considerado de frio, quando o organismo de uma pessoa tem necessidade de desencadear mecanismos de luta contra o frio. A hipotermia, que constitui a patologia geral devida ao frio, por falência da termoregulação, traduz-se no início por um arrepio generalizado, uma temperatura interna que diminui e uma pressão arterial que aumenta. Os movimentos dos dedos e das mãos podem também sofrer uma deterioração apreciável, mesmo com níveis moderados de exposição. Neste trabalho as frieiras, a diminuição da destreza manual e a redução da sensibilidade (Parsons, 1993) são elementos a valorizar, pois uma temperatura das mãos abaixo de 8°C provoca uma diminuição da sensibilidade tátil e entre 12°C e 16°C

uma diminuição para a destreza manual. Stoops (2004) mostrou que o controlo individual de sistemas de climatização, dependendo da actividade desenvolvida, proporciona um aumento da produtividade.

Neste estudo pretende-se analisar o padrão da sensação térmica de uma secção de embalagem de peixe congelado, conhecer a localização de postos de trabalho mais vulneráveis a stress térmico, a sensação térmica real dos trabalhadores, as zonas do corpo com maior desconforto e medidas de intervenção para a melhoria de fadiga, de produtividade e de bem-estar do trabalhador.

Métodos

O estudo é considerado um “estudo de caso”. Existem três contextos que definem a performance de um ambiente térmico: o “clima” do espaço; a actividade desempenhada pelos trabalhadores e o próprio edifício que define o espaço. Considerando estes pressupostos, tornou-se pertinente determinar o padrão de sensação térmica na secção de embalagem de uma empresa de transformação de peixe e numa secção de ambiente frio, com uma área de cerca de 230m².

Neste estudo são usadas duas abordagens de recolha e tratamento de dados: (i), uma de carácter objetivo levada a cabo através da identificação do padrão da sensação térmica da secção através da aplicação de índices de conforto térmico; (ii) outra de carácter subjetivo levada a cabo através da aplicação de um questionário que avalia as condições de bem-estar dos trabalhadores.

Os dados foram registados entre os meses de Janeiro e Março, e em situações de trabalho diferente (embalamento sem descarga de peixe para alimentar a classificadora (máquina constituída por células que detectam e pesam o peixe); embalagem com descarga de peixe para alimentar a classificadora; embalagem em caixas).

Numa primeira fase foram identificados pontos de observação em número de P_i com $i=1$ a 26, como se mostra na Figura 1.

Figura 1. - Layout da secção com identificação de pontos de observação

Os dados termohigrométricos foram registados usando um instrumento de medida denominado Center 317. Foram lidas temperatura do ar, temperatura do termómetro húmido e humidade relativa do ar.

A percepção dos trabalhadores foi avaliada através da aplicação de uma escala sétima de cores. Foram registadas informações acerca de zonas do corpo menos confortáveis.

Foi usado o índice *ITH*, Índice de Temperatura e Humidade, modificado por Nieuwolt (1977). Este índice usa a temperatura e a humidade relativa do ar e é calculado a partir da expressão

$$ITH = 0.8T + T \frac{HR}{500} \quad (1)$$

em que T representa a temperatura do ar (°C) e HR a humidade relativa do ar (%).

Na Tabela I são indicados valores limites de *ITH* adaptados por Talaia *et al.* (2013).

Tabela I - valores para o índice *ITH* (adaptado de Talaia *et al.*, 2013)

<i>ITH</i> (°C)	Sensação térmica
$ITH < 8$	Demasiado frio
$8 \leq ITH < 21$	Necessidade de aquecimento
$21 \leq ITH < 24$	Confortável
$24 \leq ITH < 26$	Necessidade de ventilação
$26 \leq ITH$	Demasiado quente

Foi também utilizado o índice *EsConTer* (Talaia & Simões, 2009) baseado numa escala de cores (*Es*), por considerar a sensação de conforto (*Con*) e por ser térmica (*Ter*) e é calculado aplicando a expressão,

$$EsConTer = -3.75 + 0.103(T + T_w) \quad (2)$$

onde T representa a temperatura (°C) e T_w a temperatura do termómetro húmido (°C).

O índice *EsConTer* na gama de valores -3 a +3 permite mostrar a sensação térmica de um ambiente de muito frio a muito quente.

Resultados e Discussão

Os trabalhadores em número de 17 são do sexo feminino, com uma idade de 37.0 ± 12.3 anos, uma massa de 64.2 ± 11.8 kg e uma altura de 159.0 ± 8.8 cm. 59% têm idades entre 25 a 50 anos e 23% trabalham na empresa a menos de 6 meses. Relativamente à zona corporal de desconforto, 71% responderam as mãos e 35% a cara e o tronco. A dor de cabeça representa 35% e as frieiras 30%. Usavam obrigatoriamente uma bata, umas calças, touca, sapatos, colete, máscara e luvas fornecidos pela empresa.

Um algoritmo desenhado em Matlab permitiu obter padrões térmicos para a secção de embalagem.

A Figura 2 mostra os padrões usando o índice *EsConTer* e *ITH* para uma situação de embalamento sem descarga de peixe para alimentar a classificadora. A observação da Figura 2 mostra que a sensação térmica prevista na secção é de ligeiramente fria a fria. Há postos de trabalho na zona de frio, nomeadamente os casos dos trabalhadores A, B e G.

A Figura 3 mostra os padrões para uma situação de embalamento com descarga de peixe para alimentar a classificadora. A observação da Figura 3 mostra que a sensação térmica prevista na

secção é de fria para muito fria. Há postos de trabalho na zona de muito frio, casos dos trabalhadores A, B, C, D, E e G que registaram uma sensação térmica muito próxima à prevista.

Figura 2. - Situação de embalagem sem descarga de peixe congelado

Figura 3. - Situação de embalagem com descarga de peixe congelado

Na situação de embalagem com descarga de peixe congelado há um arrefecimento abrupto, o que altera o padrão da sensação térmica do espaço e dos trabalhadores. Os padrões da sensação térmica obtidos a partir dos índices mostram uma excelente concordância e as considerações para cada posto de trabalho são iguais. O índice *EsConTer* deve ser valorizado em contexto de ambiente frio e ambiente quente pela sua simplicidade de aplicação e por permitir uma interpretação imediata dos resultados obtidos devido ao facto de usar a escala sétima, de -3 a +3.

Conclusão

Conclui-se que numa secção de embalagem de peixe congelado o padrão da sensação térmica depende do tipo ou processo de embalagem.

Os índices usados mostraram excelente concordância e o índice *EsConTer* mostrou ser um excelente instrumento para prever a sensação térmica de espaços e de trabalhadores em ambiente frio, permitindo a adopção de estratégias de intervenção de protecção aos

trabalhadores através da melhoria da vestimenta, por diminuir estados de fadiga, por aumentar a produtividade e por criar condições de satisfação ao trabalhador.

Agradecimentos

Um autor agradece o financiamento da FCT/MEC através de fundos nacionais (PIDDAC) e cofinanciado pelo FEDER através do COMPETE - Programa Operacional Fatores de Competitividade no âmbito do projeto PEst-C/CED/UI0194/2013.

Bibliografia

- ISO 7730. (2006). *Ergonomics of thermal environment- Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of PMV and PPD indeces and local thermal comfort criteria*. European committee for Standardization.
- Nieuwolt, S. (1977). *Tropical climatology*. London
- Parsons, K.C. (1993). *Human Thermal Environments*, Department of Human Sciences Loughborough University of Technology- UK.
- Stoops, J. L. (2004). *A possible connection between thermal comfort and health*, from <http://escholarship.org/uc/item/9j03d7kq>
- Talaia, M., Meles, B., & Teixeira, L. (2013). *Evaluation of the Thermal Comfort in Workplaces- a Study in the Metalworking Industry*. In P. Arezes, J. S. Baptista, M. P. Barroso, P. Carneiro, P. Cordeiro, N. Costa, G. Perestrelo (Eds.), *Occupational Safety and Hygiene* (pp. 473-477). London: Taylor & Francis Group.
- Talaia, M. & Simões, H. (2009). *Índices PMV e PPD na Definição da “performance” de um Ambiente*. In Livro de atas do V Encontro Nacional de Riscos e I Congresso Internacional de Riscos. Coimbra, Portugal.

HIDRELÉTRICAS E RISCOS A SAÚDE: O CASO DE NOVA PONTE EM MINAS GERAIS- BRASIL

Joana D’Arc Vieira Couto Astolphi

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Geografia da
Universidade Federal de Uberlândia
jastolph@terra.com.br

Vicente de Paulo da Silva

Instituto de Geografia da
Universidade Federal de Uberlândia
vicentepht@hotmail.com

RESUMO

O objetivo desse trabalho é entender as relações existentes entre os grandes projetos de investimentos hidrelétricos, associado aos riscos à saúde, especialmente os ligados ao aparecimento de novas doenças. Tomou-se como campo de pesquisa Nova Ponte, em Minas Gerais, onde foi construída a hidrelétrica de mesmo nome. Para sua execução, a cidade foi completamente inundada e a população reassentada na cidade nova, a 3 km de distância. Metodologicamente, buscou-se identificar e analisar a incidência de determinadas doenças junto à população atingida comparando com o período anterior à obra, com os registros mais frequentes para o período posterior. Desta forma, procedeu ao levantamento de dados secundários nos sistemas de informação; seleção da amostra dos pesquisados baseada em critérios pré-definidos; realização das entrevistas com uso de questionário. Acredita-se que os resultados poderão revelar uma estreita relação entre morador e território, permeada pelo processo de adoecimento.

Palavras-chave: Hidrelétricas. Riscos. Saúde. Nova Ponte.

Introdução

Os Grandes Projetos de Investimentos (GPis) decisivamente têm promovido profundas transformações no território, à medida que destroem modos de vida tradicionais ou mesmo pelas mudanças perceptíveis na própria paisagem. No caso dos empreendimentos hidrelétricos, por vezes, o deslocamento compulsório tem sido considerado um dos efeitos mais invasivos dessa decisão por grandes empreendimentos. Essa opção poderá influenciar no processo saúde-doença de moradores submetidos a este processo de deslocamento, que, conforme fala de Haesbaert (2004), também pode ser chamado de desterritorialização.

As mudanças que ocorrem no território, ou melhor, no novo espaço ocupado que os empreendedores impõem como sendo o novo território, podem influenciar no processo saúde-doença, e consequentemente no perfil epidemiológico dos moradores. Da mesma forma também podem suscitar sentimentos de desterritorialidade expressos em mudanças simbólicas como nas relações de compadrio e vizinhança, mudança na produção econômica, falta de relação com a nova terra perda de um rio, ou de produção na várzea, dentre outras. A insatisfação pode ainda levar ao abandono do novo território porque não há afetividade, ou seja, os empreendedores não consideram esses riscos no processo de transferências das pessoas de um lugar para o outro, pois, isso implicaria em atraso na execução da obra e, provavelmente, mais recursos a serem dispendidos para garantia da mesma.

Ao pensar nos efeitos dos grandes empreendimentos, as transformações que causam no território e, partindo do entendimento da dimensão territorial, enquanto espaço de construção, entende-se que esse território gera nas pessoas sentimentos de reconhecimento e pertencimento que

constituem a própria identidade. Decorrente dessa relação, poderá se formar um espaço suscetível à produção da doença no contraponto da produção da saúde.

Espera-se com este estudo encontrar dados relevantes que possam corroborar as pesquisas existentes sobre o tema ampliando com isso o conhecimento nesta área.

Grandes projetos de investimentos (GPIs) e riscos à saúde

Conforme Vainer e Araújo (1992), os GPIs, nesse caso os projetos hidrelétricos, constituem empreendimentos que materializam o processo de apropriação de recursos naturais e humanos em determinados lugares do território, na lógica predominantemente economicista, para responder a determinações e aceções conformadas em espaços relacionais externos aos das populações e regiões dos arredores dos empreendimentos.

O discurso da modernização e do desenvolvimento atribuído aos grandes projetos hidrelétricos traz no seu bojo um ideal de igualdade e de benefícios a todos, porém, é preciso atenção aos símbolos inerentes ao discurso dominante. Quando dizem que as hidrelétricas vêm trazer, para um país ou para uma região, a esperança de salvação da economia, da integração no mundo, a segurança do progresso, tudo isso são símbolos que permitem aceitar a racionalidade do objeto que, na realidade, pode exatamente vir destroçar a nossa relação com a natureza e impor relações desiguais (Santos, 1999, p.173).

A produção de energia é importante para o desenvolvimento e isto é inegável, porém, é preciso refletir, afinal estamos nos referindo ao desenvolvimento de quem, de quê, e para quem. Tais indagações ajudam no sentido de desnudar o conteúdo no plano do discurso e o que realmente restará em termos práticos, ao longo do tempo, a população para a qual se destina.

A iminência dos empreendimentos hidrelétricos nos locais mais diversos do país desperta sentimentos variados na população a ser afetada pelo projeto de execução de uma barragem, gerando desconfortos, estranhezas e suscitando crenças produzidas pelos empreendedores (agentes imediatos do capital) ao dispor de recursos (financeiros, midiáticos, estruturais) para demonstrar uma realidade que justifique a construção, isto corroborado, pelos agentes do governo, sob o lema do desenvolvimento regional/local.

Os grandes projetos afetam e transformam o território, utilizando o discurso da produção de energia através de fontes renováveis e da garantia de ações compensatórias para a população atingida pela barragem. O deslocamento compulsório de moradores, parte fundante da concretização destes projetos, conduzirá a uma problemática territorial complexa que evidencia o volumoso contingente de expropriados das áreas determinadas para o fim projetado. Martins (1993) ajuda a refletir sobre esta questão ao afirmar que os projetos são de grande magnitude econômica, envolvendo investimentos em setores da economia voltados, principalmente à infraestrutura. Em função da apropriação de determinada posição do espaço geográfico, estes empreendimentos não geram, efetivamente, uma melhora na qualidade de vida (de forma integral) da totalidade da população que os recebem.

O risco definido como uma construção social pressupõe ir além da objetivação do processo, e considerar a percepção e a subjetivação do homem nas relações cotidianas. Conforme Veyret (2007, p.24), o risco é “uma construção social. A percepção que os atores têm de algo que representa um perigo para eles próprios, para os outros e seus bens, contribui para construir o risco que não depende unicamente de fatos ou processos objetivos”.

Para compreender os riscos à saúde e o processo de adoecimento desencadeado, em especial da população submetida ao deslocamento compulsório em função da inundação de toda a área

urbana do município para a formação do lago da UHE, foi preciso capturar o entendimento sobre riscos em saúde, no campo da epidemiologia. “O conceito de risco é, portanto, usado em epidemiologia como uma forma de compreender e medir a probabilidade de ocorrência de agravos à saúde” (Castiel *et al.*, 2010, p.38).

Desta maneira, a Geografia percebe o espaço como uma distribuição de fatores de riscos, ambientais, sociais, econômicos e culturais. Em particular, o aspecto da saúde, poderá sinalizar consequências da desterritorialização, provocada pelos deslocamentos compulsórios.

Usina hidrelétrica de Nova Ponte e os riscos à saúde

O município de Nova Ponte, no qual foi executado o empreendimento hidrelétrico com o mesmo nome, faz parte da microrregião de Uberlândia/Araguari e da macrorregião de Uberlândia, definido no Plano Diretor de Regionalização da Saúde do Estado de Minas Gerais.

No Brasil, a exemplo do que ocorre em outras nações, levantamentos epidemiológicos, com dados de morbidade e mortalidade da população, realizados em diversos segmentos da sociedade demonstram que o processo de saúde-doença, é influenciado por questões da ordem sócio-econômica-cultural e ambiental.

Os moradores submetidos ao deslocamento compulsório, seja pela inundação das terras produtivas ou da cidade velha, experimentam no território “vivido” novas territorialidades como “continuum” de um processo de dominação e/ou apropriação, pelos grandes empreendimentos hidrelétricos. A situação vivenciada pelos moradores de Nova Ponte poderá desencadear o surgimento de problemas de saúde que antes não eram comuns entre os moradores submetidos à mudança.

Promover o diálogo entre a Geografia e a saúde (risco associado ao processo de saúde-doença) da população submetida ao deslocamento compulsório, requisita a inserção da saúde coletiva e sua organização enquanto política de saúde pública.

A saúde coletiva, constituída nos limites do biológico e do social, ainda continua a ter pela frente a tarefa de investigar, compreender e interpretar os determinantes da produção social das doenças e da organização social dos serviços de saúde, tanto no plano diacrônico como sincrônico da história. Ou, como apontam outros autores (Birman, 1991), a saúde coletiva ao introduzir as ciências humanas no campo da saúde, reestrutura as coordenadas desse campo, trazendo para o seu interior as dimensões simbólica, ética e política, o que somente poderá revitalizar o discurso biológico.

O conceito de saúde-doença estuda os fatores biológicos, econômicos, sociais e culturais e, com eles, pretende obter possíveis motivações para o surgimento de alguma enfermidade (Lemos e Lima, 2002). Desta forma, a vida cotidiana, configura o lugar de manifestação das “tensões” entre os processos biológicos e sociais que determinam o estado de saúde de uma população ou grupos populacionais, de base territorial, a partir do uso do território nas dimensões - política, econômica, natural e cultural.

De acordo com o levantamento de dados secundários, Brasil (2014) constatou-se a disponibilidade a partir de 1998, posterior à mudança para a cidade nova, ocorrida em 1994. O levantamento demonstrou que no período de 1998 a 2013, houve aumento dos quadros de diarreia e gastroenterite, doenças do aparelho circulatório, manteve lineares quadros de desnutrição, de diabetes, de depressão e de stress e aparecimento de casos de neoplasias (1998- 2013), de doenças endocrinológicas, nutricionais e metabólicas (1998-2013) e de transtornos mentais e comportamentais (1998-2013).

No estudo, os riscos a saúde, foram considerados como parte do processo de adoecimento da população, alterando o perfil epidemiológico, este entrecortado pela ação de implantação de um grande projeto de investimento, com a inundação da cidade velha e o deslocamento de toda a população para a cidade nova, fato este marcado pelos condicionantes socioeconômico, ambiental e cultural, interferindo no modus de vida da população e promovendo o uso do território.

Conclusão

As reflexões geradas nesse estudo apontam para uma relação estreita entre o uso do território, a partir da implantação de projetos de investimentos, do deslocamento compulsório da população, alterando o seu “*modus vivendi*”, com mudanças no processo saúde-doença, este entendido nos seus aspectos biopsicossociais, econômico, cultural e ambiental.

Talvez seja cedo para poder fazer afirmações quanto ao aparecimento dessas novas doenças entre os moradores de local atingido por grande empreendimento. Entretanto, o debate está lançado e outros trabalhos poderão corroborar com a problemática dessa empreitada, ou seja, a de que a materialização de grandes empreendimentos em lugares tradicionais de vida de um povo pode levar ao acometimento de novas doenças ligadas à perda do lugar antigo.

Não sem razão os moradores de Nova Ponte sempre se referem à cidade velha com tom de perda e impotência diante da decisão do empreendedor de construir a hidrelétrica. Mesmo o ganho material que tiveram não se apresenta como suficiente para encobrir o sentimento de carência, de saudade, de tristeza em relação à submersão da cidade velha. Porém, esse fato, do ganho material atrelado ao uso do discurso para enfatizar sua eficácia, é suficiente para mascarar essa realidade em que o território pode ser considerado com a base também para a própria vida.

Bibliografia

- Birman, J. (1991) - A physis da saúde coletiva. Physis: *Revista Saúde Coletiva*, vol. 1 (n.º 1), p.7-11.
- Brasil, Ministério da Saúde, *Portal da Saúde*. Recuperado em 15 julho, 2014, do site: datasus.saude.gov.br
- Castiel, D. L.; Guilam, M. C. R. e Ferreira, M. S. (2010) - *Correndo o risco*: uma introdução aos riscos em saúde. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 134 p.
- Haesbaert, R. (2004) - *O mito da desterritorialização*: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 400 p.
- Lemos, J. C. e Lima, S. do C. (2002) - A geografia médica e as doenças infecto-parasitárias. *Revista Caminhos de Geografia*, vol. 3(n.º6), Uberlândia, p.74-86.
- Martins, J. de S. (1993) - *A chegada do estranho*. São Paulo, Hucitec, 179 p.
- Santos, M. (1999) - *A Natureza do Espaço*: espaço e tempo, razão e emoção. 3ªed. São Paulo, Hucitec, 384 p.
- Vainer, C. B. e Araújo, F. G. B. de (1992) - *Grandes projetos hidrelétricos e desenvolvimento regional*. Rio de Janeiro, CEDI, 86 p.
- Veyret, Y. (2007) - *Os riscos*: o homem como agressor e vítima do meio ambiente. Tradução Dilson Ferreira da Cruz, São Paulo, Contexto, 319 p.

ANÁLISE DE RISCO SOCIAL E TECNOLÓGICO EM GRÁFICA DE PEQUENO PORTE EM LONDRINA/PR/BRASIL

Camila Santos Doubek Lopes

Departamento de Geografia, CCE da Universidade Estadual de Londrina
uel.camila@gmail.com

Mirian Vizintin Fernandes Barros

Departamento de Geografia, CCE da Universidade Estadual de Londrina
mirianvizintim@gmail.com

RESUMO

A indústria gráfica brasileira tem se desenvolvido intensamente, representando em 2013 2,95% do PIB do país, gerando 221 mil empregos. Porém, chama a atenção o impacto deste setor no meio ambiente e nas condições de trabalho dos funcionários, apresentando inúmeros riscos ambientais. As gráficas são sistemas de produção que possuem grandes potenciais de acidentes. Este trabalho realizou a identificação de situações de risco no processo offset em uma gráfica de pequeno porte na cidade de Londrina, Brasil. Os focos de diagnóstico foram: exposição dos trabalhadores aos produtos químicos e descarte de resíduos líquidos e sólidos. Para estabelecer a ideal forma de proteção dos funcionários e descarte dos produtos analisados e suas embalagens, foram averiguadas as Fichas de Segurança, e consultada a legislação ambiental. Ao final, as análises mostraram que a conduta da gráfica não está em conformidade às leis, expondo os funcionários e o meio ambiente a grandes riscos, tornando-os extremamente vulneráveis.

Palavras-chave: Risco; vulnerabilidade; impactos ambientais; indústria gráfica; sistema offset.

Introdução

O mercado de impressões vem tomando cada vez mais notoriedade, e com isso questões a respeito dos procedimentos de gestão de resíduos e as condições de segurança do trabalhador são levantadas. Neste ambiente de trabalho existem inúmeras situações de risco em potencial para o trabalhador e para o meio ambiente.

A vulnerabilidade que será avaliada aplica-se ao grau de susceptibilidade ou de risco a que está exposta uma população a sofrer danos.

Este trabalho propõe uma análise de risco social e tecnológico numa gráfica de pequeno porte, mais especificamente no processo de impressão offset, objetivando servir de guia para a melhoria das condições da indústria gráfica em estudo.

A metodologia utilizada foi primeiramente a bibliográfica, sendo feito o levantamento dos conceitos de risco e vulnerabilidade, assim como das questões ambientais e funcionais, problemas e aspectos relevantes da indústria gráfica, notadamente o processo de impressão offset. Posteriormente foi adotada a pesquisa de campo. Para a coleta de dados foram pesquisadas as Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Com as fichas coletadas e a legislação vigente em mãos, foi possível fazer o levantamento das condições ideais de manuseamento (necessidade de EPIs), armazenamento e descarte para posterior comparação com as condições reais do processo de offset da Gráfica X (assim nomeada para preservar a sua identidade), e assim pode-se avaliar a vulnerabilidade física e social do processo.

Revisão de literatura

Geografia e a análise de risco e a vulnerabilidade

Dentre os diferentes enfoques da Geografia, neste trabalho adotou-se o que estuda a relação sociedade e natureza, a geografia socioambiental. O risco associa-se necessariamente, à presença humana, ou ainda a interação sociedade-natureza e está associado à possibilidade de ocorrência do evento.

O risco segundo sua origem pode ser classificado nas categorias de: (i) tecnológico, relacionado aos processos produtivos e da atividade agrícola, científica e industrial; (ii) natural, ligado aos processos e eventos de origem natural ou induzido por atividades humanas (conotação ambiental ou socioambiental); e, (iii) social, fruto das atividades humanas, incluídos os econômicos, militares e os relacionados à saúde (ESTEVES, 2011). Ainda sobre os tipos de risco, Castro, Peixoto e Rio (2005) ressaltam a existência de adjetivos para qualificar os diversos tipos: risco ambiental, tecnológico, social, saúde, etc.

A averiguação do risco ambiental deve ser baseada na relação entre os aspectos físicos e sociais, ou ainda, entre o homem e o seu ambiente. Já a questão social compreende a dimensão humana, pois o seu potencial de resposta está subordinado à realidade socioeconômica e cultural da população em risco, isto é, da sua vulnerabilidade.

É importante que a avaliação de risco no gerenciamento de desastres considere não apenas a análise do perigo (evento natural), mas também a vulnerabilidade (fatores socioambientais) da população em questão.

A vulnerabilidade aplica-se ao grau de susceptibilidade ou de risco a que está exposta uma população a sofrer danos. A classificação mais simplificada é a defendida pelo National Research Council (2006) que indica dois principais tipos de vulnerabilidade: física e social. A física representa as ameaças às estruturas físicas e infraestruturas, ao meio ambiente e aos prejuízos na economia. A social representa as ameaças ao bem-estar/normalidade da população, como mortes, feridos, necessidade de atendimento médico e os impactos no funcionamento e na normalidade do sistema social devido à ocorrência de um desastre.

“Com relação aos aspectos sociais, a proposição apresentada é que o risco ambiental somente poderá ser compreendido com o enfoque da dimensão humana, pois o potencial de danos e a capacidade de resposta dependerão das condições socioeconômicas e culturais da população local, ou seja, da sua vulnerabilidade” (MENDES, 2013, p. 25).

A indústria gráfica e seus riscos

A indústria gráfica atende aos mais diversos setores da economia e possui um parque gráfico muito automatizado. No Brasil, este setor vem crescendo continuamente com aproximadamente 20.500 mil gráficas espalhadas pelo país, gerando 221 mil empregos e cada vez mais investindo em novas tecnologias e estruturas. Em 2012 teve R\$37.4 bi em produção industrial (ABRIGAF, 2013).

Devido aos sistemas de impressão, hoje tendo como o principal o offset (responsável por 70% do mercado), as gráficas manipulam diversos produtos químicos danosos ao meio ambiente e aos funcionários, que na maioria das vezes não fazem o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI) necessários (HIEDELBERG, 2006).

Segundo SESI (2006, p.30), no ambiente laboral de uma indústria gráfica, são inúmeras situações que envolvem máquinas e ferramentas ou condições que ocorrem devido à presença de “agentes

que conforme sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição, podem causar danos à segurança e à saúde dos trabalhadores”. São cinco os tipos de riscos: físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes.

Segurança no trabalho

Os riscos para os trabalhadores vão além dos físicos, como ruídos, calor e vibrações. Há também os químicos, que podem prejudicar as vias respiratórias, digestivas, a visão e a pele, e os riscos biológicos que provêm das bactérias, fungos, parasitas do ambiente. Mas essas situações podem ser evitadas com precauções por parte do empregado e das condições do local de trabalho (PERAZOLO, 2005).

Resultados - diagnóstico de risco

As medidas de controle de engenharia dos produtos exigidas pelos documentos consultados foram: instalação de sistema de ventilação, preferencialmente local exaustora ou, em caso de impossibilidade, ventilação geral diluidora, com o objetivo de manter níveis de componentes do produto no ar abaixo dos limites máximos recomendados. Adicionalmente é necessário manter chuveiros e lava-olhos de emergência nos locais onde haja manipulação do produto. A realidade da gráfica é ausência dos sistemas de ventilação citados, tampouco possui lava-olhos nas imediações das máquinas impressoras.

As fichas químicas examinadas exigem diversos tipos de EPIs: máscara tipo *full face* (contra gases), respirador com filtro químico, luvas impermeáveis (de PVC ou nitrílica), óculos de proteção hermeticamente fechados, botas impermeáveis, capacetes e roupas fechadas nos punhos. Caso a exposição seja prolongada, máscara protetora com cartucho de vapor orgânico. Quanto aos equipamentos de proteção empregados na Gráfica X, os técnicos utilizam botas (eventualmente), luvas e jalecos (eventualmente), não havendo à disposição os outros itens exigidos.

A impressora offset mono não possui guarda-corpo, expondo o operador às partes expostas da máquina.

É necessária a limpeza dos rolos de impressão a cada troca de cor. Esta limpeza é realizada pelo técnico manualmente com solventes orgânicos aplicados em panos, sendo que o operador não usa luvas impermeáveis. Esta prática expõe o técnico à inalação dos solventes e também assimilação pela pele desprotegida.

Os panos são descartados em locais destampados, gerando maior volume de solventes orgânicos no ambiente de trabalho.

As recomendações para não agressão ao meio-ambiente, segundo Brasil (2010, p.15), são de que resíduos possam ser reprocessados, incinerados em instalações adequadas ou enviados para o co-processamento em cimenteiras com autorização do órgão ambiental. A recomendação das FISPQs para o descarte dos resíduos é de nunca fazê-lo em lixo doméstico, solo, esgotos e cursos d'água. As embalagens vazias não devem ser reutilizadas.

Ainda segundo a mesma lei, fica decretado a pena de reclusão de um a quatro anos e multa para quem “Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos” (BRASIL, 2010, p.15).

Na Gráfica X, todos os resíduos líquidos e géis são descartados na rede de esgoto, enquanto as embalagens são destinadas ao lixo comum.

Com o objetivo de facilitar a visualização dos resultados, construiu-se a Tabela I com atribuição de cores, sendo que a cor vermelha sinaliza o não cumprimento das exigências, o laranja, cumprimento parcial e o verde, cumprimento total das exigências. A indicação de NA quando o item não se aplica, isto é, este assunto não é abordado pela FISPQ do produto em questão.

Quadro de resumo

Tabela I. Tabela para visualização do desempenho da Gráfica X quanto às exigências das FISPQs e a legislação.

	Controle de engenharia	EPIs	Descarte
Revelador para chapa positiva			
Gel corretor de chapa para offset			
Solvente de secagem rápida para rolo	NA		
Álcool Isopropílico	NA		
Solvente de secagem rápida para bla			NA
Solução de fonte concentrada			NA
Xampu para descristalização			
Restaurador de Blanquetas			
Goma protetora para chapa offset			
Querosene			
Limpador de chapa			

Conclusões

Com base nos resultados alcançados, pode-se concluir que:

- A Gráfica X é altamente vulnerável socialmente, pois apresenta inúmeros riscos aos seus funcionários.
- É altamente vulnerável fisicamente, pois apresenta risco iminente de contaminação do meio natural devido ao descarte equivocado de seus resíduos.
- Faz-se urgente a imediata compra dos EPIs mencionados nas FISPQs, instalação de sistema de ventilação e correta destinação dos resíduos.
- Embora exista legislação específica, a fiscalização é deficitária, o que contribui para a continuidade do problema. Se esta situação for expandida para muitas outras graficas que possivelmente estão em situação similar o risco aumenta.
- Os efeitos causados ao ambiente e às pessoas que trabalham muitas vezes são desconhecidos, e isto poderia em parte ser resolvido com cursos de capacitação e fiscalização mais acentuada.

Referências bibliográficas

- ABIGRAF. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA GRÁFICA (2013) - *A indústria gráfica em números*. Disponível em: <http://www.abigraf.org.br> Acesso em 9 out. 2013.
- BRASIL. Lei Federal Nº 12.305 de 2 de Agosto de 2010 (2010) - *Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos*; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.
- ESTEVES, C.J.O. (2011) - *Risco e Vulnerabilidade Socioambiental: Aspectos Conceituais*. Cad. IPARDES. Curitiba, PR, v.1, nº 2, p. 62-79, jul./dez.
- HEIDELBERG (2006) *100 anos de impressão offset*. São Paulo, 35p.
- GIL, A.C. (2002) - *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- MENDES, C. (2013) *Vulnerabilidade socioambiental à inundação na área urbana de Irati - PR*. 2013. Dissertação (Mestrado em Geografia). Universidade Estadual de Londrina, Londrina.
- NATIONAL RESEARCH COUNCIL (2006) - *Facing Hazards and Disasters: Understanding Human Dimensions*. Committee on Disaster Research in the Social Sciences: Future Challenges and Opportunities, Washington, D. C.: The National Academies Press, 409 p.
- PERAZOLO, C. A. (2005) - *Impressão Offset I - Curso Técnico em Artes Gráficas*. São Paulo: SENAI, 111 p.

IMPACTO DE TEMPERATURAS EXTREMAS NA MORTALIDADE E MORBIDADE - UM ESTUDO NA ILHA DA MADEIRA

Ricardo Gomes

Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM
ricardo.gomes@procivmadeira.pt

Rafael Brites

Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM
rafael.brites@procivmadeira.pt

RESUMO

A relação entre ondas de calor e efeitos fisiológicos associados a temperaturas extremas, que se refletem num acréscimo de mortalidade e aumento de admissões nas urgências hospitalares, tem sido demonstrada em diversos estudos realizados tendo por referência Portugal Continental, o mesmo não sucedendo relativamente à ilha da Madeira, uma lacuna que se pretendeu colmatar.

Identificaram-se períodos de calor particularmente intenso, entre 2002 e 2013, com base nos índices Heat Index, Índice Diaz e Índice Ondas e confrontou-se com o registo diário de óbitos e o registo diário de admissões no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para o mesmo período. Compararam-se os valores de óbitos e admissões de urgência registados nos períodos de calor intenso com os valores médios para o mesmo período, entre 2002 e 2013, de forma a identificar variações nos fenómenos da mortalidade e morbilidade, particularmente em determinados grupos etários (65 ou mais anos).

Palavras-chave: Índice Ondas; Heat Index; Índice Diaz; Mortalidade; Morbilidade;

Introdução

Diversos estudos relativos a Portugal Continental evidenciaram a relação entre momentos de calor particularmente intenso - e dias seguintes, e variações mais ou menos significativas ao nível da mortalidade e morbilidade da população, particularmente entre os mais idosos, associados a todas as causas, bem como relativamente a patologias respiratórias e circulatórias (Calado *et al.*, 2003; Paixão e Nogueira, 2003; Almeida *et al.*, 2010; Monteiro *et al.*, 2013). Estes estudos utilizam diferentes metodologias para identificar os períodos de maior desconforto térmico, utilizando diferentes variáveis e diferentes índices, nomeadamente o Heat Index, Índice Diaz e Índice Ondas (Diaz, 2004; Monteiro, *et al.* 2012; Monteiro *et al.*, 2013).

Com este trabalho pretendeu-se efetuar uma primeira análise exploratória da relação entre períodos de maior calor e a variação da mortalidade diária e da afluência ao serviço de urgências hospitalares. Pretende-se identificar variações nos fenómenos da mortalidade e morbilidade, particularmente em determinados grupos etários (65 ou mais anos) nos períodos de maior calor bem como nos dias subsequentes.

Método

Neste estudo a área em análise circunscreve-se aos concelhos de Câmara de Lobos, Funchal e Santa Cruz, concelhos contíguos que reúnem 74% da população da ilha da Madeira (INE, 2011). Identificaram-se os períodos de calor particularmente intenso, entre 2002 e 2013, com base nos índices Heat Index, Índice Diaz e Índice Ondas (Diaz, 2004; Monteiro, *et al.* 2012; Monteiro *et al.*, 2013). Para tal utilizaram-se dados relativos a Temperatura e Humidade Relativa do Ar da Estação Meteorológica do Observatório Meteorológico do Funchal (58 metros de altitude).

Relativamente aos períodos de calor selecionados, e aos 5 dias seguintes, identificou-se o número de óbitos e o registo diário de admissões no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça (Funchal) para o mesmo período. Os dados relativos aos óbitos foram disponibilizados pelo INE, tendo sido facultados apenas dados relativamente a óbitos diários por todas as causas e óbitos diários por todas as causas na classe etária de 65 e mais anos. Os dados relativos às urgências hospitalares foram disponibilizados pelo Serviço de Estatística do Hospital Dr. Nélio Mendonça. Os registos com identificação do diagnóstico segundo a Classificação Internacional de Doenças apenas existem para o ano de 2013 e parte do ano de 2012. Assim, considerando o período em análise, 2002-2013, utilizaram-se os registos de admissão nas urgências e, em particular, as admissões devido a ‘Doença súbita’.

Compararam-se os valores diários de óbitos e óbitos na classe etária de 65 ou mais anos e de admissões de urgência devidas a ‘Doença súbita’, individualizando também aqui a classe etária de 65 e mais anos, nos períodos de calor selecionados, e nos 5 dias seguintes, com os valores esperados. Estes, foram definidos através do cálculo da média diária para os meses de julho, agosto, setembro e outubro, excluindo os períodos de calor em análise. Os quatro meses selecionados correspondem aos que possuem, de acordo com as Normais Climatológicas, valores mais elevados de Temperatura Média, Temperatura Média Máxima e Temperatura Média Mínima para a estação meteorológica do Observatório Meteorológico do Funchal.

Resultados

Em agosto de 2003 registaram-se na estação meteorológica do Observatório Meteorológico do Funchal valores condizentes com existência de 3 períodos de calor, um segundo o Índice Ondas, outro segundo índice Diaz e outro segundo o Heat Index. Entre 12 e 16 de agosto de 2003 houve uma sobreposição destes períodos. Nestes 4 dias houve um acréscimo ao nível de óbitos de 33%, e de óbitos na classe etária de 65 ou mais anos de 9%, comparativamente aos valores médios de referência. Relativamente a admissões nas urgências devido a doença súbita, houve uma diminuição de 11% quer no total, quer relativamente a pacientes com 65 ou mais anos, comparativamente com os valores esperados. Considerando apenas os 5 dias subsequentes ao período de calor, houve também um aumento do número de óbitos de 9%, e de óbitos na classe etária dos 65 ou mais anos de 18%. Também neste caso as admissões no serviço de urgências devido a doença súbita diminuíram 14% e no caso de pacientes com 65 ou mais anos diminuíram 17%, comparativamente aos valores esperados.

Entre 24 e 27 de julho de 2004 registaram-se na estação meteorológica do Observatório Meteorológico do Funchal valores condizentes com existência de um período de calor, quer segundo o índice Diaz, quer segundo o Heat Index. Nesses 4 dias houve um acréscimo de óbitos de 42% relativamente aos valores esperados e aumento de 46% de óbitos na classe etária de 65 ou mais anos. Relativamente a admissões no serviço de urgências devido a doença súbita, houve uma diminuição de 8% relativamente ao valor diário de referência e uma diminuição de 2% considerando pacientes com 65 ou mais anos. Contabilizando apenas os 5 dias subsequentes ao período de calor, houve um aumento do número de óbitos de 40% e acréscimo de óbitos na classe dos 65 ou mais anos de 48%. As admissões no serviço de urgência diminuíram 8% e, no caso de pacientes com 65 ou mais anos, diminuíram 18%.

Seguindo-se ao período de calor de julho de 2004, houve em agosto desse mesmo ano novo período de calor. Entre os dias 26 e 31 de agosto registaram-se na estação meteorológica do Observatório Meteorológico do Funchal valores condizentes com existência de um período de

calor, quer segundo o índice Diaz, quer segundo o Heat Index, quer de acordo com o índice Ondas. Nesses 6 dias houve um decréscimo ao nível de óbitos de 26% e um ligeiro aumento de óbitos na classe de 65 ou mais anos de 7% comparativamente aos valores de referência. Relativamente a admissões no serviço de urgências devido a doença súbita, houve uma diminuição de 15% no total e uma redução de 27% contabilizando pacientes com 65 ou mais anos. Considerando os 5 dias subsequentes ao período de calor, houve uma diminuição do número de óbitos de 16% e também uma diminuição de óbitos na classe dos 65 ou mais anos de 41%. As admissões no serviço de urgências devido a doença súbita diminuíram 20% e, no caso de pacientes com 65 ou mais anos, diminuíram 28%.

Em 2006 ocorreram períodos de calor segundo os índices Diaz e Heat Index que se sobrepuseram entre os dias 4 e 6 setembro. Nesses 3 dias houve um acréscimo de óbitos de 43% e um aumento de óbitos na classe etária de 65 ou mais anos de 56%. Relativamente a admissões nas urgências devido a doença súbita, houve um aumento residual de 2% no total e uma diminuição de 14% relativamente a pacientes com 65 ou mais anos. Nos 5 dias subsequentes ao período de calor, houve um aumento do número de óbitos de 19% e também aumento de óbitos na classe dos 65 ou mais anos de 27%. As admissões no serviço de urgências devido a doença súbita aumentaram 3% e, no caso de pacientes com 65 ou mais anos, aumentaram 2%.

Em agosto e setembro de 2012 ocorreram 2 períodos de calor segundo índice Diaz, ambos com duração de 4 dias. No primeiro destes períodos, entre 22 e 25 de agosto, houve um acréscimo de óbitos de 24% e um aumento de óbitos na classe etária de 65 ou mais anos de 35%. Relativamente a admissões no serviço de urgências devido a doença súbita, houve uma diminuição de 17% no total e aumento de 6% pacientes com 65 ou mais anos. Nos 5 dias subsequentes ao período de calor, houve um aumento residual do número de óbitos de 4% e um aumento de óbitos na classe etária dos 65 ou mais anos de 23%. As admissões no serviço de urgências devidas a doença súbita diminuíram 8% e, no caso de pacientes com 65 ou mais anos, aumentou 8%.

No segundo destes períodos de 2012, 3 semanas depois, entre 15 e 19 de setembro, houve uma diminuição significativa quer de óbitos, quer óbitos na classe etária de 65 ou mais anos para cerca de metade. Relativamente a admissões no serviço de urgências devido a doença súbita, houve uma diminuição de 12% no total e não houve variação quanto a pacientes com 65 ou mais anos. Considerando os 5 dias subsequentes ao período de calor, houve uma pequena diminuição de óbitos e um residual aumento de óbitos na classe etária de 65 ou mais anos. As admissões no serviço de urgências devido a doença súbita diminuíram 6% e, no caso de pacientes com 65 ou mais anos aumentaram 18%.

Conclusão

Nos seis períodos identificados como particularmente quentes, bem como nos 5 dias subsequentes, registaram-se variações ao nível da mortalidade associada a todas as causas, no total e relativamente à classe etária 65 ou mais anos, bem como nas admissões no serviço de urgências. Estas variações foram mais significativas no que se refere a óbitos, em particular na classe etária 65 ou mais anos, e prolongaram-se quer pelos períodos quentes, quer pelos dias seguintes.

Identificaram-se dois padrões distintos. Nos períodos de 2003, julho de 2004, 2006 e agosto de 2012 verificou-se um aumento significativo do número de óbitos, bem como de óbitos na classe etária de 65 ou mais anos acompanhado por diminuição de admissões no serviço de urgências.

Nos 5 dias seguintes ao período quente manteve-se o acréscimo de óbitos, particularmente significativo neste caso nos óbitos da classe etária de 65 ou mais anos.

Nos períodos de agosto de 2004 e setembro de 2012, ambos antecédidos semanas antes por outros períodos quentes com significativo aumento do número de óbitos em relação ao esperado, registou-se pelo contrário significativa redução do número de óbitos, que se prolongou quer pelo período quente, quer pelos dias seguintes, e afetou tanto o número de óbitos total como na classe etária 65 ou mais anos.

Bibliografia

- Almeida, S.; Casimiro, E. e Calheiros, J. (2010) - Effects of apparent temperature on daily mortality in Lisbon and Oporto, Portugal. *Environmental Health*. 9(12), Harvard, p. 1-7.
- Calado, R.; Botelho, J.; Catarino, J. e Carreira, M. (2003) - *Mortalidade em Portugal no Verão de 2003: influência das ondas de calor*. Ministério da Saúde - Direção Geral da Saúde. P. 1-10.
- Díaz J. (2004) - *Análisis de tendencias en olas de calor a partir de series largas de temperatura*. In IV Congreso de la Asociación Española de Climatología - El clima entre el mar y la montaña. Santander: Asociación Española de Climatología. p. 347-354.
- INE (2011) - Censos 2011. Resultados definitivos-Região Autónoma da Madeira. XIV Recenseamento Geral da População e IV Recenseamento Geral da Habitação, Instituto Nacional de Estatística, Lisboa.
- Monteiro, A. et al., (2012) - *Atlas da saúde e da doença - vulnerabilidades climáticas e socioeconómicas na Grande Área Metropolitana do Porto e Concelho do Porto*. Suporte digital. Volumes I e II.
- Monteiro, A.; Carvalho, V.; Velho, S. e Sousa, C. (2013) - The accuracy of the heat index to explain the excess of mortality and morbidity during heat waves - a case study in a mediterranean climate. *Bulletin of geography. Socio-economics Series*. 20(2013), Tórón, p.71-84.
- Paixão, E. e Nogueira, P. (2003) - Efeitos de uma onda de calor na mortalidade. *Revista Portuguesa de Saúde Pública*. 21(1), Elsevier, p.41-54.

RISCO DE AGUDIZAÇÃO DE DOENÇA RESPIRATÓRIA SUSCITADA POR FRENTE FRIA

Mário Talaia

Departamento de Física, CIDTFF, Universidade de Aveiro
mart@ua.pt

Denise Pina

Departamento de Física, Universidade de Aveiro
denisesp@ua.pt

RESUMO

A asma é hoje, em pleno século XXI uma doença de prioridade de investigação, uma vez que suscita muitos problemas (absentismo, custos elevados...). Em Portugal a Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica constitui a 2ª causa de internamento por doença respiratória e a 5ª causa de morte por doença e são estimados cerca de 242 milhões de euros em custos o que indicia algum desequilíbrio financeiro. Neste trabalho mostra-se como é suscitado o risco e o agravamento de surtos asmáticos. Foram usados dados de uma estação meteorológica e ocorrências hospitalares durante um ano. Investigaram-se os tipos de circulação atmosférica que estão associados ao risco e agravamento da doença, através da análise de mapas do tempo e nestes foi identificada a presença ou aproximação de frente fria. Os resultados obtidos mostraram inequivocamente que um tipo de circulação atmosférico SW com a presença de frente fria é um condicionante de risco e agravamento da doença e estratégias de intervenção devem ser adoptadas.

Palavras-chave: Tipos de circulação atmosférica, asma, frente fria, ocorrências hospitalares.

Introdução

Desde os tempos mais remotos que as doenças respiratórias influenciam a qualidade de vida das pessoas. Na sua obra, Tromp (1980) mostra que o ser humano sempre teve necessidade de compreender o risco e a influência do tempo atmosférico, do clima, da poluição na agudização de doenças de índole respiratória.

Hoje em dia em recintos fechados a temperatura e a humidade relativa podem ser controlados, para se ter um maior conforto térmico ou seja uma melhor qualidade de vida. A procura de uma boa qualidade de vida é um direito de qualquer cidadão. A legislação portuguesa referente a ambientes térmicos confortáveis e de qualidade é ainda muito vaga. A portaria n.º 702/80 de 22 de Setembro refere alguns cuidados a ter com a temperatura e humidade relativa do ar para espaços.

Segundo dados revelados por uma organização voluntária, instituições e agências de luta para melhorar a saúde pulmonar mundial, a Aliança Global contra as Doenças Respiratórias Crónicas (GARD) criada pela OMS (D.G.S., 2008), afirma que 300 milhões de pessoas de todas as idades, em todo mundo, sofrem de asma; que a prevalência de asma aumentou após a mudança para um estilo de vida moderno e urbano; que globalmente, 250000 pessoas morrem de asma anualmente; que as mortes devidas à asma estão relacionadas com a falta de tratamento adequado; que o tratamento da asma não está ao alcance de todas as pessoas que sofrem da doença.

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica ou DPOC é uma patologia crónica, de evolução lenta e progressiva, com grande impacto sobre a função respiratória, que pode estar sujeita a períodos de agudização e complicações graves. A DPOC pode ser diagnosticada através dos resultados obtidos usando uma espirometria (Lundgren *et al.*, 2006).

Em Portugal a doença afecta entre 500 a 600 mil pessoas e no mundo ocidental constitui a 4ª causa de morte nos indivíduos do sexo masculino na idade média de vida, prevendo a Organização

Mundial de saúde (OMS) que em 2020 venha a ocupar a 1ª causa de morte relacionada com problemas respiratórios e a 3ª a nível mundial (Murray & Lopes, 1997; Oga *et al.*, 2003).

Derrick (1965) mostrou que uma massa de ar associada a uma temperatura de ar relativamente baixa (atmosfera com características de “fria”) pode irritar a mucosa respiratória e suscitar agudização de asma. Uma frente fria pode ser uma alavanca que penaliza a qualidade de vida dos asmáticos. Também o vetor entre um ambiente considerado quente para um ambiente considerado frio agrava a agudização de asma e favorece as ocorrências hospitalares.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) refere, também, que uma atmosfera considerada de “fria” é um fator desencadeante da agudização de asma. O estudo de Jamasson *et al.* (1997) mostra que a relação entre determinadas massas de ar (muitos quentes ou muito frias) e as ocorrências hospitalares por agudização de asma apresenta uma elevada concordância. Os autores referem que há um impacto nas enfermarias no Outono e no Inverno.

Neste estudo estamos particularmente interessados em conhecer o risco associado a agudização de doença respiratória (neste estudo: asma) suscitada por um determinado tipo de circulação atmosférica e por frente fria.

Métodos

O estudo é considerado um “estudo de caso”. Para o tratamento dos dados usou-se um método quantitativo e um método qualitativo.

Usaram-se dados registados nos serviços de urgência de hospital referentes a agudização de asma e dados registados na estação clássica de meteorologia da Universidade de Aveiro, durante um ano. Para uma análise de pormenor os dados foram normalizados.

Os dados das ocorrências hospitalares foram considerados em semanas do ano de modo a encontrar as semanas de maior vulnerabilidade.

Após a identificação das semanas de maior vulnerabilidade procurou-se saber os diferentes tipos de circulação atmosférica que estavam associados (Trigo & Câmara 2000). Um dos objetivos foi identificar o tipo de circulação atmosférica que suscitava a agudização da doença e se estava associada à presença de frente fria.

Resultados e Discussão

Foram construídos gráficos para conhecer como os dados normalizados permitiam conhecer condições de risco para a agudização de asma.

Para a pressão atmosférica registada às 9h00, os resultados obtidos mostraram que pressões elevadas indiciam aumento de ocorrências. Uma justificação pode ser devido à presença de um centro de alta pressão (por exemplo o anticiclone dos Açores) que favorece condições de bom tempo. Neste, podem ser registadas temperaturas altas e uma menor humidade relativa do ar o que favorece a agudização de asma, pois quando a humidade relativa é baixa, a viscosidade do “muco” é mais alta e favorece o efeito tipo tampão, dificultando a respiração passiva. No que concerne a humidade relativa registada às 9h00, os resultados obtidos mostraram que para valores de humidade relativa baixos há um agravamento de agudização de asma. Há uma tendência de melhoria quando a humidade relativa aumenta. Esta situação está em concordância com o que é usado nas “águas termais” para uma melhoria da qualidade de vida de asmáticos. Nestes locais são usadas temperaturas e humidades relativas relativamente altas para a fluidificação do “muco” de modo a facilitar a sua limpeza, melhorando a qualidade de vida do asmático (American Thoracic Society, 2007).

A Figura 1 mostra como as ocorrências são influenciadas pela temperatura mínima do ar. Na figura, a linha a tracejado mostra como as ocorrências absolutas evoluem com diferentes temperaturas. A linha a traço cheio representa as ocorrências normalizadas para os mesmos intervalos de temperaturas. É notório o registo de ocorrências mais altas quando a temperatura mínima do ar é mais baixa. Esta situação está em concordância com a literatura quando afirma que frentes frias condicionam o risco de ocorrência de surtos asmáticos. Por outro lado, como já referimos, uma temperatura baixa funciona como constrição favorecendo a dificuldade no ato de respirar.

Figura 1. - Acorrências “versus” temperatura mínima do ar

Para estudar a influência de diferentes tipos de circulações atmosféricas na agudização de asma construiu-se o gráfico da Figura 2. A observação da figura mostra a linha de evolução das ocorrências em cada semana do ano. É a partir da semana 36 que se regista uma alteração significativa nas ocorrências hospitalares. Fez-se então, uma análise semana a semana recorrendo-se aos mapas do tempo diários retirados do site <http://www.wetterzentrale.de/topkarten/tkfaxbraar.htm>. Os resultados obtidos mostraram que há uma mudança do tipo de circulação quando se regista uma agudização da doença, ou seja, do tipo N/NE para SW (semana 37). A partir desta semana os pacientes da doença devem tomar as suas estratégias de defesa. A análise das cartas do tempo diárias mostra inequivocamente que é a circulação atmosférica do tipo SW e uma passagem de frente fria que condiciona o risco de agravamento de ocorrências. De fato, como já referido anteriormente, quando as temperaturas são baixas, há constrição e dificuldade no ato de respirar, e os pacientes procuram ajuda hospitalar.

Figura 2. - Acorrências “versus” semana do ano

Conclusão

Os resultados obtidos mostraram como a agudização de asma é influenciada por parâmetros termohigrométricos.

A análise de mapas de tempo permitiu identificar que o tipo de circulação atmosférica SW com presença de frente fria favorece o risco de agudização da doença.

Os resultados obtidos permitem a adoção de estratégias de intervenção, quando há informação da proteção civil nos *mídia* acerca da previsão do estado do tempo, na melhoria da qualidade de vida e recuperação de pacientes, em espaços fechados.

Agradecimentos

Este trabalho é financiado pela FCT/MEC através de fundos nacionais (PIDDAC) e cofinanciado pelo FEDER através do COMPETE - Programa Operacional Fatores de Competitividade no âmbito do projeto PEst-C/CED/UI0194/2013.

Bibliografia

- American Thoracic Society (2007). *Asthma and Exercise for Children and adults*. Patient Information Series. www.thoracic.org.
- D.G.S. (2008). *Global surveillance, prevention and controlo of Chronic Respiratory Diseases. A comprehensive approach*. Direção-geral da Saúde
- Derrick, E.H. (1965). The Seasonal Variation in Asthma in Brisbane: Its Relation to Temperature and Humidity, *Int. J. Biometeorol.*, 9, 239-253
- Jamason, P.F., Kalkstein, L.S. & Gergen, P.J. (1997). A synoptic evaluation of asthma hospital admissions in New York City, *American Journal of respiratory and critical care medicine*, 156(6), 1781-1788.
- Lundgren, F.L.C., Cabral, M.M, Clímaco, D.C.S, Macedo, L.G., Coelho, M.A.L. & Dias, A.L.P.L.A. (2006). Determinação da eficiência do VEF_6 como substituto da CVF na triagem diagnóstica da doença pulmonar obstrutiva crónica através da comparação entre as relações VEF_1 / CVF e VEF_1 / VEF_6 . *Journal Brazilian Pneumology*, 33(2), 148-151.
- Murray, C.J. & Lopez, A.D. (1997) Alternative projections of mortality and disability by cause 1990-2020: Global Burden of Disease Study. *Lancet*, 349(9064), 1498-1504.
- Oga, T., Nishimura, K., Tsukino, M., Sato, S. & Hajiro, T. (2003). Analysis of the factors related to mortality in chronic obstructive pulmonary disease. *Am J Respir Crit Care Med.*, 167(4), 544-549.
- Portaria nº 702/80 de 22 de Setembro. *O Regulamento Geral de Segurança e Higiene do Trabalho nos Estabelecimentos Industriais*. Ministérios do Trabalho, dos Assuntos Sociais, da Agricultura e Pescas e da Indústria e Energia.
- Trigo, R.M. & Câmara, C.C. (2000). Circulation Weather Types and their Influence on The Precipitation Regime in Portugal. *International Journal of Climatology*, 20, 1559-1581.
- Tromp, S.W. (1980). *Biometeorology: the impact of the weather and climate on humans and their environment (animals and plants)*: Heyden.

LA CIUDAD COMO ESPACIO DE RIESGO AMBIENTAL: ESTIMACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y DE LA POBLACIÓN EXPUESTA EN METRÓPOLIS ESPAÑOLAS

Rosa Cañada Torrecilla

Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid
rosa.canada@uam.es

Antonio Moreno Jiménez

Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid
antonio.moreno@uam.es

Pedro Martínez Suárez

Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid
pedro.martinez@uam.e

María Jesús Vidal Domínguez

Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid
mariajesus.vidal@uam.es

RESUMEN

La ciudad es un espacio de riesgo ambiental, pues las actividades allí realizadas reducen la calidad del aire al generar contaminantes peligrosos para la salud de las personas y el entorno. Diversos informes de la OMS muestran la relación entre la exposición prolongada a PM_{10} , O_3 y NO_2 y el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer de pulmón. Los objetivos serán, en primer lugar, estimar los niveles de concentración atmosférica de estos contaminantes en tres ciudades españolas, mediante el empleo de técnicas de interpolación espacial y SIG, y en segundo lugar, determinar cuáles de ellos constituyen una amenaza para la población urbana, qué zonas y qué población vive en zonas con alta contaminación.

Palabras clave: contaminación urbana, interpolación espacial, exposición, población, SIG.

Introducción

La OMS considera que la contaminación atmosférica es el mayor riesgo medioambiental sobre la salud, estima que causa 2 millones de muertes prematuras al año (Gurjar *et al.*, 2010). De los tres contaminantes que abordamos en este estudio, PM_{10} , O_3 y NO_2 , el primero afecta a las personas más que cualquier otro. Una exposición prolongada a sus componentes (mezcla de partículas sólidas y líquidas, de sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire) contribuye al riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer de pulmón (WHO, 2013). Estudios realizados en la UE indican que la esperanza de vida se puede reducir 8,6 meses (Gurjar *et al.*, 2010). En el caso del ozono troposférico, contaminante secundario formado por una reacción fotoquímica con los óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles (COV), metano y monóxido de carbono, excesivas concentraciones, pueden afectar a la salud humana, a los materiales y a la vegetación. Pueden inducir a problemas respiratorios, desencadenar asma y causar problemas pulmonares (Amann *et al.*, 2008, WHO, 2013). Estudios epidemiológicos han demostrado que los síntomas de niños con bronquitis asmáticas aumentan con exposiciones muy largas al NO_2 , cuya principal fuente de emisión procede de los procesos de combustión llevados a cabo en actividades relacionadas con la generación de calor, generación eléctrica, vehículos a motor, etc. (Gurjar *et al.*, 2010; WHO, 2013).

Considerando lo expuesto, se pretende aquí estudiar la dimensión espacial del riesgo de contaminación por NO_2 , PM_{10} y O_3 , que con frecuencia superan los umbrales establecidos por la

legislación europea y por la OMS, en tres grandes ciudades españolas, y medir el área y población amenazadas por ellos.

Datos y métodos

Las ciudades elegidas para este trabajo son Madrid (3.215.633 hab.), Barcelona (1.611.822 hab.) y Sevilla (700.169 hab.). El ámbito de estudio, el área urbana poblada, excluye los espacios no residenciales y los periféricos no urbanizados, tras una labor de identificación apoyada en el Corine Land Cover 2006 y en imágenes aéreas recientes.

Los datos de contaminación proceden de estaciones oficiales sitas en el interior de los municipios examinados y de otros limítrofes, para mejorar la cobertura. Las variables ambientales seleccionadas han sido la concentración media anual de NO_2 , de partículas en suspensión inferiores a $10\ \mu\text{m}$ (PM_{10}) en 2010, y para el ozono (O_3) se ha utilizado el número de días con valor octohorario superior a $120\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ como promedio de tres años (2010, 2011 y 2012). Los niveles admisibles por la legislación europea y la OMS (tabla I) permitirán establecer las zonas de riesgo de alta contaminación en la ciudad.

Tabla I. Niveles de polución del aire admisibles por la legislación europea y la OMS

CONTAMINANTE	PERIODO DE REFERENCIA	VALOR LÍMITE (UE) PARA LA SALUD HUMANA	VALOR GUÍA OMS
NO_2	1 año	$40\ \mu\text{g}/\text{m}^3$	$40\ \mu\text{g}/\text{m}^3$
PM_{10}	1 año	$40\ \mu\text{g}/\text{m}^3$	$20\ \mu\text{g}/\text{m}^3$
O_3	8 Horas	$120\ \mu\text{g}/\text{m}^3$ no más de 25 días/año (promedio 3 años)	$100\ \mu\text{g}/\text{m}^3$

Para disponer de información continua de cada contaminante en el conjunto del espacio urbano se ha recurrido a técnicas de predicción espacial, práctica muy habitual en estudios de variables ambientales, usando *Geostatistical Analyst* de ArcGIS 10.1.

El procedimiento adoptado constó de varias etapas (véase Cañada *et al.* (2014), siendo la fase crucial del análisis la aplicación de los dos métodos de interpolación, IDW y Kriging ordinario, cuya diferencia radica en el procedimiento de cálculo de los pesos asignados a los valores muestrales. Una descripción más detallada de estas técnicas se pueden encontrar en Cañada, 2007a,b; Krivoruchko, 2011. Se han seleccionado aquellos métodos que consiguen los menores errores en la predicción: una media de los errores próxima a 0 (*mean error*), un error cuadrático medio más bajo (*root mean square error*, RMSE) y un *root mean square standarized error* (RMSSE) próximo a 1. Una vez obtenida la capa estimada, se convirtió a raster con una resolución de 50 metros y se “recortó” para ajustarla a la zona urbana poblada.

Análisis de los resultados

Interpolación espacial del NO_2 , y estimación de superficie y población expuesta

El método de interpolación óptimo para las tres ciudades fue el IDW anisotrópico. La vista de los mapas interpolados denotan que las mayores concentraciones se corresponden con grandes avenidas, con tráfico muy intenso. Por su parte, los niveles admisibles, siempre están vinculados a espacios verdes, con una localización eminentemente periférica (figura 1).

Figura 1. Concentración media anual de NO_2 en Madrid y Barcelona, 2010

Figura 2. Superficie y población expuesta a NO_2 alto en Madrid y Barcelona, 2010.

El 78,7% de la superficie urbana poblada de Madrid y el 73,81% de la de Barcelona sufren alta contaminación por NO_2 , siendo los porcentajes de población expuesta del 95,2% y del 87,2% respectivamente (figura 2). En Sevilla no se supera el umbral crítico.

Interpolación espacial del ozono y estimación de superficie y población expuesta

Los métodos de interpolación del O_3 han sido el Kriging anisotrópico en Madrid y el IDW anisotrópico en Barcelona y Sevilla. Factores geográficos, meteorológicos y reacciones fotoquímicas explicarían su distribución espacial. En ciudades con elevadas concentraciones de óxidos de nitrógeno, éstos destruyen el O_3 , contribuyendo a su disminución en la atmósfera, por el contrario el ozono permanece en aquellos ambientes donde las emisiones a la atmósfera de NO_x son menores. Este hecho queda muy bien reflejado en Madrid donde el área expuesta apenas representa el 2% (zona suburbana del norte y noreste), mientras que en Sevilla alcanza el 58% (figuras 3 y 4).

Interpolación espacial de PM_{10} y estimación de superficie y población expuesta

Los métodos que han proporcionado mejor bondad de ajuste han sido el Kriging anisotrópico para Madrid y Barcelona y el IDW anisotrópico en Sevilla. La disposición espacial resultante de las PM_{10} obedece a cuales son las principales fuentes de emisión: la combustión de carburantes fósiles generada por el tráfico y las zonas con pobre cobertura vegetal o suelos desnudos y secos, más fácilmente erosionables y expuestos a la acción del viento.

Figura 3. Concentración media anual de Ozono en Madrid y Sevilla, 2010

Figura 4. Superficie y población expuesta a O_3 alto en Madrid y Sevilla, 2010

Las tres ciudades no tendrían riesgo de contaminación por PM_{10} , si se considera el umbral de $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ establecido por la legislación europea; sin embargo estudios epidemiológicos recogidos por la WHO (2013) ponen de manifiesto los beneficios de una exposición a menores concentraciones en la atmósfera de PM_{10} y por debajo del umbral establecido por la UE. Por esta razón se ha investigado qué pasaría si se considera espacio de riesgo aquel que supera los $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$, umbral aconsejado por la OMS. Los resultados indican que toda el área de Barcelona sufriría de riesgo por PM_{10} elevado, en Sevilla se alcanzaría el 99,8% y en Madrid el 91,5%.

Conclusiones

Las ciudades españolas de mayor población constituyen espacios de riesgo de contaminación por NO_2 , PM_{10} y O_3 . Para su estudio, dada la escasa cobertura espacial de las estaciones de medición, se ha recurrido a técnicas de interpolación espacial, estimando así la contaminación en todo el espacio urbano poblado. Los riesgos varían según ciudades y contaminantes. En Madrid y Barcelona hay peligro por NO_2 alto. Madrid, y sobre todo Sevilla, constituyen espacios de riesgo de contaminación por O_3 y ninguna de las tres ciudades sufren amenaza de contaminación por PM_{10} excesivo.

Los resultados avalan la necesidad de que políticos, planificadores y ciudadanos se conciencien de la deficiente calidad del aire urbano e impulsen medidas más estrictas y acordes con las recomendaciones de la OMS, encaminadas a mejorar los estándares ambientales y la calidad de vida de la población.

Bibliografía

- Amann, M., Derwent, M.D., Forsberg, B., Hänninen, O., Hurley, F., Krzyzanowski, M., de Leeuw, F., J. Liu, S., Mandin, C., Schneider, J., Schwarze, P. y Simpson, D. (2008)- *Health risks of ozone from long-range transboundary air pollution*. Copenhagen, WHO, Regional Office for Europe, 111 p.
- Cañada Torrecilla, R. (2007a)- Técnicas de interpolación espacial deterministas y exactas: media ponderada por el inverso de la distancia y funciones de base radial", en Moreno A. (Coord.): *Sistemas y análisis de la información geográfica*. Madrid, Ra-Ma, p. 781-809.
- Cañada Torrecilla, R. (2007b)- Técnicas de interpolación geoestadísticas: Kriging ordinario, en Moreno, A. (Coord.): *Sistemas y análisis de la información geográfica*. Madrid, Ra-Ma, p. 823-853.
- Cañada, R., Moreno, A. y González, H. (2014)- Modelado de la calidad del aire urbano Un experimento metodológico con técnicas de interpolación espacial. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, nº 65, p. 317-342.
- Gurjar, B.R, Molina, L.T. y Ojha, C.S.P. (Eds.)(2010)- *Air Pollution. Health and Environmental Impacts*. New York, CRS Press. Taylor and Francis, 518 pp.
- Krivoruchko, K. (2011)- *Spatial Statistical Data Analysis for GIS Users*, Esri Press.
- WHO (2013)- *Review of evidence on health aspects of air pollution-REVIEW*. Copenhagen. Regional Office for Europe, 22 p.

VULNERABILIDADE AOS RISCOS SÓCIO AMBIENTAIS NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - BRASIL.

Magda Adelaide Lombardo

Instituto de Geociências e Ciências Exatas, UNESP, Rio Claro, Brasil
lombardo@rc.unesp.br

Bruna Luiza Pereira de Jesus

USP- Universidade de São Paulo - Brasil
brunajesus@usp.br

Amanda Lombardo Fruehauf

UFSCAR- Universidade Federal de São Carlos- Brasil
amandafruehauf@yahoo.com.br

RESUMO

Nos últimos 50 anos o Brasil vivenciou um processo de urbanização, caracterizado por mudanças econômicas e sociais e intenso fluxo migratório em direção aos principais centros urbanos, notadamente em São Paulo. A ocupação desordenada do território resultou na compactação e impermeabilização do solo, com obstrução de cursos d'água, eliminação da vegetação, como também a ausência de planejamento urbano com precária infraestrutura e serviço, interferindo na qualidade de vida da população e na degradação dos recursos ambientais. A ocupação das áreas de riscos associada a vulnerabilidade social cria na Região Metropolitana de São Paulo situações propensas às tragédias, principalmente no verão, onde as chuvas intensas e concentradas são mais frequentes, assim como os totais pluviométricos atuais estão em elevação. As situações de riscos aumentam ao longo dos anos em decorrência da impermeabilização do solo, aumento da intensidade de chuva, o que possibilita a expansão de áreas de alagamentos e movimentos de massa. Quanto a temperatura, é cada vez mais frequente a ocorrência de ondas de calor em São Paulo, indicando a maior temperatura máxima anual e da frequência de ocorrência de dias e noites quentes. A formação da Ilha de Calor Urbana é frequente e os extremos de temperatura entre o centro e a periferia já ultrapassam 14° C, principalmente no Outono/Inverno. A ilha de calor está associada a concentração de material particulado e gases poluentes que afetam diretamente a saúde dos habitantes, interferindo também no aumento da mortalidade. É necessário intervenções concretas no território urbano, coordenadas no âmbito metropolitano de São Paulo, destacando-se a cooperação e a coordenação entre os agentes modeladores. A adaptação aos impactos as alterações climáticas pode se beneficiar da execução da erradicação da pobreza, geração de renda, proteção do meio ambiente, aumento da capacidade adaptativa e criação de recursos materiais e tecnológicos.

Palavras-chave: vulnerabilidade, riscos socio ambiental e metropole.

Introdução

Em 2008, o Brasil esteve em 10º lugar entre os países do mundo em número de vítimas de desastres naturais, com 1,8 milhões de pessoas afetadas, considerando somente os desastres hidrológicos. No período de 1960 a 2008, foram registrados 94 desastres cadastrados com 5.720 mortes e mais de 15 milhões de pessoas afetadas, entre desabrigados e desalojados (OFDA/ CRED, 2009, apud TOMINAGA, 2012).

O estado de São Paulo segue essa mesma tendência, e se destaca por ser um dos mais atingidos pelos desastres naturais no Brasil. Segundo Amaral e Gutjahr (2012) os acidentes e desastres naturais no Estado estão associados aos escorregamentos de encostas, inundações e tempestades.

Este aumento na incidência de desastres naturais é considerado por diversos autores como consequência do intenso processo de urbanização verificado nas últimas décadas, que leva

porções expressivas da população a viver em áreas impróprias à ocupação, principalmente devido às suas características geográficas desfavoráveis.

Nos últimos 50 anos, o Brasil vivenciou um processo de urbanização, caracterizado por mudanças econômicas e sociais e verificou-se o intenso fluxo migratório em direção aos principais centros urbanos, notadamente em São Paulo - SP. Esta intensa urbanização resultou na compactação e impemeabilização do solo, obstrução de cursos d'água, eliminação da vegetação, como também na ausência de planejamento urbano, precária infraestrutura e serviços, o que interferiu na maior vulnerabilidade aos riscos sócioambientais, principalmente nas áreas de baixa renda.

A ocupação das áreas de riscos associadas à vulnerabilidade cria na Região Metropolitana de São Paulo situações propensas às tragédias, principalmente no verão onde as chuvas intensas e concentradas são mais frequentes, assim como os totais pluviométricos atuais estão em elevação. Nesse sentido as áreas de alagamento e movimento de massa estão aumentando.

Quanto à temperatura, é cada vez mais frequente as ocorrências de onda de calor em São Paulo, indicando a maior temperatura máxima anual e da frequência de dias e noites quentes. A formação da ilha de calor é frequente e os extremos da temperatura entre o centro e a periferia já ultrapassam 14° C, principalmente no outono/inverno. A ilha de calor está associada à concentração de material particulado e gases poluentes que afetam diretamente a saúde dos habitantes, interferindo também no aumento da mortalidade. Esse trabalho pretende contribuir para avaliar a vulnerabilidade aos riscos sócioambientais na região metropolitana de São Paulo - Brasil e contribuir para políticas públicas adequadas.

Bases Conceituais e Metodológicas.

O termo risco, hazards, perigo, dano, vulnerabilidade, acidentes, catástrofes, desastres, entre outros formam um vasto vocabulário utilizado nos estudos e nos processos de planejamento, gestão ou remediação de eventos naturais e/ou sociais e/ou tecnológicos que envolvem os seres humanos.

É importante salientar que há diversas definições para cada um destes termos no meio acadêmico, variável de acordo com a área de estudo ou abordagem.

Segundo Marandola Jr. & Hogan (2004, 2005), os estudos dos “natural hazard” (força matriz oriunda de elementos geofísicos) pode ser considerado uma tradição entre os geógrafos, que desde a década de 1920 tem-se dedicado a este tema.

Estas preocupações, segundo os mesmos autores, manifestaram-se originalmente nos estudos geográficos físicos (geomorfológicos, climatológicos e biogeográficos), demonstrando, portanto um forte componente natural. Ressaltam ainda que os geógrafos possuem uma grande contribuição a partir de uma abordagem integradora, fundamentada na análise da relação sociedade/natureza.

Nas décadas de 1970 e 1980 foram publicados trabalhos que se constituem em importantes obras de referência sobre o tema, como os de Hewit e Burton (1971), White (1974a e 1974b), Burton, Kates e White (1978), Whyte e Burton (1980), Kates, Ausubel e Berberian (1985). No caso dos estudos de percepção associados aos riscos ambientais Anne Whyte exerce papel de destaque. Whyte e Burton (1980) relacionam o conceito de risco com o de probabilidade de consequências adversas para o Homem ou para o seu ambiente.

A partir dos anos 1980, os estudos sobre riscos e vulnerabilidades passam a incorporar fatores sociais e tecnológicos ao lado dos elementos naturais (MARANDOLA JR & HOGAN, 2004).

Gregory (1992) destaca três aspectos relacionados aos estudos sobre os hazards no âmbito da Geografia: 1. A tendência da análise dos eventos extremos, devido à geração de prejuízos e danos; 2. A tendência de realizar a justaposição das investigações do meio físico às da relevância socioeconômica, avaliando o custo em termos de impacto econômico e dos custos ocasionados pelos hazards; e 3. A crescente consciência de que havia diferentes percepções de mundo e, consequentemente, dos problemas, havendo, assim, uma diferença entre a percepção de quem deve tomar as decisões cotidianas (as populações expostas aos hazards) e a percepção dos planejadores, por exemplo.

Marandola Jr. destaca que o uso do termo risco ou perigo “no discurso acadêmico e político se refere à ênfase que se direciona as ações preventivas pré-evento (risco), e o processo de produção e distribuição dos eventos (perigo)” (MARANDOLA JR., 2009:37).

Whyte e Burton (1980) ressaltam que estes riscos estão relacionados com a dinâmica dos elementos da natureza (ar, água, solo, etc.) e causam danos para o ser humano, podendo ser gerados ou potencializados pela tecnologia, ou mesmo pela má gestão dos recursos naturais.

Segundo Tominaga (2009), dois elementos são primordiais na determinação do risco: o perigo de se ter um evento, fenômeno ou atividade humana potencialmente danosa; e a vulnerabilidade, ou seja, o grau de susceptibilidade do elemento exposto ao perigo. Desta forma, considera o Risco (R) como uma função do Perigo (P), da Vulnerabilidade (V) e do Dano Potencial (DP), estabelecendo a seguinte equação: $R = P \times V \times DP$.

A autora considera o perigo como a possibilidade de um fenômeno natural potencialmente danoso ocorrer em um local/tempo. A vulnerabilidade corresponde a um conjunto de condições ligadas há fatores sociais e ambientais, que aumentam a suscetibilidade de um grupo de pessoas ao perigo (TOMINAGA, op.cit.).

Siqueira (apud STEINER NETO, 1998:52) explica o risco a partir dos componentes da perda potencial (componente negativo do risco) sendo eles: (I) magnitude, (II) chance de ocorrência; (III) grau de exposição. Neste contexto, os elementos determinantes da perda numa situação com risco são: impossibilidade de dominar as forças da natureza (condições climáticas, leis da natureza, etc), o comportamento humano (livre arbítrio, ações e atitudes individuais e coletivas, etc) e os recursos limitados (tempo, capital, etc.).

Tominaga (2009) destaca que quando as forças da natureza promovem uma grande perturbação do funcionamento de uma comunidade ou de uma sociedade envolvendo perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais de grande extensão, cujos impactos excedem a capacidade da comunidade ou da sociedade afetada de arcar com seus próprios recursos, passam a se chamar desastres naturais. E os critérios adotados para denominar desastre, segundo o Relatório Estatístico Anual do EM-DAT 2007 (Emergency Disasters Data Base) são: 10 ou mais óbitos; 100 ou mais pessoas afetadas; declaração de estado de emergência; pedido de auxílio internacional.

A ONU vem realizando um conjunto de estratégias para a redução de desastres, com dois grandes marcos - a Década Internacional para Redução de Desastres Naturais (década de 1990); e Quadro de Ações de Hyogo (período de 2005 a 2015) - estimulando o desenvolvimento de projetos de prevenção e redução de acidentes naturais, e fomentando a promoção da resiliência das nações e comunidades frente aos desastres.

O termo vulnerabilidade também possui inúmeras definições. Ganhou força no contexto das políticas públicas com a divulgação do 4º Relatório Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), elencando um conjunto de fatores vinculados às populações ou ao ambiente

onde estas vivem e que podem ou não potencializar o risco a desastres (MARANDOLA JR, 2009).

Considerações Finais

De modo geral, verificou-se que os riscos ambientais atingem de forma mais intensa populações vulneráveis. No caso da região metropolitana de São Paulo - BR, principalmente os movimentos de massa, ocorrem em áreas de fragilidade geoecológica associada à população de baixa renda.

Métodos e técnicas de avaliação e mapeamento de vulnerabilidade e riscos ambientais, utilizadas tanto no Brasil quanto no exterior têm contribuído para diagnosticar e subsidiar as ações dos órgãos responsáveis por essa questão. O zoneamento e a cartografia de riscos pode contribuir para subsidiar o planejamento sócioambiental das áreas mais vulneráveis.

Por mais que os dados referentes à percepção da população gerem “incertezas” na dimensão dos riscos e catástrofes, segundo Natenzon (2002), por outro lado a participação individual e coletiva ao longo do processo de gestão de riscos é fundamental, uma vez que são ou deveriam ser os maiores interessados em prol da própria segurança e qualidade de vida.

Conforme destacou Kuhnen (2009) as medidas de mitigação ou prevenção de riscos devem necessariamente levar em conta a percepção, o conhecimento e a aceitação do risco pela população. Portanto, se a redução da vulnerabilidade é possível, ela não será eficaz se não por apropriada pelos indivíduos ou grupos envolvidos. Esta apropriação passa pela compreensão dos fenômenos, mas também pelas relações no território em questão.

No Japão, por exemplo, país que tem enfrentado diversos fenômenos naturais de alta intensidade, observa-se investimentos em ações preventivas, dentre elas projetos educativos voltados ao ensino fundamental e não formal, e com utilização de recursos cartográficos para estimular a leitura e produção de mapas sociais participativos na identificação de áreas de riscos, planejamento de roteiros de fuga (KATO, 2006) entre outros aspectos. Esses projetos já demonstraram retorno positivo, com o salvamento de vidas no último grande desastre na província de Fukushima.

No Brasil, observa-se que, de forma geral, os órgãos públicos apresentam dificuldades em desenvolver ações efetivas de envolvimento da sociedade no processo de gestão de riscos ambientais. Além disso, existem também lacunas nos trabalhos educativos junto às comunidades em áreas vulneráveis e à população de forma geral na preservação dos riscos ambientais.

Os programas desta natureza são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida ambiental, como também na ampliação da segurança da população que vive em áreas mais suscetíveis aos perigos de ordem natural. Desta forma, estes autores compreendem que a problemática ambiental deve ser entendida como consequência da dinâmica e da estrutura social, na perspectiva do que preconiza, podendo os riscos e perigos ambientais ser considerados como produtos do sistema, intrincados na trama social e fruto da modernização ecológica, da modernidade tardia e de processos de segregação e desigualdades sociais.

Referências

- Renata Cavion. Cidade Sob(re) as Águas: Estratégias de Ação e de Políticas Urbanas. Tese de doutorado. Julho de 2014.
- WHITE, G. F. Natural hazards: local, national, global. New York: Oxford University Press, 1974., 288 p.

- MARANDOLA JR., E. Tangenciando a vulnerabilidade. In: HOGAN, D.J.; MARANDOLA JR., E. (Orgs) População e mudanças climáticas: dimensões humanas das mudanças ambientais globais. Campinas: NEPO/ UNICAMP; Brasília: UNFPA. 2009. 29-52p.
- TOMINAGA, L. K. Análise e mapeamento de risco. In: In: TOMINAGA, L. K. SANTORO, J., AMARAL, R. (Orgs.) Desastres Naturais: Conhecer para prevenir. Instituto Geológico (SMA/SP). 2ª ed. São Paulo: 2012. 149-160p.

ESTUDO DO CONFORTO TÉRMICO EM CONTEXTO INDUSTRIAL: CASO DE INDÚSTRIA VIDREIRA

Mariana Morgado

DEGEI, Universidade de Aveiro
marianafmorgado@ua.pt

Mário Talaia

Departamento de Física, CIDTFF, Universidade de Aveiro
mart@ua.pt

Leonor Teixeira

DEGEI-IEETA, Universidade de Aveiro
lteixeira@ua.pt

RESUMO

O desconforto térmico é uma das maiores causas de insatisfação em postos de trabalho, estando também fortemente associado a acidentes de trabalho. É neste contexto que o presente trabalho se insere, tendo como principal objetivo descrever um estudo de ambiente térmico no contexto de uma empresa da indústria vidreira da Marinha Grande, no sentido de identificar as zonas/postos de trabalho mais suscetíveis a ambientes de *stress* térmico quente, através da aplicação de dois índices térmicos, o *ITH* (índice temperatura-humidade) e o índice *EsConTer*. Para além disso, foram também analisadas as sensações térmicas dos trabalhadores nos postos de trabalho considerados mais críticos através da escala de cores associada ao índice *EsConTer*. Os resultados obtidos deste trabalho permitiram conhecer melhor o ambiente térmico do espaço em estudo, assim como a sensação térmica dos trabalhadores, tendo sido valorizados pelo Departamento de Higiene e Segurança no Trabalho.

Palavras-chave: Indústria, Ambiente térmico quente, Sensação térmica, índice *EsConTer*, índice *ITH*.

Introdução

O estudo do conforto térmico é crucial para a criação de ambientes confortáveis, seguros e mais produtivos. Num contexto industrial, o estudo do conforto térmico tem como objetivo proporcionar uma relação positiva na interação dos colaboradores com o seu ambiente laboral, necessária para uma boa performance (Bluyssen, Aries, & van Dommelen, 2011; Felix, Moura, Pereira, & Tribess, 2010; Pinto, 2009).

O ambiente térmico consiste no conjunto de variáveis termohigrométricas que influenciam direta ou indiretamente o ser humano e o seu comportamento. O conforto térmico é, segundo Emmanuel (2005), uma reação complexa a um conjunto de variáveis ambientais, podendo ser definida como a satisfação de um indivíduo quando exposto a um determinado ambiente térmico (ASHRAE, 2001; ASHRAE 55, 2004; Chow *et al.*, 2010).

A sensação térmica do ser humano está relacionada com o balanço térmico do corpo humano, devendo o calor produzido pelo metabolismo ser igual ao calor dissipado pelo corpo. Neste sentido, cada indivíduo assume necessidades diferentes de conforto térmico (Leal & Neves, 2013), as quais dependem das variáveis ambientais mencionadas anteriormente e de fatores pessoais que condicionam a sua resposta ao ambiente circundante, como por exemplo, físicos, psicológicos, fisiológicos, culturais, idade, altura, género e hábitos alimentares.

Contudo, de acordo com Liu *et al.* (2012) e Yao *et al.* (2009), os indivíduos ajustam-se aos estímulos ambientais de forma a manter e melhorar o seu bem-estar, tanto a nível psicológico, como fisiológico e comportamental. O desconforto térmico é uma das maiores causas de insatisfação em postos de trabalho (Huizenga, Abbaszadeh, Zagreus, & Arens, 2006)

O presente trabalho descreve um estudo de ambiente térmico no contexto de uma empresa da indústria vidreira durante a primavera, tendo como principal objetivo perceber e identificar as zonas/postos de trabalho mais suscetíveis a ambientes de *stress* térmico quente, bem como perceber as sensações térmicas dos trabalhadores afetos a esses ambientes térmicos, no sentido de desenvolver medidas corretivas sob o ambiente térmico que melhor satisfação ofereçam aos ocupantes do espaço industrial.

Metodologia

A metodologia aplicada no estudo descrito encontra-se dividida em dois subcapítulos, (i) identificação das zonas suscetíveis a ambiente térmico quente e (ii) avaliação da sensação térmica dos trabalhadores.

Para a identificação das zonas mais vulneráveis foi analisado o *layout* da empresa e traçada uma rota na área de produção da empresa. A rota escolhida é composta por um conjunto de pontos de observação e de recolha de dados, no interior e exterior da área a estudar. A recolha dos dados foi efetuada durante dois períodos do dia, de manhã e à tarde, de forma a compreender a influência do ciclo diurno da radiação solar no ambiente térmico interior do espaço em estudo. Em cada período foram percorridos dois circuitos com sentidos opostos. A pertinência da execução destes dois circuitos reside na tentativa de comprovar se o ambiente térmico da nave industrial dependia, ou não, da opção do circuito. Em todas as zonas de recolha de dados foi utilizado o aparelho de medida ‘Center 317 - temperature humidity meter’ e foram recolhidos valores de temperatura do ar e humidade relativa do ar.

Após a recolha dos dados, aplicaram-se dois índices térmicos, o *ITH* (Nieuwolt, 1977) e o *EsConTer* (Talaia & Simões, 2009), gerados através de algoritmos desenvolvidos em *Matlab*, apresentando gráficos de cores que permitiram identificar as regiões de trabalho mais críticas, tendo em conta os dados recolhidos nas zonas de observação. A interpretação dos dados dos dois índices foi efetuada de acordo com Teixeira *et al.* (2014).

Foram também recolhidos e analisados dados sobre as sensações térmicas dos trabalhadores que ocupavam os postos de trabalho identificados como os mais críticos. Assim, nos postos de trabalho selecionados foram recolhidos valores de temperatura do ar e humidade relativa do ar durante em dois períodos do dia, manhã e tarde. Cada período do dia foi analisado em dois momentos, no período da manhã às 10h00 e 12h00 e no período da tarde às 15h00 e às 17h00. Ao mesmo tempo que foram efetuadas as medições foram questionados os trabalhadores, afetos aos postos de trabalho em estudo, com a escala de cores utilizada no índice *EsConTer* baseada na escala sétima de sensação térmica de ASHRAE (Teixeira *et al.*, 2014). Para responder a este questionário, os trabalhadores apenas tinham que assinalar com uma cruz (X), o local que melhor correspondia à sua sensação térmica aquando da inquirição. A partir desses valores foram desenvolvidos gráficos que permitiram comparar a resposta real dos trabalhadores com a sensação prevista dos trabalhadores (dada através do índice *EsConTer*).

Resultados e Discussão

A Figura 1 representa um exemplo (dia 10 de Abril de 2014) dos mapas de cores gerados pelos algoritmos criados em *Matlab* segundo o índice *ITH* (esquerda) e o índice *EsConTer* (direita). Estes mapas mostram o padrão térmico do espaço em questão através das suas cores. A partir destes gráficos a mesma informação pode ser recolhida visto que os dois índices mostraram ser bastante concordantes, apresentando um coeficiente de correlação de 0,9954.

Figura 1. Zonas mais suscetíveis a ambiente térmico quente e postos de trabalho mais críticos de acordo com o índice *ITH* (°C) e *EsConTer*

A região de *ITH* de cerca de 28°C ou *EsConTer* cerca de 1,8 refere-se à zona termicamente mais crítica do espaço em estudo e corresponde ao forno. Alguns postos de trabalho estão localizados nesta área. Conforme se observa na Figura 1 os postos de trabalho considerados mais críticos dizem respeito aos círculos pretos numerados de 1 a 7. Os valores registados estão na gama de valores de 21°C a 24°C para o índice *ITH* e na gama de 0,4 a 1,0 para o índice *EsConTer*.

Nestes postos de trabalho os trabalhadores foram inquiridos. A Figura 2 mostra a sensação térmica dos trabalhadores no período da manhã (gráfico à esquerda) e no período da tarde (gráfico à direita). Estes gráficos dizem respeito a um dia de medições escolhido aleatoriamente, o dia 9 de Maio de 2014. Apenas para esta análise serão utilizados valores associados ao índice *EsConTer*, uma vez que este e o índice *ITH* apresentam uma forte concordância, e por isso sugerem os mesmos resultados.

A Figura 2, que representa *EsConTer* interior, mostra que o ambiente térmico interior do espaço se tornou ligeiramente mais quente no período da tarde, quando comparado com o período da manhã. No que diz respeito ao ambiente externo, representado pelo *EsConTer* exterior, esta variação também se verifica.

Figura 2. Sensação térmica dos trabalhadores no turno da manhã e no turno da tarde

Os valores de sensação térmica dos trabalhadores mostraram-se concordantes com o ambiente térmico devido à proximidade de valores previstos para o *EsConTer* interior. No entanto, tal como previsto alguns trabalhadores apresentaram valores mais discrepantes associados à

subjetividade da sensação térmica, como são exemplo, o trabalhador OP_12 na primeira avaliação (10h00), o trabalhador OP_13, no momento de avaliação das 12h00 e o trabalhador OP_18 no turno da tarde.

Conclusão

A partir das ferramentas de estudo utilizadas foi possível compreender o padrão térmico do espaço industrial em estudo, assim como a sensação térmica dos trabalhadores. Os mapas desenvolvidos em *Matlab* mostraram ser uma ferramenta bastante intuitiva no que diz respeito à compreensão do padrão térmico do espaço. Os dois índices utilizados mostraram-se concordantes, analisando de forma muito semelhante o espaço em estudo. O índice *EsConTer*, revelou-se mais uma vez um índice muito interessante, devido à associação dos seus resultados a uma escala de cores e à escala sétima de sensação térmica de ASHRAE e, como tal, eficaz na tradução do padrão térmico do espaço devido à concordância com o índice *ITH* e com a sensação térmica real dos trabalhadores. De relevar também que os resultados deste estudo foram valorizados pelo Departamento de Higiene e Segurança no Trabalho da empresa estudada, no sentido de serem desenvolvidas medidas corretivas que melhorem a satisfação os trabalhadores.

Bibliografia

- ASHRAE. (2001). Thermal Comfort. In American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (2001 ASHRA.). Colorado 80112-5776 USA: Englewood.
- ASHRAE 55. (2004). Thermal environmental conditions for human occupancy. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.
- Bluyssen, P. M., Aries, M., & van Dommelen, P. (2011). Comfort of workers in office buildings: The European HOPE project. *Building and Environment*, 46(1), 280-288. doi:10.1016/j.buildenv.2010.07.024
- Chow, T. T., Fong, K. F., Givoni, B., Lin, Z., & Chan, a. L. S. (2010). Thermal sensation of Hong Kong people with increased air speed, temperature and humidity in air-conditioned environment. *Building and Environment*, 45(10), 2177-2183. doi:10.1016/j.buildenv.2010.03.016
- Emmanuel, R. (2005). Thermal comfort implications of urbanization in a warm-humid city: the Colombo Metropolitan Region (CMR), Sri Lanka. *Building and Environment*, 40, 1591-1601. doi:10.1016/j.buildenv.2004.12.004
- Felix, V. B., Moura, D., Pereira, M. L., & Tribess, A. (2010). Evaluation of thermal comfort in surgical environments using Fanger's method and equivalent temperatures. *Ambiente Construído*, 10, 69-78.
- Huizenga, C., Abbaszadeh, S., Zagreus, L., & Arens, E. (2006). Air Quality and Thermal Comfort in Office Buildings : Results of a Large Indoor Environmental Quality Survey. In *Proceedings of Healthy Buildings* (pp. 393-397). Lisbon.
- Leal, A., & Neves, M. (2013). Study of Thermal Hot Environments: Contribution to a Technical Assessment. In *Sho'13- International Symposium on Occupational Safety and Hygiene* (pp. 187-188). Guimarães, Portugal.
- Liu, J., Yao, R., Wang, J., & Li, B. (2012). Occupants' behavioural adaptation in workplaces with non-central heating and cooling systems. *Applied Thermal Engineering*, 35, 40-54. doi:10.1016/j.applthermaleng.2011.09.037
- Nieuwolt, S. (1977). *Tropical climatology*. London.
- Pinto, A. M. P. (2009). Análise ergonómica dos postos de trabalho com equipamentos dotados de visor em centros de saúde da administração regional de saúde do centro. Universidade de Coimbra.

- Talaia, M., & Simões, H. (2009). Índices PMV e PPD na Definição da “performance” de um Ambiente. In Livro de atas do V Encontro Nacional de Riscos e I Congresso Internacional de Riscos. Coimbra, Portugal.
- Teixeira, L., Talaia, M., & Morgado, M. (2014). Evaluation of indoor thermal environment of manufacturing industry. In M. P. Azeres, J. Baptista, M. Barroso, P. Carneiro, P. Cordeiro, N. Costa, G. Perestrelo (Eds.), *Occupational Safety and Hygiene II* (pp. 553-558). London, UK: CRC Press Taylor & Francis group.
- Yao, R., Li, B., & Liu, J. (2009). A theoretical adaptive model of thermal comfort - Adaptive Predicted Mean Vote (aPMV). *Building and Environment*, 44(10), 2089-2096. doi:10.1016/j.buildenv.2009.02.014

MAPEAMENTO DA PROBABILIDADE DE CONTAMINAÇÃO EM ARSÉNIO NUMA ÁREA MINEIRA ABANDONADA (CENTRO DE PORTUGAL), USANDO A KRIGAGEM DA INDICATRIZ

Margarida Antunes

Instituto Politécnico de Castelo Branco, CIGAR, Portugal
imantunes@ipcb.pt

Teresa Albuquerque

Instituto Politécnico de Castelo Branco, CIGAR, Portugal
teresal@ipcb.pt

RESUMO

A região de Segura é uma área mineira abandonada com os seus rejeitados expostos ao longo dos últimos 50 anos. Na avaliação do risco de contaminação em arsénio nas águas, utilizou-se uma metodologia geoestatística não paramétrica - krigagem da indicatriz - selecionando dois valores de corte. O primeiro correspondendo ao 3º quartil da distribuição ($KI1=0,05\text{mg/L}$ -valor de referência) representa a vulnerabilidade específica. Para o segundo valor de corte, foi considerado o teor de fundo coincidente com o 1º quartil da distribuição e representando a vulnerabilidade intrínseca ($KI2$ =valor de fundo). Os mapas de iso-probabilidades mostram fortes anomalias associadas às atividades mineiras. Junto da povoação de Segura, a probabilidade do teor em As exceder o valor de referência, é elevada embora menor do que a probabilidade em ultrapassar o valor de fundo. As anomalias de As revelam uma elevada probabilidade das águas se encontrarem contaminadas não devendo ser utilizadas para consumo humano.

Palavras-chave: minas de sulfuretos, água, arsénio, krigagem da indicatriz

Introdução

A indústria mineira constituiu uma das mais importantes atividades económicas em Portugal ao longo de várias décadas. Atualmente, a maioria das explorações mineiras encontra-se abandonada, sem qualquer plano de recuperação ambiental implementado. Estas minas localizam-se frequentemente em zonas rurais e, por vezes, as águas são utilizadas na agricultura ou consumo humano, sem qualquer avaliação de potenciais riscos ambientais e para a saúde humana (e.g. Antunes *et al.*, 2002; Carvalho *et al.*, 2009; Gomes *et al.*, 2010).

As concentrações elevadas de arsénio (As) nas águas superficiais estão associadas a mineralizações em sulfuretos (e.g. Antunes *et al.*, 2002; Lee *et al.*, 2007; Carvalho *et al.*, 2009) sendo extremamente tóxicas. A contaminação em As tende a estar confinada no espaço e os teores de As podem atingir valores milhões de vezes mais elevados do que o background natural (Smedley e Kinniburgh, 2002).

A caracterização geoquímica de uma água revela heterogeneidades nem sempre fáceis de identificar devido ao reduzido número de amostras (espaço) e à sua representatividade (tempo). Para a representação espacial e temporal recorreu-se à aplicação de metodologias estocásticas, tendo como referência valores limite previamente definidos. A krigagem da indicatriz é uma metodologia geoestatística, não paramétrica, com resultados bastante interessantes, quando se pretende construir uma cartografia da probabilidade de ocorrência de um determinado valor, acima de um limite de corte previamente definido (e.g. Liu *et al.*, 2007; Lee *et al.*, 2008; Ungaro *et al.*, 2008; Hassan e Atkins, 2011; Antunes e Albuquerque, 2013).

A representação espacial e temporal da probabilidade de ocorrência de As, nas águas estudadas, possibilitou um melhor conhecimento da sua mobilidade e dispersão na área em estudo e uma avaliação do risco associado de uma forma probabilística.

Área de Estudo e metodologia

Na região de Segura, localizada 60 km a este de Castelo Branco (Centro de Portugal), ocorrem diversos filões de quartzo mineralizados, nos quais foram extraídas cerca de 100 toneladas de cassiterite (Sn), 12 toneladas de volframite (W), 525 toneladas de barite (Ba) e 211 toneladas de galena (Pb). As explorações mineiras de Sn-W e Ba-Pb-Zn decorreram entre 1942-1953 e desde este período, a área não foi intervencionada (Antunes *et al.*, 2002). A arsenopirite é um dos sulfuretos presente na paragénesis mineralógica da região de Segura, cuja oxidação e dissolução, a partir dos detritos mineiros sem qualquer proteção, promove a libertação de As e a sua dispersão nas águas da região. A área em estudo, com aproximadamente 22 km², inclui a povoação de Segura (Fig. 1), onde a agricultura constitui a principal atividade exigindo uma grande quantidade de água para irrigação. Localmente, a água pode ser utilizada para consumo humano.

Dezasseis pontos de água foram selecionados, correspondendo uma das amostras ao fundo geoquímico local e, desta forma, recolhida fora da influência mineira (Fig. 1; ponto de água 1). As restantes quinze amostras foram recolhidas a jusante das minas, recebendo, assim, a sua influência. Estes pontos de água foram amostrados duas vezes durante o ano de 1996 (outubro e dezembro).

Figura 1. Mapas de iso-probabilidade do teor de As nas águas exceder KI1 (0,05 mg/L):

a. outubro 1996; b. dezembro 1996 (adaptado de Antunes e Albuquerque, 2013).

Pontos de amostragem de água (●); - minas abandonadas.

Na avaliação da potencial contaminação em As nas águas da região de Segura foram construídas duas variáveis indicatriz (binárias). Para primeira (KI1) considerou-se como valor de corte, para os dois meses em análise, o terceiro quartil da distribuição dos teores em As nas águas de Segura (KI=0,05mg/L para os dois meses). A probabilidade pontual de exceder este valor não depende apenas das características geológicas e hidrológicas da área de estudo, mas também das atividades antrópicas; pelo que representa a vulnerabilidade específica ou extrínseca. Para segunda variável indicatriz considerou-se o valor de fundo ou background, do teor de As na água, nos meses de outubro e dezembro. Os valores, obtidos, no ponto 1, apresentam valores muito próximos (KI2 = 0,004mg/L) e, desta forma, foi utilizado o mesmo limite de corte para ambos os meses. É razoável assumir que este limite representa a vulnerabilidade intrínseca,

pois o teor de fundo depende das características geológicas e hidrogeológicas da área. No estudo da contaminação em As, associada às atividades mineiras abandonadas, é importante a avaliação da vulnerabilidade intrínseca e específica da região, de modo a quantificar o impacto das atividades antropogênicas, tanto no espaço como ao longo do tempo (Albuquerque e Antunes, 2010; Antunes e Albuquerque, 2013).

Resultados

Nas figuras 1 e 2 são apresentados os mapas de iso-probabilidade obtidos através da krigagem das variáveis indicatriz, anteriormente definidas, nas colheitas de outubro e dezembro 1996, respetivamente. O mapa de iso-probabilidade, correspondente a KI1, obtido para outubro de 1996, mostra uma forte anomalia, localizada a norte da área em estudo, na influência das minas abandonadas (Fig.2a). Para a colheita do mês de outubro 1996, o mapa de iso-probabilidade, para a variável KI2, é semelhante ao mapa de iso-probabilidade obtido para a variável KI1, com forte anomalia a norte da área em estudo (Fig. 1a e 2a). Junto da povoação de Segura, a probabilidade da concentração em As na água ultrapassar o valor de referência é elevada, embora menor do que a probabilidade em exceder o teor de fundo.

Figura 2. Mapas de iso-probabilidade do teor de As nas águas exceder KI2 (0,004 mg/L):

a. outubro 1996; b. dezembro 1996 (adaptado de Antunes e Albuquerque, 2013).

Pontos de amostragem de água (●); - minas abandonadas.

Na colheita realizada em dezembro de 1996, duas fortes anomalias foram identificadas. Uma delas localizada a norte da área de estudo e coincidente com a já observada em outubro 1996. A segunda anomalia observada para o mês de dezembro localiza-se próximo da povoação de Segura (Fig.1b). Estas anomalias indicam uma elevada probabilidade de as águas estarem contaminadas em As, não devendo ser utilizadas para consumo humano (Antunes e Albuquerque, 2013).

A maioria das anomalias em As encontradas nas águas da região de Segura estão associadas com as estruturas mineralizadas e atividades mineiras abandonadas. Contudo, a irregular distribuição da probabilidade de teores elevados de As nas águas pode ser justificada pela presença de arsenopirite nestes filões mineralizados (Antunes e Albuquerque, 2013). Na comparação dos mapas de iso-probabilidades para as duas variáveis indicatriz construídas, KI1 e KI2, verifica-se um diferente padrão espacial (Fig. 1 e 2). A probabilidade do teor em As nas águas, exceder o valor de corte, é elevada, particularmente no mês de dezembro de 1996. No entanto, a probabilidade de exceder o valor de fundo é mais elevada. Na parte SW da área em estudo, a probabilidade do teor de As na água ultrapassar o valor de corte (KI1) é menor, bem como, o teor de fundo (KI2) (Fig. 1 e 2).

Conclusões

O arsénio é um elemento comumente associado às mineralizações de sulfuretos metálicos sendo tóxico mesmo em baixas concentrações. Na região de Segura, o teor mais elevado de As encontrado em dezembro 1996 está associado à diluição de oxi-hidróxidos de Fe, que retêm metais tóxicos (Antunes e Albuquerque, 2013). O risco de contaminação em As nas águas associadas a atividades mineiras abandonadas pode ser avaliado através da probabilidade destas excederem um teor de corte específico (KI1-valor de corte) e essencialmente representativo da presença de atividade antrópicas na região, bem como, a definição da sua vulnerabilidade intrínseca, ligada às características geológicas e hidrogeológicas da região (KI2 - teor de fundo). Durante o mês de outubro e dezembro 1996, os mapas de iso-probabilidades mostram fortes anomalias na influência direta das atividades mineiras abandonadas da região (Antunes e Albuquerque, 2013). Nas águas da região de Segura, a probabilidade do teor de As exceder o valor de referência é elevada, embora menor do que a probabilidade em exceder o seu teor de fundo ou background. No entanto, as anomalias nos teores de As sugerem uma elevada probabilidade de contaminação, pelo que estas águas não devem ser utilizadas para consumo humano.

Agradecimentos

Um agradecimento particular à Professora Doutora Ana Neiva pelas facilidades na utilização do laboratório químico do DCT da Terra da Universidade de Coimbra, Portugal. Este trabalho foi realizado no âmbito do CIGAR - Centro de Investigação em Geo-Ambientes e Recursos.

Biobliografia

- Albuquerque, M.T.D., Antunes, I.M.H.R. (2010) - Probability mapping of arsenic vulnerabilities — risk assessment, a Portuguese study case. *Book of IAMG — International Association for Mathematical Geology*, Hungary, Budapest.
- Antunes, I.M.H.R., Neiva, A.M.R., Silva, M.M.V.G. (2002) - The mineralized veins and the impact of old mine workings on the environment at Segura, central Portugal. *Chem. Geol.*, vol. 190, 417-31.
- Antunes, I.M.H.R., Albuquerque, M.T.D. (2013) - Using indicator kriging for the evaluation of arsenic potential contamination in an abandoned mining area (Portugal). *Sci. Total Environm.*, vol. 442, 545-552.
- Carvalho, P.C.S., Neiva, A.M.R., Silva, M.M.V.G. (2009) - Geochemistry of soils, stream sediments and waters close to abandoned W-Au-Sb mines at Sarzedas, Castelo Branco, central Portugal. *Geochem. Explor. Environ. Anal.*, vol. 9, 341-352.
- Gomes, M.E.P., Antunes, I.M.H.R., Silva, P.B., Neiva, A.M.R., Pacheco, F.A.L. (2010) - Geochemistry of waters associated with the old mine workings at Fonte Santa (NE of Portugal). *J. Geochem. Explor.*, vol. 105 (3), 153-165.
- Hassan, M.M., Atkins, P.J. (2011) - Application of geostatistics with indicator kriging for analysing spatial variability of groundwater arsenic concentrations in Southwest Bangladesh. *J. Environ. Sci. Health.*, vol. 46 (11), 1185-1196.
- Lee, J.J., Jang, C.S., Wang, S.W., Liu, C.W. (2007) - Evaluation of potential health risk of arsenic-affected groundwater using indicator kriging and dose response model. *Sci. Total Environ.*, vol. 384, 151-162.
- Lee, J.J., Liu, C.W., Jang, C.S., Liang, C.P. (2008) - Zonal management of multi-purpose use of water from arsenic-affected aquifers by using a multi-variable indicator kriging approach. *J. Hydrol.*, vol. 359 (3-4), 260-273.

- Liu, J.C.S., Lu, C.W., Lin, K.L. (2007) - Delimitation of arsenic-contaminated groundwater using risk-based indicator approaches around blackfoot disease hyperendemic areas of southern Taiwan. *Environ. Monit. Assess.*, vol. 134 (1-3), 293-304.
- Smedley, P.L., Kinniburgh, D.G. (2002) - A review of the source, behaviour and distribution of arsenic in natural waters. *Appl. Geochem.*, vol. 17, 517-568.
- Ungaro, F., Ragazzi, F., Cappellin, R., Giandon, P. (2008) - Arsenic concentration in the soils of the Brenta Plain (Northern Italy): mapping the probability of exceeding contamination thresholds. *J. Geochem. Explor.*, vol. 96 (2-3), 117-131.

NITRATOS NOS SOLOS E ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - PERSPETIVA SOBRE A ATUALIDADE, TENDÊNCIAS, IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE AMBIENTAL E ABORDAGENS DE REDUÇÃO DE RISCOS

Rui Araújo

Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto
demso9000758@fe.up.pt

Ana Meira Castro

Departamento de Matemática do Instituto Superior de Engenharia do Porto
ana.meira.castro@eu.ipp.pt

António Fiúza

Faculdade de Engenharia, Universidade do Porto
afiúza@fe.up.pt

SUMÁRIO

As práticas agrícolas contemporâneas encontram-se entre as principais fontes antropogénicas de nitrato. Concentrações elevadas de nitratos nos solos e lençóis de água provocam efeitos prejudiciais na saúde humana e criam desequilíbrios substantivos em diversos ecossistemas. De entre diversas abordagens de prevenção e controlo de poluição, as tecnologias de remediação apresentam uma relevância crescente, das quais se destaca as barreiras reativas permeáveis. O presente trabalho visa, no contexto das alterações introduzidas pelo crescimento sistemático das concentrações de nitrato em diversos ecossistemas, aquilatar os méritos e limitações relativas das barreiras reativas permeáveis e perspetivar possíveis vias de melhoria do desempenho. Para este efeito, foi conduzida uma pesquisa sistemática em diversas bases-de-dados segundo quatro etapas para identificar literatura relevante. É possível concluir que as barreiras reativas permeáveis constituem-se atualmente como uma tecnologia eficaz de desnitrificação, contudo não foram constatadas evidências da utilização de nanotecnologias para potenciar o desempenho nestes processos de desnitrificação.

Palavras-chave: Nitratos, Barreira reativa permeável, saúde ambiental, prevenção e controlo da poluição, nanotecnologia.

Introdução

O azoto é uma substância essencial para a vida, sendo um elemento constituinte de aminoácidos e outras macromoléculas. Comparativamente com outros elementos essenciais para a vida, como o oxigénio, carbono, fósforo e o enxofre, o azoto é o elemento mais abundante da superfície terrestre, contudo é o menos bio-disponível. A utilização crescente de fertilizantes sintéticos, desde o século XIX, e as práticas intensivas de pecuária têm levado à ocorrência de concentrações excessivas de nitratos, assim como de outras espécies de azoto reativo, em solos e águas subterrâneas em diversas regiões do mundo. Atualmente, o nitrato é considerado o contaminante mais ubíquo em águas subterrâneas à escala planetária (Robertson, 2008), sendo os escoamentos de origem agrícola uma das suas principais causas (Liu, 2013). Os efeitos prejudiciais para o ambiente e os riscos para a saúde humana resultantes de elevadas concentrações de nitratos no solo e águas subterrâneas são atualmente considerados o tema ambiental mais relevante após as emissões de dióxido de carbono. Projeções efetuadas para as próximas décadas deixam antever o acentuar dos atuais efeitos resultantes de elevadas concentrações de nitrato e outras espécies de azoto reativo na biosfera; a utilização de fertilizantes sintéticos e as práticas pecuárias aportam contribuições significativas para essa realidade (Bouwman, 2013).

O objetivo do presente trabalho é, a partir de uma perspectiva global sobre as implicações para a saúde humana e impacto ambiental decorrentes de elevadas concentrações de nitrato no solo e águas subterrâneas, aquilatar a relevância das tecnologias de remediação num contexto mais amplo da abordagens de prevenção e controlo da poluição causada por nitrato e, para estas tecnologias de remediação, saber quais os respetivos méritos e constrangimentos relativos, muito em particular para as barreiras reativas permeáveis. Para estas últimas pretende-se ainda perspetivar eventuais oportunidades de melhoria de eficácia para processos de remediação de nitrato.

Metodologia

Para efeito de concretização do objetivo do presente estudo, foram empregues 34 bases-dados para conduzir uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica foi efetuada segundo uma abordagem metodológica estruturada em 4 etapas principais. Na primeira etapa foi utilizado um primeiro conjunto de palavras-chave para a identificação de publicações para análise posterior. Na segunda etapa, e para o mesmo propósito, utilizaram-se sinónimos do primeiro conjunto de palavras-chave. Estas duas etapas iniciais permitiram compilar um conjunto relevante de bibliografia. A Terceira etapa consistiu em pesquisa adicional das bases-dados, desta vez recorrendo a outras palavras-chave obtidas a partir do primeiro conjunto de elementos bibliográficos selecionados. Na quarta e última etapa, recorreu-se à bibliografia indicada nos artigos selecionados para identificar outras referências bibliográficas relevantes. O conjunto de documentos compilados por este processo foi utilizado para o objetivo deste trabalho.

Resultados

Efeitos sobre a saúde humana

No que respeita os efeitos adversos na saúde humana decorrentes da ingestão ou absorção cutânea de nitrato, é consensual a possibilidade do nitrato reagir com aminas e outros compostos contendo azoto, originando nitrosaminas, elementos cancerígenos (Doyle, 1997; Huang, 1998). A ocorrência de nitrato em água para consumo humano constitui uma ameaça para crianças com menos de 6 meses de idade. Uma vez ingerida a água com nitrato, este é reduzido a nitrito (NO_2^-), que por sua vez combinado com a hemoglobina origina metahemoglobina, restringido o transporte de oxigénio no corpo, e causando metahemoglobinemia, condição também designada por “doença do bebé azul” (Kapoor, 1997). O Centro de Clínicas Mayo no Minnesota conduziu pesquisa que demonstrou a correlação entre a ingestão de água doméstica contendo elevadas concentrações de nitrato e uma maior incidência de carcinomas, nomeadamente da tiroide (Ward, 2010), bexiga, estômago e dos ovários (Van Leeuwen, 1999).

Efeitos ambientais

Os impactes ambientais prejudiciais originados pelo azoto reativo englobam a acidificação de solos e águas superficiais, a eutrofização e a ocorrência de áreas hipóxicas associadas (Hoek, 1997; Horswill, 2008; Long, 2011; Sliggers, 2004), assim como, mudanças na composição e diversidade do biota dos solos (Bradley, 2006; Cairney, 1999), frequentemente conduzindo à perda de biodiversidade e à diminuição da saúde de ecossistemas (Galloway, 2003). Efeitos adversos à escala global incluem o aumento da concentração com gases de efeito de estufa

(Fowler, 2013; Sliggers, 2004; Zhang, 2011) a depleção da camada de ozono, como resultado das emissões de óxido nitroso (Fowler, 2013; Long, 2011; Zou, 2010) e a inibição da oxidação do metano na atmosfera por nitrato (Mochizuki, 2012).

Abordagens para o controlo da concentração de nitrato no solo e lençóis de água

Atendendo aos efeitos do nitrato na saúde humana e ambiente, a Comunidade Europeia produziu a Diretiva n.º 91/676/CEE que fixou em 50mg/l a concentração limite a partir da qual as águas são consideradas poluídas ou em risco de o virem a ser. Também a Organização Mundial de Saúde (OMS) indica 50mg/l como limiar máximo para a concentração de nitrato na água para ingestão. Contudo, para este efeito, a OMS refere também como concentração limite de nitrito na água 3mg/l, uma outra espécie de azoto reativo. Deste modo, quando ambos nitrato e nitrito ocorrem simultaneamente na água, a soma das proporções da concentração destes compostos face aos respetivos valores limite não deve ultrapassar a unidade.

A Diretiva n.º 91/676/CEE estabelece como ações de controlo de concentrações elevadas de nitrato nos lençóis de água a implementação de um código de boas práticas agrícolas, a imposição de regras relativas aos processos de fertilização dos solos e armazenamento de estrume animal. A Declaração de Nanjing sobre a gestão do azoto reativo, para as práticas agrícolas, propõe o incremento da eficácia e eficiência da produção agrícola, enquanto se reduz os efeitos negativos do azoto reativo, e o aumento da disponibilidade do azoto reativo para a produção de alimentos, fibras entre outros em áreas geográficas com insuficiência de azoto, evitando a sua poluição. A este título, Galloway (2008) refere que o aumento da eficiência das plantações na absorção de azoto e a melhoria das estratégias de gestão animal se traduzem, para cada uma, numa redução de 15 Tg N a⁻¹, tendo por base as 187 Tg N a⁻¹ produzidas em 2005.

Medidas adicionais de controlo da poluição causada por nitrato envolvem o recurso a remediação do nitrato no solo e lençóis de águas. Tecnologias como a osmose inversa, troca iónica e eletrodialise têm um historial relevante e bem sucedido, contudo apresentam algumas desvantagem, nomeadamente, não resolvem integralmente o problema decorrente das concentrações elevadas de nitrato, geram efluentes ricos em nitratos - difíceis de descarte adequado, apresentam um nível de complexidade tal que dificulta a sua aplicação *in situ*, além de que apresentam custos de operação relativamente elevados (Barrabés, 2011, Rocca, 2007). A hidrogenação catalítica de nitratos é também uma tecnologia promissora, no entanto, a formação de amónio é um obstáculo ainda a ultrapassar (Barrabés, 2011).

Barreiras Reativas Permeáveis

As abordagens mais relevantes para reduzir a concentração de nitrato em água subterrânea são processos de desnitrificação (Bednarek, 2014, Gibert, 2008). Como o nitrato se difunde facilmente para ambientes subsuperficiais, e uma vez aí demonstra ter uma elevada mobilidade nos solos (Moon, 2004), a aplicação de processos de desnitrificação deve ocorrer tão perto da fonte de poluição quanto possível, de modo a limitar os diversos impactes adversos à medida que espécies de azoto reativo se deslocam para jusante nos lençóis de água (Galloway, 2003). A tecnologia das Barreiras Reativas Permeáveis (BRP) é um sistema passivo *in situ* muito eficaz (Liu, 2013), que possibilita a obtenção do gás azoto a partir de nitrato por intermédio de processos biológicos, (Bednarek, 2010; Schmidt, 2012). A aplicação das BRP é relativamente recente, apresentando aproximadamente 20 anos de existência. As BRP constituídas por fontes

de carbono orgânico têm demonstrado eficácia na remoção de azoto a custos controlados. Estas estruturas de remediação apresentam ainda a vantagem de serem flexíveis na sua construção, têm um impacto visual mínimo e geralmente longo período de vida útil, ainda que dependente da quantidade de carbono orgânico disponível. Como limitações das BRP refere-se que diferentes fontes de carbono apresentam diferentes eficácias de remediação de nitrato, a eficácia de determinada aplicação de BRP depende das condições hidrológicas locais, níveis freáticos mais baixas favorecem a remediação biótica de nitratos, a redução de nitratos está também dependente de fatores como a temperatura e o oxigénio dissolvido (Bednarek, 2014). A necessidade de um adequado controlo da biomassa pode também constituir-se uma dificuldade (Rocca, 2007). Trabalhos laboratoriais têm empregue processos de desnitrificação associados ao uso de ferro zero valente para o controlo de variáveis biogeoquímicas (Liu, 2013). Falta contudo elucidar qual o impacto na eficácia do desempenho das BRP quando processos de desnitrificação são conjugadas com nanotecnologias.

Conclusões

As práticas agrícolas contemporâneas, além dos benefícios aportados na provisão de alimentos para uma população mundial em expansão, tem, entre outros efeitos, contribuído para alterações relevantes do ciclo do azoto, em grande medida por via do nitrato. Concentrações elevadas de nitrato nos solos e lençóis de água são reconhecidos como uma ameaça para a saúde humana e o equilíbrio ambiental. De entre as várias medidas de prevenção e controlo da poluição causada por nitrato, atendendo às dinâmicas em curso na utilização de fertilizantes e práticas pecuárias, haverá nas próximas décadas um acentuar da dependência da humanidade de tecnologias de remediação de nitrato. A tecnologia das BRP tem demonstrado eficácia no controlo de risco para a saúde ambiental resultante de concentrações elevadas de nitrato no solo e águas subterrâneas. No contexto atual e para o futuro que se perspetiva, o aumento da eficácia da tecnologia das BRP parece ser uma necessidade. A conjugação de nanotechnologias com processos de desnitrificação poderá eventualmente aportar uma eficácia acrescida às BRP.

Bibliografia:

- Barrabés, N., J. Sá, Catalytic nitrate removal from water, past, present and future perspectives. *Applied Catalysis B: Environmental*, 2011, (104), 1- 5.
- Bednarek, A., S. Szklarek, M., Zalewski, M., Nitrogen pollution removal from areas of intensive farming—comparison of various denitrification biotechnologies. *Ecohydrology & Hydrobiology*, 2014, (14), 132-141.
- Bednarek, A., Stolarska, M., Ubraniak, M., Zalewski, M. Application of permeable reactive barrier for reduction of nitrogen load in the agricultural areas - preliminary results. *Ecohydrology & Hydrobiology*, 2010, (2-4), 355-362.
- Bradley, K., Rhae A. Drijber, J. Knops, Increased N availability in grassland soils modifies their microbial communities and decreases the abundance of arbuscular mycorrhizal fungi. *Soil Biology & Biochemistry*, 2006, (38), 1583-1595.
- Bouwman, L., K.K. Goldewijk, K.W. Van Der Hoek, A.H. W. Beusen, D.P. Van Vuuren, J. Willems, M.C. Rufino, E. Stehfest, Exploring global changes in nitrogen and phosphorus cycles in agriculture induced by livestock production over the 1900-2050 period. *PNAS*, 2013, 110(52), 20882-20887.
- Cairney, J. W. G., A.A. Meharg, Influences of anthropogenic pollution on mycorrhizal fungal communities. *Environmental Pollution*, 1999, (106), 169-182.

- Doyle, M. P., Beuchat, L.R., Montville, T.J., Food Microbiology Fundamentals and Frontiers. Edtion ed. Washington, DC: ASM Press, 1997.
- Fowler, D., M. Coyle, U. Skiba, M.A. Sutton, J. N. Cape, S. Reis, L.J. Sheppard, A. Jenkins, B. Grizzetti, J.N. Galloway, P. Vitousek, A. Leach, A.F. Bouwman, K. Butterbach-Bahl, F. Dentener, D. Stevenson, M. Amann, M. Voss, The global nitrogen cycle in the twentyfirst century. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 2013, (29), 1-13.
- Gibert, O., S. Pomierny, I. Rowe, R.M. Kalin, Selection of organic substrates as potential reactive materials for use in a denitrification permeable reactive barrier (PRB). *Bioresource Technology*, 2008, (99), 7587-7596.
- Hoek, A., Scenarios of Animal Waste Production and Fertilizer Use and Associated Ammonia Emission for the Developing Countries. *Atmospheric Environment*, 1997, 24(31), 4095-4102.
- Horswill, P., O. O'Sullivan, G.K. Phoenix, et al., Base cation depletion, eutrophication and acidification of species-rich grasslands in response to long-term simulated nitrogen deposition. *Environmental Pollution*, 2008, (155), 336-349.
- Huang, C.-P., H.-W. Wang, P.-C. Chiu, Nitrate Reduction by Metallic Iron. *Water Research*, 1998, 32(8), 2257-2264.
- Kapoor, A., Viraraghavan, T., Nitrate removal from drinking water—review. *Journal of Environmental Engineering*, 1997, (123), 371-380.
- Liu, S.-J., Z.-Y. Zhao, J. Li, J. Wang, Y. Qi, An anaerobic two-layer permeable reactive biobarrier for the remediation of nitrate-contaminated groundwater. *Water Research*, 2013, (47), 5977-5985.
- Long, L.M., L.A. Schipper, D.A. Bruesewitz, Long-term nitrate removal in a denitrification wall. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 2011, (140), 2011.
- Mochizuki, Y., K. Koba, M. Yoh, Strong inhibitory effect of nitrate on atmospheric methane oxidation in forest soils. *Soil Biology & Biochemistry*, 2012, 50(164-166).
- Moon, H.S., K.-H. Ahn, S. Lee, K. Nama, J.Y. Kim, Use of autotrophic sulfur-oxidizers to remove nitrate from bank filtrate in a permeable reactive barrier system. *Environmental Pollution*, 2004, (129), 499-507.
- Robertson, W. D., J.L. Vogan, P.S. Lombardo, Nitrate Removal Rates in a 15-Year-Old Permeable Reactive Barrier Treating Septic System Nitrate. *Groundwater monitoring and remediation*, 2008, 28(3), 65-72.
- Rocca, C. D., Vincenzo Belgiorno, Sureyya Meriç, Overview of in-situ applicable nitrate removal processes. *Desalination*, 2007, (204), 46- 62.
- Schmidt, C.A., M.W. Clark, Efficacy of a denitrification wall to treat continuously high nitrate loads. *Ecological Engineering*, 2012, (42), 203- 211.
- Sliggers, J. The need for more integrated policy for air quality, acidification and climate change: reactive nitrogen links them all. *Environmental Science & Policy*, 2004, (7), 47-58.
- Van Leeuwen, J. A., Walter-Toews, D., Abernathy, T., Smit, B., Shoukri, M., Associations between stomach cancer incidence and drinking water contamination with atrazine and nitrate in Ontario (Canada) agroecosystems, 1987-1991. *International Journal of Epidemiology*, 1999, (28), 836-840.
- Ward, M.H., Kilfoy, Briseis A., Weyer, P.J., Anderson, Kristin E., Folsom, Aaron R., Cerhan, James R., Nitrate Intake and the Risk of Thyroid Cancer and Thyroid Disease. *Epidemiology*, 2010, 21(3), 389-395.
- Zhang, X. L. A. F., Nitrogen fertilizer induced greenhouse gas emissions in China. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 2011, (3), 407-413.
- Zou, J., Yanyu Lu, Yao Huang, Estimates of synthetic fertilizer N-induced direct nitrous oxide emission from Chinese croplands during 1980-2000. *Environmental Pollution*, 2010, (158), 631-635.

SAÚDE E RISCO AMBIENTAL: O CASO DOS USUÁRIOS DE FOGÃO A LENHA NO ESTADO DO CEARÁ, REGIÃO NORDESTE DO BRASIL

Ricardo Luis Teles de Carvalho

Doctoral Programme in Civil Engineering, Aalborg University, Copenhagen, Denmark
rlc@sbi.aau.dk

Adeildo Cabral da Silva

Departamento de Construção Civil, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Fortaleza, Brasil
cabral@ifce.edu.br

Magda Adelaide Lombardo

Instituto de Geociências e Ciências Exatas, UNESP, Rio Claro, Brasil
lombardo@rc.unesp.br

RESUMO

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estudos ambientais e epidemiológicos em comunidades expostas a fumaça proveniente da queima de biomassa em ambientes internos, indicaram relação consistente entre a exposição e aumento de doenças respiratórias e, conseqüentemente baixa qualidade de vida da população exposta. A reduzida eficiência dos fogões tradicionais de cozinha se constitui um problema ambiental para famílias de baixa renda do Ceará. A pesquisa objetivou uma análise relacionada ao uso dos novos (ecoeficientes) e tradicionais fogões em três municípios do Estado (Limoeiro do Norte, Horizonte e Maranguape) em habitações predominantemente rurais. No primeiro estudo de caso, em uma comunidade com 75 famílias abrangidas pelo projeto, foi realizada aplicação de questionários e medições de conforto ambiental no local. Concluiu-se que 13% do consumo de energia diz respeito ao gás butano e 87% está relacionado ao uso de lenha, sendo que 20% das famílias sentem desconforto provocado pela fumaça e aumento da temperatura interior causado pelos fogões melhorados. No interior de uma habitação, onde se utiliza o fogão (ecoeficiente), a concentração máxima de CO₂ foi 922 ppm e a temperatura média do ar 28°C, com baixos valores de umidade relativa média do ar, de 28%. O trabalho de monitoramento do conforto ambiental nos três municípios foi finalizado, e os dados serão objeto do trabalho completo.

Palavras-chave: biomassa, impacto ambiental, saúde pública.

Introdução

Os fogões a lenha são uma das tecnologias de fornecimento de energia mais ancestrais e populares do mundo, sendo que 3 bilhões de pessoas no mundo utiliza fogões a biomassa nas suas actividades de cozinha ou para o aquecimento doméstico (SIMON, 2011; UNDP 2009). Os problemas de saúde ocupacional e ambientais têm vindo a aumentar devido à combustão interior de biomassa e é reconhecido que o número de pessoas afectadas em 2030 possa ultrapassar os 200 milhões.

Atualmente, o uso de fogões a biomassa é a quarta maior causa de morte em países em desenvolvimento, sendo que as mulheres e crianças são os grupos mais expostos aos problemas causados pela combustão doméstica (CIAP, 2012).

Na América Latina, os fogões de cozinha são bastante populares em habitações rurais, onde predominam as construções tradicionais e onde existe potencial para o desenvolvimento de culturas de agrofloresta (MAIA, 2008).

Apesar da instalação recente de 23000 unidades de fogões eco-eficientes em habitações (26500 famílias) nos estados do Ceará e Amazonas, ainda não foi efectuado estudo consistente sobre os impactos da sua utilização no clima interior das habitações rurais (IDER, 2008); sendo assim

o objetivo geral desse projeto foi analisar o uso dos novos (ecoeficientes) e tradicionais fogões em três municípios do Estado (Limoeiro do Norte, Horizonte e Maranguape) em habitações predominantemente rurais em relação aos impactos socioambientais.

Áreas de estudo

Como estudo de caso específico para essa publicação seleccionou-se uma pequena comunidade rural de baixa renda, localizada na região semi-árida do baixo Jaguaribe (Litoral Leste do estado do Ceará-Brasil) no Município de Limoeiro do Norte. Segundo o IDER (2012), neste município foram instalados 477 novos fogões afectando 11 comunidades onde residem 2936 famílias. o trabalho de coleta de dados foi executado na comunidade do Km60, onde foram instalados mais fogões ecoeficientes e uma das mais isoladas do referido município. Nesta localidade habitam 174 famílias onde foram instalados 75 fogões a lenha ecoeficientes.

A comunidade do Km60 encontra-se afastada do centro da cidade de Limoeiro do Norte e é uma região com disponibilidade de lenha para uso em fogões de cozinha, tendo sido esse um dos critérios relevantes na escolha da aplicação do estudo de caso.

Estudo de caso no interior Ceará

Foi realizado um estudo caso em tres Municípios, através da aplicação de questionários em habitações construídas em alvenaria (telha cerâmica e piso de cimento queimado), com o objectivo de efectuar um levantamento sobre a percepção dos seus habitantes acerca do impacto da combustão de lenha em fogões ecoeficientes no conforto ambiental interno, com ênfase nas problemáticas das perdas de energia térmica por sobreaquecimento. Foi efetuado um levantamento sobre o estado actual de uso dos fogões e padrões típicos de consumo de energia nas habitações unifamiliares. Também foram elaboradas questões relacionadas aos impactos do uso dos fogões ecoeficientes na qualidade do ar interior (emissão de gases de combustão) e os problemas de saúde associados como a asma e alergias.

O estudo de campo e respectivas entrevistas decorreram durante o mês de Agosto/2012, tendo contado com a colaboração dos alunos participantes no curso Gestão de Energia e Qualidade do Ar - Programa de Pós-graduação em Tecnologia e Gestão Ambiental (PPGTGA) do IFCE.

Resultados

No primeiro estudo de caso com o tópico: estudo compreensivo do conforto ambiental em habitações rurais do Ceará, Carvalho, R.L.T. Silva, A. C. Santos, P.G.L. e Tarelho, A. L. C. publicaram na Revista Geonorte (CARVALHO et al., 2012) resultados prelimiões do trabalho de campo desenvolvido na localidade do Km 60. Apresenta-se aqui uma análise dos resultados dos dados coletados em campo pelos alunos do PPGTGA do IFCE. em conjunto com informações obtidas por meio de sensores e de monitoramento automático de dados.

Segundo Carvalho et al. (2012) sobre a saúde ocupacional e qualidade do ar interior foi identificado que, das habitações em estudo, 47% das famílias revelaram ter problemas de saúde e 40% das famílias revelou existirem doenças ou sintomas de asma e/ou alergias nas suas casas. Cinco famílias apresentaram queixas sobre desconforto ambiental provocado pela utilização dos fogões a lenha, sendo 3 das quais relacionadas com a operação de fogões ecoeficientes (20% das famílias envolvidas neste estudo).

Na sessão de monitoramento realizada em uma das habitação resultou que a temperatura do ar interna, junto ao fogão a lenha ecoeficiente, variou entre 34,2 °C (início da tarde) e 32,7 °C

(final da tarde), enquanto a umidade relativa no mesmo ponto variou entre 29,7 % (início da tarde) e 28,0 % (final da tarde). A temperatura do ar no exterior variou entre os 37,8 °C (início da tarde) e os 35,2 °C (final da tarde).

A concentração de CO₂ variou entre os 922 ppm (meio da tarde) e 908 ppm (final da tarde). O pico de concentração CO₂ decoreceu pelas 16h02, quando do manuseamento da câmara de combustão para demonstração do funcionamento do processo de combustão de lenha no fogão ecoeficiente. O ponto de amostragem junto ao fogão ecoeficiente encontrava-se localizado num pátio anexo à casa, bem ventilado pelas correntes de ar que atravessam a mesma, ventilação natural promovida pela abertura de portas e janelas da habitação.

Na continuidade da análise sobre o uso dos fogões no estado do Ceará, Caetano (2013) com trabalho nomeado: Impacto socioambiental dos fogões ecoeficientes na comunidade do km 60 do município de Limoeiro do Norte - CE, apresentado ao Departamento de Construção Civil do IFCE como Trabalho de Conclusão do Curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental, apresentou como objetivo geral da investigação identificação dos impactos socioambientais após a implantação dos fogões ecoeficientes na do comunidade do KM 60, e como objetivos específicos verificar em que consiste o projeto dos fogões ecoeficientes; observar os benefícios de sua implantação e; identificar quais os procedimentos para a implementação do projeto em uma cidade.

O percurso metodológico consistiu no levantamento e análise bibliográfico, construindo e fortalecendo a base teórica da pesquisa, assim como a coleta dos dados da comunidade junto a amostra estabelecida, apresentando os resultados com base no trabalho de campo realizado em agosto/2012, com a colaboração dos alunos participantes no curso Gestão de Energia e Qualidade do Ar do PPGTGA.

Caetano (2013) verificou que apesar da implementação e manutenção a custos baixos dos modelos de fogões ecoeficientes na comunidade do Km 60, tanto o modelo a gás quanto o modelo tradicional a lenha ainda perduram em grande escala na região. Os efeitos benéficos para a saúde, segundo a autora, ainda não foram devidamente percebidos, pelo fato da fumaça ainda resistir com o novo modelo de fogão. Por residirem em uma região de clima semiárido, esse novo modelo não reduz de forma tão considerável a temperatura, sendo percebida por muitos como uma desvantagem.

A percepção dos usuários de fogão a lenha, eficiente e a gás butano, e seus reflexos na saúde humana, um estudo de caso na comunidade quilombola de Alto Alegre em Horizonte- CE, dos autores Fabrício, Rocha e Silva (2013) apresentado no Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação (CONNEPI, 2013), analisa outro trabalho de campo executado pelo mesmo grupo de alunos do curso Gestão de Energia e Qualidade do Ar e que teve como objetivo identificar os agentes causadores de desconforto e agravos à saúde na Comunidade Quilombola de Alto Alegre, em Horizonte-CE.

A Comunidade Quilombola de Alto Alegre é localizada no distrito de Queimadas no município de Horizonte-CE e é composto por 375 famílias que ocupam uma área de cerca de 588,2774 hectares de terra. (MONTEIRO, 2009).

Assim, com a análise dos dados gerais da pesquisa realizada com os usuários de fogões a lenha tradicional e eficiente constatou-se que, apesar da maioria dos entrevistados dizer que não sente diferença em sua saúde quando utiliza o fogão eficiente conforme registrado na figura 1, o uso desses altera de forma negativa a saúde dos entrevistados, principalmente a respiração e temperatura elevada do ambiente.

Figura 1. Percepção da Salubridade do Ambiente pelos Usuários dos Fogões Eficientes, Comunidade Quilombola
Fonte: Fabrício, Rocha e Silva (2013)

Conclusão

A comunidade de baixa renda em estudo é um exemplo típico de um aglomerado populacional localizado numa região remota do Ceará, com acesso limitado a tecnologias modernas de produção descentralizada de energia, nomeadamente geradores GPL/diesel e sistemas de micro-geração solar e/ou eólica que requerem elevado custo de investimento inicial. As comunidades encontram-se numa região com elevada disponibilidade de lenha do semiárido, onde a maioria dos moradores ainda utiliza fogões a lenha em simultâneo com fogões a gás butano.

Concluiu-se que, o fogão a gás butano é o preferido pelas comunidades em estudo, seguido do fogão ecoeficiente, sendo o primeiro o mais prático de operar, evitando o sobreaquecimento das casas, enquanto que o fogão a lenha ecoeficiente provoca o sobreaquecimento e a emissão de compostos poluentes para os espaços interiores, aquando do manuseio da madeira na câmara de combustão. Na maioria das habitações utilizam-se fogões ecoeficientes durante a maior parte do tempo, devido ao baixo custo de aquisição da lenha, reduzido consumo deste combustível e melhor confecção dos alimentos atribuindo um gosto especial à comida. O custo do gás butano é ainda elevado para comunidades de baixa renda.

Bibliografia

- CAETANO, D. S. **Impacto socioambiental dos fogões ecoeficientes na comunidade do km 60 do município de Limoeiro do Norte - CE**, Monografia- IFCE, Fortaleza-CE, 2013.
- CARVALHO, R. L. **Eficiência de fogões a biomassa e impactos na qualidade do ar interior**. Dissertação (Tese de Mestrado em Sistemas Energéticos Sustentáveis), Universidade de Aveiro, Aveiro, 2010.
- CARVALHO, R.L.T. SILVA, A. C. SANTOS, P.G.L. e TARELHO, A. L. C. **Estudo compreensivo do conforto ambiental em habitações rurais do Ceará** Revista GEONORTE, Edição Especial 2, V.2, N.5, Manaus, 2012
- FABRÍCIO, T. N. R.; ROCHA N. N.; SILVA A. C. da. **A percepção dos usuários de fogão a lenha, eficiente e a gás butano, e seus reflexos na saúde humana, um estudo de caso na comunidade quilombola de Alto Alegre em Horizonte- CE**. Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, IFBA, Salvador-BA, 2013.

- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ENERGIAS RENOVÁVEIS. **Fogões EcoEficientes**, 2012.
Disponível em: <http://www.ider.org.br/projetos/fogoes-ecoeficientes>. Acesso em 31 Agosto 2012.
- MONTEIRO, F. H. P. **Construção da identidade étnica entre os quilombolas de Alto Alegre**. Dissertação (Mestrado em Sociologia - Departamento de Ciências Sociais) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza - CE, 2009
- MAIA, G. et al. **Implementation of a dissemination strategy for efficient cook stoves in northeast Brazil**, Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Energias Renováveis, 2008.
- SIMON, L. G. et al. **Win-win scenarios at the climate-development interface: Challenges and opportunities for stove replacement programs through carbon finance**, Global Environmental Change, University of Colorado Denver, USA, 2011.

MEDICINA DE CATÁSTROFE: DE FUKUSHIMA PARA O MUNDO

Rita Marques da Silva

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
ritasuzana.gms@gmail.com

Paulo Campos

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
pacampos@netcabo.pt / paulocampos@inem.pt

Ana Mafalda Reis

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
docmaf@sapo.pt

Romero Bandeira

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
hmedcat@icbas.up.pt

RESUMO

Várias catástrofes foram desencadeadas ao longo da História Natural, evoluindo o mundo até ao ponto como o conhecemos hoje. O aumento da intervenção humana na industrialização de sociedades com ação direta no equilíbrio de ecossistemas provoca fenómenos que aumentam a probabilidade de novas catástrofes, num âmbito tecnológico e industrial, colocando diferentes desafios à Medicina.

A Medicina de Catástrofe é uma medicina de massas, que necessita ter como base uma série de planos de atuação, com uma rede integrada em Socorros Polivalentes com cuidados médicos de urgência, recurso à tecnologia como a telemedicina, onde tem de haver obrigatoriamente coordenação e liderança, desafiando constantemente a capacidade de resposta programada para a sua gestão, para que não impere o imprevisto no meio do caos.

Pelas suas características inéditas, consequências além do expectável e dimensão mundial, é abordada a catástrofe que ocorreu a 11 de Março de 2011 em Fukushima, Japão. Através da revisão de artigos e livros da especialidade revê-se conceitos básicos, analisa-se a evolução dos acontecimentos, explora-se protocolos de atuação médica em socorro a multivítimas e discute-se estudos das consequências a curto, médio e longo prazo dos efeitos radiológicos, saúde pública, problemas sociais e psicológicos, não só para as populações atingidas mas também para os interventores. Igualmente procurar-se-á abordar os problemas éticos internacionais, que colocaram em causa a continuidade da Energia Nuclear no Japão.

Numa perspetiva de preparar cada vez mais os profissionais de saúde para este tipo de fenómenos, a análise do tema “Medicina de Catástrofe: De Fukushima para o Mundo”, serve como ponto de partida e exemplo, para minimizar as taxas de morbilidade e mortalidade quando o mundo se voltar a deparar com um cenário idêntico no futuro.

Palavras-chave: *tsunami*, energia nuclear, socorro a multivítimas, telemedicina, saúde pública

Introdução

A noção de Medicina de Catástrofe surge-nos como uma prioridade numa emanção dos tempos que correm. Não se trata de uma especialidade ou de uma competência que tenha surgido por diferenciação programada ou específica, única e exclusivamente de âmbito médico, mas sim pela aglutinação de situações de extrema gravidade para pessoas e bens que a sociedade neste século XX desenvolveu ou criou e que os médicos para as resolverem se vêm obrigados a lançar mão de recursos sociais polivalentes, pois caso contrário a resposta a essas situações de crise não será minimamente suficiente. Estas circunstâncias fazem com que a Medicina de Catástrofe se pautar por métodos e processos específicos e diferentes da Medicina de Urgência habitual (Bandeira, 2008).

O conceito de catástrofe muito para além da sua definição baseia-se em três componentes: afluxo intenso de vítimas, destruições de ordem material e desproporcionalidade acentuada entre os meios humanos e materiais de socorro e as vítimas a socorrer (Bandeira, 2008).

Catástrofes Naturais

Apesar de todo o avanço científico e tecnológico algumas questões continuam insolúveis. Assim não há relação clara entre a intensidade e a magnitude de um sismo; de três em três dias aparece um sismo potencialmente perigoso (magnitude 6) em qualquer ponto do planeta; não é possível preverem-se seguramente os tremores de terra (Allégre, 1993; Bandeira, 2008; Rothé, 1946).

Além dos muitos benefícios que o oceano traz, este tem sérios riscos sísmicos e meteorológicos. Os ciclones tropicais e *tsunamis* representam os perigos mais poderosos e destrutivos do mar (Cartwright & Nakamura, 2008).

Vários termos em inglês foram abandonados a favor da utilização generalizada da palavra japonesa *tsunami*, significando ondas (nami) a quebrar em cima de um porto (tsu) (Cartwright & Nakamura, 2008). *Tsunami* é o resultado de uma grande quantidade de água que é deslocada num curto espaço de tempo. Cerca de 90-95% dos *tsunamis* são causados por grandes terremotos (habitualmente de magnitude 7.5 (Keim, 2006) na escala de Richter (Richter, 1935) ou maior) em zonas de subducção (onde uma placa tectónica desliza sobre a outra) (Keim, 2006).

Tsunamis têm o potencial de causar um enorme impacto com milhões de mortes. De 1895 a 1995, foram registados 454 *tsunamis* no Pacífico, os 94 mais mortais originaram 51.000 mortes. O *tsunami* de 2004 no Oceano Índico matou perto de 300.000 pessoas e afetou mais de 2.000.000 em doze nações (Keim, 2006).

Catástrofes Nucleares e Radiológicas

Emergências nucleares, radiológicas, biológicas e químicas (NRBQ) ocorrem por exposição ocupacional, incêndio, explosão, libertação de tóxicos ou químicos perigosos, agentes de guerra biológica, e são causadas por ignorância, negligência, incompetência, acidente ou intencionais (Sharma, 2010).

Após o acidente de Chernobyl em 1986, foi amplamente reconhecido que os acidentes nucleares podem ter consequências sobre amplas áreas geográficas, podendo facilmente tornar-se um evento internacional com necessidade de resposta ao mesmo nível (Ugletveit & Molhoek, 2004).

Fukushima

A 11 de Março de 2011, um terremoto de magnitude 9 ocorreu no fundo do mar (a 24km de profundidade (Tanaka, 2012)) a cerca de 130 km ao largo da costa nordeste da principal ilha do Japão, ilha de Honshu (Ono, 2012), e consequentemente um *tsunami* que atingiu uma altura sem precedentes de cerca de 14 metros (Dauer et al., 2011).

Estes acontecimentos despoletaram o maior evento nuclear que as autoridades japonesas declararam como nível 7, o nível mais alto da Internacional Nuclear Event Scale (INES) (Dauer et al., 2011), semelhante ao episódio de Chernobyl que ocorreu em 1986 (Wada, Yoshikawa, Hayashi, & Aizawa, 2012).

Terremotos fortes são frequentemente seguidos de incêndios e existem diversos registos no passado dessa associação. A Fire and Disaster Management Agency confirmou 15.898 mortes,

6.115 feridos e 3.917 desaparecidos, bem como 117.652 edifícios completamente destruídos e 178.200 edifícios severamente danificados em 18 localidades, os quais foram causados maioritariamente pelas ondas do *tsunami*, em vez do tremor (Tanaka, 2012).

Socorro a multivítimas

As quantidades significativas de radioatividade lançadas no ambiente tornaram mandatórias as evacuações e medidas preventivas (Dauer et al., 2011).

Os códigos de Ética Médica hoje em dia chamam claramente a atenção para a obrigatoriedade de intervenção quando surja uma situação de catástrofe. (Bandeira, 2008)

Consequências a curto, médio e longo prazo

Muitos aspetos da resposta a um evento radiológico são comuns a outros eventos multivítimas, incluindo trauma, queimaduras, hemorragias, infeções, stress psicológico, num ambiente médico com condições precárias. Os eventos radiológicos têm questões adicionais de descontaminação e os efeitos da radiação no corpo como insuficiência da medula óssea, imunossupressão, queimaduras da radiação, e lesões internas de órgãos. A janela de oportunidade para contramedidas médicas é limitada (C. Norman Coleman et al., 2009).

Na perspectiva de Lee et al., 2012, a maioria das morbi e mortalidade a curto prazo devem-se às altas doses de radiação associadas a complicações hematológicas, gastrointestinais ou cutâneas, como se viu após a catástrofe de Chernobyl.

O terramoto e subsequente *tsunami*, foi a pior catástrofe que o Japão vivenciou desde a Segunda Guerra Mundial, causando trauma psicológico entre os sobreviventes, bem como stress pós-incidente crítico entre as equipas de resgate (Matsuoka et al., 2011). Os resultados concluíram que a preocupação com a exposição radiológica estava fortemente associada com as perturbações psicológicas entre os profissionais de resgate (Matsuoka et al., 2012).

Conclusão

Em Medicina de Catástrofe deve proceder-se a uma observação retrospectiva do Passado, que é fundamentalmente uma análise “laboratorial” histórica, no sentido de motivar a clarificação e preparação das ações no Presente, além de prevenir e prever as mesmas para o Futuro.

Os Códigos Deontológicos ditam a obrigatoriedade da intervenção médica em situações de catástrofe. É necessário que os interventores saibam como proceder, tenham capacidade física e psicológica, elaborem um plano prático, objetivo, e rápido, com uma triagem eficaz, um espaço para prestação de cuidados médicos/cirúrgicos imediatos e uma evacuação previamente delineada. Com a telemedicina, a triagem, o diagnóstico e o tratamento passam a ser feitos local-independente, reforçando a noção de intervenção global.

Não se verificaram casos de Síndrome de Radiação Aguda (SRA) em Fukushima e nos estudos previamente apresentados não se registaram níveis internacionais preocupantes para a saúde pública, incluindo Portugal. Após este acidente foi relançado o debate internacional sobre a continuidade de centrais nucleares em funcionamento.

Enquanto país propenso a catástrofes naturais, nomeadamente terremotos, como já verificado, e a possível contaminação radiológica atmosférica de acidentes nucleares noutros países, é importante uma melhor preparação para os médicos portugueses para uma abordagem adaptada a um socorro de multivítimas, com equipamentos, meios e procedimentos específicos, diferente da Medicina de Urgência habitual.

Bibliografia

- Allégre, C. (1993). *As Fúrias da Terra* (F. Sousa, Trans.). Lisboa.
- Bandeira, R. (2008). *Medicina de Catástrofe. Da Exemplificação Histórica à Iatroética* (E. d. U. d. Porto Ed. 1ª Edição ed.).
- Cartwright, Julian H. E., & Nakamura, Hisami. (2008). *Tsunami: A History of the term and of scientific understanding of the phenomenon in Japanese and Western culture. The Royal Society*, 62(2), 151-166. doi: 10.1098/rsnr.2007.0038
- C. Norman Coleman, MD, Chad Hrdina, MS, Judith L. Bader, MD, Ann Norwood, MD, Robert Hayhurst, MBA, MS, Joseph Forsha, MA, . . . Ann Knebel, RN, DNSc. (2009). Medical Response to a Radiologic/Nuclear Event: Integrated Plan From the Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response, Department of Health and Human Services. *Annals of Emergency Medicine*, 53(2). doi: 10.1016/j.annemergmed.2007.12.021
- Dauer, L. T., Zanzonico, P., Tuttle, R. M., Quinn, D. M., & Strauss, H. W. (2011). The Japanese *tsunami* and resulting nuclear emergency at the Fukushima Daiichi power facility: technical, radiologic, and response perspectives. *J Nucl Med*, 52(9), 1423-1432. doi: 10.2967/jnumed.111.091413
- Keim, Mark E. (2006). Cyclones, *Tsunamis*, and Human Health. The Key Role of Preparedness *Oceanography* (Vol. 19, pp. 40-49)
- Lee, J. K., Han, E. A., Lee, S. S., Ha, W. H., Barquinero, J. F., Lee, H. R., & Cho, M. S. (2012). Cytogenetic biodosimetry for Fukushima travelers after the nuclear power plant accident: no evidence of enhanced yield of dicentric. *J Radiat Res*, 53(6), 876-881. doi: 10.1093/jrr/rrs065
- Matsuoka, Y., Nishi, D., Nakaya, N., Sone, T., Hamazaki, K., Hamazaki, T., & Koido, Y. (2011). Attenuating posttraumatic distress with omega-3 polyunsaturated fatty acids among disaster medical assistance team members after the Great East Japan Earthquake: the APOP randomized controlled trial. *BMC Psychiatry*, 11, 132. doi: 10.1186/1471-244X-11-132
- Matsuoka, Y., Nishi, D., Nakaya, N., Sone, T., Noguchi, H., Hamazaki, K., . . . Koido, Y. (2012). Concern over radiation exposure and psychological distress among rescue workers following the Great East Japan Earthquake. *BMC Public Health*, 12, 249. doi: 10.1186/1471-2458-12-249
- Noto, R., Huguernard, P., & Larcen, A. (1994). *Medicine de Catastrophe* (Masson Ed. 2ª ed. Paris ed.).
- Ono, K. (2012). Fukushima nuclear power station: what happened? Why all health care professionals need radiation training. *Aesthetic Plast Surg*, 36(2), 231-233. doi: 10.1007/s00266-011-9852-3
- Richter, Charles F. (1935). An instrumental earthquake magnitude scale. *Bull. Seism. Soc. Am*, 25(1), 1-32.
- Richter, Charles F. (1935). An instrumental earthquake magnitude scale. *Bull. Seism. Soc. Am*, 25(1), 1-32.
- Rothé, J. P. (1946). *Séisme et Volcans*. Paris.
- Sharma, Rakesh Kumar. (2010). Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear disasters: Pitfalls and perils. *Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences*, 2(3), 155.
- Tanaka, Takeyoshi. (2012). Characteristics and problems of fires following the Great East Japan earthquake in March 2011. *Fire Safety Journal*, 54, 197-202.
- Ugletveit, F., & Molhoek, W. (2004). Ongoing efforts to improve the international nuclear and radiological emergency response. *Radiat Prot Dosimetry*, 109(1-2), 149-150. doi: 10.1093/rpd/nch251
- Wada, K., Yoshikawa, T., Hayashi, T., & Aizawa, Y. (2012). Emergency response technical work at Fukushima Dai-ichi nuclear power plant: occupational health challenges posed by the nuclear disaster. *Occup Environ Med*, 69(8), 599-602. doi: 10.1136/oemed-2011-100587

CATÁSTROFE DE 20 DE FEVEREIRO DE 2010 NA ILHA DA MADEIRA. O IMPACTO NOS INTERVENTORES DE SAÚDE NO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO HOSPITAL DR. NÉLIO MENDONÇA.

Isa Silva

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
isa_jbs@hotmail.com

Paulo Campos

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
pacampos@netcabo.pt / paulocampos@inem.pt

Ana Mafalda Reis

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
docmaf@sapo.pt

Romero Bandeira

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
hmedcat@icbas.up.pt

RESUMO

A impossibilidade de reproduzir em meio experimental uma situação de catástrofe faz com que a Medicina de Catástrofe viva de história que importa analisar cuidadosamente por forma a perceber erros e encontrar soluções que possam modelar futuras respostas dos prestadores de socorro. No caso dos interventores de saúde é premente que exista uma divulgação dos pressupostos de intervenção, treino de aptidões e reflexão conjunta de maneira a vislumbrar-se uma resposta eficaz.

São objectivos deste trabalho caracterizar e analisar a percepção dos interventores de saúde do serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça relativamente às suas competências na gestão e implementação de uma resposta numa situação de catástrofe e perceber as implicações do aluvião ocorrido na ilha da Madeira a 20 de Fevereiro de 2010 na adoção de novas estratégias formativas bem como, determinar o nível de importância atribuída a este nível de prevenção. O estudo enquadra-se numa metodologia quantitativa, do tipo descritivo e analítico. A técnica utilizada para a colheita de dados foi o questionário. A amostra foi constituída por 45 interventores de saúde em desempenho de funções, no serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no dia 20 de Fevereiro de 2010.

No dia 20 de Fevereiro de 2010, 75,6% dos inquiridos tinha conhecimento do Plano de Resposta Hospitalar e Emergências Externas com Vítimas em vigor no Hospital Dr. Nélio Mendonça, 55,6% sentia-se preparado para intervir de acordo com este e 31,1% tinha formação na área da catástrofe, adquirida maioritariamente em simulacros/exercício (26,7%). 73,3% dos interventores consideraram que a participação em simulacros/exercícios é muito importante para a sua preparação. Após o 20 de Fevereiro de 2010, verificou-se um aumento de interventores a realizar ações de formação e informação na área da Catástrofe.

Como principais conclusões, considerou-se que, a maioria dos interventores sente-se preparado para intervir face a uma situação de catástrofe. Consideraram que os planos de formação e exercícios/simulacros são muito importantes e benéficos, uma vez que aumentam o seu nível de preparação para intervenções futuras. No entanto, salientam que são insuficientes, sendo necessário um crescente investimento em estratégias formativas na área da Medicina de Catástrofe.

Palavras-chave: medicina, formação, catástrofe, urgência, interventores de saúde

Introdução

A Medicina de Catástrofe (MC) deve ser conceptualizada enquanto conceito dinâmico do qual são componentes integrantes, e em estreita interação, o afluxo intenso de vítimas em resultado de um evento marcado por destruição de ordem material com consequente desproporcionalidade entre a capacidade de resposta por parte dos meios humanos e materiais de socorro (Bandeira, 2008). Partindo desta concepção torna-se óbvia a necessidade de sensibilização e formação dos interventores nesta área no sentido de otimizar a sua capacidade de resposta (Al Khalaileh *et al*, 2012; Hermawati *et al*, 2010). Do mesmo modo, a celeridade que exigem estas situações, com respostas prontas, organizadas e integradas, só se torna possível quando planeadas de forma pluridisciplinar. Portanto, a MC não é um domínio exclusivo da medicina (Bandeira, 2008). É antes disso, transversal a várias áreas do saber, que importa divulgar e não, de forma centripeta, limitar à classe médica.

Uma das características da MC que a diferenciam de outras áreas científicas é a impossibilidade de reproduzir em meio experimental uma situação de catástrofe. Assim, a MC vive de história que importa reportar e analisar cuidadosamente por forma a perceber erros e encontrar soluções que, devidamente fundamentadas e divulgadas, possam modelar futuras respostas dos prestadores de socorro.

Baseados nestes pressupostos teóricos usamos como referencial temporal e contextual o aluvião ocorrido na ilha da Madeira a 20 de Fevereiro de 2010. Este evento catastrófico, marcado por forte precipitação, produziu um abundante e violento caudal nas linhas de água e elevada concentração de água nas zonas altas responsáveis por diversos deslizamentos de terras com grandes volumes de inertes e outros materiais que, ao atingirem as zonas habitacionais, provocaram grandes prejuízos materiais e humanos como 43 mortos, 8 desaparecidos, 120 feridos, cerca de 600 desalojados e isolamento de povoações (Sena, 2010).

Um elemento central da MC é o planeamento (Kumar and Weibley, 2013; Rumoro *et al*, 2010). No caso dos interventores de saúde (médicos e enfermeiros), grupo no qual centramos o nosso estudo, é premente que exista uma divulgação dos pressupostos de intervenção, treino de aptidões e reflexão conjunta por forma a vislumbrar-se uma resposta eficaz, assente em conhecimentos científico-práticos corretos e unificadora das diversas áreas científicas participantes. Para Walsh e colaboradores (2012) enquanto alguns profissionais são treinados, a outros poderá faltar formação e experiência necessárias a um desempenho adequado às exigências.

Materiais E Métodos

O presente estudo pretende conhecer o impacto da formação e do treino especializados em MC nos Interventores de Saúde do Serviço de Urgência (SU) do Hospital Dr. Nélío Mendonça (HNM) numa situação com características semelhantes às verificadas no evento utilizado como referência. Assim, podemos enquadrar o estudo numa metodologia quantitativa, do tipo descritivo e analítico.

São objectivos deste trabalho caracterizar e analisar a perceção dos interventores de saúde do serviço de urgência do HNM relativamente às suas competências na gestão e implementação de uma resposta numa situação de catástrofe e perceber as implicações do aluvião ocorrido na ilha da Madeira a 20 de Fevereiro de 2010 na adoção de novas estratégias formativas bem como, determinar o nível de importância atribuída a este nível de prevenção.

A população em estudo foi constituída pela totalidade dos 65 interventores de saúde em desempenho de funções no SU do HNM no dia 20 de Fevereiro de 2010. A nossa amostra foi

constituída por todos os interventores de saúde da população que se mostraram disponíveis e aceitaram participar neste estudo. Assim, a amostra consta de um total de 45 inquiridos, sendo 19 médicos e 26 enfermeiros. O instrumento para a colheita de dados foi o questionário por nós construído, orientado para os objetivos específicos e composto por um conjunto de questões dirigidas ao conceito central desta investigação. Após a elaboração do questionário, foi realizada a revisão do mesmo por peritos.

Resultados

Relativamente às características sociodemográficas, verificamos que a amostra em estudo era predominantemente do sexo masculino (53,3%) e com uma idade compreendida entre os 30 e os 39 anos. No que concerne à profissão, a amostra é maioritariamente composta por enfermeiros (57,8%). A maioria dos inquiridos apresenta mais de 10 anos de tempo de exercício profissional e de tempo de exercício no SU.

No dia 20 de Fevereiro de 2010 a maioria dos inquiridos (75,6%) tinha conhecimento do Plano de Resposta Hospitalar e Emergências Externas com Víctima (PRHEEV) em vigor no HNM e sentia-se preparado para intervir de acordo com este (55,6%). Apenas 31,1% dos inquiridos tinha formação na área da catástrofe, adquirida maioritariamente em simulacros/exercício. No entanto, sabendo-se que o PRHEEV deve ser do conhecimento da totalidade dos interventores de saúde por forma a otimizar-se a resposta e a se verificar na prática um encadeamento de ações, não é de descurar que uma minoria significativa (24,4%) não tinha conhecimento da existência do referido plano nem do seu responsável (28,9%) e/ou dos procedimentos específicos por ele previstos.

Após o 20 de Fevereiro de 2010, a maioria dos interventores considerou a formação/simulacro um recurso pedagógico muito importante no desenvolvimento de competências de intervenção numa situação de catástrofe, contudo, insuficiente. Estes achados são congruentes com os enunciados por Bartley e colaboradores (2005) que consideram, que apesar dos exercícios e formação na área da catástrofe serem extremamente benéficos para os interventores, é necessário promover uma formação contínua nesta área com crescente importância. No âmbito do estudo, denota-se que esta actividade formativa foi promovida maioritariamente pela instituição, o HNM. Este dado vai de encontro ao defendido por Hsu e colaboradores (2005) os quais atribuem como questão prioritária da Saúde Pública o investimento sério na formação e preparação dos interventores de saúde para uma situação de catástrofe.

Vislumbrando-se uma análise comparativa entre os períodos prévio e posterior ao dia 20 de Fevereiro verificou-se existir, por parte dos interventores de saúde, um maior número de elementos com conhecimento do PRHEEV. Este aumento poderá ser atribuído à maior promoção da formação em catástrofe pelo HNM desde aquele evento.

Constatou-se que na eventualidade da ocorrência de uma situação com características e consequências semelhantes às verificadas no 20 de Fevereiro de 2010, a maioria dos interventores sente-se preparado para intervir e está confiante da operacionalidade do PRHEEV. No entanto, consideram que o nível de preparação para intervir numa situação de catástrofe é, atualmente, consideravelmente superior ao verificado no dia 20 de Fevereiro de 2010. Segundo O'Sullivan e colaboradores (2008) é imperativo a realização de estudos que definam a variação do nível de preparação para intervir numa catástrofe ao longo do tempo, de forma a delinear os métodos de formação/treino mais eficazes. Refere ainda que este tipo de estudos é imprescindível na eventualidade de surgirem novas catástrofes, de modo a aferir o seu impacto na percepção de preparação do interventor.

Conclusão

Consideramos que os resultados obtidos nesta investigação, permitiram-nos compreender o impacto da catástrofe do 20 de Fevereiro de 2010, na Ilha da Madeira, nos intervenores de saúde a exercer funções no SU do HNM, assim como, informar acerca das necessidades formativas dos intervenores na área da catástrofe no dia 20 de Fevereiro de 2010 e no período subsequente. Como principais conclusões, considerou-se que, a maioria dos intervenores sentia-se preparado para intervir face a uma situação de catástrofe como a do dia 20 de Fevereiro de 2010. Consideraram que os planos de formação e exercícios/simulacros são muito importantes e benéficos, uma vez que aumentam o seu nível de preparação para intervenções futuras, no entanto salientam que são insuficientes. De uma maneira geral, após o 20 de Fevereiro de 2010, os intervenores participaram em formação na área da catástrofe, maioritariamente por iniciativa do HNM.

Partindo-se do enunciado por Bandeira (2008) que as “(...) *as virtudes e defeitos de um plano só se evidenciam quando ele é posto em prática, na realidade*” não será redundante alertar-se para a necessidade da continuação da investigação na área da MC e apelar a um crescente investimento em estratégias formativas e de sensibilização dos intervenores de saúde para as questões que se prendem com a resposta face a uma situação de catástrofe, assim permitindo rectificar inadequações e compreender as falhas formativas nos intervenores. Assim, esperamos que a realização desta investigação desperte para a importância crescente da prevenção, do exercício e das necessidades formativas nos intervenores de saúde no âmbito da MC.

Bibliografia

- Al Khalailieh MA et al. (2012) - Jordanian nurses' perceptions of their preparedness for disaster management. *International Emergency Nursing*, 20:14-23
- Bandeira, R. (2008). *Medicina de Catástrofe. Da Exemplificação Histórica à Iatroética* (E. d. U. d. Porto Ed. 1ª Edição ed.).
- Bartley B et al. (2005) What is a Disaster!? Hospital Disaster Preparedness: Are Hospital Clinical Staff Well-Informed? Does a Mock Disaster Exercise Make a Difference? *Prehospital and Disaster Medicine*; 20:62-63.
- Hermawati D et al. (2010) *Nurses' preparedness of knowledge and skills in caring for patients attacked by tsunami in Indonesia and its relating factors. International Conference on Humanities and Social Sciences*; Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University.
- Hsu CE et al. (2005) Assessing the readiness and training needs of non-urban physicians in public health emergency and response. *Disaster Management & Response*; 3:106-111
- Kumar A, Weibley E. (2013) Disaster management and physician preparedness. *Southern Medical Journal*; 106:17-20
- O'Sullivan TL et al. (2008) Disaster and emergency management: Canadian nurses' perception of preparedness on hospital front lines. *Prehospital and Disaster Medicine*; 23: s11-18.
- Rumoro DP et al. (2010) A comprehensive disaster training program to improve emergency physicians' preparedness: a 1-year pilot study. *American Journal of Disaster Medicine*; 5:325-331
- Sena L. (2010) *Dossier Aluvião de 20 de Fevereiro de 2010 na Madeira*. Funchal: Centro de Documentação do Museu Quinta das Cruzes.
- Walsh L et al. (2012) Core competencies for Disaster Medicine and Public Health. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*; 6: 44-52

ÁGUAS RESIDUAIS, LAMAS, COMPOSTO - SEUS EFEITOS NA SAÚDE HUMANA

Carla Carocha

Departamento de Geologia, CeGul, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, bolsista da Fundação Ciência e Tecnologia
carlacaroca@sapo.pt

RESUMO

Resíduos resultantes do tratamento das águas de abastecimento e das águas residuais, têm sido utilizados pela sociedade como forma de resolver o problema da sua colocação. Alguns estudos científicos alertam para os graves perigos desta utilização. Várias entidades pedem a revisão da legislação internacional e nacional, e, exigem mais estudos técnicos e científicos.

Palavras-chave: águas residuais, lamas, composto, efeitos

Introdução

O aumento progressivo de volume de resíduos e a obrigação de cumprir os objectivos das Directivas obriga a que haja uma gestão de resíduos. A autoridade Nacional de Resíduos (ANR) e as Autoridades Regionais de Resíduos (ARR) asseguram e acompanham os planos de gestão dos resíduos. (Republicação do DL nº178/2006, de 5 de Setembro, do DL nº73/2011, de 17 de Junho).

Resíduo, na Decisão nº2000/532 de 3 de Maio de 2000, a partir de 1 de Janeiro de 2002, define-se como qualquer substância ou objecto de que o seu produtor ou detentor se desfaz ou tem intenção ou obrigação de se desfazer (Aragão, 2006).

No caso do ciclo urbano da água, que engloba o abastecimento e o saneamento de águas residuais, os resíduos produzidos são as águas residuais tratadas, as lamas, o composto, as areias e as gorduras.

A Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR) (Conferência «Perspectivas de Futuro do Sector dos Resíduos em Portugal» realizada no dia 29 de Abril de 2013, no âmbito da abertura do Curso Direito dos Resíduos, no ICJP, na FDUL) não concorda que no DL nº73/2011 de 17 de Junho (artigo 3º), não estejam incluídas as águas residuais, no que se refere às «operações de gestão de resíduos destinadas a prevenir ou reduzir a produção de resíduos, o seu carácter nocivo e os impactes adversos decorrentes da sua produção e gestão, bem como a diminuição dos impactes associados à utilização dos recursos, de forma a melhorar a eficiência da sua utilização e a protecção do ambiente e da saúde humana» (artigo 2º do DL nº73/2011 de 17 de Junho).

O aumento da produção destes resíduos pelas Estações de Tratamento de Água (ETA) e das Águas Residuais (ETAR) gerou um grave problema; onde depositá-los com o mínimo de impacto possível? O aterro foi uma das soluções, mas o artigo 13º, alínea 3, do Decreto-Lei nº73/2011 obriga à redução dos resíduos urbanos biodegradáveis nos aterros e a medidas que incentivem: «a) A recolha selectiva de biorresíduos, tendo em vista a sua compostagem e digestão anaeróbia; b) O tratamento dos biorresíduos em moldes que satisfaçam um elevado nível de protecção do ambiente; c) A utilização de materiais ambientalmente seguros produzidos a partir de biorresíduos, designadamente composto».

Outras propostas foram: a utilização das águas residuais para rega de campos de golfe, de jardins e de agricultura; a aplicação das lamas directamente nos solos agrícolas e nos terrenos

ardidos; a valorização das lamas por compostagem (produção do composto) e para a produção de biogás. No caso das areias e das gorduras, o estudo não foi realizado em pormenor, mas, através da informação da Sr^a Eng^a Cristálida Duarte da ETAR de Nazaré, as areias são entregues a uma empresa certificada que as utiliza nos aterros sanitários, e as gorduras são decompostas, libertando água e dióxido de carbono. Esta água é novamente colocada no circuito do tratamento das águas residuais.

O objectivo deste artigo é chamar atenção para os perigos graves confirmados, não só para os humanos como para o ambiente. Com isto, pretende-se impedir que haja interesse em gerar mercados de resíduos, «diminuindo a procura de matérias-primas primárias e promovendo simbioses industriais» (DL nº210/2009, de 3 de Setembro).

Breve descrição sobre as águas residuais, as lamas e o composto

A água residual apresenta-se sob a forma de uma suspensão muito diluída de materiais diversos (incluindo microorganismos), com turbidez acentuada, cor e cheiro característico. As lamas resultam essencialmente da acumulação de produtos sólidos decantáveis, nos quais se encontram matéria mineral inerte, matéria orgânica fermentável (formada por restos de plantas e de seres vivos completamente decompostos) e microorganismos (bactérias, vírus e parasitas). O composto é um produto de valorização da lama através do processo de compostagem (degradação da matéria orgânica, na presença de oxigénio, efectuada por microorganismos: bactérias, fungos e vírus).

A composição geral destes resíduos, consiste numa complexa mistura de substâncias químicas: sódio, cálcio, magnésio, cloreto, sulfato, potássio, ião hidrogenocarbonato, carbonato, nitrato, metais pesados (cádmio, chumbo, zinco, ferro níquel, manganês, cobre, mercúrio, cromo), poluentes orgânicos (PCBs, DDT, atrazina, dioxinas), sólidos em suspensão e numerosos microorganismos, alguns patogénicos (bactérias, vírus, parasitas, fungos).

Efeitos na saúde humana

Os efeitos na saúde humana são vários, quer por contacto, por inalação ou por ingestão; directa ou indirectamente, por proximidade das estações de tratamento e de valorização destes resíduos, terrenos com aplicação destes resíduos, no consumo de vegetais e/ou de animais desenvolvidos nestes campos.

A ingestão, a inalação e/ou a absorção cutânea de metais pesados (elementos químicos que apresentam, no geral, densidade maior que 4,0g/cm³ (Davis *et al.*, 1986)) geram alergias, otites crónicas, erupções cutâneas relacionadas com infecções fúngicas de pele, inflamação dos olhos, diarreia, dores de cabeça, febre, fadiga, doenças graves cancerígenas e até a morte (Bertoldi *et al.*, 1987).

Os microorganismos patogénicos (bactérias, vírus, fungos, parasitas) presentes nas águas residuais, nas lamas e no composto, afectam tanto humanos, como plantas e animais (Ferreira *et al.*, 2010). Nos humanos, as bactérias podem provocar diarreias, gastroenterites, vômitos, fadiga, cólera, tétano, febre tifóide, pneumonia, sífilis e tuberculose. Os vírus são responsáveis por gastroenterites, hepatites A e E, ébola, gripe, meningite, herpes, poliomielite, pneumonia, dengue, varicela, rubéola e cancro cervical. Os fungos podem provocar micoses, efeitos carcinogénicos, mutagénicos, e até morte. Os parasitas originam várias infecções: toxoplasmose (parasita do gato), triquinose (parasita do cão, do porco, do javali e do cavalo), teníases (parasitas de bovinos e de porcos), fasciolose (parasitas de ovinos e de bovinos); que provocam

febres, vômitos e diarreias podendo até morrer em casos extremamente graves. (Ferreira et al., 2010; <http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus> (05/08/2014)).

Os poluentes químicos orgânicos como pesticidas (insecticidas, fungicidas, etc) e PCBs (químicos organocloreto) acumulam-se nos organismos vivos provocando malformações do feto, autismo, déficit de atenção ou a hiperactividade, problemas de desenvolvimento, vários tipos de cancro e até a morte (Baird, 1995; Jornal Oficial da União Europeia, 2007).

Considerações finais

A Organização Mundial das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Banco Mundial pretendem que se invista na melhoria da qualidade da água potável, diminuindo numerosas doenças e mortes provocadas por águas poluídas, quer em países subdesenvolvidos, quer em países desenvolvidos (Desjardin, 1997). No entanto, um grupo científico da OMS, em 1989, alertou para os vários perigos de saúde, resultando muitas vezes em morte, do uso de águas residuais tratadas na agricultura, nos jardins, nos campos de golfe, nos usos recreativos e na recarga de aquíferos. Pediam que a legislação fosse mais rigorosa sobre os tratamentos de águas residuais e das lamas. Isto não aconteceu, pois era inviável economicamente, mantendo-se até hoje, na lei nacional, a descarga licenciada de águas residuais urbanas, depois de submetidas a um tratamento secundário (artigo 5º, do DL nº152/97, de 19 de Junho; OMS, 1989). Entende-se por tratamento secundário, «o tratamento das águas residuais urbanas que envolve geralmente um tratamento biológico com decantação secundária ou outro processo que permita respeitar os valores constantes do quadro nº1 do anexo I» (CBO<25mg/l, CBO<125mg/l e SST<35mg/l) (artigo 2º, alínea 7), do DL nº152/97, de 19 de Junho). A Comissão Europeia (2006) considera que nenhum dos processos de desinfecção é completamente satisfatório (Marecos do Monte e Albuquerque, 2010).

O CESE (Jornal Oficial da União Europeia, 2007) refere que a actual directiva sobre as lamas de depuração (86/278/CEE) ainda permite uma elevada concentração de metais pesados e outros poluentes nas lamas que se podem espalhar nas terras aráveis, considerando imperioso publicar esta directiva alterada em relação à utilização de lamas de depuração quando aplicadas nos solos. Lembra também que pouco se sabe sobre o conteúdo de outros poluentes químicos, sobre a forma como interagem entre si e sobre os seus efeitos no solo e na segurança dos produtos alimentares quando se espalham em terras cultivadas.

O composto, forma melhorada da lama, é utilizado nos solos como correctivo orgânico, mas ainda apresenta riscos para os humanos, animais e plantas, semelhantes às lamas de depuração.

Conclui-se que é necessário mais estudos científicos de forma a conhecer o comportamento e a toxicidade das substâncias presentes nas águas residuais tratadas, nas lamas e no composto. Só deste modo se consegue elaborar uma legislação eficaz na gestão dos resíduos globais.

Bibliografia

- Aragão, T. (2006) - O Direito e a Cooperação Ibérica, Iberografias, 7, Campo das Letras, p.271-311.
- Baird, C. (1995) - Environmental Chemistry, W.H. Freeman and Company, USA, p. 484
- Bertoldi, M., Ferranti, M.P., L'Hermite, P., Zucconi, F. (1987) - Compost: Production, Quality and Use, Commission of the European Communities, Proceedings of a symposium organized by the Commission of the European Communities, Directorate-General Science, Research and Development, held in Udine, Italy, 17-19 April 1986, Elsevier Science Publishing CO., Inc, Elsevier Applied Science, New York, USA, p.853

- Davis, R.D., Haeni, H., L'Hermite, P. (1986) - Factors influencing sludge utilisation practices in Europe, Proceedings of a Round-Table seminar organized by the Commission of the European Communities, Directorate-General Science, Research and Development, Environment Research Programme, held in Liebefeld, Switzerland, 8-10 May, 1985, Elsevier Science Publishing Co., Inc., Galliard (Printers) Ltd, Great Britain, p.123
- Desjardim, R. (1997) - Le Traitment des Eaux, 2^eédition Revue et Améliorée, Éditions de l'École Polytechnique de Montréal, Canadá, p.304
- Ferreira, W.F.C., Sousa, J.C.F., Lima, N. (2010) - Microbiologia, Lidel - Edições Técnicas, Lda, Lidel, Porto, p.622
- Jornal Oficial da União Europeia (2007) - Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro para a protecção do solo e altera a Directiva 2004/35/CE», *COM(2006) 232 final – 2006/0086 (COD)*, (2007/C 168/05), 20.7.2007 PT Jornal Oficial da União Europeia C 168/29, p.5;
- Marecos do Monte, H., Albuquerque, A. (2010) - Reutilização de Águas Residuais, ISEL e ERSAR, Lisboa, p.319
- Merian, E. (1991) - Metals and their Compounds in the Environment - Occurrence, Analysis and Biological Relevance, VCH Publishers, Inc, Federal Republic of Germany, p. 715-1371
- OMS (1989) - L'Utilization des Eaux usées en Agriculture et en Aquiculture: Recommendations à Visées Sanitaire, Rapport d'un Groupe Scientifique de L'OMS, Organisation Mondiale de La Santé, Serie de Rapports Techniques 778, Genève, p.86.

IMPACTES DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS EM ESCOMBREIRAS DE CARVÃO ABANDONADAS

Cármén Ferreira

Departamento de Geografia e CEGOT,
Faculdade de Letras da Universidade do Porto
dra.carmenferreira@gmail.com

Luciano Lourenço

Departamento de Geografia e CEGOT,
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
luciano@uc.pt

Francisco Costa

Departamento de Geografia e CEGOT,
Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho
costafs@geografia.uminho.pt

Maria Gouveia

Aluna de Doutoramento, Departamento de Geografia e CEGOT
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
mmalgouveia@gmail.pt

RESUMO

A indústria mineira tem apreciáveis impactes ambientais. No caso das minas de carvão, os resíduos resultantes da exploração - as escombreyras -, podem originar contaminação de solos, águas superficiais e aquíferos, constituindo um ponto importante de discussão na agenda política das questões ambientais. Após o abandono da atividade mineira, as escombreyras vão-se recobryndo de solo e de vegetação arbustiva e arbórea, que encobre os resíduos de carvão que as constituem.

Analisam-se e comparam-se as situações ocorridas nas escombreyras das minas de S. Pedro da Cova (Gondomar) e da mina da Bezerra (Porto de Mós), esta última integrada na área do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC). Estas escombreyras foram encontradas em combustão lenta, após terem ocorrido incêndios florestais na área onde se localizam. Da combustão lenta das escórias de carvão resultou o abatimento das escombreyras, fumos, emissões de monóxido de carbono e anidrydos sulfurosos e um cheiro intenso a enxofre que se dispersou pelas localidades em questão, provocando mal-estar na população. Referem-se as medidas de mitigação utilizadas na escombreyra da Bezerra para acabar com a combustão lenta e diminuir os impactes ambientais dessa situação. Em contrapartida, nas escombreyras de S. Pedro da Cova, apesar dos documentos legais que impõem a adoção de medidas para superação do seu passivo ambiental, pouco ou nada se fez até agora.

Palavras-chave: Incêndios florestais; escombreyras de carvão; combustão lenta; degradação ambiental.

Introdução

Em Portugal os incêndios florestais têm sido recorrentes e destruído milhares de hectares de floresta. Os impactes dos incêndios florestais são diversos, destruindo de forma direta não só os povoamentos florestais, como também a biodiversidade, e provocam alteração na paisagem da área onde ocorrem. Foi sobretudo a partir da década de 70 do século passado, que se verificou um aumento crescente de área ardida, salientando-se, desde 1970 a 2014, o ano de 2003, com uma área ardida de 425 726 ha responsável pela destruição de cerca de 8% da área de povoamentos florestais. Segundo o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), no período pós 2003, o ano de 2014 é o terceiro melhor ano, em termos de área ardida desde 1 de Janeiro a 15 de Setembro, com apenas 11 745 ha (ICNF, 2014).

As minas de carvão desativadas localizam-se, sobretudo, em áreas de uso florestal daí que a ocorrência de incêndios nessas áreas também constituem um risco para as escombrelas que se encontram junto da área de mineração e que, por vezes, até se apresentam próximas de áreas edificadas. Ora, como as escombrelas abandonadas, são constituídas por acumulação de resíduos de carvão resultantes da exploração, constituem, por isso, material facilmente ignescente. A combustão lenta das escombrelas, que pode ocorrer durante largos períodos de tempo, provoca impactes ambientais diversos nas unidades territoriais onde se situam.

A escombrela da mina de S. Vicente, em S. Pedro da Cova, Gondomar

O concelho de Gondomar foi muito conhecido pela exploração das minas de carvão resultantes da bacia carbonífera do Douro que atravessa a parte oriental do concelho. As minas de S. Pedro da Cova, nas quais se insere a mina de S. Vicente, implantadas numa freguesia de cariz ainda rural, foram das mais importantes concessões mineiras dessa bacia carbonífera e uma das mais antigas minas de carvão exploradas em Portugal. (Ferreira, 2013).

A extração do carvão, na mina de S. Vicente, teve início em 1921 e encerrou em 1970. As rochas estéreis provenientes de atividade extrativa foram depositadas em montes que constituem as escombrelas, ou seja, locais de acumulação de resíduos de atividade extrativa, mas que hoje, terminada a mineração, são escombrelas abandonadas.

Os estéreis acumulados na escombrela da mina de S. Vicente nunca sofreram qualquer tipo de tratamento ou manutenção e constituem um perigo potencial para a saúde pública e um risco para a população que ali vive.

Esta escombrela, à qual corresponde, atualmente, a cota de cerca de 150 metros, com uma altura de cerca de 50 metros, a partir da base, foi sendo, após do encerramento da atividade mineira em 1970, recoberta, naturalmente, por uma fina camada de solo que, posteriormente, permitiu o desenvolvimento de uma cobertura arbórea do tipo pinheiro bravo (*Pinus pinaster*) e eucalipto (*Eucalyptus globulus*), bem como de uma vegetação sub-arbustiva e herbácea diversas. As escórias de carvão foram, em parte, dissimuladas por essa delgada camada de solo onde se desenvolveu uma vegetação igual à das áreas envolventes.

Situada junto à vertente ocidental da Serra de S. Justa, e revestida com espécies pirófitas, esta escombrela constituía e constitui uma área de risco de incêndio florestal. É precisamente através das encostas das serras que se propagam os incêndios dos concelhos vizinhos que vão afectar o concelho de Gondomar, e, neste caso, a freguesia de S. Pedro da Cova.

Um incêndio florestal ocorrido em 2003, afetou a área da escombrela da mina de S. Vicente que, depois de combatido, deu origem a uma combustão lenta no interior da escombrela que resiste até hoje. Os impactes ambientais dessa combustão lenta que dura há já 11 anos são diversos, do tipo físico, químico e biológico, produzindo-se, no solo, água e ar uma concentração de substâncias em quantidade, concentração e durante um período de tempo tal, que podem ameaçar a saúde das pessoas, e causam a perda da biodiversidade local.

A escombrela tem vindo a abater significativamente. A subsidência desta, resulta das características da distribuição de tensões no interior da escombrela que, devido à combustão, vai criando vazios para onde se deslocam os resíduos supra ou adjacentes (Rodrigues, 2001). A área de aparente coberto vegetal queimado vai aumentando sem ocorrência de incêndio superficial, o que significa que as raízes das espécies vão ardendo lentamente desde o interior da escombrela, o que configura um incêndio subterrâneo. A lenta combustão da escombrela vai consumindo as escórias (fig. 1), provocando a acumulação de enxofre à superfície do solo,

bem como o aparecimento de lagoas de águas ácidas, por contaminação provocada pelas águas de escorrência (fig. 2).

A

B

Figura 1 - A - Vista parcial da vertente da escombreira da mina de S. Vicente em combustão lenta; B - Fendas no solo que evidenciam a combustão interna da escombreira. (Fotografias de Cármen Ferreira, Out.2007).

A

B

Figura 2 - A - Manchas de enxofre na superfície do solo, resultantes da combustão das escória; B - Lagoas de águas ácidas. (Fotografias de Cármen Ferreira, Março 2010).

A combustão lenta da escombreira acentua, necessariamente, os processos de erosão hídrica, os movimentos de vertente e a lixiviação dos resíduos minerais com a consequente formação de águas ácidas. O fumo eleva-se no ar vindo do interior do solo, onde as temperaturas da combustão atingem, pelo menos, 1000°C (J. Ribeiro *et al.*, 2010). Como consequência, a temperatura superficial do solo é elevada e as fendas que se abrem no terreno são autênticos “fornos” que, atendendo à fragilidade do material, podem tornar o terreno movediço e consumir, literalmente, quem ou o que por lá passa. As fissuras e fendas abertas na escombreira proporcionam canais através dos quais o oxigénio pode circular e, assim, manter ativa a combustão.

Por estranho que possa parecer, durante estes 11 anos de combustão lenta na escombreira da Mina de S. Vicente, S. Pedro da Cova, nenhuma intervenção foi feita no local. Até aos dias de hoje, o problema da combustão lenta desta escombreira continua a existir e a constituir um

risco para o complexo desportivo existente a umas dezenas de metros deste local, bem como para o edificado adjacente ao complexo desportivo.

A escombreira da mina da Bezerra, em Serro Ventoso, Porto de Mós

A mina da Bezerra fica situada na freguesia de Serro Ventoso, concelho de Porto de Mós, em plena área do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC). Esta mina foi descoberta nos finais do século XIX ou início do século XX e encerrou, definitivamente, em 1959, quando o desinteresse pelo carvão da Sociedade Mineira do Lena conduziu à perda da concessão da Termoelétrica de Porto de Mós, em 1948, e, depois, à desativação da linha férrea, em 1959.

As marcas da atividade mineira, se bem que esbatidas, são ainda perceptíveis no território, nomeadamente a escombreira, recoberta por carvalhos e medronheiros. O grande incêndio florestal que ocorreu em 2006 no lugar da Bezerra, incendiou a escombreira da antiga mina de carvão, que entrou em combustão lenta, ficando o fogo a lavar no seu interior dando origem a fumos (figura 3) e cheiros intensos que provocam mal estar na população local.

Figura 3 - Escombreira da mina da Bezerra em combustão lenta após o incêndio florestal que ocorreu no local em 2006.

Fonte:<http://geopedrados.blogspot.pt/2006/09/o-incndio-no-pnsac.html>

Tal como aconteceu na mina de S. Vicente, em S. Pedro da Cova, Gondomar, também nesta escombreira se pôde ver, desde o exterior, a chama da combustão interna da escombreira de que resultava a libertação de monóxido de carbono e de anidridos sulfurosos que, para além de tóxicos, são irritantes e incomodam a população.

Todavia neste caso, após a ocorrência do incêndio superficial, a autarquia de Porto de Mós procurou uma solução para resolver o problema do incêndio subterrâneo, a qual consistiu na asfixia da mina com terra, cortando o oxigénio para o seu interior. Embora sendo a escombreira de acesso difícil, tornando quase impossível a deslocação de máquinas para o local, o problema foi resolvido com a utilização de uma máquina giratória que assim permitiu a injeção de terra e a asfixia da combustão no interior da escombreira. Toda esta tarefa ficou terminada no final do ano de 2006 e o problema da combustão lenta da escombreira da mina da Bezerra deixou de existir.

Conclusão

Os dois casos apresentados de escombreyras em combustão lenta tiveram resoluções diferenciadas por partes das autarquias locais responsáveis pela garantia da proteção civil de pessoas e do património natural. A consciencialização do risco que estas situações implicaram para as populações locais das unidades territoriais onde cada uma destas minas se insere, foi bem diferenciada em cada uma das autarquias. Com efeito, os agentes decisores do planeamento e ordenamento do território devem encontrar as medidas eficazes para cada situação de risco e que, nos casos em apreço, passam por devolver à comunidade, devidamente requalificados, esses locais que são exemplo de degradação ambiental, paisagística e humana.

Bibliografia

- Ferreira, C. (2013) - “A degradação dos solos por atividade mineira: as minas de carvão de S. Pedro da Cova (Gondomar)”. *Direito Rural*, Vida Económica, Porto, p. 93-108.
- ICNF (2014) - 7º Relatório Provisório de Incêndios Florestais. <http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/relat/>
- Ribeiro, J; Jesus, A. D. P.; Flores, D. (2010) - *Petrografia e geoquímica orgânica das escombreyras de carvão da Bacia Carbonífera do Douro - implicações ambientais*. Revista Electrónica de Ciências da Terra; <http://e-terra.geopor.pt>, ISSN 1645-0388, volume 9, nº12.
- Rodrigues, L. (2001) - “Instabilidade Geomorfológica em Explorações de Carvão Abandonadas, Área de Serro Ventoso-Bezerra, Concelho de Porto de Mós”. *Actas do II Seminário Recursos Geológicos, Ambiente e Ordenamento do Território*, Vila Real, p. 145-154.

AVALIAÇÃO DE CRITÉRIOS EPIDEMIOLÓGICOS NA POPULAÇÃO PORTUGUESA

Cristina. S. Pereira

CHUC - Centro Hospitalar Universitário de Coimbra
crisilvapereira@gmail.com

Carla G. Soares

IDEALMED-Unidade Hospitalar de Coimbra
carla.soares@idealmed.pt

J. V. Silva Pereira

Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração (ISCIA)
jvsilvapereira@sapo.pt

RESUMO

Há marcadores epidemiológicos utilizados na saúde pública dos países, cuja importância e relevância dependem de inúmeros fatores como localização regional, natalidade, mortalidade e ambiente. Alguns são tão importantes como a natalidade e imigração que alteram a estrutura social e económica. Estudos têm sido feitos para demonstrar sua importância e influência. Em Portugal, o responsável pela avaliação e controlo é o Instituto Nacional de Estatística e a Direção Geral de Saúde. Para que um marcador seja importante numa população ele deverá ser avaliado em diversos âmbitos e ter um significado estatístico relevante como é a imigração na população portuguesa (TABI, INE). Mundialmente, marcadores estudados por meta-análise tem sido considerados significativos e uniformes por toda a bibliografia avaliada (TABI). Concluímos que as técnicas de avaliação de marcadores epidemiológicos utilizadas no nosso país são compatíveis e devem ser aplicadas de forma crítica.

Palavras-chaves: Vigilância epidemiológica, Marcadores populacionais, Saúde pública.

Introdução

O sistema de vigilância epidemiológica tem por atribuição principal oferecer apoio aos diversos sistemas de controlo nas diferentes populações a nível nacional e internacional. Têm sido implementados por esse organismo normas para avaliação de vários aspetos populacionais através dos marcadores laboratoriais em *lato senso* como pela identificação de marcadores virais, bacteriológicos, farmacológicos, bem como psicossociais, económicos e culturais.

Todos eles são importantes, mas em cada população a magnitude é diferente devido a inúmeros fatores tais como, localização regional, número da população, natalidade, mortalidade e factores ambientais. Alguns são tão importantes como a natalidade e imigração que modificam totalmente a estrutura social, económica e outros marcadores. (Ahluwalia IB,2000 ; Fonseca JF.)

Inúmeros trabalhos e livros têm sido escritos para demonstrar sua importância, influência e associações. Na população portuguesa o órgão responsável por esta avaliação é o Instituto Nacional de Estatística, sendo que a Direção Geral de Saúde faz também o seu controlo.

Os laboratórios deste sistema têm também por atribuição o desenvolvimento tecnológico aplicado à produção de antígenos e anticorpos, assim como o desenvolvimento e padronização de técnicas para diagnóstico e atividades voltadas a oferecer soluções em saúde pública. Praticamente, toda a tecnologia desenvolvida é utilizada pelos laboratórios públicos e privados do sistema nacional de saúde. Estes laboratórios somente executam exames para diagnóstico em situações especiais e mediante solicitação específica e justificável.

Para que um marcador seja importante numa população deverá ser avaliado de diversos ângulos e ter um significado estatístico relevante na população estudada, como é a imigração na população portuguesa como se observa na TAB.I do INE(Portal do Instituto Nacional de Estatística)

Em termos metodológicos podem ser utilizados vários métodos de avaliação, tal como revisões bibliográficas dos critérios de avaliação do sistema epidemiológico extraídas de publicações periódicas, jornais e revistas; bem como bases de dados nacionais e internacionais. Foram considerados nesta metodologia todos os objetivos, obedecendo a diferentes versões aplicáveis, adequados ao devido sistema de saúde e realizado a análise da informação obtida em comparação ao marcador estudado.

Em todo o mundo diversos marcadores estudados tem sido adequadamente considerados como mostra a meta-análise realizada por nós, TAB II, com *odds ratio* significativo e uniforme por quase toda a bibliografia avaliada.

TAB.I- Marcadores epidemiológicos 2000-2007 em Portugal.(INE)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
População em 31 de Dezembro	10.256.658	10.329.340	10.407.465	10.474.685	10.529.255	10.569.592	10.599.095	10.617.575
Razão de Masculinidade (%)	93,3	93,4	93,4	93,7	93,7	93,8	93,8	93,8
Total de Nados Vivos	120.008	112.774	114.383	112.515	109.262	109.399	105.351	102.492
Total de Óbitos	105.364	105.092	106.258	108.795	101.932	107.462	101.948	103.512
Saldo Natural	14.644	7.682	8.125	3.720	7.330	1.937	3.403	-1.020
Saldo migratório	47.000	65.000	70.000	63.500	47.240	38.400	26.100	19.500
Variação populacional	61.644	72.682	78.125	67.220	54.570	40.337	29.503	18.480
Crescimento Natural (%)	0,14	0,07	0,08	0,04	0,07	0,02	0,03	-0,01
Crescimento Migratório (%)	0,46	0,63	0,68	0,61	0,45	0,36	0,25	0,18
Crescimento Efectivo (%)	0,60	0,71	0,75	0,64	0,52	0,38	0,28	0,17

Fonte: [Instituto Nacional de Estatística](#). Estimativas provisórias de população residente, 2007. Portugal, NUTS II, NUTS III e municípios. Lisboa: INE-IP, 2008

TAB.II - Resultado da metaanálise realizada com odds ratio ≥ 1 .

Este trabalho visa avaliar a importância de marcadores epidemiológicos para a determinação de perigos na saúde. (Risk Manag Healthc Policy, 2014)

Material e Métodos

Foram utilizadas revisões bibliográficas de marcadores epidemiológicos em vários países através de metaanálise e observada a sua importância estatística quando comparada com dados obtidos em Portugal. A Fig. 1 mostra a sequência da análise dos dados considerada significativa devido ao valor de *odds ratio* estar acima de 1.

Fig. 1-Sequência de análise dos dados realizada.

Conclusões

Na meta-análise realizada, observamos uma distribuição homogénea nos artigos avaliados com *odds ratio* acima de 1, na maioria dos estudos utilizados. Isto indica que houve uma escolha adequada na análise, bem como os marcadores aqui assinalados tem um significado relevante nas populações estudadas. Em Portugal, foram utilizados os dados obtidos no INE que apresentam paralelismo evidente. Assim, todas as avaliações dos estudos, leva-nos a crer que têm sido utilizadas metodologias adequadas já que há uma coincidência próxima entre a avaliação dos marcadores populacionais no mundo e em Portugal.

Bibliografia

- Ahluwalia IB, Tessaro I, Grummer-Strawn LM, MacGowan C, Benton-Davis, 2000.S.Georgia's breastfeeding promotion program for low-income women.Pediatrics. Jun;105(6):E85.
- Blumberg BS, Alter HJ and Visnich S. A "New" antigen in Leukemia sera. JAMA 1965; 191(7): 541-6.
- Boozary AS, Farmer PE, Jha AK. JAMA. 2014 Oct 6. The Ebola Outbreak, Fragile Health Systems, and Quality as a Cure.
- Chock LR, Hayes DK, Tomiyasu DW. Insights in public health: the special supplemental nutrition program for women, infants and children: strengthening families for 40 years. Hawaii J Med Public Health. 2014 Sep;73(9):295-300.
- Devapriam J, Gangadharan S, Pither J, Critchfield M. Delayed discharge from intellectual disability in-patient units. Psychiatr Bull (2014).
- Evans AA, London WT. Epidemiology of hepatitis B. In: Zuckerman Viral hepatitis: Scientific basis and clinical management. 2nd ed. London: Churchill Livingstone;1998. p.107-14.
- Fonseca JF. Hepatite D. In: Focaccia R, editor. Hepatites virais. São Paulo: Atheneu; 1997.p.67-9.
- Kuzuya T, Nakagawa S., Satoh J., Kanazawa Y., Iwamoto Y., Kobayashi M., Nanjo K., Sasaki A., Seino Y., Ito C, Shima K., Nonaka K., Kadowaki T.; Committee of the Japan Diabetes Society on the diagnostic criteria of diabetes mellitus. Report of the Committee on the classification and diagnostic criteria of diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract. 2002 Jan;55(1):65-85.
- Lind M., Tuomilehto J., Uusitupa M., Nerman O., Eriksson J., Ilanne-Parikka P., Keinänen-Kiukaanniemi S., Peltonen M., Pivodic A., Lindström J. The Association between HbA1c, Fasting Glucose, 1-Hour Glucose and 2-Hour Glucose during an Oral Glucose Tolerance Test and Cardiovascular Disease in Individuals with Elevated Risk for Diabetes. PLoS One. 2014 Oct 6;9(10).
- Logue JN. The public health response to disasters in the 21st century: reflections on Hurricane Katrina.J Environ Health. 2006 Sep;69(2):9-13, 26.
- Margolis HS, Alter MJ, Hadler SC. Hepatitis B: evolving epidemiology and implications for control. Sem Liver Dis 1991; 2: 84-92.HEPATITES.
- Munger KL, Köchert K, Simon KC, Kappos L, Polman CH, Freedman MS, Hartung HP, Miller DH, Montalbán X, Edan G, Sandbrink R, Pohl C. Molecular mechanism underlying the impact of vitamin D on disease activity of MS. Ann Clin Transl Neurol. 2014
- Ochnio JJ, Scheifele DW, Ho M. Hepatitis A virus infection in urban children - are preventive opportunities being missed? J Infect Dis 1997; 176: 1610-3.
- Portal do Instituto Nacional de Estatística -www.ine.pt
- Reifsnider E1, Bishop SL, An K, Mendias E, Welker-Hood K, Moramarco MW, Davila YR. We Stop for No Storm: Coping with an Environmental Disaster and Public Health Research. Public Health Nurs. 2014 Oct 5.

- Risk Manag Healthc Policy. 2014 Sep 24;7:163-75. Evidence from the national health account: the case of Dubai.
- Singh G, Helman D, Brady SK. American College of Physicians, Hawai'i Chapter, Annual Meeting 2014. Hawaii J Med Public Health. 2014 Sep;73(9 Suppl 1):2.
- Soilu-Hänninen M1, Aivo J, Lindström BM, Elovaara I, Sumelahti ML, Färkkilä M, Tienari P, Atula S, Sarasoja T, Herrala L, Keskinarkaus I, Kruger J, Kallio T, Rocca MA, Filippi M. A randomised, double blind, placebo controlled trial with vitamin D3 as an add on treatment to interferon β -1b in patients with multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012 May;83(5):565-71.
- Stroffolini T, Cialdea L, Catapano R, Palumbo F, Novaco F et al. Incidence and risk factors of acute Delta hepatitis in Italy: Results from a national surveillance system. J Hepatol 1994; 21: 1123-6.
- Stuyver L. Genótipos de VHC e métodos de genotipagem. News Lab 1996; 15: 147-52.
- Wei J1, Hansen A, Zhang Y, Li H, Liu Q, Sun Y, Xue S, Zhao S, Bi P. PLoS One. 2014 Oct 6;9(10). The Impact of Climate Change on Infectious Disease Transmission: Perceptions of CDC Health Professionals in Shanxi Province, China.

EDUCAÇÃO PERMANENTE COMO UM INSTRUMENTO PARA A PERCEPÇÃO DE RISCOS E PREVENÇÃO DE DESASTRES NATURAIS BIOLÓGICOS EM VIAGENS PARA A PRÁTICA DESPORTIVA

Joilma Nogueira do Espírito Santo

Universidade Federal Fluminense

joilmanogueira@gmail.com

Benedito Carlos Cordeiro

Universidade Federal Fluminense

bcordeiro@id.uff.br

Alcineá Rodrigues Athanázio

Universidade Federal Fluminense

alcinea_rodrigues@hotmail.com

RESUMO

Introdução: nos últimos anos houve um aumento de casos de desastres no mundo. Diante dessa problemática, surge a necessidade de Educação Permanente (EP) como um instrumento para a percepção de riscos e prevenção desses eventos. **Objetivos:** apontar e relatar a percepção que os professores de Educação Física (EF) do Instituto Federal Fluminense (IFF) possuem sobre desastres naturais biológicos; Identificar e descrever os riscos de desastres naturais biológicos encontrados em viagens para a prática desportiva; Implementar por meio de Educação a Distância a EP em desastres naturais biológicos para os professores de EF do IFF, com base nos riscos encontrados em viagens para a prática desportiva. **Método:** abordagem qualitativa, estudo descritivo e exploratório, com a utilização de pesquisa bibliográfica e entrevista semiestruturada a ser realizada no Brasil. **Resultado:** espera-se contribuir para o sucesso da proposta de Educação Permanente em Saúde visando capacitar os professores de EF.

Palavras-chave: desastres naturais; educação continuada; educação em desastres; professores.

Introdução

Desastre é definido como o “resultado de evento adverso, natural ou provocado pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais” (Brasil, 2007, p. 9).

Segundo o banco de dados internacional EMDat (*Emergency Events Database*), entre 2000 e 2007, foram registrados 36 desastres provocados por enchentes, estiagens e deslizamentos de terra que, juntos, afetaram mais de 1,5 milhões de pessoas. (Marcelino, 2006). Nota-se que os dados apresentados apontam a ocorrência dos desastres mais comuns no país.

Existe uma tendência na sociedade brasileira a achar que são desastres somente os acidentes decorrentes de chuvas, de seca ou de eventos climáticos em geral. Essa percepção equivocada tem levado muitas cidades que não sofrem com essas situações a não se organizarem para responder sistemicamente as inúmeras ameaças e vulnerabilidades existentes (Ceped, 2011).

No entanto, é importante ressaltar que a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE) possui 104 desastres (incluindo categoria, grupo, subgrupo, tipo e subtipo) e, entre eles, encontram-se os desastres naturais biológicos que compreendem as Epidemias e as Infestações/Pragas.

A Instrução Normativa nº 001/2012 em seu Art. 7º define desastres naturais como “aqueles causados por processos ou fenômenos naturais que podem implicar em perdas humanas ou outros impactos à saúde, danos ao meio ambiente, à propriedade, interrupção dos serviços e distúrbios sociais e econômicos” (Brasil, 2012, p. 30). Quando os desastres naturais estão

relacionados a causas biológicas, podem causar uma dificuldade de controle de surtos intensificados de doenças transmissíveis, que tendem a agravar endemias ou a criar condições favoráveis à disseminação de surtos epidêmicos (Castro, 2004).

Com base nas informações acima, pode-se perceber que os desastres naturais biológicos também exigem maior atenção não só dos gestores públicos, mas também da sociedade brasileira em geral. É preciso que ações educativas de percepção e prevenção sejam implementadas para que todos estejam atentos e preparados para responder a esses eventos que potencialmente podem ocorrer.

Partindo das informações apresentadas é possível perceber que prevenir é a melhor solução. É por meio de medidas educativas que será possível trabalhar antes que o desastre ocorra, evitando que o caos se instale e que vidas sejam perdidas. Nesse contexto, destaca-se a necessidade de Educação Permanente para a percepção de riscos e prevenção de desastres.

A Educação Permanente é definida como “aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho” (Brasil, 2009, p. 20).

Levando esse contexto de educação permanente para o ambiente escolar, é possível refletir sobre a necessidade de adotar medidas, a fim de ampliar a percepção de riscos de desastres e assim reduzir os seus efeitos.

A percepção sobre a realidade está relacionada com o modo como se aprende e de como a pessoa foi educada. Existe também a influência das experiências anteriores e da forma como se aprende a ver o mundo. Por isso, a percepção orienta a tomada de decisão referente ao que se percebe. Sendo assim, “o modo como as pessoas percebem os fatores de riscos e o quanto estão vulneráveis aos mesmos, influencia os seus comportamento de autocuidado e proteção, e na constituição de uma cultura de redução de riscos” (Ceped, 2012, p. 7).

Habitualmente a mídia expõe somente informações relacionadas aos riscos de desastres provocados por deslizamentos, tempestades, inundações e enxurradas. Assim, ela acaba privilegiando informações e, de certa forma, faz com que as pessoas selecionem quais os riscos que merecem maior atenção. Desta forma, a percepção dos riscos de desastres naturais biológicos precisa ser ampliada e isso depende de estratégias de educação para que haja a possibilidade de entendimento e controle da problemática em questão.

Deste modo justifica-se a importância deste projeto de dissertação de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde, uma vez que a proposta de educação permanente para a percepção de riscos e prevenção de desastres naturais biológicos em viagens para a prática desportiva poderá promover um ambiente de problematização e capacitação para os professores de educação física, articulando a escola bem como os seus alunos, iniciando assim uma rede de multiplicadores em saúde.

Questões Norteadoras

Qual a percepção que os professores de educação física possuem sobre desastres naturais biológicos? Como identificar e descrever os riscos de desastres naturais biológicos encontrados em viagens para a prática desportiva? Como implementar a educação permanente em desastres naturais biológicos para os professores de educação física?

Objetivo Geral

Implementar a política de Educação Permanente dos professores de educação física do Instituto Federal Fluminense (IFF), visando contribuir para a percepção de riscos e prevenção da ocorrência de desastres naturais biológicos em viagens para a prática desportiva.

Objetivos Específicos

Apontar e relatar a percepção que os professores de educação física possuem sobre desastres naturais biológicos; identificar e descrever os riscos de desastres naturais biológicos encontrados em viagens para a prática desportiva; implementar por meio de Educação à Distância a educação permanente em desastres naturais biológicos para os professores de educação física, com base nos riscos encontrados em viagens para a prática desportiva.

Procedimentos Metodológicos

A pesquisa terá como base uma abordagem qualitativa do tipo pesquisa de campo, o tipo de estudo será o descritivo e exploratório e será utilizado como técnica de coleta de dados a entrevista semi-estruturada que será gravada e a pesquisa bibliográfica.

O cenário de pesquisa será o Instituto Federal Fluminense Campus Campos Centro, localizado no município de Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Os sujeitos da pesquisa serão servidores docentes da área de educação física que atuam no cenário informado acima, que interagem com os alunos participantes de práticas desportivas e que realizam viagens para esse fim. Serão convidados aproximadamente 20 servidores.

A análise dos dados será realizada de acordo com as técnicas de coleta. Para estruturar a percepção que os sujeitos possuem sobre os riscos de desastres naturais biológicos identificados na primeira técnica e os riscos deste tipo de desastre em viagem para a prática desportiva identificados na segunda técnica, será realizada a análise de conteúdo.

Como instrumento de coleta de dados será utilizada a entrevista semi-estruturada, com a finalidade de identificar junto aos sujeitos, como eles percebem os riscos de desastres naturais biológicos em viagens para a prática desportiva e o que eles sabem sobre a prevenção desse tipo de desastre; será utilizada também a pesquisa bibliográfica com a finalidade de identificar e descrever os riscos de desastres naturais biológicos encontrados em viagens para a prática desportiva.

Seguindo este raciocínio, este estudo terá como referência de análise a obra de Laurence Bardin considerando ser uma literatura de referência muito utilizada atualmente em análise de conteúdo, visando atingir os objetivos propostos.

Conclusão

Esta pesquisa irá contribuir para o enriquecimento da proposta de Educação Permanente em Saúde visando capacitar os professores de educação física e avaliando os resultados que a Política de Educação Permanente proporciona na qualificação profissional. Acredita-se que o presente estudo será um instrumento a viabilizar ferramentas para a Educação Permanente dos servidores docentes do Instituto Federal Fluminense, que atuam na área de educação física para que eles sejam facilitadores do conhecimento de saúde na escola, auxiliando na construção de um saber apropriado, amplo, diversificado e resolutivo sobre o risco de desastres naturais biológicos, de forma a favorecer a instituição de ensino em questão e, consequentemente, o município onde esta se encontra, uma vez que outras instituições também poderão ser beneficiadas posteriormente com os resultados desta pesquisa.

Bibliografia

Brasil, (2012) - *Instrução Normativa nº 001, de 24 de agosto de 2012*. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil.. Diário Oficial da União. Seção 1, n. 169, quinta-feira, 30 de

- agosto de 2012. Retrieved March 04, 2014 from the World Wide Web: http://www.defesacivil.sp.gov.br/v2010/porta_defesacivil/conteudo/documentos/InstrucaoNormativa24082012.pdf
- Brasil, (2007) - *Manual de Medicina de Desastres*. Brasília: Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil, volume 1. 3. Ed, [91] p. Retrieved February 28, 2014 from the World Wide Web: http://www.integracao.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=06e97a88-cd47-4d68-a0a8-844eef352f7&groupId=10157
- Brasil, (2009) - *Política Nacional de Educação Permanente em Saúde*. Distrito Federal, Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação em Saúde.. Série B. Textos Básicos de Saúde Série Pactos pela Saúde 2006, v. 9.
- Castro, A.L.C. (2004) - *Manual de desastres: desastres humanos de natureza biológica*. Brasília (DF): Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. [158] p. . Retrieved March 04, 2014 from the World Wide Web: http://www.esdec.defesacivil.rj.gov.br/documentos/publicacoes_da_secretaria_nacional/9_desbiologicos.pdf
- Ceped, UFSC. (2011) - *Capacitação Básica em Defesa Civil*. Florianópolis, Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres. Universidade Federal de Santa Catarina, textos Alexandre Lucas Alves, Juliana Frandalozo Alves dos Santos e Sarah Marcela Chinchilla Cartagena. Retrieved February 27, 2014 from the World Wide Web: http://ceped.ufsc.br/sites/default/files/projetos/pr_-_2011.106_-_conteudo_completo_0.pdf
- Ceped, UFSC. (2012) - *Mobilização comunitária e comunicação de risco para a redução de riscos de desastres*. Florianópolis, Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres. Universidade Federal de Santa Catarina, texto Juliana Frandalozo Alves dos Santos. [16] p. : il. color. ; 21 cm. - (Redução de Riscos de Desastres na Prática). Retrieved February 27, 2014 from the World Wide Web:http://www.ceped.ufsc.br/sites/default/files/projetos/mobilizacao_comunitaria_e_comunicacao_de_risco_0.pdf
- Marcelino, E.V., Nunes, L.H., Kobiyana, M. (2006) - Banco de dados de desastres naturais: análise de dados globais e regionais. *Revista on line Caminhos da Geografia*. 6(19):130-149. Retrieved March 01, 2014 from the World Wide Web: http://www.inpe.br/crs/geodesastres/conteudo/artigos/Marcelino-et al_2006_Banco_de_dados_de_desastres_naturais.pdf

ELETROMAGNETIC FIELDS AND ENVIROMENTAL NOISE: HUMAN HEALTH IMPACTS IN SERZEDELO, GUIMARÃES (PORTUGAL)

Juliana Araújo Alves

PhD Student at the Department of Geography, University of Minho
jalves.geografia@gmail.com

Lígia Torres Silva

School of Engineering, University of Minho
lsilva@civil.uminho.pt

Paula Cristina Remoaldo

Institute of Social Sciences, University of Minho
premoaldo@geografia.uminho.pt

ABSTRACT

The present paper investigates the risks that arise from exposure to noise from powerpoles and powerlines in Serzedelo, in the municipality of Guimarães, in Portugal. This research focused on four guiding questions: Can powerlines cause noise? Do powerlines cause discomfort? Do powerlines cause discomfort due to noise? And can powerlines effect human health? Two groups were the basis of the study: people that were *exposed* to electromagnetic waves and people that were *not*. The research pointed to the harmful influence of the presence of powerlines and high-voltage masts in residential areas and the damage to the cells in the human body. This type of environmental noise, which has the spectral content of a low frequency, typically tonal noise and a very high speed of propagation, is a complex source to explain in terms of the health profiles of the human population living in Serzedelo, located in an area that is densely occupied by high voltage powerlines and powerpoles.

Keywords: environmental noise, low frequency noise, electromagnetic fields, human health, poles and powerlines.

Introduction

This paper discusses a complex issue that involves the effects of electromagnetic fields and low frequency noise coming from high and very high voltage electrical powerpoles and powerlines in Serzedelo, a municipality of Guimarães, in Portugal. This territory is suffering from important population pressures in Portugal and is intersected by high concentrations of high and very high voltage powerpoles and powerlines. More specifically, there are four powerlines that are 400kv and 9 powerlines that are 150kv.

The process of the production, transmission and use of electricity is associated with the generation of electric, magnetic and electromagnetic fields. In Portugal, the electricity supply comes through a 50Hz frequency current, which is considered to be a high or very high voltage current. This often places the process of the production, transmission and supply of electricity in the range of low frequency. The electric field formed by these powerlines and powerpylons can ionize air molecules and cause a low frequency noise. This ionization occurs in a thin crown of air around the conductors; it is termed the crown or corona effect. This ionized air can be spread by the wind up to a few kilometres away (Sá, 2008). According to Berglund et al. (1996), the low frequency noise is conceptualized as an unpleasant sound containing major components within a specific frequency range (<500 Hz, including infrasound).

The concept of risk

The classical approach of risks can be distinguished into three phases of epistemological interpretation. The first phase corresponds to the hazard paradigm (Parker, 2000), with a focused vision in nature that prevailed until the 1970s. The second phase considers the anthropic dimension in the process production risk. Finally, the third phase, from 1990, corresponds to an integrated approach to natural hazards and their management, the complexity of causal relationships and the recontextualization risks throughout the social system (Pelling, 2003; Vinet, 2007). The concept of the adopted risk is comprised of the invisible risks from the impact of the exposure to noise from powerpoles and powerlines. In this sense, it is a risk nature built and is comprised of a system of risk that is inserted into a spatio-temporal context, and therefore, is liable to suffer interference from other processes.

LFN and effects in human health

Noise exposure has harmful effects and constitutes a risk factor for human health. Some authors have treated these effects under the names of *vibroacoustic disease* (Castelo Branco; Alves-Pereira, 2004), *vibroacoustic syndrome or pathology vibronoise* (Grechkovskaia et al., 1997), and systemic pathology, encompassing the entire organism, characterized by the abnormal proliferation of extra-cellular matrices, caused by excessive and prolonged exposure to low frequency noise (LFN) (Alves-Pereira, 1999; Castelo Branco; Alves-Pereira, 2004).

Since the 1920s, there have studies conducted on the physiological effects of noise on human health arising from different sources (Laird, 1928; Dart, 1946; Rumancev 1961; Cohen, 1976; Grechkovskaia et al., 1997; Balunov et al., 1998; Magomedov et al., 1997; Izmerov et al., 1997). Despite the record number of studies over the past century on the effects of low frequency noise on the impact on human health, there are still no references to LFN from the electromagnetic fields of the powerpoles and powerlines and their corresponding effects on human health. The electric, magnetic and electromagnetic fields are physical agents associated with the use of electricity for the transmission and transportation of energy (low frequency, 60 Hz). These fields interact with living beings, in general, and the human body, in particular, causing harm by inducing electrical currents that exceed the shielding skin, damaging cells and the most sensitive organs (Déoux and Déoux, 1996, WHO, 1998). The noise study focused on the low frequency range below 500Hz, as these are the characteristics of the source.

Materials and methods

The methodology used for the monitoring of the environmental noise was grounded in the document prepared by the Agência Portuguesa do Ambiente (Portuguese Environment Agency) and supported by the company, Redes Energéticas Nacionais (National Energy Networks), titled the *Methodological Guide for Assessing the Environmental Impact of Infrastructure of the National Network of Transmission of Electricity*. The methods adopted and the methodological procedures used are described in *Annex LA 21*, which deals with the parameters monitored in the soundstage.

The methodology described in the document has been alluded to in the Portuguese applicable standards; it has undergone some minor changes. Among these changes are the query to the meteorological data of the Instituto Português do Mar e da Atmosfera (Portuguese Institute of Ocean and Atmosphere), the measurement frequency and the measurement L_{Aeq} .

The measuring points were selected based on the methodology used by Azevedo (2010) about exposure to electromagnetic fields in Serzedelo, Guimarães. This included exposed (e.g. domiciled within 50 meters) and unexposed (e.g. domiciled a distance equal to or greater than 250 meters). A field measurement of LAeq was taken using a sound level meter of class 1 and a tripod. Measurements were performed at two intervals of 10 minutes each, for the first measurement and the second frequency measurement LAeq. The measurements were made on typical days. In each case, the measurement height was 1.5 m; it was carried out away from the facade of the buildings (4 m) and the reflective surfaces.

Discussion and conclusions

Loud noise causes many disturbances in the human system. These include mood changes, irritability and interference with the metabolism in terms of risk of cardiovascular disorders. Sound pressure levels above 65 dB (A) can corroborate to increase the cases of insomnia, stress, irritability and aggressive behavior. Levels above 75 dB (A) can generate problems of hypertension and deafness (Laird, 1928; Dart, 1946; Rumancev 1961; Cohen, 1976; Grechkovskaia et al., 1997; Izmerov et al., 1997; Magomedov et al., 1997; Balunov et al., 1998; Alves-Pereira, 1999; Castelo Branco and Alves-Pereira, 2004). In Serzedelo, 9 points were selected for the measurement of environmental noise. Measurements were performed during three collection activities: June 26, July 3, and July 8, 2014. A spectral analysis was used to verify the spectral composition of the two groups in the analysis. It was performed on the same day of the measurement with the same weather conditions and different terrains (Figure 1).

Figure 1: Spectral analysis of the first, second and third block

Although the data presented little distinction about the two groups in the analysis (Azevedo, 2010), some concluding notes were exposed. More specifically, in both of the groups, the analysis of higher intensities was concentrated in the low frequency. This can have two plausible explanations. The first is that noise in the low frequency area is not the exposed group from another source. The second is the need to redefine the radius of the exposed and unexposed

groups. The spectral analysis of the third block distinguishes the features of the previous measurements. The particularity of this analysis is found in high levels in the exposed group in the low frequency and was higher than the unexposed group. In the case of this analysis, it is assumed that the capacity of the high voltage powerpole can reveal significant aspects. For example, the powerpoles with a very high tension of the emitters can be perceived as noise, and as the spectral analysis of the measurement block, display intensities were higher in the low and high frequency in the exposed group and the medium frequency in the unexposed group.

Rescuing the guiding questions, some observations can be drawn: a) Do powerlines of high and extra high voltage cause noise? Yes, powerlines of high and extra high voltage cause low frequency noise; this was observed in the measurements made; b) Do powerlines of high and extra high voltage cause discomfort? A range of studies have reinforced the assertion that the low frequency noise causes harmful effects on human health. The powerlines of high and extra high voltage cause discomfort, as can be seen in two interviews conducted during the activity in situ; c) Do powerlines of high and extra high voltage cause discomfort due to noise? Yes, the sixth measurement enabled us to verify the existence of noticeable noise; testimony from residents was also collected about noise nuisance from the powerpoles; d) Do powerlines of high and extra high voltage cause impacts on human health? A series of studies, including the World Health Organization (WHO), has warned people about the harmful human health effects of exposure to electromagnetic field effects.

Acknowledgements

To CAPES for the doctoral scholarship in Geography for Juliana Alves Araújo (BEX-1684-13 / 2).

References

- Alves-Pereira M (1999). Noise-induced extra-aural pathology: a review and commentary. *Aviat Space Environ Med*, 70: A7-A21.
- Azevedo, Bruno F. O (2010). *O impacto do lugar na saúde da população do concelho de Guimarães - estudo de caso do electromagnetismo em Serzedelo*. Portugal: Universidade do Minho.
- Balunov VD, Barsukov AF, & Artamonova VG. (1998). Clinical and functional evaluation of health status of workers exposed to infrasound, noise and general vibration. *Medizina Truda Prom Ekologie*, 5: 22-6.
- Berglund, B. Hassmén, P.: Job Soames, R.G (1996). Sources and effects of low frequency noise. *J. Acoust. Soc. Am.* v. 99, n. 5. may.
- Castelo Branco; NAA; Alves-Pereira, M (2004). Vibroacoustic disease. *Noise & Health*, 6 (23): 3-20.
- Cohen A. (1976). The influence of a company hearing conservation program on extra-auditory problems in workers. *Journal of Safety Research*, 8: 146-62.
- Dart, EE. (1946) Effects of high speed vibrating tools on operators engaged in airplane industry. *Occupational Medicine*, 1: 515-50.
- Déoux, S.; Déoux, P. (1996). *Ecologia é a Saúde*, Lisboa, Instituto Piaget.
- Grechkovskaia NV & Parpalei IA. (1997). The impact of the working conditions on morbidity in workers in jobs hazardous for vibration and noise in aviation enterprises. *Lik Sprava*, 5: 20-3.
- Izmerov NF, Suvorov GA, Kuralesin NA, & Ovakimov VG. (1997). Infrasound: body's effects and hygienic regulation. *Vestn Ross Akademii Meditsiny Nauk*, 7: 39-46.
- Laird DA. (1928). Experiments on the physiological cost of noise. *Journal of the National Institute of Industrial Psychology*, 4: 251-58.

- Magomedov MM & Kunel'skaia NL. (1997). Early diagnosis of sensorineural hearing loss among female workers of textile factories. *Vestn Otorinolaringologie*, 5: 8-11.
- Parker D. J. (dir.) (2000). *Floods*. Routledge: London, 2 vol..
- Pelling M (2003). *The vulnerability of cities. Natural disaster and social resilience*. Earthscan Publications Ltd.
- Sá, JLCP (2008). *Campos electromagnéticos de extremamente baixa frequência, saúde pública e linhas de alta tensão*. Portugal: Instituto Superior Técnico.
- Vinet F (2007). *Approche institutionnelle et contraintes locales de la gestion du risque*. Recherches sur le risque inondation en Languedoc-Roussillon. Mémoire d'habilitation à diriger des recherches (HDR). Université Paul-Valéry Montpellier III. Montpellier.
- WHO (1998). *Extremely Low Frequency* - Fact Sheet nº 205. Disponível em: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs205/en/>

CONFORTO TÉRMICO NA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES DE SAÚDE E SEGURANÇA: REVISÃO DA LITERATURA

Mariana Morgado

DEGEI, Universidade de Aveiro
marianafmorgado@ua.pt

Leonor Teixeira

DEGEI-IEETA, Universidade de Aveiro
lteixeira@ua.pt

Mário talaia

Departamento de Física, CIDTFF, Universidade de Aveiro
mart@ua.pt

RESUMO

O estudo do conforto térmico, ligado à ergonomia e saúde ocupacional, tem sido alvo de diversas investigações tendo em conta o seu impacto na segurança conforto e saúde dos ocupantes de um determinado espaço. Assim, o presente trabalho de investigação apresenta numa breve revisão da literatura deste tema com o intuito de dar a conhecer o que tem sido desenvolvido ao nível do estudo do conforto térmico em espaços fechados e não fechados, mostrando como é que os indivíduos reagem e interagem termicamente com o ambiente que os rodeia, seja em condições de conforto ou *stress* térmico.

Palavras-chave: Ambiente térmico, Conforto Térmico, Stress Térmico, Índices Térmicos

Introdução

A sociedade atual, fortemente afetada pela globalização, é caracterizada por uma crescente preocupação com as gerações vindouras, nomeadamente no que diz respeito às questões ambientais. Neste sentido, a comunidade científica e profissionais de várias áreas e diversos grupos ambientalistas têm lutado para o desenvolvimento e criação de condições mais *green* que contribuam para a sustentabilidade do planeta terra.

O estudo de maximização do conforto térmico de espaços, associado à necessidade de redução de consumos energéticos (Castilla et al., 2011; Daum, Haldi, & Morel, 2011), tem sido alvo de investigação nos mais variados contextos, com o intuito de desenvolver soluções arquitetónicas que garantam a segurança, o conforto e a saúde dos indivíduos. Para além disto, este tipo de estudos, geralmente associados à ergonomia e saúde ocupacional, são fulcrais para que as pessoas que habitam um determinado espaço se sintam bem e estejam providas de todas as condições de saúde e segurança, tendo como base a compreensão das reações dos indivíduos, bem como a sua adaptação às diferentes condições ambientais que circundam um determinado espaço ocupacional.

Assim, pretende-se com este trabalho dar a conhecer o que tem sido desenvolvido ao nível do estudo do conforto térmico em espaços fechados e não fechados, mostrando como é que os indivíduos reagem e interagem termicamente com o ambiente que os rodeia, seja em condições de conforto, ou mesmo de *stress* térmico.

Conforto térmico

Segundo Emmanuel (2005) o tema do conforto térmico começou a ser estudado por arquitetos e *designers* como consequência da urbanização. No entanto, foi com os estudos de Fanger

(1972) que a investigação neste domínio ganhou relevo e seguidores, tanto na área da meteorologia, como nas áreas da medicina, da arquitetura, da engenharia, entre outras.

O conforto térmico pode ser definido como a satisfação de um indivíduo quando exposto a um determinado ambiente térmico (ASHRAE, 2001; ASHRAE 55, 2004; Chow *et al.*, 2010). A sensação térmica está relacionada com o balanço térmico do corpo humano (ser homeotérmico) e, por isso, é muito própria de cada indivíduo, dependendo de vários fatores, quer do ambiente térmico, quer mesmo de factores pessoais, como por exemplo, fatores físicos, psicológicos e fisiológicos (Castilla *et al.*, 2011). O ambiente térmico consiste no conjunto de variáveis termohigrométricas, como por exemplo, a temperatura do ar, a temperatura média radiante, a velocidade do ar e a humidade relativa do ar, que influenciam direta ou indiretamente o ser humano e o seu comportamento.

Stress Térmico

De acordo com vários autores o *stress* térmico é o estado de insatisfação de um indivíduo quando exposto a ambientes térmicos extremos de frio ou calor (Teixeira, Talaia, & Morgado, 2014). As condições de *stress* térmico reduzem os índices de produtividade e aumentam os comportamentos de risco e a probabilidade de acidentes de trabalho (Riniolo & Schmidt, 2006). No entanto, o corpo humano, quando exposto a estes dois tipos de ambientes desencadeia ações de regulação adequadas a partir do sistema termorregulador do organismo e do comportamento. Contudo, em determinadas situações, o permanente contacto com este tipo de ambientes pode desencadear doenças e, em casos extremos até pode levar à morte (ASHRAE, 2001).

Espaços fechados e não fechados

Segundo Hoppe (2002), e principalmente nos países mais industrializados, as pessoas passam mais tempo em espaços fechados do que em espaços abertos. Este facto é devido ao estilo de vida e ao controlo térmico dos mesmos, sendo mais fácil experienciar sensações de conforto térmico num espaço onde os ocupantes têm controlo do ambiente que os rodeia - espaços interiores (Akimoto, Tanabe, Yanai, & Sasaki, 2010). Contudo, para a climatização de espaços interiores é necessário ter em conta os espaços exteriores em redor, uma vez que estes exercem sempre influência sobre o ambiente dos espaços interiores (Yao, Li, & Liu, 2009).

Ambientes distintos são percebidos pelos seus ocupantes de formas distintas. De acordo com o Hoppe (2002) existem três aspetos fundamentais que justificam a diferença de comportamentos e sensação de conforto por parte dos ocupantes dos espaços interiores e exteriores, aspetos psicológicos, aspetos fisiológicos e aspetos energéticos. No que diz respeito às razões psicológicas estas relacionam-se com as expectativas do ser humano (razão de estar num determinado local), prendendo-se com as suas experiências pessoais. As questões fisiológicas caracterizam-se pelo tempo de exposição ao ambiente. As razões energéticas estão relacionadas com a regulação térmica do ser humano, a qual é distinta de indivíduo para indivíduo.

Adaptação dos ocupantes aos espaços

Os ocupantes dos espaços ajustam-se aos estímulos ambientais de forma a manter e melhorar o seu bem-estar. De acordo com o IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (2012) a adaptação consiste no ajustamento dos indivíduos ao ambiente atual assim como aos seus

efeitos, realçando a intervenção humana no sentido de facilitar o ajustamento ao ambiente esperado. Para Liu et al. (2012) e Yao et al. (2009) a adaptação do ser humano ao ambiente em seu redor pode ser de três tipos: psicológicas, fisiológicas e comportamentais. A adaptação fisiológica pode acontecer através da adaptação genética, isto é, de geração para geração, ou através de aclimatização, que consiste no processo de adaptação de um organismo vivo a uma alteração de ambiente (Gosling et al., 2014). Alguns exemplos de adaptação fisiológica são a transpiração, vasoconstricção e a vasodilatação. A adaptação comportamental consiste em ações conscientes ou inconscientes em rotinas diárias como são exemplo a troca de roupa, a abertura de janelas, o consumo de bebidas quentes/frias e a cultura (Yao et al., 2009). A adaptação psicológica é a mais difícil de ser medida, estando relacionada com uma alteração de percepção ou reação a um estímulo sensorial devido a experiências térmicas pessoais.

Metodologias de estudo para o ambiente térmico e sensação térmica

Diversas têm sido as metodologias aplicadas para o estudo dos vários tipos de espaços, fechados e não fechados e da sensação térmica dos ocupantes dos mesmos. A aplicação de índices térmicos destaca-se como a metodologia mais utilizada para este tipo de investigações. A tabela I apresenta alguns exemplos.

Tabela I- Índices térmicos e variáveis recolhidas para o estudo do ambiente térmico e sensação térmica

Autor	Contexto	Objetivos	Índices térmicos		Variáveis recolhidas
			Ambiente térmico	Sensação térmica	
Nogueira et al. (2014)	AeroStep (sala de fitness)	Avaliar a sensação térmica das praticantes de AeroStep	EsConTer; ITH (índice temp. e humidade)	Escala de cores associada ao EsConTer	temperatura do ar; humidade relativa do ar; sensação térmica (questionário)
Bakar et al. (2010)	Indústria automóvel da Malásia (espaço interior)	Determinar o conforto térmico dos trabalhadores da empresa	WBGT (<i>wet bulb globe temperature</i>);	PMV (<i>predicted mean vote</i>); PPD (<i>predicted percentage dissatisfied</i>); escala sétima de sensação térmica de ASHRAE	velocidade do ar (m/s); Humidade relativa do ar (%); temperatura média radiante; temperatura do ar; nível de atividade (met); isolamento do vestuário(clo)
Pereira (2013)	Salas de aula de escolas públicas	Avaliar o desempenho da ventilação natural para a promoção de conforto térmico de salas de aula de escolas públicas		PMV; PPD; escala sétima de sensação térmica de ASHRAE	temperatura do termómetro húmido; temperatura do ar; temperatura do globo; sensação térmica (questionário)
Lin et al. (2010)	Espaço exterior- Campus da <i>National Formosa University</i> , Taiwan	Análise do efeito da sombra em ambientes exteriores, baseado no intervalo de conforto dos habitantes de Taiwan.	PET (<i>physiologically equivalent temperature</i>);	Escala sétima de sensação térmica de ASHRAE	temperatura média do globo; temperatura do ar; humidade relativa do ar; temperatura média radiante; velocidade do ar; isolamento do vestuário (clo); metabolismo (met); SVF (<i>sky view factor</i>)
Akimoto et al. (2010)	Escritório	Estudo da influência do comportamento e controlo da climatização na sensação de conforto dos trabalhadores.		escala sétima de sensação térmica de ASHRAE	temperatura horizontal; humidade relativa do ar; temperatura vertical; velocidade do ar; temperatura média radiante; isolamento do vestuário (clo); metabolismo (met); sensação térmica (questionário)

Conclusão

O grande objetivo do estudo de conforto térmico é criar ambientes que satisfaçam o maior número de ocupantes de um espaço, seja ele interior ou exterior (Parsons, 2000). Tendo por

base estas observações, é compreensível aceitar a existência de diferentes zonas de conforto térmico, isto é, de diferentes intervalos na literatura consultada visto que depende de componentes subjetivas e individuais ou quaisquer especificidades locais/contexto (Starling, Mendonça, Alsina & Monteiro, 2013). Neste sentido, a metodologia de estudo aplicada em determinado caso de estudo deverá ser ajustada ao local em estudo e essencialmente à sensação térmica dos seus ocupantes para criar espaços cada vez mais confortáveis e que assegurem condições de segurança e saúde.

Bibliografia

- Akimoto, T., Tanabe, S., Yanai, T. & Sasaki, M. (2010). Thermal comfort and productivity - Evaluation of workplace environment in a task conditioned office. *Building and Environment*, 45(1), 45-50. doi:10.1016/j.buildenv.2009.06.022
- ASHRAE. (2001). Thermal Comfort. In American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (2001 ASHRA.). Colorado 80112-5776 USA: Englewood.
- ASHRAE 55. (2004). Thermal environmental conditions for human occupancy. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.
- Bakar, R. a, Jusoh, N., Makhtar, N. K., Rahman, M. N. & Meier, C. (2010). Thermal comfort assessment: A case study at Malaysian automotive industry. *American Journal of Applied Sciences*, 3(8), 1495-1501. Retrieved from <http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-77950998262&partnerID=40&md5=e5cdd7927be98e474963978f49f4af83>
- Castilla, M., Álvarez, J. D., Berenguel, M., Rodríguez, F., Guzmán, J. L. & Pérez, M. (2011). A comparison of thermal comfort predictive control strategies. *Energy and Buildings*, 43(10), 2737-2746. doi:10.1016/j.enbuild.2011.06.030
- Chow, T. T., Fong, K. F., Givoni, B., Lin, Z. & Chan, a. L. S. (2010). Thermal sensation of Hong Kong people with increased air speed, temperature and humidity in air-conditioned environment. *Building and Environment*, 45(10), 2177-2183. doi:10.1016/j.buildenv.2010.03.016
- Daum, D., Haldi, F. & Morel, N. (2011). A personalized measure of thermal comfort for building controls. *Building and Environment*, 46(1), 3-11. doi:10.1016/j.buildenv.2010.06.011
- Emmanuel, R. (2005). Thermal comfort implications of urbanization in a warm-humid city: the Colombo Metropolitan Region (CMR), Sri Lanka. *Building and Environment*, 40, 1591-1601. doi:10.1016/j.buildenv.2004.12.004
- Fanger, P. (1972). Thermal Comfort (2nd editio.). New York: McGraw-Hill.
- Gosling, S. N., Bryce, E. K., Dixon, P. G., Gabriel, K. M. a, Gosling, E. Y., Hanes, J. M., & Wanka, E. R. (2014). A glossary for biometeorology. *International journal of biometeorology* (Vol. 58, pp. 277-308). doi:10.1007/s00484-013-0729-9
- Lin, T.-P., Matzarakis, A. & Hwang, R.-L. (2010). Shading effect on long-term outdoor thermal comfort. *Building and Environment*, 45(1), 213-221. doi:10.1016/j.buildenv.2009.06.002
- Liu, J., Yao, R., Wang, J. & Li, B. (2012). Occupants' behavioural adaptation in workplaces with non-central heating and cooling systems. *Applied Thermal Engineering*, 35, 40-54. doi:10.1016/j.applthermaleng.2011.09.037
- Nogueira, J. & Talaia, M. (2014). Influence of hot thermal environment in practice of Aerostep. In G. Perestrelo P. Arezes, J. S. Baptista, M. P. Barroso, P. Carneiro, P. Cordeiro, N. Costa (Ed.), *Occupational Safety and Hygiene* (pp. 473-477) (pp. 473-477). London: CRC Press Taylor & Francis group.
- Parsons, K. (2000). Environmental ergonomics: a review of principles, methods and models. *Applied Ergonomic*, 31, 581-594.

- Pereira, D. (2013). Climatic process and their effects on thermal dissipation in classrooms at public schools. In Sho'13-International Symposium on Occupational Safety and hygiene. Guimarães, Portugal.
- Peter, H. (2002). Different aspects of assessing indoor and outdoor thermal comfort. *Energy and Buildings*, 34, 661-665.
- Riniolo, T. C. & Schmidt, L. A. (2006). Chronic heat stress and cognitive development: An example of thermal conditions influencing human development. *Developmental Review*, 26, 277-290.
- Starling, Mendonça, V., Alsina, O. & Monteiro, L. (2013). Ergonomic Analysis at a Working Station Located in a Technology an Information Management Company from Sergipe, Brazil, Based on Temperature and Termic Stress Level. In Sho'13-International Symposium on Occupational Safety and hygiene (pp. 403-404). Guimarães, Portugal.
- Teixeira, L., Talaia, M. & Morgado, M. (2014). Evaluation of indoor thermal environment of manufacturing industry. In M. P. Azeres, J. Baptista, M. Barroso, P. Carneiro, P. Cordeiro, N. Costa, ... G. Perestrelo (Eds.), *Occupational Safety and Hygiene II* (pp. 553-558). London, UK: CRC Press Taylor & Francis group.
- Yao, R., Li, B. & Liu, J. (2009). A theoretical adaptive model of thermal comfort - Adaptive Predicted Mean Vote (aPMV). *Building and Environment*, 44(10), 2089-2096. doi:10.1016/j.buildenv.2009.02.014

A FORMAÇÃO DE CIDADÃOS ATRAVÉS DO USO E INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS: RISCOS CONDICIONADOS PELA TEMPERATURA DO PONTO DE ORVALHO

Mário Talaia

Departamento de Física, CIDTFF, Universidade de Aveiro
mart@ua.pt

Carla Vigário

Departamento de Educação, Universidade de Aveiro
carla.vigario@ua.pt

RESUMO

A problemática das alterações climáticas justifica a implementação no ensino de metodologias de ensino e aprendizagem inovadoras. Um dos maiores desafios que a sociedade atual tem colocado aos educadores é o desenvolvimento de competências nos alunos, futuros formadores. Neste trabalho apresenta-se uma inovadora metodologia de ensino, onde futuros formadores do ensino superior, desenvolvem competências na interpretação do ar húmido partindo da interpretação de imagens que mostram a formação de uma gota de orvalho. A metodologia adotada é avaliada. Os resultados obtidos são reveladores da eficácia desta inovadora metodologia e é esperado que os formandos se tornem cidadãos que, mais tarde, possam interpretar fenómenos físicos quando é envolvido ar húmido, como por exemplo o que suscita risco de incêndio florestal e risco de saúde pública. O estudo mostrou que o uso de boas imagens é um recurso didático que deve ser valorizado.

Palavras-chave: Cidadania, Ensino das Ciências, imagens, proteção civil, saúde pública.

Introdução

A Coluna de Trajano, erigida no ano 113 D.C., é um dos monumentos mais importantes do antigo Império Romano. Situada numa pequena praça do Fórum, esta coluna tem 38m de altura e um diâmetro de cerca de 4m, facto que permitiu construir, no seu interior, uma escadaria em espiral que leva à plataforma no topo. O que este monumento tem de curioso é que ao longo da coluna, formando um friso de cerca de 200m de comprimento, estão representados vários episódios de guerras, assaltos e pilhagens, todos eles relativos à campanha do Imperador Trajano contra os Dácios. Um total de 2500 imagens com expressões e atitudes individualizadas aparecem ao longo de toda a coluna. É interessante registar a preferência de um Imperador pela imagem, em detrimento do texto escrito, quando deseja glorificar a sua capacidade militar, numa clara campanha de propaganda política (Talaia & Marques, 2009).

Existem, porém, evidências de que a imagem tem sido usada amplamente pela sociedade humana desde os seus primórdios. Hoje em dia, a *ciência da imagem* está a atingir um patamar invulgar. A instituição escolar tem a necessidade de acompanhar essa evolução. Neste contexto, o uso da imagem no ensino parece-nos adequado e deve ser considerado instrumento pedagógico a valorizar. No entanto, a imagem não deve ser usada de forma indiscriminada. O professor deve ser capaz de isolar os objetivos a que se propõe estudar de modo a usar a imagem de forma eficaz, no desenvolvimento de competências. A seleção duma imagem nem sempre é fácil pois uma imagem nem sempre diz aquilo que se deseja dizer, ou seja, há que ter sempre presente a característica polissémica duma imagem. Afinal, as imagens são multifacetadas e polivalentes - concretas e abstratas, icónicas e racionalizadas, eficazes e mágicas, estéticas e

denotativas, funcionais e incontroláveis. O uso de uma boa imagem só é possível se o professor, antes, já desenvolveu aquilo que chamamos de uma *banda larga* de conhecimento científico. De todos os sentidos que o Homem possui, a visão é, sem dúvida, o mais especializado e mais informações transportam para o cérebro. Enquanto os recetores sensoriais da visão são cerca de 135 milhões, os do ouvido são de 20 a 30000 (Calado, 1994). A visão é muito mais do que um ato físico; é um ato de inteligência.

Metodologia

Neste trabalho apresenta-se uma inovadora metodologia de ensino, onde 64 alunos do ensino superior (1º ciclo), futuros formadores, usam imagens para a interpretação de fenómenos físicos.

O estudo começa com imagens de exemplos de gotas de orvalho e algumas palavras acerca do fenómeno físico. Numa primeira fase o formando deve excluir e/ou acrescentar palavras e quando tiver seleccionado ou criado o rol das palavras deve construir um mapa conceptual. A seguir responde a uma questão problema referente à formação de orvalho. Numa segunda fase e em contexto de sala de aula são desenvolvidas competências e é construído conhecimento científico numa base de contexto real, numa dinâmica CTS-A e numa perspectiva de Ensino Por Pesquisa. Depois, a primeira fase é repetida, sendo possível corrigir, adaptar, apresentar, interpretar através de imagens a formação de orvalho e a importância da temperatura do ponto de orvalho. Numa terceira fase é avaliada a metodologia através de uma questão problema colocada no teste escrito de avaliação individual sem consulta.

Aplicação da Metodologia Inovadora

Já Sócrates, o famoso filósofo grego, mostrou que a primeira fase do ensino tem a ver com a *IRONIA*, que significa perguntar, fingindo ignorar. Assim sendo, o professor, através de perguntas bem direccionadas, deve elucidar o formando da sua própria “ignorância”, após o que o formando estará suscetível a descobrir por si mesmo, sob a orientação do professor, a resolução da problemática em causa, sendo a segunda fase do método socrático denominada de *MAIÊUTICA*, ou seja a arte de fazer nascer as ideias (Petti & Piletti, 1986). Uma forma de consumir a segunda fase, do nosso ponto de vista, é recorrer ao Ensino Por Pesquisa (EPP) o único capaz de explorar todas as potencialidades do uso de uma imagem. Cachapuz *et al.* (2002) mostraram que existem três momentos fortes na perspectiva de EPP: *Problematização*, *Metodologias de Trabalho* e *Avaliação*.

No primeiro momento da *Problematização* o professor poderia colocar a questão problema: *Como já deves ter observado, muitas vezes, após o “nascer do Sol” observas que muitas folhas da vegetação e superfícies, em geral, estão cobertas de gotas de orvalho ou água. Porque razão acontece tal fenómeno?* Esta é, sem dúvida, uma questão de carácter CTS-A (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) e é uma situação problema do quotidiano, conhecida pelos formandos. No segundo momento do *Método (Metodologias de Trabalho)* o professor poderia incitar os alunos à reflexão por meio da análise da imagem da Figura 1 e por meio de perguntas secundárias bem direccionadas, tais como: *que condições de tempo atmosférico e que elementos são necessários para que ocorra a formação de orvalho ou será fácil fazer uma previsão da formação de orvalho?*

Figura 1. - Gotas de orvalho em folhas (após o “nascer” do Sol)

Visto que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) apresentam enormes potencialidades no desenvolvimento da autonomia dos formandos (Cachapuz *et al.*, 2002), seria muito interessante consultar o sítio <http://www.ipma.pt/pt/otempo/obs.tempo.presente/> do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para obter cartas do tempo atmosférico do dia e para horas diferentes; mapas de superfície com temperaturas e comparar mapas relativos às primeiras horas da madrugada. Facilmente os formandos chegariam à conclusão, no geral, de que a temperatura do ar na camada adjacente à superfície terrestre diminui ao longo da noite.

Finalmente, o terceiro momento tem a ver com *Avaliação* dos produtos ou seja é concretizada por meio de uma questão problema num teste escrito individual sem consulta. A avaliação dos processos é avaliada quantitativamente e qualitativamente e podem ser solicitados comentários e sugestões à eficácia da implementação da metodologia.

Resultados

A Figura 2 mostra a utilização de palavras para a explicação da questão problema.

Figura 2. - Palavras usadas pelos formandos na pré e na pós estratégia

A observação do gráfico da Figura 2 mostra inequivocamente que os formandos corrigiram algumas ideias ou conhecimento construído na educação formal, nomeadamente que a temperatura do ponto de orvalho, a existência de um céu estrelado, a humidade relativa do ar, a noite, a condensação do vapor de água e a existência de uma superfície são determinantes para a formação de orvalho. Depois, a partir do desenvolvimento de competências construíram o seu conhecimento científico através da construção de um mapa concetual.

A Figura 3 mostra os resultados obtidos na avaliação. A observação do gráfico mostra que 77% dos formandos conseguem interpretar corretamente a formação de orvalho e que destes 57% registaram uma valorização acima de 75% (out 100%). Apenas 11% registaram uma pontuação inferior a 25%. Os resultados obtidos são muito interessantes pois a questão problema tem algum grau de dificuldade de interpretação física. Uma formanda escreveu “...ao contrário daquilo que se ouve, o orvalho não cai...o orvalho forma-se numa superfície. Este fenómeno ocorre durante a noite, na ausência de vento (ou com uma intensidade muito baixa) pois este favorece a evaporação. O céu deve mostrar estrelas ou seja a atmosfera deve ser transparente. A humidade relativa do ar não deve ser demasiada alta. Durante a noite quando a temperatura de uma superfície é inferior à temperatura do ponto de orvalho do ar o processo de condensação do vapor de água acontece, formando-se gotas de orvalho. É o caso que acontece numa pétala de uma rosa...”. Outra formanda escreveu “...tomara que todas as aulas fossem assim...”, ainda outra “...gostei imenso da metodologia adoptada, levou-me a olhar para a natureza e a ter um raciocínio coerente...”.

Figura 3. - Resultados obtidos - terceira fase Avaliação

Durante a construção do conhecimento foi mostrada, aos formandos, a influência da temperatura do ponto de orvalho no ar húmido. Por exemplo, no risco de incêndio, um ambiente com uma temperatura de 30°C e uma humidade relativa de 30% apenas regista uma massa volúmica de vapor de água de 10,0g/cm³ enquanto que para a mesma temperatura e uma humidade relativa de 60% regista uma massa volúmica de vapor de água de 19,2g/cm³, o que faz toda diferença no risco de incêndio florestal. Em termos de saúde pública mostrou-se que há risco para DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica) quando o ar tem um grande poder secante, pois aumenta a viscosidade do “muco” das vias respiratórias, devido ao processo de desidratação.

Conclusão

A análise de resultados mostrou que foram muito positivos e até mesmo reveladores do potencial que tem o uso da imagem no ensino das ciências.

Também, os resultados obtidos mostraram que houve um envolvimento excelente da maioria dos formandos, e indicaram que o uso de boas imagens é um recurso didático que deve ser valorizado para o desenvolvimento de competências e construção do conhecimento.

Nós acreditamos sinceramente que a estratégia de ensino usada neste estudo abriu portas para que, no futuro outros estudos mais aprofundados possam vir a ser realizados.

Agradecimentos

Este trabalho é financiado pela FCT/MEC através de fundos nacionais (PIDDAC) e cofinanciado pelo FEDER através do COMPETE - Programa Operacional Fatores de Competitividade no âmbito do projeto PEst-C/CED/UI0194/2013.

Bibliografia

Cachapuz, A., Jorge, J. & Praia, J. (2002). *Ciência, Educação em Ciência e Ensino das Ciências*. Lisboa

Calado, A. (1994). *A utilização educativa das imagens*. Porto: Porto Editora.

Petti, C. & Piletti, N. (1986). *Filosofia e história da educação*. São Paulo; Ática editora.

Talaia, M. & Marques, J. (2009). *Sinais do tempo atmosférico - O uso de imagem como instrumento didático*.

In Somet-Cuba, Sociedade Meteorologia de Cuba (Eds.). *Proceedings of V Congresso Cubano de Meteorologia*, 20-34.

CAPÍTULO 3.4

RISCOS TECNOLÓGICOS E DESENVOLVIMENTO

RISCOS TERRITORIAIS NA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS CANAVIEIROS

Eduardo Rozetti de Carvalho

Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal de Uberlândia - UFU (MG), Brasil
eduardorozetti@uol.com.br

Vicente de Paulo da Silva

Instituto de Geografia, Universidade Federal de Uberlândia (MG), Brasil
vicentepht@hotmail.com

RESUMO

O espaço rural brasileiro passa por modificações, motivadas pelo desenvolvimento, que ultrapassam os limites territoriais, sociais e ambientais, gerando diferentes riscos as suas estruturas de representação por meio de conflitualidades: de um lado o capital e do outro os atingidos. Pensando nesses fatores, apresentamos como objetivo principal desse artigo a busca de compreender como ocorre a formação do agronegócio canavieiro, destacando os riscos que se seguem. Dá-se especial atenção à perspectiva dos efeitos gerados no processo do setor na contemporaneidade. Metodologicamente esse artigo está sustentado em debates e revisões bibliográficas a cerca da temática. Como resultados parciais tem-se o entendimento de que o capital é responsável por gerar efeitos que ultrapassam aspectos apenas ligados ao trabalho, mas transformam fatores como os modos de vida, a segurança/soberania alimentar e ambiental. Ligado a isso, destaca-se a categoria território como válida para compreender esses processos, pois a ele são englobadas as relações de poder e de territorialidades distintas.

Palavras-chave: Empreendimentos Sucroalcooleiros, Território, Riscos, Canavieiro.

Introdução

Há algumas décadas percebemos que vivemos em uma sociedade de riscos, em uma sociedade de ameaças resultantes da modernização e do progresso. Verificar os riscos que se seguem na implantação dos grandes empreendimentos tornam-se uma necessidade, pois, é o capital o maior gerador de riscos as comunidades tradicionais.

Pensando nissno, esse trabalho prioriza compreender como ocorre a formação do agronegócio canavieiro, destacando os riscos desse capital expropriador e os efeitos que são gerados, como resultados da exposição de trabalhadores ou moradores de lugares onde foram implantados os projetos.

Metodologicamente as argumentações estão sustentadas em debates e revisões bibliográficas acerca do tema, expondo informações, reflexões e debates oriundos da utilização de diferentes publicações, tais como: livros, artigos, relatórios, dissertações e teses e, também, direcionamentos reflexivos da realidade do campo canavieiro.

Assim, apresentamos esse artigo estruturado basicamente na compreensão que o capital é o agente promotor de riscos sociais, principalmente as sociedades tradicionais, refletindo em efeitos que se seguem nas estruturas territoriais locais.

Os riscos e efeitos da dinâmica dos grandes empreendimentos canavieiros

É preciso entender o conceito de “risco” como resultado de atividades sociais, o que por sua vez o materializa como uma possibilidade de efetivação de contraposições ao que está implantado, ou seja, o sentido de perigo ao que existe ou ao que foi construído pelas tarefas sociais.

Para Veyret devemos compreender o risco como “[...] uma construção social. A percepção que os atores têm de algo que representa um perigo para eles próprios, para os outros e seus bens, contribui para construir o risco que não depende unicamente de fatores ou processos objetivos” (VEYRET, 2007, p. 23). Desde que compreendamos a historicidade na formação do que é o risco, pois ele permite gerar uma percepção sobre sua existência.

Os riscos são criados pelos grandes empreendimentos, em especial quando do processo de sua implantação, são regidos por uma necessidade do capital em reproduzir seu modelo, tendo como direcionadores o aprimoramento e fortalecimento de grupos econômicos hegemônicos, que recria a política local.

Isso é confirmado por Veyret que destaca: “o risco é desde sempre indissociável da política: tomar as decisões concernentes à organização do território, à repartição dos bens, ao uso dos recursos, equivale, ao menos em parte, a fazer apostas sobre o futuro, a construir cenários que encerram sempre uma dose de riscos.” (VEYRET, 2007, p. 29).

De acordo com November (2002), os riscos, em relação ao seu vínculo com o local, não importa a perspectiva na qual eles são abordados, eles se produzem dentro de um espaço geográfico, e mais precisamente, dentro de um território. Nessa medida o risco ou os riscos sempre serão territoriais.

É nesse aspecto que a busca pelo entendimento da territorialização do processo de construção da sociedade e do agronegócio sucroalcooleiro é importante, já que também se utilizam dessa categoria e muitas vezes ultrapassam os limites territoriais, formando territórios regidos pelo capital, separando as relações do espaço de administração com do capital, criando seu território de interesse. Interesse esse que, em muitos casos, culminam com as rupturas de estruturas tradicionais, que estão presentes antes mesmo da articulação do capital.

Pois, como pensa November (2006), o risco é literalmente enraizado nos espaços por ser participante ativo das transformações territoriais, capaz de modificar áreas ao longo do tempo e, até mesmo, fazer-se parte integrante da paisagem que se estabelece. Garcia-Tornel (1997) também considera esse entendimento e, portanto, essa categoria geográfica para compreender os riscos. Pois, o autor ao estabelecer o “território potencial de risco”, como todo espaço que tem a possibilidade de sofrer o evento catastrófico, não importando o grau de intensidade coloca os grupos humanos em situações diversas de perigo, ou seja, em graus diferentes de vulnerabilidade, porque o território precisa ser representado como habitado, vivido e apropriado.

É importante ressaltar que, esses territórios e suas construções, principalmente, para os setores canavieiros, surgem a partir da atuação das relações e conflitos entre o capital e o trabalho, muitas vezes tradicionais, como também a partir dos conflitos dos próprios capitais de concorrência. Isso acarreta na formação de estruturas de territorialidades dos grandes empreendimentos sucroalcooleiros, os quais reconstróem os territórios antes de identidades e relações da terra para com a terra, para relações capitalistas produtivas e desligadas às atividades sociais clássicas.

Partindo desses posicionamentos, definimos que os riscos, materializados pelos grandes empreendimentos, nascem ou são gerados como uma ameaça ao que é produzido e mantido costumeiramente, rompendo com os modos de viver e tornando vulneráveis as sociedades tradicionais.

Entendemos que os Grandes Projetos de Investimentos (GPI), como o agroindustrial canavieiro, se mostram nesse processo como agentes causadores de riscos às sociedades estabelecidas, uma vez que se enquadram como riscos a manutenção dos territórios tradicionais. Enquanto

que as populações viventes, ou melhor as sociedades de risco, se materializam como a representação da vulnerabilidade frente a chegada do capital. Assim, os GPI são agentes que trazem riscos as comunidades, economias e setores locais clássicos.

É importante lembrar que os riscos nascem de políticas desenvolvimentistas dos projetos de investimentos e necessidades de mercado, mas afetam de maneira negativa, principalmente, as populações tradicionais locais, modificando seus modos de vida e de trabalho, em detrimento ao desenvolvimento do capital.

Os locais onde esses GPI, como o canavieiro, se instalam, conforme Elias, são formados ou consolidados, como Regiões Produtivas Agrícolas (RPA) “novos espaços de fluxos rápidos inerentes às redes agroindustriais, nas quais as verticalidades têm predominância sobre as horizontalidades” (ELIAS, 2012, p. 155), que podem ser caracterizados pelos seguintes processos: Intensa substituição dos sistemas técnicos agrícolas; Significativa mudança das formas de uso e ocupação do espaço agrícola; Forte substituição da produção de alimentos pela produção de *commodities*; Substituição das vocações naturais pelas imposições econômicas; Difusão de especializações produtivas.

Processos esses que podem ser compreendidos como alguns efeitos da materialização da apropriação dos territórios tradicionais pelo capital empreendedor, quando da materialização e efetivação de sua implantação, ou seja, a consumação do risco. Portanto, compreendemos que o agronegócio da cana-de-açúcar é uma materialização dessas Regiões Produtivas Agrícolas, pois as transformações rurais e urbanas que a atividade canavieira ocasiona nos municípios em que se instalam são variadas e profundas.

Uma questão importante, são os efeitos sobre as áreas de cultivos de alimentos e mesmo a concentração fundiária. Lembrando que a compra de terras e o arrendamento são fortes indícios desse processo nos municípios onde a atividade canavieira se instala.

Nessa questão temos o território sujeitando-se a uma nova forma de produzir, onde o monopólio das terras, através da propriedade privada e/ou do arrendamento, passa a desempenhar um papel preponderante de deterioração da renda fundiária, que é a lógica da racionalidade econômica capitalista no âmbito da agricultura de base empresarial - empregada pelos empreendimentos sucroalcooleiros.

Novos efeitos são gerados nessa realidade produtiva capitalista. Para conhecimento, foi possível definir três principais universos de efeitos reais dos empreendimentos sucroalcooleiros, sendo eles: 1) Na produção de alimento: deslocamento e expropriação; 2) Na relação de trabalho: condições e sobrevivência; 3) Ao Ambiente: recursos e sustentabilidade. Ressaltando que tais efeitos englobam territorialidades, dimensões de sobrevivência e conflitos de capital.

Assim, entendemos que o território agrário e clássico local são drasticamente afetados pelo capital do GPI. Os resultados mais concretos e empiricamente verificáveis são o predomínio de uma nova cultura na paisagem, o que significa a destruição de usos, que prevaleceram no período anterior à implementação da atividade que chega, rompendo com os modos e pensamentos enraizados das sociedades que ali viviam.

Conclusão

Os riscos, assunto que tem sido objeto de discussão em vários campos do conhecimento, com a intenção de verificar os riscos que antecedem e os efeitos que se seguem na implantação dos grandes empreendimentos, torna-se cada vez um desafio, mas na verdade uma necessidade, pois, o capital é o maior gerador de riscos às comunidades tradicionais.

Em nosso estudo percebemos que a (re)construção das territorialidades do capital, em torno da cana-de-açúcar, surgem da conflitualidade dos agentes envolvidos, de um lado o capital e do outro as populações afetadas, mas que na maioria recaem sobre processos de exclusão, formação de novas estruturas territoriais, gerando riscos sociais, culturais, ambientais e políticos.

Entendemos que as comunidades tradicionais são sociedade de risco, que estão ameaçadas pelo processo e modelo de modernização implementado pelo capital, que tem como discurso principal o progresso, mas que na verdade utilizam desses territórios para sua reprodução e ganho financeiro.

Percebemos que o risco, na sociedade contemporânea, está relacionado diretamente ao desenvolvimento tecnológico, que são engendrados ao modelo econômico capitalista de reprodução, que por sua vez é algo pertencente aos grandes projetos. Esses processos formam territórios regidos pelo capital, separando as relações do espaço de administração com do capital, criando seu território de interesse. Interesse que, em muitos casos, culminam com a rupturas de estruturas tradicionais, que estão presentes antes mesmo da articulação do capital.

Bibliografia

- BECK, Ulrich. (2006) - *La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad*. Barcelona: Paidós, 1986. p. 275-281.
- ELIAS, Denise. (2012) - Agronegócio e novas regionalizações no Brasil. *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*, Local de publicação (editar no plugin de tradução o arquivo da citação ABNT), 13, jun. p.153-167.
- GARCÍA-TORNEL, Francisco Calvo. (1997) - Algunas cuestiones sobre Geografía de los Riesgos. Scripta Nova. *Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, Barcelona, n. 10. 11p.
- HAESBAERT, R. (2004) - *O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 400 p.
- NOVEMBER, Valérie. (2006) - Le risque comme objet géographique. *Chantiers de géographie du Québec*. Québec, v. 50, n. 141, Dez. p. 289-296.
- NOVEMBER, Valerie. (2002) - *Les Territoires du risque: le risque comme objet de réflexion géographique*. Berna: Lang. 332p.
- ORTEGA, A. C. (2008) - *Territórios deprimidos: desafios para as políticas de desenvolvimento rural*. Campinas: Alínea/EDUFU: Uberlândia. 244 p.
- PIQUET, R.; RIBEIRO, A. C. T. (Org.). (1991) - *Brasil, território da desigualdade: descaminhos da modernização*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 181p.
- RIBAS, A. D.; SPOSITO, E. S.; SAQUET, M. A. (Org.). (2004) - *Território e desenvolvimento: diferentes abordagens*. Francisco Beltrão: UNIOESTE. 171 p. p.121-147.
- SILVA, José Graziano. (1996) - *A nova dinâmica da agricultura brasileira*. Campinas: Ed. Unicamp. 217p.
- VEYRET, Yvette. (2007) - *Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente*. São Paulo: Contexto. 319p

RISCOS TECNOLÓGICOS: MODELAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DE UM ACIDENTE NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CLORO

Henrique Costa

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
hvcosta@hotmail.com

Manuel Trelles

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
manuel77trelles@gmail.com

António Gomes

CEGOT - Faculdade de Letras da Universidade do Porto
atgomes@letras.up.pt

RESUMO

O presente trabalho analisa um acidente tecnológico ocorrido durante o transporte rodoviário de uma cisterna com 21 toneladas de cloro (Cl_2). Apesar de não ter ocorrido fuga da substância transportada, são avaliadas as potenciais consequências para a população e ambiente, caso a fuga de cloro tivesse ocorrido. Explana-se os softwares utilizados para a modelação da possível área atingida pela fuga, e ainda para determinar o número e as possíveis consequências fisiológicas na população presente das áreas afetadas.

Palavras-chave: Riscos Tecnológicos; SIG; Cloro; Matérias Perigosas; Proteção Civil;

Introdução

A 30 de Julho de 2009 ocorreu um fatídico acidente na freguesia de Gondarém, concelho de Vila Nova de Cerveira. Um camião que transportava 21 toneladas de cloro (n.º ONU 1017), despistou-se no viaduto de acesso à A28, precipitando-se para a EN13 que se encontra a uma cota inferior. Deste acidente não ocorreu a fuga do produto transportado, contudo importa aferir quais seriam as áreas e a população potencialmente afetada caso esta tivesse ocorrido. Esta análise assume-se como um contributo para melhorar a prevenção, resposta e mitigação de futuros acidentes deste tipo.

Propriedades do Cloro

O cloro é um gás corrosivo, tóxico e comburente (ANPC, 2011), mais denso que o ar (tabela I), tendo sido inclusivamente utilizado como arma de guerra química durante primeira guerra mundial (Winder, 2001) dadas as suas propriedades toxicológicas (tabela II).

Tabela I - Propriedades do Cloro

Propriedade	Valores
Peso atómico	35.43
Peso molecular	70.91
Ponto de ebulição	-34.6 °C
Ponto de fusão a 760 mg Hg	-101 °C
Pressão de vapor a 0 °C e a 760 mg Hg	3.61 a 760 mg Hg
Densidade a 0 °C e a 760 mg Hg	3.21 g/L
Solubilidade em água a 0 °C e a 760 mg Hg	14.6 g/L (diminui com o aumento da temperatura)

Fonte: Winder, 2001

Tabela II - Efeitos no ser humano da exposição ao cloro

Concentração	Efeitos no ser humano
1-3 ppm	Ligeira irritação das membranas mucosas que pode ser tolerado durante curtos períodos de tempo. Referência para o limite de exposição de curta duração 3 ppm.
> 5 ppm	Irritação dos olhos
> 15 ppm	Irritação da garganta
15 a 30 ppm	Tosse, asfixia, queimaduras
> 50 ppm	Pneumonia química
430 ppm	Morte após 30 minutos de exposição
>1000 ppm	Morte em poucos minutos

Fonte: Adaptado de Winder (2001) e Evans (2005)

Metodologia

A modelação das áreas potencialmente afetadas pela fuga de Cloro foi realizada com o *software* ALOHA - Areal Locations of Hazardous Atmospheres - (EPA & NOAA, 2007), tendo em conta os *Inputs* especificados na figura 1. As condições meteorológicas utilizadas na modelação foram as observadas no dia e hora do acidente, registadas pelo SNIRH (Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos), concretamente na estação meteorológica de Vila Nova de Cerveira.

Figura 1- Metodologia da modelação do acidente tecnológico

Para se estimar no *ArcMap* a população e as áreas potencialmente afetadas face à exposição da fuga de cloro, foi utilizado o método de ponderação espacial “Areal Weighting”, de acordo com o descrito por Chakraborty & Amstrong (1995) e Margai (2001), em que:

$$\text{População potencialmente afetada} = \sum_{i=0}^n P_i + \sum_{j=0}^m \left(P_j * \frac{a_j'}{a_j} \right)$$

n = n.º de subsecções que se encontram totalmente contidas na área do sinistro (cujos limites não coincidem com os limites da área afetada);

P_i = população das subsecções totalmente contidas na área do sinistro e em que $i = 0, 1, 2, \dots, n$;

m = n.º de subsecções parcialmente contidas na área do sinistro (cujos limites intersectam ou coincidem com o limite da área afetada);

P_j = população das subsecções parcialmente contidas na área do sinistro em que $j = 0, 1, 2, \dots, m$;

a_j = Área total das subsecções contidas parcialmente na área do sinistro;

a_j' = Área das subsecções parcialmente contidas na área do sinistro;

Pela hora e dia da ocorrência do acidente (cerca das 14h00 de sexta-feira), foram realizados os cálculos da população potencialmente afetada tendo em conta a População Presente, por subsecção, à data dos censos 2011 do INE.

Resultados e Discussão

Figura 2 - Dispersão da fuga de cloro e População Presente por subsecção

Figura 3 - Dispersão da fuga de cloro e uso do solo (Corine Land Cover 2006)

Tabela IV - População potencialmente afetada

Concentração	Consequência	Área km ²	Total de População Presente potencialmente afetada
>1000ppm	Morte em poucos minutos	1,18	237
430ppm	Morte em 30 min. de exposição	0,74	133
>50ppm	Pneumonite química, tosse, irritação de garganta e olhos, etc.	4,09	525
	Total	6,01	896

Os resultados obtidos na modelação patente na figura 2 e tabela IV evidenciam que a área mortal em poucos minutos (>1000ppm), atingiria uma superfície de 1,18 km², onde 237 indivíduos seriam potencialmente afetados. Também 133 indivíduos poderiam vir a falecer caso estivessem expostos durante 30 minutos a 430ppm, e 525 iriam sofrer consequências severas para a saúde como pneumonite química.

Tabela V - Área potencialmente afetada por tipo de uso do solo

Código CLC	Tipo de uso do solo (Corine Land Cover Nivel 3)	Área Km ²
112	Tecido urbano descontinuo	1,12
212	Cultura temporárias de regadio	1
241	Culturas temporárias e/ou pastagens associadas a culturas permanentes	0,56
312	Florestas de resinosas	1,63
313	Florestas mistas	0,32
322	Matos	0,53
324	Florestas abertas, cortes e novas plantações	0,18
332	Vegetação esparsa	0,01
522	Desembocaduras fluviais	0,65
Total		6,01

Analisando as modelações realizadas com a Corine Land Cover 2006 (figura 3 e tabela V), o impacto no ambiente ocorreria, para os níveis >50 ppm, numa área de 1,63 km² de florestas resinosas, 0,53 km² de matos, 0,32 km² de florestas mistas, 0,18 km² de florestas abertas, 0,01 km² de vegetação esparsa e 0,65 km² de desembocaduras fluviais do Rio Minho. É importante referir que o Rio Minho e as suas margens se encontram integradas na Rede Natura 2000 pelo que qualquer dano no seu ecossistema representa uma agravante séria a nível ambiental. A exposição da vegetação a uma fuga accidental de cloro dar-se-á sobretudo através da dispersão do gás na atmosfera. A vegetação exposta poderá sofrer danos e diminuição da área foliar, diminuição nos níveis de clorofila e morte. (EPA, 2003)

Conclusão

A relação entre riscos e o território é complexa e apenas a análise detalhada dos locais e contextos específicos nos poderá ajudar a compreender a suas dinâmicas. O território não deve ser estudado sem se considerarem os perigos, vulnerabilidades e riscos que enfrenta e, por outro lado, nenhum risco pode ser avaliado sem ter em consideração a dimensão espacial (Queirós, 2009). No caso concreto do trabalho realizado, a integração entre o ALOHA e o ArcMap, complementados pela metodologia “*Areal Weighting*”, permite estimar as potências consequências da fuga de cloro para a população e ambiente. Assim, poder-se-á concluir, através da análise dos resultados, que um acidente envolvendo o transporte de cloro poderá acarretar um elevado dano nas populações e no ambiente. Além da metodologia proposta, este estudo constitui-se também como instrumento de apoio à prevenção, resposta e mitigação de futuros acidentes, contribuindo para a sensibilização, formação e resposta de todos os agentes de proteção civil.

Bibliografia

- Autoridade Nacional de Proteção Civil (2011) - *Manual de intervenção em emergências com matérias perigosas - químicas, biológicas e radiológicas*. Carnaxide, ANPC, p.313;
- Chakraborty, J., Armstrong, M.P., (1996) - Using Geographic plume analysis to assess community vulnerability to hazardous accidents, *Computers, Environment and Urban Systems*. [Online] 19, 341-356. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0198971595000186> [Acedido em 14 de Janeiro de 2013]
- Evans, R.B. (2005) - Chlorine: State of the art. *Lung*, 183(3), 151-167
- Margia, F. L. 2001 - Health Risks and Environmental Inequity: A Geographical Analysis of Accidental Releases of Hazardous Materials. *The Professional Geographer*. [Online] 53(3):422-34. Disponível em: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00330124.2001.9628473#.U9phzvldVCg> [Acedido em 14 de Janeiro de 2013]
- Queirós, M. (2009) - Riscos e Ordenamento do Território: *Prometeus* ou conhecimento e partilha. *Planeamento Civil de Emergência*, [Online] 21, 20-28. Disponível em: http://riskam.ul.pt/images/pdf/artrevnac_2009_%20riscos_ot_prometeus.pdf [Acedido em 14 de Janeiro de 2013]
- Winder, C. (2001) - The toxicology of chlorine. *Environmental Research*, 85(2), 105-114.
- U.S. Environmental Protection Agency (EPA) & National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) (2007) - *ALOHA user manual*, [Online] 195. Disponível em: <http://www2.epa.gov/cameo/cameo-downloading-installing-and-running-aloha> [Acedido em 14 de Janeiro de 2013]
- U.S. Environmental Protection Agency (2003) - National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants: Chlorine and Hydrochloric Acid Emissions from Chlorine Production, *Federal Register*, vol.(68). [70947-70957]

OS RISCOS CLIMÁTICOS E A MERCANTILIZAÇÃO DA NATUREZA NA ERA DO AQUECIMENTO GLOBAL - O PAPEL DA MÍDIA

Paulo Cesar Zangalli Junior

Doutorando em Geografia, Departamento de Geografia, Grupo de Pesquisa GAIA;
FCT/UNESP Presidente Prudente.
pauloczangalli@gmail.com

João Lima Sant'Anna Neto

Professor Titular, Departamento de Geografia, Grupo de Pesquisa GAIA;
FCT/UNESP Presidente Prudente.
jlsn57@uol.com.br

RESUMO

O debate científico sobre as mudanças climáticas globais remete a como a mídia constrói e divulga um discurso catastrofista, com forte impacto no modo como a população percebe os riscos. A proposta deste artigo é debater como a mídia atua na construção e divulgação do discurso das mudanças climáticas globais e qual o seu papel frente a formulação de exigências para minimizar os riscos desse problema. A forma como a mídia divulga o tema amplia e maximiza a percepção do risco e muitas vezes distorce a realidade. Como considerações, podemos apontar que a mídia atua como um agente legitimador de agendas públicas sobre as mudanças climáticas e ao generalizar os discursos, contribui para a mercantilização do clima.

Palavras-chave: Mudança Climática, Risco, Percepção, Seguros

Introdução

Há varias concepções para a noção de risco. Para Veyret (2007), o risco é “objeto social e define-se como a percepção do perigo, da catástrofe possível e, portanto, ele existe apenas em relação a um indivíduo, a uma sociedade que o apreende e com ele convive por meio de práticas específicas”.

Sabe-se que a noção de risco se estabelece na relação conflituosa entre os homens e entre estes e o ambiente em um processo de mútua influência. A percepção do risco é uma componente fundamental na estruturação de resposta ao perigo, influenciando vários aspectos da vida individual e coletiva. Porém deve-se romper com a ideia de um evento natural agressor que atua sob uma sociedade que se coloca, de forma homogênea, como vítima. (SOUZA e, ZANELLA, 2009).

Nesta perspectiva, esse trabalho procura debater como a mídia atua na construção e divulgação de um discurso sobre as mudanças climáticas globais no Brasil, como risco e, qual o seu papel frente à formulação de exigências para minimizar esse problema.

Os riscos e a mídia: a consolidação de uma agenda pública sobre o clima

Assumindo o contexto abordado por Ulrich Beck (1992) de que a sociedade industrial, caracterizada pela produção e distribuição de bens, foi deslocada para uma sociedade de risco, na qual a distribuição dos riscos geraria uma nova forma de capitalismo, ou seja, uma nova ordem global, essa parte do processo, representada pela mídia, contribui para a consolidação e a percepção dos riscos.

No contexto apontado por Beck (1992), em que o próprio conceito de risco se confunde com o de globalização, ou seja, os riscos não respeitam fronteiras, classes sociais, nações, atribuindo-se valor a tudo, inclusive aos impactos possíveis dos problemas ambientais.

Globaliza-se cada vez mais os problemas que precisam ser debatidos na esfera do local, na percepção de uma responsabilidade comum, porém diferenciada. Esse processo nega as especificidades do local, padroniza soluções, atribui valores à natureza e insere-os num contexto econômico, em que o processo de produção capitalista reponsável pela degradação passa a ser a única solução para o problema

A mídia, em especial a brasileira, exerce papel central neste debate, e o perfil e a maleabilidade pela qual se configuram as opiniões dos editoriais de jornais e revistas precisam ser lembrados. Nem sempre os fatos jornalísticos condizem com os fatos reais cotidianos, científicos, políticos, etc, atendendo muitas vezes aos interesses do próprio jornal, e da classe ou segmento da sociedade que ele representa.

Figura 1: Relação entre Produção Científica e Divulgação da Mídia. Fonte: Zangalli Jr, 2013.

De pronto pode-se destacar um fator importante, a rotina de notícias é pré determinada. Mais do que um fato, a notícia é “o produto de um sistema fixo de trabalho, cuja tarefa é impor um sentido de ordem e previsão no caos de múltiplos e, por vezes, não relacionadas acontecimentos e questões” (HANNIGAN, 1995). Assim, é notável o interesse dos veículos de informação por uma rotina de notícias calendarizadas, como conferências oficiais, discussões públicas e excepcionalidades como eventos climáticos e sua repercussão no espaço.

Os impactos, inclusive, são muito mais abordados pela mídia do que pela ciência. Comparando os dados obtidos nos periódicos *Theoretical and applied climatology* e *Climatic Change*, com os dados dos jornais *Folha de S. Paulo* e *O Estado de S. Paulo*, de acordo com os principais conceitos abordados, tanto pela ciência quanto pela mídia, percebe-se que a ciência prefere o debate sobre as mudanças climáticas com o devido rigor científico, enquanto a mídia exagera na utilização dos impactos, como se verifica na figura 1.

A mídia, em geral, reduz o rigor científico, quer exista ou não perigo nisso. Um exemplo é uma entrevista com Alberto Figueiredo Machado, negociador chefe do Brasil na COP 11, publicada no dia 28 de novembro de 2005 no jornal *Folha de S. Paulo*. Nesta entrevista, o jornal apresenta aos seus leitores um glossário em que define mudança climática como “*Conjunto de alterações dos padrões climáticos em decorrência do aquecimento global. Os riscos incluem aumento do nível do mar*”. Esta definição está longe do conceito adotado pela OMM, que considera a MCG como: “todas as formas de inconstâncias climáticas, independentemente da sua natureza estatística, escala temporal ou causas físicas [...] que persista por mais de 30 anos”.

O que de fato deve-se ressaltar é que a mídia atua como um sujeito legitimador de agendas públicas (sejam ambientais ou não). A preferência pelos impactos, o pouco interesse pelo o rigor científico é

usado para (re)significar ainda mais o problema ambiental, o que não descaracteriza o debate científico sobre o fato, mas influencia e maximiza a percepção do risco por parte do público.

Além disso, utiliza-se da exaltação como estratégia para transmitir os fatos jornalísticos. Segundo Hannigan (1995), a mídia utiliza quatro elementos para formular os problemas ambientais. O primeiro diz respeito ao paradigma social existente, ou seja, a mídia associa o problema específico com imagens de fácil percepção pelos leitores. Essa associação ecoa sobre esse paradigma, porém de maneira superficial, sem capacidade de romper com o mesmo.

O segundo elemento destacado refere-se à necessidade do problema ambiental em questão estar articulado através das agendas política e científica correndo o risco, caso não atendam a esses requisitos, de não se legitimar como um problema na agenda dos meios de comunicação social. O terceiro elemento, destacado, é a “dramatização social”. Como as notícias estão roteirizadas e calendarizadas, essa dramatização se torna algo simples de se estabelecer.

O quarto elemento, ainda segundo Hannigan (1995), é o que associa o problema ambiental com o tempo presente, ao invés de um futuro distante. É nesse sentido que o risco aos impactos do clima é percebido e maximizado. O risco futuro se reflete na vulnerabilidade do agora, essa estratégia pode ser verificada no Quadro I.

Quadro I: Versão oficial apresentada pela mídia. Fonte: Revista Época, Edição/nº386, 10 de outubro de 2005.

A NOVA GEOGRAFIA		
O que se previa há dez anos	Como a Terra já mudou	As consequências para nossa vida
O clima ficará mais quente, alterando as tradicionais divisões entre zonas temperadas e tropicais do planeta. Mesmo que um ou outro ano seja eventualmente mais frio, a média geral será mais alta.	A média de aquecimento do planeta foi de 0,6°C nos últimos cem anos, a maior do milênio. Os últimos dez anos, com exceção de 1996, foram os mais quentes registrados desde 1861.	Áreas originalmente temperadas como a Flórida já sofrem com doenças tropicais, como malária, típica de regiões quentes e úmidas. No ano passado, os furacões Charles, Frances, Ivan e Jeamme atingiram o Estado e causaram US\$ 30 bilhões em prejuízos, na temporada de furacões mais cara da História até então.
Parte da Antártida e da Groenlândia derreterá. O deslocamento dessa grande massa de gelo, que estava em terra firme, elevará o nível do mar.	O derretimento de geleiras na Antártida contribui com cerca de 0,2 mm por ano no aumento do nível do mar, e a Groenlândia com 0,1 mm. Estima-se que o nível do oceano tenha aumentado entre 10 e 20 cm no século XX.	A elevação média de 1,1 mm por ano no nível do mar em Santos pode ser a causa das ressacas violentas que têm atingido a cidade. Em maio, ondas derrubaram as muretas de proteção da praia e invadiram garagens de prédios.
O aquecimento da temperatura na superfície dos oceanos aumentará a incidência e a força dos furacões. Áreas que não tinham furacões poderão passar a sofrer com o fenômeno.	Pesquisas recentes indicam que a frequência e a intensidade dos furacões de categoria 4 e 5, os mais fortes, quase dobraram em 30 anos. Nos últimos 20 anos, o número de desastres naturais mais que dobrou. São cerca de 800 por ano.	Indaiatuba, no interior paulista, foi atingida neste ano por um tornado que causou prejuízos de R\$ 97,2 milhões. No ano passado, um furacão atingiu parte da costa de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e causou prejuízo de mais de R\$ 1 bilhão. Foi o primeiro fenômeno desse tipo a acontecer no Atlântico Sul.
A Floresta Amazônica ficará mais quente e, talvez, mais seca, portanto, vulnerável a queimadas. Partes dela poderão virar quase um cerrado.	A temperatura média da região amazônica aumentou 0,56°C nos últimos 20 anos.	Quatro municípios decretaram estado de emergência na semana passada devido ao baixo nível dos rios Solimões e Negro, que está em 16 metros, índice quase tão baixo quanto o recorde histórico, de 1963.

Fontes: Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e Munich Re.

Há algumas características que são capazes de influenciar a percepção do problema, atenuando ou agravando a leitura que se faz da realidade. Pode-se citar a magnitude, duração, frequência, extensão em área, velocidade de deflagração e distribuição temporal do evento, por exemplo (SOUZA e, ZANELLA, 2009 p. 37). Ainda nessa perspectiva, Whyte (1985) apresentou um conjunto de fatores associados a fenômenos climáticos adversos (Figura 2). Esses fatores podem ser

percebidos na abordagem midiática que elucida a dimensão que tomou o aquecimento global, principalmente depois de sucessivas ondas de calor no hemisfério norte.

Quadro II: Processos climáticos capazes de influenciar a percepção dos indivíduos. Fonte: Adaptado de Whyte (1985) in Souza e Zanella, 2009, p. 37

Forte Influência	Fraca Influência
Alta probabilidade de ocorrência	Baixa probabilidade de ocorrência
Curto intervalo de recorrência	Impactos nunca experimentados
Expectativa de que ocorra em breve	Expectativa de que ocorra no futuro
Evento extremo	Baixa variação em torno do habitual
Evento imaginável, de fácil definição	Início e fim difíceis de identificar
Fortes consequências	Fracas consequências
Impacto direto sobre o bem estar	Efeitos indiretos sobre o bem estar
Perdas de vidas humanas	Sem perdas de vidas humanas
Vítimas identificáveis	Vítimas tratadas estatisticamente
Impactos concentrados	Impactos aleatórios
Razoável certeza de que irá ocorrer	Incerteza de que irá ocorrer
Mecanismos e efeitos inteligíveis	Mecanismos e efeitos não entendidos
Impactos dramáticos	Impactos pouco perceptíveis

Assim, ao mesmo tempo em que legitima as mudanças climáticas em um dos maiores problemas ambientais, o Aquecimento Global, a mídia induz a percepção dos riscos e a insere no contexto da globalização econômica, fundada na sociedade do risco e, consequentemente, como afirma Leff, (*apud* OLIVEIRA, 2012) no processo de naturalização da mercantilização da natureza, em que o processo de produção capitalista passa de causa a solução do problema.

Conclusão

Conclui-se que a mídia atua, frente aos danos ambientais, como um agente legitimador de agendas públicas, conferindo a visibilidade necessária para que as mudanças climáticas se tornem um problema ambiental amplo e consolidado. Para isso utiliza de elementos como a calendarização dos fatos e a preferência pelos impactos.

Ao optar por estas estratégias, a mídia ajuda a maximizar a percepção dos riscos frente aos impactos das mudanças climáticas, situando o problema no tempo presente, sem deixar de prever os impactos futuros (re)significando, assim, o Aquecimento Global com mecanismos inteligíveis e facilmente perceptíveis ao imaginário da população. Com isso, contribui para divulgação de diversos discursos, inserido no processo de mercantilização da natureza.

Bibliografia

- Souza, L. B., Zanella, M. E. (2009) - *Percepção de Riscos Ambientais: teoria e aplicações*. Fortaleza, Edições UFC, 240 p.
- Hannigan, J. (1995) - *Sociologia Ambiental: a formação de uma sociologia ambiental*. Lisboa: Instituto Piaget.
- Zangalli Jr, P. C. (2013) - *Entre a ciência, a mídia e a sala de aula: contribuições da geografia para o discurso das mudanças climáticas globais*. Presidente Prudente, Dissertação de Mestrado, 148 p.
- Beck, U. (1992) - *Risk society. Towards a new modernity*. Londres: Sage Publications.
- Oliveira, L. D. (2012) - *Da Eco 92 à Rio+20: uma breve avaliação de duas décadas*. Boletim Campineiro de Geografia, vol 2, n. 3, 479-499 p.
- Veyret, Y. (2007) - *Os Riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente*. São Paulo: Contexto.
- Whyte, A. V. T. (1985) - Perception. [Pp 403-436] In: R.W. Kates, J.H. Ausubel, e M. Berberian. *Climate Impact Assessment: Studies of the interaction of climate and society*. ICSU/SCOPE Report, n. 27. Chichester: John Wiley.

LIXO MARINHO DE ORIGEM INDUSTRIAL E AS SUAS ABORDAGENS DE RISCO

Plínio Martins Falcão

Departamento de Geografia, Instituto Federal da Bahia - IFBA
Grupo de Pesquisa *Terra&Mar* - CNPq / IFBA - Campus Salvador
pliniomf@gmail.com

RESUMO

O lixo marinho, seus riscos e efeitos englobam a realidade de todos os continentes, com efeitos para além do oceano, a exemplo dos sistemas naturais costeiros, como as praias. Microlixos são os resíduos com dimensões inferiores a 5 mm, na qual se encontram os *pellets*, que são resinas poliméricas usadas como matéria prima para a indústria de plásticos. Estudos sobre a sua presença em praias vêm sendo realizados desde a década de 1970. Este trabalho teve como objetivo apresentar as principais abordagens levantadas e analisadas pela comunidade científica acerca dos *pellets* e identificar os riscos da presença e dispersão desses no ambiente costeiro. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, elaboração de um banco de dados e trabalhos de campo. Os estudos sobre os *pellets* podem ser agrupados em três níveis de análise: química, física e biológica, representando desde problemas relacionados a transporte de elementos químicos a graves interferências no meio biótico.

Palavras-chave: Poluição Marinha e Costeira; Microlixo; Riscos; Praias.

Introdução

A questão dos resíduos sólidos está na pauta das maiores demandas da atualidade, como foco de estudos e propostas na tentativa de se minimizar os impactos decorrentes da sua produção, que está diretamente relacionada ao crescimento e aos padrões de consumo da sociedade contemporânea. Sobre esse tema existe uma série de estudos que enfatizam, inclusive, os diferentes setores de origem de materiais, a exemplo do urbano, rural, industrial, etc.

No caso do setor industrial, a ampliação dos mercados consumidores e o próprio fenômeno da globalização são os principais responsáveis pela disseminação de matérias-primas e produtos finais das mais diferentes linhagens comerciais e financeiras. Para Sposito e Santos (2012), os diferentes aspectos da internacionalização do capital estão ligados diretamente às relações que as empresas estabelecem em outros países; por exemplo, por meio do comércio de bens e serviços, dos Investimentos Estrangeiros Diretos (IED), das associações com firmas de outros países (na forma de *joint ventures*) e dos fluxos de capital financeiro.

À medida que a industrialização alcança esta versatilidade, vem ocorrendo, paralelamente, maior geração de resíduos em todas as etapas do processo, desde a obtenção da matéria até o seu produto final. Entretanto, havendo maior oferta, proporcionalmente os usos se elevam os desperdícios ou perdas de materiais para o ambiente se acentuam. É o que acontece com os chamados *pellets* de plástico, que são resinas resistentes (esférulas), constituintes da cadeia polimérica e dimensionado na categoria do microlixo marinho, que são aqueles com dimensões inferiores a 5 milímetros ($\leq 5\text{mm}$).

Este trabalho teve como objetivo apresentar as principais abordagens levantadas e analisadas pela comunidade científica acerca dos *pellets* de plástico e identificar os principais riscos da presença e dispersão desse material no ambiente costeiro.

Para tanto, a metodologia empregada consistiu em pesquisa bibliográfica e cartográfica, elaboração de um banco de dados e trabalhos de campo. O desenvolvimento dessas atividades

foi fundamental na organização de um diagnóstico que aponta para alguns tipos de riscos representados pela presença de um material no espaço e que não possui relações diretas com os meios físico e biótico.

Os *pellets* de plástico

Os polímeros se constituem numa das inúmeras formas macromoleculares originadas dos hidrocarbonetos (Baird, 2002), a exemplo do polipropileno (PP), polietileno (PE), poliestireno (PS) e poliuretano (PUE), que servem de base para setores estratégicos da indústria mundial. Estes, por sua vez, são produzidos em forma de grânulos, com densidades, estruturas, composições e cores variadas, a depender das substâncias empregadas, derivados, em sua maioria, do petróleo.

Esses grânulos ou esférulas plásticas, também conhecidos como *pellets*, têm até 5 mm de diâmetro (em média) e são matérias-primas para a fabricação de utensílios plásticos com inúmeras finalidades. Consistem num dos principais problemas ambientais da atualidade, pois durante o seu manuseio e transporte, são comumente perdidas no ambiente, acumulando-se principalmente em praias e zonas de convergência oceânica (Santos et al., 2008), quase sempre provenientes das áreas industriais onde são produzidos.

Fig. 1 - *Pellets* de plástico (esférulas)

Fonte: Falcão, Plínio (2014)

Poluição marinha e costeira, fontes e riscos

A poluição marinha pode ser definida por Garrison (2010) como a introdução no oceano pelos seres humanos de substâncias - ou energia - que alteram a qualidade da água ou afetam o ambiente químico, físico ou biológico. De todos os contaminantes associados às fontes de contaminação em geral, deve-se destacar os resíduos sólidos e o problema da biodegradação da maioria deles (Zujar, *et al*, 2001).

Tais problemas são antigos, haja vista o crescente da população mundial e as suas necessidades de consumo. Entretanto, quando os primeiros oceanógrafos começaram a realizar ensaios amplos, a Revolução Industrial estava bem estabelecida e as alterações já haviam ocorrido. Traços de compostos sintéticos agora são encontrados em todos os cantos do oceano (Garrison, 2010).

Fig. 2 - Abordagens dos estudos sobre pellets em praias

Fonte: Falcão, Plínio (2012)

Uma referência para estes casos baseia-se na análise dos Poluentes Orgânicos Persistentes (POP's), que conferem aos pellets de plástico a capacidade de adsorção de elementos químicos que envolvem os bifenilos policlorados (PCB), os diclorodifeniltricloroetanos (DDT), os hexaclorociclohexanos (HCH) e os policíclicos aromáticos hidrocarbônicos (PAH) (IPW, 2009). Estes seriam, no caso dos grânulos plásticos, alguns dos principais condutores de contaminação química que caracterizam um quadro específico de poluição marinha (Weber, 1993 *apud* Relatório da Comissão Mundial Independente sobre os Oceanos, 1999).

Os riscos da propagação do microlixo marinho proveniente de indústrias (fonte) pode ter a sua origem no oceano e zona costeira ou no interior dos continentes, dispersados a partir de rios, estuários e canais. Sendo assim, as causas e as soluções da poluição da água não serão encontradas olhando-se apenas para dentro da água; geralmente, é o gerenciamento incorreto da bacia hidrográfica que destrói nossos recursos aquáticos (Odum, 2012).

Portanto, os principais riscos promovidos a partir da presença dos microplásticos (*pellets*), baseados nas abordagens de distribuição, biológica e química, são: (a) Impactos sobre o turismo na zona costeira, visto que grandes quantidades desse material em praias se tornam visualmente alarmantes; (b) Ingestão / asfixia por espécies da fauna; (c) Contaminação química associada, com organismos, espécies da flora e fauna; (d) Dispersão biológica, quando material é transportado por espécies para outras áreas, a exemplo de berçários.

Conclusão

O estudo dos riscos está na pauta das discussões acerca das transformações no planeta e suas dinâmicas sociais e ambientais. O lixo marinho, seus riscos e efeitos englobam a realidade de todos os continentes, com efeitos que podem ser visíveis além do oceano, a exemplo dos sistemas naturais costeiros, como praias, manguezais, recifes de coral, costões rochosos e áreas estuarinas.

O processo produtivo agrega, a cada ano, maior quantidade de resíduos à natureza. A China, por exemplo, maior produtor mundial de pellets, tem se destacado no mercado global por fornecer matéria-prima e produtos acabados em maior quantidade por menor preço. Isso lhe coloca no ranking de um dos países que mais colaboram com os riscos iminentes à produtividade industrial, sem equilibrado controle dos atenuantes ambientais. Desta forma, tornam-se evidentes os riscos associados aos resíduos que, incidentalmente ou não, todos os anos vão parar no mar e nas praias, como os pellets.

Bibliografia

BAIRD, C. 2002. **Química Ambiental**. Porto Alegre: Bookman.

INTERNATIONAL PELLET WATCH - IPW. Global Monitoring of Persistent Organic Pollutants (POPs) using Beached Plastic Resin Pellets. Disponível em: <http://www.pelletwatch.org> Acessado em: 12 de fevereiro de 2011.

ODUM, E. P. 2012. **Ecologia**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

O OCEANO... Nosso futuro. 1999. **Relatório da Comissão Mundial Independente sobre os Oceanos**. Rio de Janeiro: Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos, 248 p.

SANTOS, I.R.; BAPTISTA NETO, J.A.; WALLNER,-KERSANACH, M. Resíduos sólidos. In: BAPTISTA NETO, J.A.; WALLNER,-KERSANACH, M.; PATCHINEELAM, S.M. **Poluição Marinha**. Rio de Janeiro: Interciência, 2008.

SPOSITO, E.S.; SANTOS, L.B. 2012. **O capitalismo industrial e as multinacionais brasileiras**. São Paulo: Outras Expressões.

WEBER, P. 1993. Abandoned seas: reversing the decline of the oceans. **Worldwatch Institute Review**, Washington D.C., p.89-111.

ZUJAR, J.O.; VILLALTA, I.V.; ROMERO, G.G. 2001. El acceso de los estados al mar: áreas costeras y cuencas marinas. In: VIVERO, J.L.S. (Org.) **Los océanos**. Medio ambiente, recursos y políticas marinas. Barcelona: Ediciones del Serbal.

Agradecimentos

Ao **INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - IFBA**, instituição na qual o autor atua como docente e pesquisador do seu quadro permanente.

ANÁLISE DA VULNERABILIDADE AOS ACIDENTES TECNOLÓGICOS NO ENTORNO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE PAULÍNIA, SÃO PAULO - SP.

Rafael Alexandre Ferreira Luiz

Departamento de Saúde Ambiental, Faculdade de Saúde Pública de São Paulo
rafalexfe@usp.br

Adelaide Cássia Nardocci

Departamento de Saúde Ambiental, Faculdade de Saúde Pública de São Paulo
nardocci@usp.br

RESUMO

Instalações industriais representam uma das maiores fontes de riscos tecnológicos para a sociedade e o meio ambiente, por isso, o entendimento e gerenciamento destas adquirem grande importância para a garantia dos níveis de segurança. A compreensão da relação entre a vulnerabilidade e o risco permite a contextualização deste último, o que faz com que estudos que privilegiem tal associação se tornem essenciais. Avaliar as vulnerabilidades existentes nestas áreas é de suma importância, pois os resultados podem ser úteis para a formulação de propostas e melhorias no gerenciamento dos riscos. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi a aplicação do modelo conceitual de mapeamento da vulnerabilidade proposto pelo método ARAMIS (*Accidental Risk Assessment Methodology for Industries in the Context of the Seveso II Directive*), a fim de avaliar a vulnerabilidade da área de entorno do distrito industrial do município de Paulínia no estado de São Paulo, Brasil. Verificou-se assim, a aplicabilidade deste modelo ao contexto brasileiro, bem como a identificação dos alvos sensíveis à ocorrência de grandes acidentes e, sobretudo, sua aplicabilidade como instrumento de ordenamento territorial. Devido às características existentes nas áreas de entorno das plantas industriais nas grandes cidades brasileiras e, devido à gravidade e extensão dos danos que possíveis acidentes podem causar à saúde humana, a problemática da vulnerabilidade aos acidentes tecnológicos pode e deve ser encarada como um assunto pertinente da Saúde Pública capaz de contribuir em muito na gestão dos riscos associados e no ordenamento territorial de tais atividades.

Palavras-chave: Vulnerabilidade, Acidentes Tecnológicos, Ordenamento Territorial.

Introdução

O mapeamento da vulnerabilidade no entorno de plantas industriais permite a visualização de áreas vulneráveis (alvos) à situações de riscos, a análise e a avaliação dos processos que as originam. Além disso, podem servir de subsídio para políticas públicas de gerenciamento de riscos em atividades desta natureza.

Devido ao fato do Brasil não possuir uma diretriz nacional para a gestão de riscos de grandes acidentes industriais e, ao planejamento territorial ser uma competência exclusiva dos municípios, estes geralmente desprovidos de recursos, existe uma grande lacuna no que se refere à gestão de riscos, em especial em pólos industriais complexos.

Neste sentido, este trabalho teve como objetivo aplicar o modelo de avaliação e mapeamento de vulnerabilidade proposto pelo método ARAMIS (*Accidental Risk Assessment Methodology for Industries in the Context of the Seveso II Directive*) para uma área industrial no Brasil, além de verificar a viabilidade deste para o contexto brasileiro e sua aplicabilidade na gestão de uso do solo no entorno de distritos industriais de grande porte no país.

Método

A vulnerabilidade do entorno de uma planta industrial é obtida através da composição de uma malha (de tamanho variável de acordo com os objetivos da pesquisa) na área de estudo selecionada. A seguir, é elaborado um índice que leva em conta a presença das três categorias de alvos: humano, ambiental, e material e suas respectivas subcategorias (Quadro I).

Quadro I. Categorias e subcategorias de alvos.

Alvos Humanos (H)	Alvos Ambientais (E)	Alvos Materiais (M)
Trabalhadores da indústria (H1)	Áreas agrícolas (E1)	Plantas industriais (M1)
População local (H2)	Florestas e áreas semi-naturais (E2)	Infraestruturas e serviços públicos (M2)
População em estabelecimentos públicos (H3)	Áreas naturais específicas (E3)	Estruturas privadas (M3)
Usuários de vias de comunicação (H4)	Nascentes e corpos d'água (E4)	Estruturas públicas (M4)

A vulnerabilidade de cada categoria de alvo é determinada em função da combinação de quatro tipos de efeitos físicos: sobrepressão, fluxo térmico, toxicidade de gás e poluição líquida com três tipos de impactos gerados em termos de: integridade (estrutura do alvo), econômicos (perda de produção ou reabilitação) e psicológicos (influência em um grupo de pessoas). A sobreposição de todas, resulta na vulnerabilidade global (TIXIER et al 2006). A quantificação dos alvos é representada adimensionalmente na malha, onde 0 indica ausência total e 1 indica a presença máxima do alvo.

Área de estudo e cenários hipotéticos de acidentes

A figura 1 exibe a região do distrito industrial do município de Paulínia, no estado de São Paulo, Brasil, onde uma malha de 500 x 500 metros foi definida a partir do centro da área da Refinaria de Paulínia (REPLAN), assim como a distância máxima de abrangência representativa de uma sobreposição de 14 cenários acidentais hipotéticos.

Figura 1. Localização da Área de Estudo.

A construção dos cenários hipotéticos de acidentes levou em consideração a overpressure, athermal flux e a gas toxicity como causas acidentais e, gás liquefeito de petróleo, gás de amônia e combustíveis líquidos inflamáveis como substâncias envolvidas. As distâncias de abrangência para cada cenário foram obtidas através da bibliografia disponível (KHAN e ABASSI, 1999) e por meio de simulações do *software Effect-GIS*.

Resultados

Na figura 2 é possível verificar a identificação e espacialização dos alvos humanos, ambientais e materiais na área de estudo.

Figura 2. Identificação e espacialização dos alvos humanos (A), ambientais (B) e materiais (C) na área de estudo.

Na figura 3 é possível verificar a identificação e espacialização das vulnerabilidades na área de estudo.

Figura 3. Identificação das vulnerabilidades encontradas na área de estudo.

A vulnerabilidade humana apresentou valores elevados nas porções centro-oeste, sul e sudoeste, já na ambiental, detectou-se os maiores valores obedecendo a um padrão centrífugo ao núcleo industrial. Em relação à vulnerabilidade material, os valores mais elevados foram associados às extensões industriais. Por fim, a vulnerabilidade global apresentou valores elevados de maneira similar às encontradas nas vulnerabilidades humana e material e valores pequenos similares aos encontrados na vulnerabilidade ambiental.

Conclusão

De acordo com Farias (2010), o perímetro destinado ao uso industrial já corresponde a 40% da mancha urbana, fato que desperta preocupações sobre as transformações das formas de ocupação e que influencia, sobretudo na vulnerabilidade humana da região. Ressalta-se assim, a importância do planejamento territorial como instrumento capaz de mitigar as consequências de um acidente tecnológico. Neste sentido, destacam-se países da Europa e os EUA que levam

em conta a delimitação de zonas adjacentes ao entorno de plantas industriais com diferentes restrições de uso e ocupação do solo, prática que tem sido ignorada em regiões como o município de Paulínia, onde, frequentemente, as áreas vulneráveis superam espacialmente o limite industrial. O modelo de avaliação da vulnerabilidade utilizado neste estudo se mostrou viável de ser aplicado à realidade brasileira, uma vez que é conceitual e possui grande aplicabilidade em ambiente GIS, além de fornecer subsídios preciosos que podem ser inseridos em instrumentos de gestão do uso do solo no entorno de áreas industriais, pois os resultados em formato de mapas tornam-se acessíveis e de fácil interpretação para todas as entidades que estão envolvidas em processos como este.

Bibliografia

- Farias, O. (2010) - *Análise do processo de instalação e expansão dos loteamentos fechados horizontais de alto padrão na cidade de Paulínia*. Campinas, Universidade de Campinas, 105 p.
- Khan, I.; Abbasi, A. (1999) - A new tool for conducting rapid risk assessment in refineries and petrochemical industries. *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, vol. 18, n.º 3, p. 135-145.
- Tixier, J.; Dandrieux, A.; Dussere, G; Bubbico, R.; Mazzarotta, B.; Silvetti, B.; Hubert, E.; Rodrigues, N.; Salvi, O. (2006) - Environmental vulnerability assessment in the vicinity of an industrial site in the frame of ARAMIS European project. *Journal of Hazards Materials*, n.º 130, p.251-264.

CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICAS E RISCOS SOCIAIS: O CASO DO RIO ARAGUARI - MG, BRASIL

Vicente de Paulo da Silva

Instituto de Geografia, Universidade Federal de Uberlândia (MG), Brasil
vicentepht@hotmail.com

RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar a realidade do rio Araguari, no estado de Minas Gerais - Brasil, no que tange à opção brasileira pela construção de hidrelétrica e, conseqüentemente, os riscos sociais a que os moradores são submetidos. Ao longo do rio foram construídas quatro grandes hidrelétricas - UHEs (Nova Ponte, Miranda, Amador Aguiar 1 e 2) e duas pequenas centrais hidrelétricas - PCHs (Pai Joaquim e Cachoeira dos Macacos) construídas, principalmente, a partir de meados dos anos de 1980. Os deslocamentos compulsórios tem sido a forma de maior agressão a modos de vida e diferentes culturas decorrentes dessas obras. Nossas investigações se voltam para os riscos sociais decorrentes dessa opção, quando discutimos os efeitos sociais e espaciais provocados pelas barragens. Os riscos estão, principalmente, associados ao aparecimento de novas doenças, perdas de rituais simbólicos, acentuação de processos de desterritorialização em função dessa forma de apropriação dos territórios.

Palavras-chave: (Territórios, Hidrelétricas, Riscos Sociais, deslocamentos compulsórios, Rio Araguari).

Introdução

Este trabalho teve sua origem nas preocupações levantadas por ocasião de nossa pesquisa de doutoramento em Geografia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - Brasil, Silva (2004), no qual se buscou discutir o significado do uso do território por grandes projetos, na forma específica de usinas hidrelétricas e refletir acerca dos efeitos e riscos provocados por essa decisão. Neste sentido, a definição de grandes projetos é dada por Vainer (1992), o qual diz que estes “são empreendimentos que consolidam o processo de apropriação de recursos naturais e humanos em determinados pontos do território, sob a lógica estritamente econômica...” (1992, p.34).

O termo Grandes Projetos passou a definir mais objetivamente os projetos hidrelétricos de grandes dimensões. Nesses casos, diz Vainer, sua natureza e sua lógica, são no sentido de explorar certos recursos naturais e espaços, além de mobilizar determinados territórios com fins específicos de produzir eletricidade.

Para Martins (1992), os grandes projetos se referem aos projetos econômicos de envergadura. Como exemplos ele cita as hidrelétricas, rodovias, planos de colonização, de grande impacto social e ambiental que, como diz o autor, embora esses projetos não tenham por destinatárias as populações locais “seu pressuposto é o da remoção dessas populações” (p.62).

Mas é importante lembrar como o papel do Estado é importante e definidor nas tomadas de decisão que garantem a execução desses grandes empreendimentos. Sua forte presença constitui uma garantia de que o projeto se realizará, ao passo em que financia a destruição das condições existentes nos locais escolhidos para a execução de uma obra.

Por meio do discurso o Estado promove o rompimento das relações pré-estabelecidas e o apego pelas coisas tratando-as como sentimentos reducionistas. Por outro lado, os moradores desses locais, quando ocupam as áreas a ser tomadas para a execução da obra, são taxados de alheios ao progresso, ou seja, do progresso de grupos econômicos no poder. A memória e o sentimento

de apego pelo lugar antigo são traços marcantes da vida dos deslocados que os acompanharão e se tornarão úteis na reconstrução do novo lugar.

Decisões sobre o território... dos outros

Os grandes projetos, em especial os empreendimentos hidrelétricos, têm promovido profundas transformações no território, enquanto o apelo ao discurso tem sido o grande trunfo utilizado para garantir o desenvolvimento dos mesmos. Esses discursos visam, muitas vezes, promover o fim do lugar, pois ele é o campo de negociação e de busca de inserção nos projetos de modernização. Inserção aqui assume as mais diferentes formas, não significando apenas ir contra o projeto, mas poder opinar a respeito dele e, se necessário, intervir, ainda que contra ele.

A abordagem do território parte do entendimento de que o mesmo constitui uma dimensão do espaço ou uma construção social na qual as pessoas se reconhecem e sentem reconhecidas, ou seja, são aspectos da própria identidade. Assim, entende-se que os deslocamentos compulsórios, mais do que tirar pessoas do lugar em que moram e deslocarem para outros lugares, significam uma agressão a uma vida culturalmente experienciada entre o território e o modo de viver das pessoas. Essa mobilidade faz com que se criem sentimentos de perdas muitas vezes ignorados por empreendedores responsáveis pela execução de grandes obras.

Diferentes riscos podem ser associados a esses eventos os quais podem ser de grau e intensidade diferentes se a análise se foca mais na montante ou à jusante das obras. Os riscos podem ser desde aparições de problemas de saúde que antes não eram comuns entre os moradores submetidos a esses processos, como, depressão, problemas psicológicos, ou o que se conhece por doenças psicoafetivas, cuja incidência pode estar diretamente relacionada com o fato de se deslocarem as pessoas de suas moradias. Também é preciso considerar os riscos decorrentes da exposição a resíduos tóxicos oriundos de práticas usadas na execução das obras, bem como, os riscos de rompimento ou qualquer outro tipo de falha técnica decorrente dessas construções.

No mundo moderno, há muitos sinais de manipulação de territórios que são transformados ou mesmo destruídos, em função da decisão por grandes projetos. É, por exemplo, o caso das hidrelétricas, cuja formação dos reservatórios exige a inundação de extensas áreas, rurais e urbanas e, conseqüentemente, a destruição dos lugares.

Por um lado, isto se da em função do conhecimento aperfeiçoado da natureza dos lugares, conforme diz Relph (1980), e, por outro lado, em razão da emergência de abastecimento do mercado com a energia hidrelétrica. A mobilidade permite que se criem novos territórios. Ainda assim o lugar antigo, ou que tenha passado por um processo de transformação, terá, por certo tempo, um significado para aqueles que o viveram.

Na cidade, os efeitos dos grandes projetos são significativos. Decorrente da decisão de implantá-los, toda uma realidade pré-existente é submetida ao processo de mudança. Terras férteis têm sido inundadas e cidades inteiras têm sido submersas. Além disso, tem havido sérias implicações na ictiofauna, nas florestas e outros sítios. Da mesma forma, não podem ser deixados de lado os casos de adoecimento de pessoas submetidas a esses processos, cujos efeitos podem ser maiores ou menores a depender do grau de envolvimento da pessoa com seu território; o nível de apego; os laços com o lugar.

A destruição seja de uma cidade, de um povoado, um lugarejo qualquer, enfim, de um ambiente socialmente construído, em função da execução de um projeto é algo complexo. Sua reconstrução, contudo, parece-nos mais complexa ainda. Reconstruir esse ambiente não

significa, simplesmente, construir casas e ruas, mas será, acima de tudo, a reconstrução do lugar que dará nova morada aos destituídos de seu lugar anterior.

Brasil: grandes projetos no rio Araguari-MG

A história dos grandes empreendimentos hidrelétricos, no Brasil, poderia ser contada com uma conotação de maior positividade se não fosse o expressivo número de população atingida pela formação dos lagos. Os deslocamentos tendem a ser cada vez maiores, pelo fato de que os projetos também têm crescido, seja em quantidade seja em alcance. A partir do momento em que são realizados os procedimentos para identificar o potencial energético de uma bacia - os inventários - e, constatado esse potencial, tudo mais será considerado como recurso adicional ou entrave para execução do projeto.

Pode ser considerada como entrave a existência de florestas, a ictiofauna, a utilização produtiva de rios ricos em espécies de peixes, a existência de amplas faixas de terras férteis e, como efeitos negativos, além da destruição desses ambientes, há o deslocamento compulsório de milhares de moradores como grupos indígenas, produtores rurais e mesmo moradores de áreas urbanas que têm engrossado esse contingente de expropriados das áreas definidas para execução de projetos.

É importante retomar aqui os argumentos de Rosa e Schaffer (1988), quando dizem que, mesmo reconhecendo a importância do aproveitamento energético dos rios brasileiros, o que não se pode mais permitir é que decisões autoritárias sejam tomadas à revelia da população. Além disso, eles dizem que o fato de se identificarem esses sítios, como aconteceu em relação ao rio Araguari, não significa que, obrigatoriamente, os mesmos devam ser aproveitados. O caso do rio Araguari é bastante revelador dessas condições.

A bacia do rio Araguari, conforme Figura 1, compreende uma área de 22.091Km², abrangendo vinte municípios. Localiza-se no oeste do Estado de Minas Gerais, entre as coordenadas 18° 20' e 20° 10' de latitude sul e 46° 00' e 48° 50' de longitude oeste. A sua maior porção territorial insere-se na mesoregião geográfica do Triângulo Mineiro, fazendo ainda divisa com a bacia do Rio Tijuco a oeste sudeste; a bacia do Rio Grande ao sul; bacia do São Francisco a leste; a norte e noroeste com a Bacia do Rio Dourados e também ao norte com as nascentes do Rio Paranaíba. O rio Araguari nasce no Parque Nacional da Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas e percorre 475 Km até a sua foz no Rio Paranaíba, sendo um dos afluentes do rio Grande, que integra a bacia transnacional do rio Paraná (Portal dos Comitês de Bacia - MG, 2013)

O rio, conforme se observa na figura 1, nasce no Parque Nacional da Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas, e percorre uma área de 475 quilômetros de extensão, da nascente à foz. Ao longo de seu curso, foram construídas quatro hidrelétricas, de grande porte - Nova Ponte, Miranda, Amador Aguiar I e Amador Aguiar II - e duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH's) - Pai Joaquim e Macacos.

Além disso, parte significativa do rio é represada pela Hidrelétrica de Itumbiara, no rio Paranaíba, onde o Araguari deságua.

Ao longo de todo o seu percurso, o rio apresenta uma série de utilidades e abriga histórias, reais ou fantásticas, em que sua presença muito contribui para a consolidação de modos de vida e representações culturais nos diversos municípios por ele banhados. Tais manifestações têm sido drasticamente alteradas pela presença significativa dessas hidrelétricas em todo seu curso, como se confirma pelo mapa acima, além da projeção de outras à montante da PCH Cachoeira dos Macacos e em diversos afluentes do Araguari.

Figura 1: Rio Araguaari-MG Fonte: ROSA et al, 2004

Conclusão

O rio apresenta grande quantidade de área lacustre o que provavelmente pode representar uma maior vulnerabilidade ao aparecimento de doenças devido à proliferação de mosquitos ou outros vetores e dos riscos de rompimento que poderiam desencadear uma série de efeitos em cascata e colocariam em situação de emergência as hidrelétricas à jusante seja por aumento drástico do volume d'água ou novos riscos de rompimento dessas.

Além disso, há que se considerar a possibilidade de inundação dos novos territórios formados a partir da apropriação dos espaços à margem dos lagos, onde houve uma valorização que levou a que muitos moradores viessem a construir ranchos de veraneio, por vezes luxuosos, para desfrutarem a nova paisagem.

Nossas pesquisas ainda não podem ser conclusivas, porém, as evidências têm apontado que nenhuma possibilidade deverá ser descartada até que se prove o contrário. Os riscos existem, quer sejam técnicos (rompimento) quer sejam sociais (novas doenças, inundação, afogamentos etc). Contudo, acreditamos que estudos comparativos, em outras áreas que estejam nas mesmas condições do Araguaari, poderão revelar situações passíveis de análise e confirmação dessas ameaças encobertas pelo discurso que garante a execução das grandes obras.

Agradecimento:

Nossos agradecimentos à Universidade Federal de Uberlândia, Pró Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação (PROPP) pelo financiamento de nossa participação nesse evento.

Referências

MARTINS, J. de S (1993) - A chegada do estranho. São Paulo: Hucitec, 179p.
Portal dos comitês de bacia - MG. Disponível em: <http://comites.igam.mg.gov.br/comites-estaduais/bacia-do-rio-paranaiba/pn2-cbh-do-rio-araguaari/1148-conheca-a-bacia>. Acesso em agosto 2014

RELPH, E. (1980) - Place and placelessness. London: Pion Limited, 156 p

ROSA, L. P. e SCHAEFFER, R. (1988) - A política energética brasileira. In: SANTOS, L. A. O. e ANDRADE, L. M. M. de (org). As hidrelétricas do Xingu e os povos indígenas. São Paulo: ZERODOIS Serviços Editoriais S/C. Ltda. p. 53 - 58

ROSA, R. et al (2004) - Elaboração de uma base cartográfica e criação de um banco de dados georreferenciados da bacia do rio Araguari-MG. In: LIMA, S. do C. e SANTOS, R. J. (Organizadores). Gestão ambiental da bacia do rio Araguari - rumo ao desenvolvimento sustentável. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Geografia; Brasília: CNPq, 221p.

SILVA, Vicente de Paulo da.(2004) Efeitos Sócio-espaciais de Grandes Projetos em Nova Ponte - MG: Reorganização do Espaço Urbano e Reconstrução da Vida Cotidiana/ Rio de Janeiro: UFRJ / IGEO / PPGG, 2004. Tese (Doutorado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, CCMN, Programa de Pós Graduação em Geografia.

VAINER, C. B.; ARAÚJO, F. G. B. (1992) - Grandes projetos hidrelétricos e desenvolvimento regional. Rio de Janeiro: CEDI, 86 p.

INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA DOS RISCOS TECNOLÓGICOS ORIUNDOS DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS NO BRASIL: UM OLHAR A PARTIR DAS PRÁTICAS PARTICIPATIVAS

Delanney Vidal Di Maio Junior

Analista em C&T do Instituto de Aeronáutica e Espaço - IAE, Mestre pela Universidade de Taubaté - UNITAU
delanneydvdmj@iae.cta.br

Marilsa de Sá Rodrigues Tadeucci

Profª. Drª. do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Desenvolvimento Regional da UNITAU
marilsatadeucci@hotmail.com

Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira

Prof. Dr. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA da UNITAU
edson.oliveira@unitau.com.br

RESUMO

Este artigo tem por objetivo apresentar exemplos de inovação na gestão dos riscos tecnológicos. A partir da revisão teórica dos conceitos de perigo, risco, risco tecnológico, inovação na gestão pública, participação cidadã e governança local dos riscos; apoiado no método bibliográfico e documental; exemplifica Legislação que regula as atividades da indústria de Petróleo e Gás no Brasil. Os temas abordados estão sistematizados para favorecer a discussão sobre a limitação da Ciência para isoladamente equacionar problemas complexos como o proposto, além de tipificar como inovação a participação cidadã das comunidades potencialmente atingidas por estes riscos, que fortalece a governança local.

Palavras-chave: Gestão. Gestão Pública. Inovação. Risco Tecnológico.

Introdução

O Brasil, a partir de 1930 iniciou seu processo de industrialização, e o país até então de características agrária, já nos anos 50 começa a observar a concentração da população nos centros urbanos. Em 03 de outubro de 1953, por meio da Lei nº 2004, foi criado a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras. O processo de industrialização se acelerou no pós-guerra e trouxe problemas relacionados à consecução de processos industriais em grande escala e sua proximidade a aglomerados humanos.

A Secretaria Nacional de Defesa Civil ressalta que o agravamento da crise econômica que atingiu o País, na década de 70, “gerou reflexos altamente negativos sobre o processo de desenvolvimento social e sobre a segurança das comunidades contra desastres” (Brasil, 2007, p. 3).

O sociólogo alemão Ulrich Beck cunhou o termo “sociedade de risco” proposto em seu clássico livro *Risikogesellschaft - Auf dem Weg in eine andere Moderne*, de 1986, onde alerta sobre os riscos aos quais as sociedades atuais estão sujeitas, particularmente os riscos de caráter tecnológico e ambiental.

Após a ocorrência de acidentes industriais maiores (FUNDACENTRO, 2002); a sociedade se organiza e pressiona a Indústria (principalmente a nuclear, a petrolífera e a química), bem como os representantes dos três níveis de Governo, para que sejam tomadas medidas efetivas para coibir eventos similares.

De maneira geral, para fazer frente às pressões sociais a Indústria tem investido em mais tecnologia para controle dos processos. Os Poderes Executivo e Legislativo por sua vez, têm intensificado a fiscalização e aprovado legislações mais restritivas para autorizar a instalação destas indústrias.

Asseveram Lieber e Romano-Lieber (2005, p 13), ser “próprio do uso da ciência, a possibilidade de um desastre particular, o desastre tecnológico”, visto que a ciência apresenta uma condição de ‘conhecimento provisório’ e de operação na fronteira do conhecimento.

Este artigo a partir de breve revisão teórica; apoiado no método bibliográfico e documental; exemplifica Legislação que regula as atividades da indústria de Petróleo e Gás no Brasil e tem por objetivo apresentar exemplos de inovação na gestão dos riscos tecnológicos, fortalecendo sua governança.

Diferenciação entre Risco e Perigo

Destacam Marandola Jr. e Hogan (2004a) que no linguajar cotidiano risco e perigo são muitas vezes empregados como sinônimos, porém é importante fazer a adequada diferenciação. Perigo é o potencial que determinada atividade ou ação tem de causar danos a pessoas ou instalações, enquanto risco é a possibilidade de determinado evento se concretizar com determinada intensidade e severidade em função da vulnerabilidade pessoal, institucional, local ou regional, que qualificarão o dano que se verificará.

Para Moraes (2007), o termo risco, cientificamente elaborado, está ligado ao aprendizado dos perigos, sua constância ou rigidez, e assume a característica de previsibilidade e controle sobre um possível futuro, quando eventos exequíveis poderiam efetivar-se trazendo consequências boas ou más.

Autores como Renn (2008); Marandola Jr. e Hogan (2004b) e Areosa (2010) atestam que o risco tem sido abordado e interpretado por cientistas das mais diversas áreas, tais como: biologia (ecologia), comunicação, direito, economia, engenharia, geografia, geologia, medicina, psicologia, saúde coletiva (vigilância sanitária), sociologia, toxicologia, e urbanismo (arquitetura), entre outros. Cada ciência realiza suas reflexões ao tema abordado e valoriza diferentes dimensões ou aspectos do risco.

Renn (2008) destaca que não há que se considerar uma perspectiva de análise dos riscos mais relevante que outra e que para atingir-se a adequada Gestão dos Riscos é de importância capital que se construa uma abordagem integrada das referidas perspectivas, citando como exemplo a Amplificação Social do Risco.

Classificação dos Riscos

Jones (1990) e Egler (1996) afirmam que os riscos são onipresentes e podem ser divididos em três categorias O Ministério do Meio Ambiente referenda que podem ser classificados como: Naturais, Sociais e Tecnológicos; conforme Macro Diagnóstico da Zona Costeira e Marinha do Brasil (Brasil, 2008).

Riscos Tecnológicos

Os riscos tecnológicos estão vinculados à probabilidade de ocorrência de vazamentos, explosões, incêndios e outros, a partir de processos industriais impactando o meio ambiente e a comunidade instalada no entorno. Esse tipo de risco pode ser definido como “potencial de ocorrência de eventos danosos à vida, a curto, médio e longo prazo, em consequência das decisões de investimento na estrutura produtiva” (Brasil, 2008, p.21).

Inovação na Gestão Pública

Visto que as formas com que o Governo tradicionalmente tem conduzido o processo para fazer frente às ocorrências dos acidentes tecnológicos até o momento não foram eficazes faz-se

necessário à implantação de inovação no sentido de melhorar a Gestão Pública deste fenômeno.

Jacobi e Pinho (2006, pag. 8) afirmam que são exemplos de processos inovadores “experiências como o orçamento participativo, gestão compartilhadas de recursos comuns, parcerias com a sociedade civil e, principalmente, a participação dos cidadãos em diversas instâncias da Gestão Pública”.

Participação Cidadã e Governança Local dos Riscos

Cançado, Tenório e Pereira (2011) mencionam o necessário controle social da ciência, convoca a população à responsabilidade pelo próprio direcionamento da ciência. Em uma perspectiva mais amplificada, repreende a posição de especialistas que muitas vezes decidem sobre o destino dos indivíduos sem sequer indagá-los, realçando que o próprio desentendimento entre os especialistas e seu afastamento da realidade não asseguram que a sua decisão seja a melhor.

A participação cidadã se faz necessária e Benevides (1991, p. 96) acredita que “quanto maior for a participação popular, maiores serão as chances de se criar, no povo, a consciência de seus direitos, em seu sentido essencial, de exigências contra outrem”.

Marandola Jr. e Hogan (2004b) ressaltam a importância de levar em conta a forma como as populações vivenciam e percebem (se percebem) os riscos a que estão expostas, quando da formulação da política pública de gestão dos riscos. Caso contrário, as ações mitigadoras dos riscos estarão fadadas ao fracasso por não mobilizarem a comunidade que não entende os motivos de tais propostas. A governança do risco só será alcançada com a efetiva participação de todos os atores sociais envolvidos.

Gestão de Risco

O gerenciamento de risco vai além da identificação dos potenciais problemas que possam ocorrer. A estimativa da probabilidade de sua ocorrência, a determinação de meios para evitá-los e mesmo enfrentá-los, caso necessário, o ponto chave é a tomada de decisão estruturada para a realização do empreendimento (CETESB, 2002).

Visando garantir a realização da gestão dos riscos tecnológicos o governo tem papel preponderante no sentido de regulamentar o cumprimento mínimo de determinadas exigências legais a título de exemplo, apresenta-se no Quadro I exemplo de acordo internacional assinado pelo Brasil aplicado à área de petróleo e gás.

Quadro I: Exemplo de Acordo Internacional aplicado à área de petróleo e gás.

Normas	Características
O DECRETO LEGISLATIVO Nº 246, DE 2001 - Aprova o texto da Convenção nº 174 da OIT sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, complementada pela Recomendação nº 181, adotadas em Genebra, em 2 e 22 de junho de 1993, respectivamente; e	Tem por objeto a prevenção de acidentes industriais maiores que envolvam substâncias perigosas e a limitação das consequências desses acidentes. A expressão “acidente maior” designa todo evento subitâneo, como emissão, incêndio ou explosão de grande magnitude, no curso de uma atividade em instalação sujeita a riscos de acidentes maiores, envolvendo uma ou mais substâncias perigosas e que implica grave perigo, imediato ou retardado, para os trabalhadores, a população ou o meio ambiente.
O DECRETO Nº 4.085, DE 15 DE JANEIRO DE 2002 - Promulga a Convenção nº 174 da OIT e a Recomendação nº 181 sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores.	Com base na informação fornecida pelo empregador, a autoridade competente assegurará que planos e procedimentos de emergência, contendo medidas para proteção da população e do meio ambiente fora do local de cada instalação de riscos, sejam criados, atualizados em intervalos apropriados, e coordenados com autoridades e órgãos pertinentes.

Fonte: Adaptado de Calixto (2011).

Conclusão

Faz-se necessário ter cautela com possíveis dissimulações no que diz respeito à legitimação política dos Riscos Tecnológicos; neste sentido Beck (2011, p. 24) ressalta que “A promessa de segurança avança com os riscos e precisa ser diante de uma esfera pública alerta e crítica, continuamente reforçada por meio de intervenções cosméticas ou efetivas no desenvolvimento técnico-econômico”.

É necessário abrir à negociação para todos dos atores sociais que indiretamente ou diretamente estejam relacionados aos problemas abordados, é reconhecido que para fazer frente aos problemas dos Riscos Tecnológicos, existem mais de uma solução técnica e que a opção entre elas, distante de ter apenas o cunho técnico e específico, é também fruto de decisão política, cultural e econômica.

Como exemplo de Programa e Política Pública inovadora apresenta-se:

- O Programa Municipal de Redução de Riscos (PMRR) que possui inclusive recursos previstos no Plano Plurianual - PPA 2012 - 2015 aprovado pela Lei Nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012 que prevê a tratativa da Gestão de Riscos e Respostas a Desastres (Programa 2040); e
- A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC aprovada pela Lei Nº 12.608/2012, que prevê em seu artigo 3º, “integrar-se às políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável”.

Não basta o Governo conceder o direito da população participar da discussão sobre a aceitação dos Riscos Tecnológicos é fundamental que as comunidades se apropriem do debate como espaço empoderante da cidadania participativa.

Bibliografia

- Areosa, J. (2010) - O risco nas ciências sociais: uma visão crítica ao paradigma dominante. *Revista Angolana de Sociologia*. Luanda, n. 5 e 6, jun.-dez. p. 11-33;
- Beck, U. (2011) - *Sociedade de risco*: Rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo: Ed. 34, 2ª Ed. 384 p.;
- Benevides, M. V. M. (1991) - *A cidadania ativa*: referendo, plebiscito e iniciativa popular. São Paulo: Ática, 208 p.;
- Brasil. Secretaria Nacional de Defesa Civil. (2007) - *Política Nacional de Defesa Civil*. Brasília: Ministério da Integração Nacional, 82 p.;
- Brasil. Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental. (2008) - *Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha do Brasil*. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 242 p.;
- Calixto, E. (2011) - *Contribuições para plano de contingência para derramamento de petróleo e derivados no Brasil*. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: UFRJ; COPPE, 301 p.;
- Cançado, A. C.; Tenório, F. G.; Pereira, J. R. (2011) - Gestão social: reflexões teóricas e conceituais. *Cad. EBAPE.BR*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, set. p. 681-703;
- CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. (2002) - *Análise, Avaliação e Gerenciamento de Riscos*. São Paulo, 244p.;
- Egler, C. A. G. (1996) - Risco Ambiental como Critério de Gestão do Território. *Território*, 1, p. 31- 41;
- FUNDACENTRO (2002) - *Prevenção de Acidentes Industriais Maiores*, Contribuição da OIT para o Programa Internacional de Segurança Química do PNUMA, OIT e OMS (IPCS), São Paulo, 120 p.;

- Jacobi, P.; Pinho, J. A. (2006) - *Inovação no campo da gestão pública local: novos desafios, novos patamares*. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 204 p.
- Jones, D. (1993) - Environmental hazards in the 1990s: problems, paradigms and prospects. *Geography*. v. 78, n. 2, 1993. p. 161-165;
- Lieber, R. R.; Romano-Lieber, N. S. (2005) - Risco e precaução no desastre tecnológico. *Cadernos de Saúde Coletiva*. Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 67-84;
- Marandola Jr., E.; Hogan, D. J. (2004a) - NATURAL HAZARDS: O Estudo Geográfico dos Riscos e Perigos. *Ambiente & Sociedade*. v. VII, n. 2, jul./dez. p. 95-110;
- Marandola Jr., E.; Hogan, D. J. (2004b) - O risco em perspectiva: tendências e abordagens. *Geosul*, Florianópolis, v. 19, n. 38, jul./dez., p 25-58;
- Moraes, P. M. (2007) - *As representações sociais de funcionários sobre o risco em uma refinaria de petróleo*. Dissertação de mestrado. Taubaté: UNITAU, 223 p.;
- Renn, O. (2008) - *Risk governance: coping with uncertainty in a complex world*. London: Earthscan, 368 p.

GUIAS METODOLÓGICOS: ELABORAÇÃO DO FATOR AMBIENTAL ANÁLISE DE RISCOS EM ESTUDOS DE IMPACTE AMBIENTAL

Margarida Correia Marques

Unidade de Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real
mcm@utad.pt

Cristina Sá

Unidade de Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
cristinaflipasa@gmail.com

Sara Capela

UVV, Centro de Modelação de Sistemas Ambientais, Lda., Gafanha da Nazaré; Unidade de Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
sara@uvv.pt

Cristina Russo

Agência Portuguesa do Ambiente I.P. - Lisboa
cristina.russo@apambiente.pt

RESUMO

O fator ambiental Análise de Riscos é de especial relevância nos Estudos de Impacte Ambiental (EIA) devido à tipologia de acidentes que podem ocorrer, com consequências graves para o ambiente, população e património, nas fases de construção, exploração e desativação dos projetos. A atual ausência de metodologias e critérios para elaboração e avaliação deste fator ambiental impôs a necessidade de se disponibilizar orientações e métodos de aplicação que possibilitem reconhecer e definir a profundidade e a importância de uma abordagem mais específica e homogênea da análise de riscos ambientais, passando a ser parte integrante e fulcral de EIA. O Guia metodológico de apoio à elaboração da análise de riscos ambientais em EIA de propostas de projetos 1, do setor das Pedreiras ou 2, dos sectores industriais da Transformação e da Produção de Eletricidade de origem térmica, convertem-se numa mais-valia no reduzir da subjetividade e no agilizar do processo de Avaliação de Impacte Ambiental.

Palavras-chave: Análise de Riscos Ambientais, Estudo de Impacte Ambiental, Pedreiras, Indústria do Sector da Transformação, Indústria do Sector da Produção de Eletricidade de origem térmica.

Introdução

A análise de riscos ambientais possibilita disponibilizar informações eficientes e objetivas, fulcrais para a tomada de decisão, tornando-se um passo relevante e indispensável dos Estudos de Impacte Ambiental (EIA). Contudo, atualmente ainda existem lacunas de conhecimento que dificultam a sua realização, como a falta de consenso sobre os métodos a aplicar, a dificuldade na definição dos cenários de acidente ou a ausência de critérios de aceitação e/ou tolerância ao risco. De realçar, também, são alguns aspetos críticos de metodologias de análise de riscos que não devem ser descurados, tal como a utilização de *softwares* adequados à situação em análise, a descrição dos pressupostos assumidos e a justificação das opções tomadas ao longo do estudo. Para além disso, observa-se uma disparidade significativa no grau de desenvolvimento deste fator ambiental nos EIA atualmente produzidos em Portugal (Capela e Correia Marques, 2013; Sá *et al.*, 2014).

Neste contexto, surgem os presentes Guias metodológicos setoriais, com o objetivo de apoiar o proponente na elaboração da análise de riscos ambientais em EIA de propostas de projetos 1, do

setor das Pedreiras ou 2, dos sectores industriais da Transformação e da Produção de Eletricidade de origem térmica. Adicionalmente visam servir de suporte à equipa que avalia o EIA, permitindo desta forma, melhorar e agilizar o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), com diminuição do tempo de resposta das partes envolvidas.

Metodologia para Elaboração da Análise de Riscos no EIA

A metodologia apresentada conjuga as indicações e referências dos documentos legais e normativos atualmente em vigor, a nível nacional e internacional.

Optou-se por desenvolver um documento técnico flexível, quer na escolha das ferramentas e *softwares*, quer na profundidade da análise, que depende muito da informação disponível acerca do projeto e da envolvente. Por outro lado, o procedimento tem um carácter dinâmico, de modo a que possa ser continuamente melhorado, desenvolvido e adaptado às novas informações que surjam no âmbito da análise de riscos ambientais. Nos Guias consideraram-se todas as atividades operacionais diretamente relacionadas com o funcionamento do projeto, excluindo as atividades indiretas.

Fases de Construção e Exploração

Nas fases de construção e exploração, o processo de análise de riscos nos EIA deve incluir três etapas distintas e sequenciais: Caracterização Ambiental da Envolvente, Caracterização do Projeto e Análise de Riscos Ambientais.

Caracterização Ambiental da Envolvente

O enquadramento geográfico pode definir a vulnerabilidade decorrente dos riscos tecnológicos e o grau de desenvolvimento que o estudo terá de atingir, no que diz respeito à análise quantitativa de riscos.

A área para análise da envolvente deve corresponder à área potencial de afetação da atividade em análise (construção ou exploração) e ser definida de modo a que abranja as zonas povoadas, recetores e fontes de risco mais relevantes. De realçar que esta caracterização deve ser desenvolvida em coordenação com os fatores ambientais avaliados no EIA e, sempre que possível, deve ser feita com recurso sistemas de informação geográfica e gráficos, que facilitem a visualização e perceção do leitor.

Caracterização do projeto

A caracterização do projeto deve conter a sua descrição, a identificação e quantificação dos materiais perigosos que irão ser manuseadas e armazenadas, a análise estatística do registo histórico de acidentes industriais (se for uma instalação nova, pode consultar-se bases de dados internacionais e usar dados de instalações similares), a identificação das fontes de risco internas e externas e a identificação das medidas de contenção e prevenção de acidentes graves previstas para a fase de construção e exploração.

Análise de Riscos Ambientais

A análise de riscos ambientais engloba a identificação das fontes de risco, dos cenários de acidente, suas causas e potenciais consequências, bem como, o examinar das vulnerabilidades encontradas. Assentando a determinação de um nível do risco na conjugação das consequências e das respetivas verosimilhanças de ocorrência do cenário de acidente (NP

ISO 31000:2013), a análise riscos pode assim ser expressa de forma qualitativa, quantitativa e semi-quantitativa. Porém, importa ter sempre em atenção a subjetividade e a incerteza inerentes ao próprio processo de análise de riscos, mediante a sua correta ponderação e descrição por parte dos decisores, ou seja, divergências de opinião entre os especialistas, a disponibilidade, qualidade, quantidade e relevância de informações deverão ser devidamente declaradas e evidenciadas (ISO/IEC 31010:2009) em todo o processo de análise de riscos ambientais.

Finda a etapa de análise de riscos, e para cada um dos riscos que foram considerados, identificam-se os níveis aceitáveis e/ou toleráveis mediante a aplicação das medidas de avaliação e dimensiona-se as respetivas medidas de prevenção e mitigação.

Fase de Desativação

O processo de análise de riscos da fase de desativação assenta essencialmente na monitorização e acompanhamento dos aspetos ambientais mais relevantes, pelo que dever ser elaborado um Plano de Monitorização adequado aos planos de desativação do projeto.

Aquando da desativação, o responsável deve igualmente fazer, com recurso a uma equipa de especialistas, uma análise da evolução ambiental da envolvente, de modo a verificar a adequabilidade das simulações de risco efetuadas na fase de EIA. Assim, caso se justifique, quer pela existência de mais recetores sensíveis, quer pela existência de novas e relevantes fontes externas de risco, o proponente deve apresentar novas análises quantitativas de risco.

Estrutura dos Guias Metodológicos

O Guia metodológico de apoio à elaboração e avaliação do fator ambiental Análise de Riscos em EIA de propostas de projetos 1, do setor das Pedreiras (Figura 1); e 2, dos sectores industriais da Transformação e da Produção de Eletricidade de origem térmica apresentam a seguinte estrutura geral:

- Introdução: Descrição dos objetivos, âmbito de aplicação e principais destinatários;
- Caracterização do Setor: sumula elucidativa do *modus operandi* do Setor em análise e sua importância para a perceção de Risco Ambiental;
- Avaliação de Impacte Ambiental: Enquadramento, sua aplicação ao Setor em análise e análise de riscos no processo de AIA no geral e no caso de estudo;
- Análise de Riscos Ambientais: definição de conceitos relativos à análise de riscos; descrição detalhada do procedimento de análise de riscos; abordagem de metodologias de análise de riscos; metodologia proposta para elaboração da análise de riscos ambientais no EIA;
- Critérios de Apoio à Apreciação Técnica da Análise de Riscos Ambientais: Apresentação de uma *check list* de verificação dos pontos-chave da metodologia de análise de riscos proposta;
- Acrónimos: Abreviaturas apresentadas no Guia;
- Glossário: Definição dos principais conceitos aplicados na elaboração do Guia;
- Bibliografia: Referências bibliográficas consultadas durante a elaboração do Guia.

	Evento Iniciador	Fontes de Perigo	Causas de Acidente	Tipo de Incidente
Fase de Construção e Fase de Exploração	Aterros e escavações Desmatamento e decapagem	Modificações na morfologia do terreno	Microinstabilidade geológica local Aumento do escoamento superficial Desmonte de formações rochosas	Deslizamento de terra Queda de blocos em taludes Ravinamentos Alterações do curso natural das linhas de água superficiais e subterrâneas Arrastamento de partículas sólidas para os órgãos de drenagem pluvial
	Alteração da rede de drenagem e na qualidade da água	Depósito inadvertido de terras nas linhas de escoarência	Natural: elevada pluviosidade Humanas: descarga de efluentes para o meio hídrico	Ocorrência da subida dos níveis de água em áreas de trabalho
	Manutenção e utilização de explosivos	Detonação acidental Projeção de blocos	Descuidos, mau isolamento da área	Danos em pessoas e equipamentos Aumento da intensidade de vibrações, ruído e poeiras Incêndio ou explosão
	Alteração ao trânsito local	Perturbação da circulação rodoviária	Circulação de maquinaria pesada Não cumprimento e/ou alteração de medidas de segurança, sinalização e informação da circulação rodoviária e pedonal	Acidentes rodoviários nos acessos à pedreira e vias de maior afluência
	Ações de lavra e transporte	Existência de substâncias contaminantes (óleos, gasóleo, etc.)	Derrame ou fuga de substâncias poluentes	Contaminação da área de implantação da pedreira, linhas de água, aquíferos e solo Vibrações, ruído e poeiras
	Tratamento e beneficiação do mineral extraído	Instalações industriais, anexos da pedreira	Derrame ou fuga de substâncias poluentes	Contaminação da área de implantação da pedreira, linhas de água, aquíferos e solo
Fase de Exploração e Fase de Encerramento	Alteração da rede de drenagem	Incorreto dimensionamento dos sistemas de drenagem ou falta de manutenção	Entupimento do normal escoamento de drenagem das águas conjuntamente com condições de elevada pluviosidade	Ocorrência de extravases para terrenos vizinhos
	Criação de taludes rochosos	Presença de desníveis acentuados	Acessos às pedreiras inadequadamente sinalizados Área mal vedada	Queda em altura de pessoas ou animais

GUIA METODOLÓGICO

PARA A ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO FATOR AMBIENTAL
ANÁLISE DE RISCOS DE UM ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

O SETOR DAS PEDREIRAS

AGÊNCIA
PORTUGUESA
DO AMBIENTE

utad

Figura 1: Guia Metodológico para a Elaboração e Avaliação do Fator Ambiental Análise de Riscos de um Estudo de Impacte Ambiental. Caso de estudo - o Setor das Pedreiras.

À esquerda: Fontes de Perigo induzidas pela laboração de pedreiras;

À direita: Capa do Guia.

Conclusões

A implementação do Guia metodológico de apoio à elaboração e avaliação do fator ambiental Análise de Riscos em EIA de propostas de projetos 1, do setor das Pedreiras e 2, dos sectores industriais da Transformação e da Produção de Eletricidade de origem térmica vão permitir a homogeneização dos estudos e uma melhoria e agilização do processo de AIA, com diminuição do tempo de resposta das partes envolvidas.

O método de análise de riscos ambientais apresentado nos Guias é um processo dinâmico, devendo ser revisto periodicamente, de modo a contemplar todas as ações de melhoria identificadas ao longo da sua aplicação. É, também, um processo flexível, devendo em cada caso específico fazer-se as adaptações necessárias, quer à informação disponível, quer à tipologia de projeto.

Bibliografia

Capela, S.; Correia Marques, M. (2013) - Guia Metodológico para a Elaboração e Avaliação do Fator Ambiental Análise de Riscos em Estudos de Impacte Ambiental. Caso de Estudo - Indústrias do Sector da Transformação e do Subsector da Produção de Eletricidade de origem térmica. In: Borrego C., Miranda A. I., Arroja L., Fidélis T., Castro E. A., Gomes A. P. (Eds) - Repensar o Ambiente: Luxo ou inevitabilidade? 10ª Conferência Nacional do Ambiente/XII Congresso Nacional do Ambiente, 6 a 8 de novembro de 2013. Aveiro, Universidade de Aveiro, ISBN: 978-989-98673-0-7, p 466-471.

- ISO/IEC 31010:2009 (2009) - *Risk Management - Risk Assessment Techniques*. Switzerland: International Organization for Standardization, 192 p.
- NP ISO 31000:2013 (2013) - *Gestão do risco. Princípios e linhas de orientação*. Instituto Português da Qualidade, Caparica, 30 p.
- Sá C., Correia Marques, M., Russo, C. (2014) - Guia Metodológico para a Elaboração e Avaliação de Análise de Riscos em Estudos de Impacte Ambiental do Setor das Pedreiras. 7º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia / IV Congresso de Engenharia de Moçambique - A Engenharia como Motor para a Inovação e Desenvolvimento. Organização. Escola Superior de Hotelaria e Turismo, 14-18 Abril 2014, Inhambane/ Moçambique, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane e Ordens dos Engenheiros de Portugal e de Moçambique.

CONTROLE SOCIAL, GESTÃO SOCIAL E GOVERNANÇA LOCAL DOS RISCOS TECNOLÓGICOS A PARTIR DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Quésia Postigo Kamimura

Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Desenvolvimento Regional da UNITAU
qkamimura@gmail.com

Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA da UNITAU
edson.oliveira@unitau.com.br

Delanney Vidal Di Maio Junior

Instituto de Aeronáutica e Espaço - IAE/DCTA, Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional pela UNITAU
delanneydvdmj@iae.cta.br

RESUMO

Este artigo tem por objetivo evidenciar a desejável governança local dos riscos tecnológicos consolidando-se a partir da participação cidadã das comunidades potencialmente atingidas. Introduce-se o Estado Democrático de Direito; a prática participativa direta nas gestões democráticas, o denominado “fenômeno da Democracia Participativa”. Apresenta-se uma revisão teórica dos conceitos de controle social e gestão social, reafirma-se a presença dos riscos tecnológicos tendo por base a tese da sociedade global do risco, proposta por Ulrich Beck; apoiado no método da pesquisa bibliográfica exploratória; discute-se a governança destes riscos sob a égide da participação cidadã e finalmente conclui-se que o empoderamento das comunidades local se dá pelo exercício pleno da cidadania.

Palavras-chave: Gestão. Gestão Social. Governança Local. Risco Tecnológico.

Introdução

A conquista e manutenção de um Estado Democrático de Direito vai além da sua existência, do direito ao voto, à palavra, e dos direitos institucionais dos cidadãos. Na verdade, este passa e se configura pela prática participativa direta nas gestões democráticas, em todos os seus níveis e etapas.

A prática de se viver a democracia pautada na descentralização do poder constituído e na participação social, denominada por Oliveira (2005) como “fenômeno da Democracia Participativa”, vem tomando vulto, notadamente, desde a última década do século XX.

Até como reflexo externo, resultante da globalização, também no Brasil verifica-se uma nova maneira de se entender o “papel do Estado” e suas ações nos seguimentos econômico e social, no qual a população passa acompanhá-las exigindo mais transparência, qualidade, empenho e responsabilidade no que tange a verbas públicas, visando, principalmente, a promoção e bem estar social e consequente desenvolvimento sustentável.

Apesar da evolução positiva observada no nível da qualidade de vida que as sociedades têm experimentado, no último século, principalmente em função do desenvolvimento tecnológico; gradativamente percebemos que a maioria das tecnologias a nossa disposição apresentam perigos associados, implicando em riscos tanto para o meio ambiente como para nós e até mesmo para as futuras gerações.

Com a evolução tecnológica dependemos cada vez mais de especialistas para nos revelar, e propor controle destes problemas, como médicos que examinam um paciente doente ou apresentando determinados sintomas, elaboram diagnósticos e “prescrevem remédios e

propõem formas de comportamentos individuais e/ou coletivos que deveremos adotar para evitar consequências piores do que as já existentes, denominando-se isto de ‘gerenciamento de riscos’” (Freitas; Gomez, 1996, p. 486).

Questiona-se como as sociedades, que potencialmente se beneficiam pela adoção de determinada tecnologia e estejam sujeitas aos riscos (nem sempre conhecidos) por ela gerados, devam estabelecer “processos decisórios” (inclusive para aprovação de instalação destes empreendimentos). Tenório (2011) reflete sobre a “gestão social mediada por uma cidadania ativa, protagonista”, tipificando desta forma os “fundamentos da democracia deliberativa”.

No Brasil, os temas Controle Social, Gestão Social e Participação Cidadã, têm sido frequentemente estudados, com grande propriedade, pela academia. A contribuição mais significativa que se pretende trazer, com este artigo, é sondar a articulação destes temas com a Governança Local frente aos Riscos Tecnológicos. Assim, adotou-se a seguinte estrutura, além desta Introdução: Controle Social e Gestão Social; Os Riscos Tecnológicos na Sociedade Global do Risco; Discussão sobre a Governança dos Riscos Tecnológicos a partir da Participação Cidadã e Conclusão.

Controle Social e Gestão Social

Diversos estudiosos têm tratado dos temas Controle Social e Gestão Social; parte-se aqui dos conceitos atualmente consagrados e dos mecanismos previstos nas normas jurídicas vigentes para embasar o ‘efetivo controle’ da função administrativa do Estado.

Ressalta Saule Júnior (1998) que o Estado Brasileiro se qualifica como Democrático em razão de seus princípios da dignidade, da cidadania e do reconhecimento dos direitos fundamentais da pessoa humana. Assevera, ainda, que com a expansão do conceito de democracia, o texto constitucional admite a necessidade e a relevância da participação popular nas tomadas de decisão sobre os rumos do País.

Tenório (2011) e Brandão (2007) ressaltam que os processos de descentralização têm o seu potencial democrático ampliado em nível local e/ou regional, como no município e/ou arranjos institucionais de municípios. Em outras palavras, as menores escalas de planejamento e decisão favorecem a participação e o acompanhamento por parte da sociedade.

Esclarece Siraque (2005, pp. 112-113) que os fundamentos jurídicos do controle social e da participação popular por vezes se confundem, visto que:

[...] o núcleo essencial destes direitos são a cidadania, a soberania popular e o princípio republicano, porém, clara está a distinção dos momentos em que se aplicam: a participação popular se verifica [...] antes ou durante o processo de decisão da Administração Pública [...] já o controle social [...] após a concretização deste processo [de decisão] com o intuito de verificar se a norma jurídica foi concretizada pela Administração na forma estabelecida.

Cançado, Tenório e Pereira (2011) entendem que o campo de conhecimento da gestão social está em construção, e em síntese apresentam como tomada de decisão coletiva, sem a necessária exigência legal, baseada na uniformização da linguagem, construída a partir do diálogo esclarecedor dos envolvidos no processo de forma transparente, tendo como fim último a emancipação dessa coletividade.

Os Riscos Tecnológicos na Sociedade Global do Risco

Destaca Guivant (1998) que o conceito de risco passou a ocupar um papel central na teoria social a partir da contribuição de dois importantes teóricos sociais contemporâneos, Ulrich

Beck e Anthony Giddens. Para esses teóricos, os riscos ambientais e tecnológicos de graves consequências constituem-se conceitos-chave para se compreender as características, os limites e transformações do projeto histórico da modernidade.

Beck faz do risco o centro de sua teoria social, e entende que:

O núcleo da consciência do risco não está no presente, e sim *no futuro*. Na sociedade de risco, o passado deixa de ter força determinante em relação ao presente. Em seu lugar, entra o futuro, algo todavia inexistente, construído e fictício como “causa” da vivência e da atuação presente. Tornamo-nos ativos hoje para evitar e mitigar problemas ou crises do amanhã ou do depois de amanhã, para tomar precauções em relação a eles - ou então justamente não. (Beck, 2011, p. 40).

A proposta teórica desses autores “se fundamenta na ideia central de que a sociedade industrial (típica da primeira modernidade) deve ser substituída pela sociedade de risco, ou seja, o conceito de sociedade de risco permitiria a compreensão da modernização reflexiva” (Campo, 2006, p. 140), pois como afirma Beck:

Qualquer um que conceba a modernização como um processo de inovação autônoma deve contar até mesmo com a obsolescência da sociedade industrial. O outro lado dessa obsolescência é a emergência da sociedade de risco. Este conceito designa uma fase no desenvolvimento da sociedade moderna, em que os riscos sociais, políticos, econômicos e individuais tendem cada vez mais a escapar das instituições para o controle e a proteção da sociedade industrial. (Beck; Giddens; Lash, 1997, p. 15).

Beck e Giddens propõem não apenas construir um novo conceito dentro da teoria social, mas uma teoria da sociedade global de risco, que estabeleça um novo paradigma teórico dentro da sociologia.

Discussão sobre a Governança dos Riscos Tecnológicos a partir da Participação Cidadã

A participação cidadã se faz necessária e Benevides (1991, p. 96) acredita que “quanto maior for a participação popular, maiores serão as chances de se criar, no povo, a consciência de seus direitos, em seu sentido essencial, de exigências contra outrem”.

Di Giulio *et al.* (2012) elucidam o termo governança do risco de acordo com a definição dada por Renn (2008). Os autores alegam que governança do risco é um recurso que envolve representantes de todos os grupos sociais, os atores sociais envolvidos, tais como autoridades e agências reguladoras, dentre outros, e necessita que esses atores venham a participar ativamente e de forma construtiva no discurso, para que possam conseguir alcançar a compreensão comum a respeito da grandiosidade do risco e como precisam fazer para gerenciá-lo de forma efetiva.

Marandola Jr. e Hogan (2004) ressaltam a importância de levar em conta a forma como as populações vivenciam e percebem (se percebem) os riscos a que estão expostas, quando da formulação da política pública de gestão dos riscos. Caso contrário, as ações mitigadoras dos riscos estarão fadadas ao fracasso por não mobilizarem a comunidade que não entende os motivos de tais propostas. A governança do risco só será alcançada com a efetiva participação de todos os atores sociais envolvidos.

Conclusão

De maneira geral, a sociedade potencialmente afetada pela existência de risco prefere negá-lo, evitando assim sair de sua zona de conforto, aceitando a convivência taciturna. Apesar de não

mais deduzir o risco como manifestação divina, ainda delega seu controle ao ente religioso, “Deus”.

A partir do exercício da comunicação de risco, a comunidade do entorno passa a exigir a gestão destes por parte dos órgãos competentes (empresa/poder público). Ela se empodera do equacionamento do risco; participando de plano de emergência, tendo ciência do risco e ações que tenha que tomar na eventualidade deste se concretizar.

É fundamental que o poder público disponibilize foros de discussão dos pontos de vista de todos os atores sociais envolvidos para que se tome a decisão mais adequada para o equacionamento dos riscos tecnológicos e consolidação do desenvolvimento regional de forma sustentável. Se existir uma gestão adequada dos riscos tecnológicos é possível viabilizar o desenvolvimento sustentável, uma vez que se evita o exponencial custo com as perdas oriundas dos desastres.

A participação popular e o controle social interferem nas “tomadas de decisões” que impactam os rumos da unidade de planejamento em questão (principalmente nas escalas local, regional ou mesmo a nacional); a articulação destes dois agir pelos cidadãos, potencialmente afetados, favorece a Administração Pública cumprir o princípio constitucional da eficiência em tutelar a sociedade.

Bibliografia

- Beck, U.; Giddens, A.; Lash, S. (1997) - *Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna*. Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Unesp Editora, 264 p.;
- Beck, U. (2011) - *Sociedade de risco: Rumo a uma outra modernidade*. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo: Ed. 34, 2ª Ed. 384 p.;
- Benevides, M. V. M. (1991) - *A cidadania ativa: referendo, plebiscito e iniciativa popular*. São Paulo: Ática, 208 p.;
- Brandão, C. A. (2007) - A reafirmação do nacional e as possibilidades de estratégias e políticas de desenvolvimento e suas escalas espaciais. In: BRANDÃO, C. A. *Território e Desenvolvimento: as múltiplas escalas entre o local e o global* (cap. 5). Campinas, SP. Editora Unicamp, p. 183-213;
- Campo, G. L. R. (2006) - Globalização e trabalho na sociedade de risco: ameaças contemporâneas, resistências local-globais e a ação política de enfrentamento. *Teoria e Evidência Econômica: revista do Centro de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas (CEPEAC)*, Passo Fundo, v. 14, n. 26, p. 135-156;
- Cançado, A. C.; Tenório, F. G.; Pereira, J. R. (2011) - Gestão social: reflexões teóricas e conceituais. *Cad. EBAPE.BR*, Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 681-703;
- Di Giulio, G. M. et al. (2012) - Experiências brasileiras e o debate sobre comunicação e governança do risco em áreas contaminadas por chumbo. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, p. 337-349;
- Freitas, C. M.; Gomez, C. M. (1996) - Análise de riscos tecnológicos na perspectiva das ciências sociais. *História, Ciências, Saúde - Manguinhos*, v. 3, n. 3, p. 485-504;
- Guivant, J. S. (1998) - A trajetória das análises de risco: da periferia ao centro da teoria social. *Revista de Informações Bibliográficas - ANPOCS*, n. 46, p. 3-38;
- Marandola Jr., E.; Hogan, D. J. (2004) - O risco em perspectiva: tendências e abordagens. *Geosul*, Florianópolis, v. 19, n. 38, jul./dez., p. 25-58;
- Oliveira, G. H. J. (2005) - Participação administrativa. *Revista de Direito Administrativo e Constitucional - A&C*, Belo Horizonte, MG, ano 5, n. 20, abr./jun., p. 167-194;
- Renn, O. (2008) - *Risk governance: coping with uncertainty in a complex world*. London: Earthscan, 368 p.

- Saule Júnior, N. (1998) - *A Participação dos Cidadãos no Controle da Administração Pública*. São Paulo, Pólis Papers, n.1, 27 p.;
- Siraque, V. (2005) - *Controle Social da Função administrativa do Estado: possibilidades e limites na constituição de 1988*. São Paulo: Saraiva, 256 p.;
- Tenório, F. G. (2011) - Descentralização político-administrativa, gestão social e participação cidadã. In: DALLABRIDA, V. R. (Org.) *Governança territorial e desenvolvimento: descentralização político-administrativa, estruturas subnacionais de gestão do desenvolvimento e capacidades estatais*. Rio de Janeiro: Garamond, p. 73-93.

CAPÍTULO 3.5

RISCOS SOCIAIS NO CONTEXTO DE CRISE GLOBAL

DESASTRES NO BRASIL: UMA ANÁLISE SOCIO-ESPACIAL DA VULNERABILIDADE INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA EVOLUÇÃO DA DECRETAÇÃO MUNICIPAL DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA

Norma Valencio

Programa de Pós Graduação em Sociologia, Universidade Federal de São Carlos
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, Universidade de São Paulo
normaf@terra.com.br

RESUMO

O debate sociológico no tema dos riscos de desastres tem enfatizado os problemas decorrentes da lógica tecnocrática que permeia a gestão pública das emergências. A racionalidade burocrática e autoritária, própria do *ethos* tecnocrático, obstaculiza uma atuação técnico-operacional compatível com as demandas protetivas da sociedade civil. Disso resultam novos processos de esgarçamento do tecido socioambiental, dentre eles, a ampliação dos desastres. Esse estudo focaliza tal problemática no Brasil e a ilustra através da evolução do ato administrativo de decretação municipal de situação de emergência (SE) e de estado de calamidade pública (ECP), reconhecidos por portaria da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional (SEDEC/MI), no decênio 2004-2013. Foram identificados aspectos temporais e espaciais relevantes que subsidiam a discussão acerca da vulnerabilidade institucional do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC). Apoio: CNPq.

Palavras-chave: Sociologia dos Desastres; Defesa Civil; Brasil.

Introdução

No Brasil, a gestão pública das emergências e dos desastres apresenta um *ethos* tecnocrático, o qual orienta as práticas de seu quadro humano, predominantemente, para a atuação na resposta - isto é, para o resgate e reabilitação imediata dos grupos atendidos - ao invés da atuação de cunho preventivo ou recuperativo. Esse tipo de gestão tem acentuado o distanciamento entre os repertórios interpretativos da realidade concreta adotados pelo meio técnico-operacional de defesa civil e pelos grupos sociais afetados, o que resulta numa desconexão entre as expectativas e as práticas de ambos.

Convém refletir se, porventura, a acomodação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) na referida lógica estaria prestes a se revelar como uma armadilha auto-imposta; isto é, estaria explicitando o anacronismo da engrenagem institucional devido a crescente incapacidade de cumprir a missão em nome da qual foi criada.

“Desastres não geram efeitos...”

Muito a calhar, é a reflexão de Dombrowsky (1998) de que desastres não geram efeitos, mas são efeitos de um processo sociopolítico deteriorado. Os aspectos físicos da devastação não são autoexplicativos e o seu desvelamento depende do quanto se saiba acerca da crise social por detrás da ocorrência (Quarantelli, 2005; Alexander, 2005; Tierney, 2007). A resistência institucional em aceitar essa abordagem é imensa em sociedades onde vigora o patrimonialismo no seio do Estado, como no Brasil, porque os seus agentes se favorecem de práticas autocráticas. Tal como em outros contextos latino-americanos, como os mencionados por Lavell (1993), no Brasil o *mainstream* científico pactua com a gestão tecnocrática e difunde um discurso que inviabiliza perceber a complexidade social inerente aos desastres. Nesse discurso, focaliza-se a

predição e o monitoramento *strictu*, com destaque aos eventos da natureza. A discussão pauta-se por parâmetros físicos e por tecnologias sofisticadas de difícil acesso social. O *establishment* científico tem se tornado massivamente institucionalizado e opressivamente hierárquico (Ingold, 2000), criando disputas científicas assimétricas e instrumentalizadas pelos interesses ocultos nas tramas do Estado e do mercado. O faz de modo a desqualificar tanto a perspectiva relacional exigida pela discussão dos temas complexos, como o dos desastres, quanto o repertório empírico de quem vivencia tais acontecimentos trágicos. Uma das estratégias de desqualificação é atribuir o qualificativo ‘natural’ a certos tipos de desastres - não por acaso, a maioria deles - a fim de esvaziar a possibilidade de identificação das responsabilidades públicas (Douglas e Wildawsky, 1982).

Os desastres no contexto institucional brasileiro

Se observarmos o contexto de ocorrência de desastres no Brasil, vemos que as autoridades nomeiam como ‘naturais’ a sua quase totalidade (mais de 90%). O foco das explicações institucionais sobre os desastres havidos recai sobre as especificidades do evento - no geral, de origem hidrometeorológica - até concluir que se tratou de um *perigo inusitado*. É dessa explicação que se extrai a justificativa institucional para não se estar adequadamente preparado nem ter promovido a preparação comunitária devida, associando à ideia de que só restaria lidar com uma parcela das consequências (perdas e danos), no geral, movimentando a *indústria do desastre* (Valencio, 2014).

No decênio 2004-2013, foi preocupante tanto a evolução dos atos administrativos de decretação municipal de situação de emergência (SE) e de estado de calamidade pública (ECP) no país, reconhecidos pelo ente federal através de portaria emitida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional (SEDEC/MI), quanto a sua média anual. Durante a primeira gestão Lula (2003-2006), o percentual anual de decretações municipais de emergência (SE e ECP) em relação ao total dos municípios brasileiros foi de 21,25%. Na segunda gestão Lula (2007-2010), foi de 22,75 %. Já na gestão Dilma, em fase de finalização (recorte de janeiro de 2011 a agosto de 2014), em média, anualmente, 31,56% dos municípios brasileiros declarou emergência. Em média, no país e a cada ano, 1/3 das decretações de emergência se repetem ou se estendem temporalmente no mesmo município. Isso indica que as autoridades locais não conseguiram equacionar o problema, ainda que com o auxílio dos níveis superiores de governo (estadual e federal). Esse é também um indício da debilidade estrutural do SINPDEC frente ao objetivo de tomar providências para uma recuperação mais duradoura do espaço onde os cidadãos vivem e convivem. No referido decênio, a média anual de 1.944 decretações de desastre (SE e ECP) por autoridades municipais, com o devido endosso federal, ocorre num universo de 5.565 municípios.

Ao distribuir os decretos de SE e ECP nas cinco (dentre 27) Unidades da Federação (UF) que apresentaram o maior número de emergências no período 2004-2013, identifica-se que as mesmas são integrantes das macrorregiões mais ricas e mais pobres do país, a saber, as macrorregiões Sul (IDH=0,830) e Nordeste (IDH=0,716). Tais UFs - a saber, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, Paraíba e Bahia - concentram 10.183 das ocorrências, o que representa 52,36% do total. O percentual de municípios, pertencentes a essas UFs, que vivenciou emergência mais de uma vez, no referido período, é superior a 70%. A repetição de um mesmo tipo de desastre, nos mesmos moldes - isto é, na similaridade dos perigos e nas características das perdas e danos humanos, materiais e ambientais -, paira por sobre o Estado brasileiro como

se não houvesse lição a extrair a cada ocorrência ou, ainda, como se os eventuais processos adaptativos em curso, que não resultam eficazes, não precisassem ser problematizados.

Conclusões

Para finalizar, enumeraremos três fios da teia tecnocrática que urge ser desmanchada, a saber:

(a) o *processo de crescimento da estrutura institucional de defesa civil*, que é calcado na ampliação de recursos humanos e tecnológicos voltados para o monitoramento de condições atmosféricas, hidrológicas, de estabilidade dos terrenos sujeitos aos escorregamentos de massa e afins, mas denomina isso, equivocadamente, como monitoramento de desastres. Falta uma parte expressiva de variáveis nessa equação;

(b) a *cronicidade de decretação de emergências em um conjunto de municípios e UFs*, o que gera uma banalização daquilo que Agamben (2004) define como *Estado de exceção*. Isto é, a máquina pública local (ou estadual) considera normal adotar um *modus operandi* não democrático para deliberar e gerir recursos orçamentários e extraordinários e estabelecer parcerias com a indústria do desastre. Isso enseja um ambiente institucional propício ao aumento da corrupção e de práticas correlatas, que são frequentes num contexto histórico e institucional patrimonialista. Enquanto isso, as comunidades afetadas recebem providências de reabilitação de baixa qualidade e são paulatinamente abandonadas à própria sorte (Valencio, 2012);

(c) a *forma autocrática de condução do modelo econômico neodesenvolvimentista*, o que impede a discussão pública sobre alternativas de desenvolvimento que ampliem a segurança humana no contexto dos desastres. O neodesenvolvimentismo das gestões Lula e Dilma é caracterizado por apelos nacionalistas, populistas e policlassistas, cujo programa essencial é o crescimento econômico que não rompa com os limites do modelo neoliberal das gestões FHC e é modelo sobre o qual se torna socialmente incorreto manifestar oposição (Boito Jr., 2012).

Nessa teia, é possível identificar aquilo que Hewitt (1995) chama de *missing voices*. Aqueles que não têm recursos de voz são invisíveis, ignorados ou marginalizados no *mainstream* da agenda pública (Douglas, 1992), o que ocasionará o que Hewitt (1995) denominará de *missing agendas*. O número significativo de decretos de emergência ao ano aponta para a existência de uma crise crônica no contexto nacional, razão pela qual é possível supor que a forma como a mesma tem sido interpretadas institucionalmente seja uma das causas de sua persistência. Indaga-se: os órgãos de defesa civil, articulados no SINPDEC, estariam, de fato, aptos a cumprir a sua missão institucional, se os números oficiais os desdizem? Até que ponto as comunidades desassistidas e fragilizadas aguentarão seus níveis crescente de vulnerabilidade sem questionar a lógica tecnocrática?

Pelos vícios que a teia acima mencionada suscita, consideramos que a repolitização do debate em torno dos rumos institucionais de defesa civil seria salutar e providencial. O avanço da decretação dos desastres, pelo Brasil adentro, esvazia paulatinamente as conquistas democráticas e flexibiliza os direitos dos grupos sociais afetados. Uma vez aceita a decretação, os agentes institucionais impõem o discurso sobre aquilo que será entendido como perigo e vulnerabilidade; promovem um novo ordenamento territorial (socialmente higienista); definem prioridades e o conteúdo do atendimento emergencial aos que estão em circunstância de *vida nua* (os espaços e regras de acolhimento, as opções de alimentação, as cotas de abastecimento

hídrico e afins); gerem autonomamente os recursos públicos descartando o controle social, entre outros.

A lógica tecnocrática institucional em defesa civil se vale de uma confusão deliberada entre *eventos*, *perigos* e *desastres*. Assim, impede que o imaginário social compreenda, com maior clareza, que os eventos hidrometeorológicos severos ou extremos que, eventualmente, se manifestem não devam ser mecanicamente interpretados como sinônimos de perigos; se, porventura, as características intrínsecas e espaciais de manifestação de um desses eventos específicos o torna um perigo, do mesmo não decorre, necessariamente, um desastre. Quando as componentes sociais são adicionadas à explicação, o discernimento entre evento, perigo e desastre é facilitado. Contudo, essa adição implica questionar a prática política que baliza a soluções técnicas ora adotadas e, de resto, questionar os modos precários de garantir direitos territoriais, de morar, de circular e de trabalhar de milhões de pessoas que, de tal ou qual forma, integram famílias e comunidades indefesas no Brasil. Num contexto de milhões de *sem-fala* e *sem-agenda*, os desastres aumentam no Brasil. Isto é, aumentam em ordem direta aos sentimentos de desamparo e de desfiliação social os quais não derivam, primariamente, da experiência extrema de privação material e de desestruturação das rotinas da vida cotidiana, que um desastre suscita, mas de uma ordem pública que pode desumanizar a sociedade civil.

Bibliografia

- ALEXANDER, David E. (2005) - "An interpretation of disasters in terms of changes in culture, society and international relations". In: PERRY, RONALD W.; QUARANTELLI, ENRICO L. (Eds.) - *What is a disaster? New answers to old questions*. Newark, International Research Committee on Disasters, p. 25-38.
- AGAMBEN, Giorgio (2004) - *Homo sacer: o poder soberano e a vida nua*. Belo Horizonte, Editora da UFMG, 197p.
- BOITO JR., Armando (2012) - "As bases políticas do neodesenvolvimentismo". Trabalho apresentado na edição de 2012 do Fórum Econômico da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Disponível em: <http://www.eesp.fgv.br/sites/eesp.fgv.br/files/file/Painel%203%20-%20Novo%20Desenv%20BR%20-%20Boito%20-%20Bases%20Pol%20Neodesenv%20-%20PAPER.pdf> Acessado em: 14 de janeiro de 2013.
- DOMBROWSKY, Wolf R. (1998) - "Again and again: is a disaster what we call a "disaster"?". In: QUARANTELLI, ENRICO L. (org.). *What is a disaster? Perspectives on the question*. London/New York, Routledge, p. 19-30.
- DOUGLAS, Mary (1992) - *Risk and blame: essays in cultural theory*. London/New York, Routledge, 336 p.
- DOUGLAS, Mary; WILDAVSKY, Aaron (1982) - *Risk and culture - and essay on the selection of technological and environmental dangers*. Berkeley, University of California Press, 232 p.
- HEWITT, Kenneth (1995) - "Excluded perspectives in the social construction of disaster". *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*, v. 13, n. 3, Mattoon, p. 317-339.
- INGOLD, Tim (2000) - *The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill*. London and New York, Routledge, 2000, 462 p.
- LAVELL, Allan (1993) - "Ciencias Sociales y Desastres Naturales en América Latina: un encuentro inconcluso". In: Maskrey A. (org.). *Los desastres no son naturales*. Panamá, Rede de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, p. 111-127.
- QUARANTELLI, Enrico L. (2005) - "A social science research agenda for de disasters of the 21st century: theoretical, methodological and empirical issues and their professional implementations". In PERRY, RONALD W.; QUARANTELLI, ENRICO L. (Eds.) - *What is a disaster? New answers to old questions*. USA, International Research Committee on Disasters, p. 325-396.

- TIERNEY, K. J. (2007) - "From the margins to the mainstream? Disaster research at the crossroads". *Annual Review of Sociology*. Vol. 33, p.p.503-525. DOI: 10.1146/annurev.soc.33.040406.131743
- VALENCIO, Norma (2012) - Para além do desastre: O caso brasileiro. Curitiba, Editora Appris, 227p.
- VALENCIO, Norma F. L.S. (2014) - "Desastres, tecnicismo e sofrimento social". *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 19, n. 9, p. 3631-3644.

RISCOS SOCIAIS, CURRÍCULO DA EJA E POTENCIALIDADES DOS JOVENS DE PRAIA DO FORTE, BAHIA/BRASIL

Maria Gonçalves Conceição Santos

Mestrado em Educação de Jovens e Adultos da Universidade do Estado da Bahia
Pesquisadora do Grupo Recôncavo
mgsantos1962@yahoo.com.br

Tula Ornellas Farias Santos

Mestranda em Educação de Jovens e Adultos da Universidade do Estado da Bahia
Departamento de Ciências Humanas - Salvador
tulaibes@yahoo.com.br

Márcia Regina Barbosa

Universidade Federal de Pernambuco, Brasil
Pós-Doutoranda em Educação na Universidade de Coimbra
marciap46@hotmail.com

RESUMO

A educação de jovens em situação de risco social perpassa pela contextualização da Educação de Jovens e Adultos - EJA, no tempo e no espaço. Esta modalidade de ensino surgiu como função reparadora de uma dívida social que o país tem com os jovens e adultos, decorrente do analfabetismo, da baixa qualificação profissional, do desperdício de experiências, entre outros. O estudo lança luz sobre saberes e fazeres de jovens da comunidade de Açú da Torre, distrito de Praia do Forte, localizado no município de Mata de São João, Bahia, no intuito de contribuir para minimizar riscos sociais aos quais estão submetidos. Considerando isto, o artigo está organizado em três pontos básicos: riscos e EJA; saberes e fazeres de jovens e a inserção das experiências dos jovens e adultos no currículo da EJA. Trabalhos de autores que discutem a questão dos riscos sociais, do currículo, com aporte na EJA e no mundo do trabalho, nos dão respaldo teórico. A pesquisa de campo, por meio da observação “*in loco*” e do diálogo com os jovens e adultos da área em estudo, constitui importante caminho metodológico.

Palavras-chave: Risco Social, Currículo da EJA e Potencialidades de Jovens e Adultos.

Introdução

O trabalho tem a proposta de ampliar as discussões sobre os riscos sociais resultantes das dificuldades de articulação de saberes e fazeres apreendidos e sentidos com as potencialidades culturais, observadas em jovens e adultos, na comunidade de Açú da Torre, Praia do Forte, Mata de São João, Bahia, Brasil. A localidade em estudo apresenta dicotomias que estão presentes na materialidade e na imaterialidade da paisagem. De um lado, há um crescimento acelerado do setor imobiliário, acontece uma expansão das inovações tecnológicas, dos fluxos do turismo nacional e internacional, da melhoria da infraestrutura, favorecendo a ampliação das possibilidades de inserção dos jovens e adultos ao mundo do trabalho. Por outro, há um aumento da evasão escolar e o desinteresse pela escola. Aliado a isso, o distanciamento dos saberes tradicionais vividos, sentidos e ouvidos constituem pontos de reflexão que podem perpassar as políticas públicas e privadas que visem o desenvolvimento local e regional.

Este artigo resulta das pesquisas no âmbito do Mestrado em EJA e do Grupo de Pesquisa Recôncavo, da UNEB, nos municípios de Nazaré, Jiquiriça, Salvador, Santo Antônio de Jesus e, atualmente, Mata de São João. Os estudos sobre riscos sociais e sua correlação com a EJA, em áreas de grande potencialidade cultural, no litoral norte da Bahia, são recentes e datam do final da década de 1990. No entanto, a perspectiva de investigação sobre a inclusão dos diferentes saberes e fazeres de jovens e adultos ascende a partir da aproximação

de leituras que versam sobre a relevância das experiências e sua potencialização, no intuito de criar caminhos de emancipação social e profissional. Por meio destas interlocuções, as leituras de autores da área foram ampliadas visando fomentar debates entre educandos, educadores, gestores públicos, empresários e comunidade nos processos de desenvolvimento local.

Por meio das observações diretas e diálogos realizados com estudantes, professores e Direção da Escola Municipal João Pereira Vasconcelos, situada em Açú da Torre, identificamos que tanto do ponto de vista educacional, quanto social e cultural há maior dialogicidade da práxis pedagógica. Se coloca aqui, uma sintonia entre saberes e fazeres com vista ao mundo do trabalho, em que o currículo da EJA contribua com uma educação libertadora e criativa, que estimule e valorize as potencialidades individuais e coletivas dos sujeitos desta comunidade. O artigo aborda riscos sociais e a EJA; saberes e fazeres de jovens e adultos; o currículo e as experiências dos sujeitos.

Riscos Sociais e a EJA

A discussão sobre a correlação entre riscos e EJA é recente e resulta de pesquisa envolvendo sujeitos de uma região de grandes potencialidades, com belas paisagens, mas com elevada taxa de homicídio juvenil. Mata de São João (figura 1) apresenta uma diversidade paisagística e cultural, mas ao mesmo tempo, desponta como o segundo município do Brasil em homicídio juvenil, 371,5 homicídios por cada 100 mil jovens (WAISELFISZ, 2014). Procuramos entender de que forma ocorre a articulação dos saberes e fazeres de educandos(as) desta comunidade, no intuito de desenraizar as condições de vulnerabilidades social.

Figura 1 - Comunidade Escolar João Pereira Vasconcelos, Açú da Torre.

Fonte: Miguel Santos, 2014.

A falta de contextualização e significação dos conteúdos ministrados em sala de aula com a vida dos estudantes da EJA contribui para ampliar as condições de insegurança, o que pode se configurar num risco social. Os estudos sobre riscos sempre estiveram relacionados à ideia de perigo e de catástrofes naturais. Becker (1992) introduz a perspectiva social e as discussões sobre riscos vêm evoluindo desde a abordagem relacionada com os fenômenos naturais e às ações antrópicas (REBELO, 2003). No momento em que os fenômenos provocam situação de perigo para a sociedade, podendo ser a causa natural ou antrópica, ocorrem os riscos ou azares (GONÇALVES, 2003). Os estudos sobre riscos podem ser classificados como naturais, antrópicos ou mistos (LOURENÇO, 2007). A percepção de perigo e a relação com a segregação, à fragmentação urbana e à insegurança (VEYRET, 2007; SANTOSA, 2013).

Saberes e Fazeres de Jovens e Adultos

A escolha da Escola, campo de pesquisa, decorre: de estar inserida no circuito do turismo nacional e internacional, com grandes projetos imobiliários e de elevada circulação de capital; a escola abriga oito (8) turmas de EJA, no turno noturno, atendendo estudantes de quinze (15) localidades; e, o município onde a escola está situada se destacar como o segundo mais violento do país. A população residente é formada, na maioria, por jovens, com baixo poder aquisitivo e nível de escolaridade. A área contrasta com rápido crescimento imobiliário, a exemplo de hotéis, resorts e casas de veraneio. O conhecimento da região e a aproximação com os sujeitos da pesquisa apontam para a necessidade de uma escola que promova uma EJA contextualizada e inclusiva dos valores, saberes e fazeres dos jovens e adultos. O *saber tradicional* entendido nesta pesquisa como conhecimento local, associado à cultura e às práticas sociais. É um saber que, segundo Muñoz (2003, p. 285), vem de “práticas comunitárias do saber ser, saber estar, saber dar uso, de um mundo que se reconhece na convivência e nas práticas”, que nem sempre a escola reconhece e valoriza (figura 2).

Figura 2 - Saberes e fazeres da comunidade. Fonte: Tula Ornellas, 11 de abril de 2014.

O currículo da EJA deve [...] estudar as práticas cotidianas, procurando nelas (,) os traços de uma lógica de produção e ações de sujeitos reais, atores e autores de suas vidas, irredutível à lógica estrutural, plural e diferenciada ação fundamental para este tipo de pesquisa (OLIVEIRA, 2008).

O Currículo e as Experiências dos Sujeitos

Após o período de redemocratização, diversas políticas foram inseridas no intento de atender às necessidades crescentes e urgentes da EJA no Brasil e algumas vias foram empregadas como forma de ‘dialogar’ com os distintos poderes e com a sociedade civil, perpassando mudanças de organismos, nomenclaturas e até mesmo propostas políticas para esta modalidade de ensino. A articulação entre a teoria e a prática pode ser o ponto de partida para a construção desta práxis, garantindo já na formação inicial uma vivência. Destaca-se a importância do currículo estar voltado para as necessidades dos sujeitos jovens e adultos, utilizando no ensino deste público, metodologia adequada.

Freire (1997) ressalta que a educação enquanto prática específica do ser humano pode intervir no mundo no sentido de responder aos desafios e as possibilidades postas pelas novas conformações sociais. É preciso, portanto, repensar as práticas pedagógicas vivenciadas nos diferentes cursos de EJA, uma vez que estes devem favorecer a percepção dos jovens e adultos como sujeitos políticos, sociais e culturais. É importante que as práticas pedagógicas devam articular a teoria e a prática no sentido de estabelecer essa relação nas ações desenvolvidas em sala de aula e nos conteúdos. A aquisição das competências e a educação vão mais além, incluindo as questões da profissionalização, dos valores, da inserção social, da solidariedade e da cooperação entre os indivíduos e grupos humanos.

Considerações finais

A escola pesquisada conta com espaço físico bom e um corpo docente comprometido com os interesses da escola. O povoado exibe uma diversidade paisagística e cultural com ricos mananciais, flora, fauna, gastronomia, ou seja, pelo patrimônio material e imaterial. Todavia, apresenta indicadores sociais preocupantes como analfabetismo e vulnerabilidades, sobretudo, dos jovens. As leituras têm indicado situações constrangedoras em relação à EJA. Os dados publicados pelo IBGE em 2014 apontam o Município de Mata de São João como sendo o segundo mais violento do país, o que tem nos chamado a atenção para o elevado número de homicídio juvenil. A pesquisa detectou que não há articulação dos saberes e fazeres de educandos(as) com o currículo escolar, no intuito de traçar novas trajetórias de desenvolvimento local. Constatamos que do ponto de vista “natural” a comunidade de Praia do Forte não dispõe de ocorrências relacionadas aos abalos sísmicos ou outra catástrofe natural, ao ponto de merecer destaque. No tocante às relações territoriais, decorrentes do modelo de desenvolvimento adotado, há indícios de riscos sociais. O estudo sobre as possibilidades de articulação dos saberes e fazeres de educandos com o mundo do trabalho demonstra a necessidade de repensar os conteúdos da EJA, no intuito de estimular a criatividade e a dialogicidade entre os conhecimentos, na perspectiva de uma nova “escrita” social.

Referencias Bibliográficas

- BECK, Ulrich (1992). *Risk Society*. London: SAGE publications.
- FREIRE, Paulo (1997). *Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra.
- GONÇALVES, Neyde M. S. (2003). *Impactos pluviais e desorganização do espaço urbano em Salvador* In: MONTEIRO, Carlos A. Figueiredo & MENDONÇA, Francisco. *Clima Urbano*. São Paulo: Contexto.
- LOURENÇO, Luciano (2007). Riscos naturais, antrópicos e mistos. *Revista Territorium da Associação Portuguesa de Risco*, v.14, Coimbra, pp.109 - 113.

- MUÑOZ, M. G (2003). *Saber indígena e meio ambiente: experiência de aprendizagem comunitária* In: LEFF, E. (Org.). *A complexidade ambiental*. São Paulo: Cortez.
- OLIVEIRA, I. B (2008). Criação curricular, autoformação e formação continuada no cotidiano escolar In: FERRAÇO, C.E.(Org.). *Cotidiano escolar, formação de professores(as) e currículo*. São Paulo: Cortez.
- REBELO, Fernando (2003) . *Riscos Naturais e Acção Antrópica: estudos e reflexões*. 2ª edição, Coimbra: Universidade de Coimbra.
- SANTOSA, Miguel et al (2013). Riscos Ambientais e Juventudes no Recôncavo Baiano. In: LOURENÇO, Luciano F. et al(Org.). *Riscos Naturais, antrópicos e mistos*. 1ªed.Coimbra: Universidade de Coimbra, pp. 35-50.
- WAISELFISZ, Julio Jacobo (2014). *Mapa da Violência no Brasil. Os jovens no Brasil*. Rio de Janeiro: FLACSO.
- VEYRET, Yvette (2007). *Os Riscos. O homem como agressor e vítima do meio ambiente*. Tradução de Dilson Ferreira da Cruz. São Paulo: Ed. Contexto.

ENTRE A POEIRA E A LAMA: REPERCUSSÕES DOS DESASTRES NA VIDA COTIDIANA DE GRUPOS VULNERABILIZADOS

Norma Valencio

Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal de São Carlos
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, Universidade de São Paulo
norma@terra.com.br

RESUMO

No tema dos desastres, é relevante a discussão sobre a ação do Estado que resulte em manter ou em elevar a desproteção social dos grupos debilitados. Multiplicam-se os casos em que essa ação, expressa nas práticas técnicas dos órgãos atuantes na resposta e na reabilitação, fica aquém das demandas sociais quando não, em aberto conflito. Diante disso, toma-se o contexto brasileiro de desastres para analisar sociologicamente o processo através do qual o modo de atendimento deflagrado pelo meio técnico aponta para uma progressiva legitimação institucional de práticas de esgarçamento dos direitos de grupos sociais debilitados. Apresenta-se a síntese de resultados de pesquisa de campo, de base qualitativa, sobre dez diferentes casos no referido país, nos quais os grupos sociais focalizados experimentaram variadas formas de violência de Estado contra eles, entrelaçando um conteúdo material, social, espacial e simbólico de deterioração dos direitos da pessoa humana. Apoio: FAPESP.

Palavras-chave: Sociologia dos desastres; Defesa civil; Brasil.

Introdução

No senso comum dominante no mundo contemporâneo, parece ser politicamente incorreto levantar suspeitas sobre a ação do Estado em situações críticas, como nos desastres. O simples fato de o meio técnico-operacional se apresentar no cenário, e ali tomar certas providências, costuma sinalizar positivamente para quem assiste os acontecimentos do lado de fora; isto é, indica que tudo foi feito a respeito.

Contudo, no âmbito das Ciências Sociais, tem havido uma importante discussão acerca dos efeitos da ação do Estado tanto na manutenção quanto na elevação da desproteção dos grupos sociais debilitados nas circunstâncias de um desastre. Autores como Oliver-Smith (2006), Alexander (2011), García-Acosta (2012), Valencio (2012) e outros assinalam que a degradação da esfera social se explicita pela desconsideração dos técnicos para com as necessidades de preservação da intimidade pessoal e familiar, pelo desrespeito aos vínculos sociais das famílias com o lugar de moradia, pela negação do valor subjacente aos laços de coesão da vizinhança e pela facilidade em desvincular as famílias e suas respectivas comunidades de seu lugar. Isso significaria uma ação do Estado que, no varejo, a cada desastre, segue alterando o curso da história de grupos debilitados de modo a negar o seu valor humano intrínseco e jogá-los na anomia social.

No conjunto das discussões no tema, proliferam casos nos quais a ação estatal, expressa nas práticas técnicas dos órgãos atuantes na resposta e na reabilitação, fica aquém das demandas sociais quando não, em aberto conflito. Nesse sentido, as discussões sobre o tema da violência e o dos desastres convergem cada vez mais.

O caso brasileiro

No caso brasileiro, o que tem estado no centro da questão é a incapacidade do Estado atuar criticamente em face ao *processo de vulnerabilização* (Acsehrad, 2006) devido ser ele um ator-

chave constitutivo da *modernidade anômala* (Martins, 2003). Isso culmina em expor ou favorecer a exposição de determinados grupos sociais a ameaças recorrentes. No referido país, os desastres oficialmente reconhecidos estão, em mais de 90% dos casos, relacionados à água (ao estresse hídrico ou às chuvas intensas), e os mesmos se devem menos aos eventos hidromeorológicos em si do que aos insistentes déficits de infraestrutura para controlar os seus efeitos (Valencio, 2012).

Assim, os casos concretos de violência nos desastres são inumeráveis e se explicitam pelo modo de atendimento do meio técnico-operacional, que tende a esgarçar os direitos de grupos sociais debilitados. O conjunto dos estudos produzidos pela equipe do Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres (NEPED) da Universidade Federal de São Carlos - tais como os de Siena (2014), Sartori et al (2014), Vargas (2013), Valencio et al (2011), Valencio (2014), Venturato-Landmann e Valencio (no prelo) e outros - têm demonstrado que os casos de violação dos direitos humanos, praticada por agentes do Estado, se proliferam e apontam para uma progressiva legitimação da barbárie.

Um desses estudos foi a pesquisa intitulada “Entre a poeira e a lama: repercussões dos desastres na vida cotidiana de grupos vulnerabilizados”, realizada no período de junho de 2011 a maio de 2014 e apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). A referida pesquisa objetivou descrever e analisar o conteúdo material, social, espacial e simbólico dos processos de degradação subjacentes ao plano da vida cotidiana de diferentes grupos sociais debilitados nos desastres de maior expressão nos últimos cinco anos (2009-2014). Em relação aos resultados alcançados, apresentamos um recorte de dez dos casos investigados, a fim traçar um panorama mais geral das formas de violência que estão se espalhando. Os casos analisados encontram-se abaixo mencionados (Quadro I). Junto aos grupos sociais mais debilitados no desastre, realizamos coleta de informações através de uma abordagem qualitativa de pesquisa social, baseada em entrevista em profundidade e observação direta.

Quadro I - Localidade do desastre, ano de ocorrência e subgrupo social abordado na pesquisa

Localidade Município/Unidade Federativa	Ano de início ocorrência	Tipo de desastre (ref. SEDEC/MI)	Subgrupo social abordado na pesquisa
Angicos/Rio Grande do Norte Aracati/Ceará	2012 2013	estiagem seca	<ul style="list-style-type: none"> • pequenos prod. rurais autônomos • assentados rurais • quilombolas
Brasiléia/Acre Juazeiro/Bahia Petrolina/Pernambuco Petrópolis/Rio de Janeiro	2012 2013 2013 2011	enchentes estiagem estiagem enxurradas	<ul style="list-style-type: none"> • imigrantes indocumentados • pequenos prod. rurais autônomos • lideranças comunitárias • lideranças comunitárias • coord. de redes sociais locais
Porto Velho/Rondônia São Jerônimo/Rio Grande do Sul	2014 2012	inundações granizo/inundação	<ul style="list-style-type: none"> • ribeirinhos indígenas desabrigados • moradores de periferias urbanas • pequenos produtores rurais autônomos
São Rafael/Rio Grande do Norte Teresópolis/Rio de Janeiro	2012 2011	estiagem enxurradas	<ul style="list-style-type: none"> • reassentados de barragem • moradores de periferias urbanas • moradores de bairros de classe média

Fonte: elaborado pela autora.

As informações obtidas indicam que as formas de violência praticadas pelo meio-técnico operacional, nas suas ações de resposta e reabilitação, entrelaçam um conteúdo material, social, espacial e simbólico de deterioração dos direitos da pessoa humana, conforme se encontra no Quadro II. Tais práticas comprometem a dignidade e os meios de vida - de indivíduos, das famílias e das comunidades afetadas - no curto e médio prazo e põem em risco as perspectivas mais promissoras que os mesmos vinham construindo ou idealizando.

Quadro I - Principais formas de violência observadas e relatadas pelos grupos sociais debilitados nos desastres

Conteúdo da violência	Práticas de manifestação da violência
Material	<ul style="list-style-type: none"> - Ausência ou insuficiência de programas de recuperação/restituição de locais, objetos e de meios de trabalho danificados ou destruídos (oficinas/instalações, estoques de matérias-primas, insumos, produtos finais, máquinas e equipamentos, ferramentas), o que inviabiliza o retorno ao exercício pleno do trabalho, com comprometimento da possibilidade de obtenção da renda familiar ou do auto-sustento do grupo; - Ausência de política pública compensatória à família diante o falecimento de membro arrimo de família ou equivalente, especialmente, quando inserido no mercado de trabalho informal e envolver a sobrevivência de dependentes; - Oferecer compensações irrisórias referentes ao bem imóvel interditado (terreno e edificação), assim como a pertences que a família se vê obrigada a se desfazer nessa interdição, coagindo (através de pressão moral, financeira e psíquica) para que o chefe da família aceite a proposta; - Falta de padronização e de transparência nos critérios técnicos locais de atendimento às famílias para distribuição de auxílio-moradia e kits de bens de primeira necessidade (cestas básicas) e bens de consumo duráveis de uso domésticos (eletrodomésticos e mobiliários).
Social	<ul style="list-style-type: none"> - Imposição e padronização de regras do meio técnico sobre a dinâmica e as rotinas da vida cotidiana das várias famílias conviventes em abrigos provisórios, desautorizando o comando dos chefes, da família e do lar, no referente às normas de convivência de seus membros na esfera privada e na vocalização ativa pra a busca de consensos, próprio da sociabilidade comunitária; - Praticar ou favorecer a prática de assédio moral e sexual de pessoas em abrigos provisórios, por exemplo, através da desproteção à intimidade do indivíduo ou família; - Não suprir os abrigados com regularidade e num patamar aceitável e omitir-se em providências de higienização pública, oferecimentos de serviços de acesso à água e energia, tornando os abrigos provisórios insalubres; - Insuficiência do atendimento à saúde em situação pessoal de adoecimento (físico ou mental) relacionado ao desastre; - Insuficiência das cotas de alimentos e de água potável para moradores de comunidades em emergência, adotando-se formas de distribuição pública vexatórias destes itens (isto é, resultando em humilhação das pessoas) e sem garantia de proteção aos grupos sociais especiais (gestantes, idosos, pessoas com deficiência, crianças); - Insuficiência das medidas operacionais adotadas na recuperação de corpos de pessoas desaparecidas no desastre; - Falta de apoio oficial aos ritos e ao processo de luto, tais como em relação ao que estabelecem as práticas culturais da família na realização de funeral, ao sepultamento dos mortos e à elaboração simbólica e psicossocial das perdas de pessoas com quem eram mantidos vínculos sociais estreitos; - Ausência ou demora de serviço especializado de resgate, exigindo o exercício extenuante de determinadas técnicas corporais para manter-se vivo ou resgatar pessoas ou animais em perigo iminente; - Submissão à solicitação técnica para preenchimento de inúmeros cadastramentos, cujo efeito prático positivo para a família não é notado; - Letargia dos órgãos competentes na liberação de documentação que permita a livre circulação e o direito de trabalho no país; - Disseminar discursos estigmatizantes sobre os grupos sociais afetados nos desastres, incluindo, discursos de cunho racista.
Espacial	<ul style="list-style-type: none"> - Desproteção na guarda de bens móveis (de valor econômico e imaterial) que ficaram na moradia de origem; - Flexibilização dos direitos territoriais individuais e comunitários, com a expulsão dos moradores de sua residência, do uso do terreno e da comunidade onde habitava e mantém laços econômicos e extra-econômicos; - Falta de apuração de denúncias de contaminação da área afetada; - Constrangimento técnico (indireto ou indireto) sobre a rede primária da família para que proceda ao acolhimento da mesma, mesmo que as condições locais do anfitrião sejam precárias; - Dissolução da convivência comunitária devido à dispersão da vizinhança; - Ausência de informações e providências acerca do encaminhamento das soluções habitacionais definitivas.
Simbólica	<ul style="list-style-type: none"> - Perda dos objetos de memória (individual, familiar ou comunitário) e de demais referências materiais de caráter identitário, diante as quais o esforço de apoio técnico à recuperação é nulo ou relegado a um segundo plano no elenco das prioridades.

Fonte: elaborado pela autora.

Conclusão

Embora ainda à margem - e incomodados com uma tendência autoritária de impor um silenciamento social diante o Estado, a qual vem forjando a disseminação da cultura do medo e insegurança no século XXI -, outros sentidos comuns começam a tomar forma em relação a como observam a qualidade da atuação técnica no contexto dos desastres. Dois novos patamares de observação pública e significação sobre os acontecimentos emergem, corroborando as discussões críticas das Ciências Sociais, a saber: o primeiro, o que passa a levar em consideração que desastres ocorrem, em parte, por falha do meio técnico-operacional no referente às medidas de prevenção e preparação postas em curso; o segundo, o que identifica que as medidas de

resposta (resgate e reabilitação) e recuperação, deflagradas pelo meio técnico, têm sido igualmente falhas. Vistos em encadeamento e como uma espiral, estes patamares de observação suscitam a conclusão de que, a cada desastre, no qual o atendimento público mantém-se ruim em todas as fases de operação, forja-se a oportunidade para um novo desastre.

Naturalmente, desastres que pudessem ser evitados resultariam em menor sofrimento social. A questão que se coloca é que o aparato estatal que se encontra historicamente tolerante com a violência - expressa e disseminada, de modo ativo, pela prática de seus agentes ou pela omissão de providências destes - não encontra caminhos, dentro da própria cultura institucional, para aboli-la. Mais do que isso, sob uma perspectiva foucaultiana, infligir sofrimento ao outro é parte constitutiva de uma relação biopolítica que ultrapassa o Estado e se incrusta no corpo social. Portanto, mantém-se atualíssima as ponderações de Oliver-Smith (2006) de que o incremento da mortalidade e das perdas materiais nos desastres localizados em países emergentes se deve tanto à degradação ambiental quanto aos fatores políticos de exclusão, perseguição, expulsão e opressão dos socialmente mais fracos (os pobres, os grupos étnicos, os povos tradicionais e afins). No tecido dessa insegurança social generalizada, a deficiência das práticas de atendimento técnico às emergências e desastres não é aquilo que destoa, mas que confirma uma crise de legitimidade ainda mais profunda.

Bibliografia

- Acserald, H. (2006) - Vulnerabilidade ambiental, processos e relações. In: FIBGE. *II Encontro Nacional de Produtores e Usuários de Informações Sociais, Econômicas e Territoriais*. Rio de Janeiro, FIBGE.
- Alexander, D. (2011) - Modelos de vulnerabilidade social a desastres. *Rev.Crítica de Ciências Sociais*. Vol. 93 (jun), p. 9-29.
- García-Acosta, V. (2012) - Introducción. In: García-Acosta, V.; Audefroy J.F.; Briones F. (orgs.). *Estrategias sociales de prevención y adaptación*. México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores em Antropologia Social, p. 11-15.
- Martins, J.S. (2003) - *A sociedade vista do abismo: novos estudos sobre exclusão, pobreza e classes sociais*. 2ª edição. Petrópolis: Editora Vozes, 228 p.
- Oliver-Smith, A. (2006) - Disasters and Forced Migration in the 21st Century. *Understanding Katrina Essay Forum: perspectives from the social sciences*, Vol. único, Social Science Research Council, New York (EUA). Disponível em: <<http://understandingkatrina.ssrc.org/Oliver-Smith/>>. Acesso em: 30 nov. 2006.
- Perry, R.W. (2007) - What is a disaster? In: Rodríguez, H.; Quarantelli, E.L.; Dynes, R.R. (eds). *Handbook of disaster research*. New York, Springer, p.1-15.
- Sartori, J.; Batista, J.G.; Tarin, D.M.; Almeida, J. P. (2014) - Desastres como oportunidade de articulação, diálogo e fortalecimento de fóruns. In: R. Carmo; N. Valencio (orgs). *Segurança humana no contexto dos desastres*. São Carlos, RiMa Editora, p. 141-157.
- Siena, M. (2014) - A atenção social nos desastres: quando o deslocamento compulsório acontece. In: N. Valencio e M. Siena (orgs). *Sociologia dos desastres: construção, interfaces e perspectivas*. Vol. IV, São Carlos, Rima Editora, p. 151-178.
- Valencio N; Siena M; Marchezini V. (2011) - *Abandonados nos desastres: uma análise sociológica de dimensões objetivas e simbólicas de afetação de grupos sociais desabrigados e desalojados*. Brasília, Conselho Federal de Psicologia, 160 p.
- Valencio, N. (2012) - *Para além do desastre: O caso brasileiro*. Curitiba, Editora Appris, Coleção Ciências Sociais, 227 p.

- Valencio, N.F.L.S. (2014) - Desastres, tecnicismo e sofrimento social. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 19, n. 9, p. 3631-3644.
- Vargas, M.A.R. (2013) - “Rosas”, “Dulces”, comandantes e peritos: a luta pela classificação do mundo no contexto dito ‘desastre’. *Sociologia dos desastres: construção, interfaces e perspectivas*. Vol. III, São Carlos, RiMa Editora, p. 153-174.
- Venturato-Landmann, R.; Valencio, N. (no prelo) - Visão e ação comunitária cabocla ribeirinha num desastre relacionado às cheias extremas na Amazônia brasileira: a memória social de mulheres do Alto Juruá, Acre. *Cadernos de Trabalho da Rede Waterlat-Gobacit*, Série Água e Desastres, Newcastle Upon Tyne, Vol.1, N. 2 (no prelo).

POR ENTRE BRASAS E FUMAÇAS: UMA ABORDAGEM GEOGRÁFICA

Luciano Lourenço

Departamento de Geografia e CEGOT, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
luciano@uc.pt

Norma Valencio

Programa de Pós Graduação em Sociologia, Universidade Federal de São Carlos
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, Universidade de São Paulo
normaf@terra.com.br

Rosemeire Scopinho

Departamento de Psicologia e NUESTRA, Universidade Federal de São Carlos
scopinho@ufscar.br

RESUMO

Apresenta-se a abordagem geográfica que esteve na base dum projeto, desenvolvido na Serra do Açor (Portugal), por investigadores provenientes de três diferentes núcleos de investigação científica, pertencentes a universidades brasileiras e portuguesas, e também a três áreas científicas distintas (geografia, sociologia e psicologia social), que procuraram caracterizar, em termos sociais, as consequências deixadas pelos incêndios florestais na vida dos aldeões. Assim, identificaram-se os grandes incêndios que afetaram a serra do Açor e explicitam-se os critérios que levaram à escolha das áreas-amostra onde foi desenvolvido o estudo: oito localidades, todas elas afetadas, direta ou indiretamente, por incêndios florestais, umas há mais tempo e outras mais recentemente.

Em comum, apresentam a característica de todos esses incêndios permanecerem bem gravados na memória social das comunidades, guardada pelos moradores idosos, que constituem a população dominante destas aldeias.

Palavras-chave: Serra do Açor, incêndios florestais, memória social, idosos.

Introdução

Partindo da cartografia obtida através de trabalho de campo, desenvolvido nos últimos anos, em municípios do alto do distrito de Coimbra, bem como de análise cartográfica e documental, designadamente dos Planos de Defesa da Floresta contra Incêndios (Nacional e Municipais), foi possível promover nova investigação, de base qualitativa e de caráter sociológico, no início do período crítico de incêndios do ano de 2013, que decorreu em três desses municípios, tendo permitido desenhar um panorama geral das especificidades locais que envolvem a problemática da floresta e dos incêndios florestais na área de estudo.

Com efeito, a cartografia dos incêndios florestais ocorridos nas últimas cinco décadas, permitiu identificar as localidades mais suscetíveis a incêndios no alto distrito de Coimbra, de entre as quais foram selecionadas oito aldeias, em três concelhos diferentes, para realizar entrevistas não só aos moradores idosos, mas também aos agentes envolvidos na prevenção e combate a incêndios florestais desses municípios.

Depois, em resultado do contacto com as autoridades autárquicas, foi possível aceder aos documentos oficiais de planificação das ações oficiais de defesa da floresta contra incêndios que, em cada um desses municípios, são aplicadas no terreno.

Localização da área de estudo

A área de estudo, inicialmente prevista, compreendia quatro municípios do alto distrito de Coimbra, pertencentes à serra do Açor, por serem aqueles que possuem a maior área ardida do

distrito. Todavia, depois, por falta de financiamento do projeto, os investigadores foram forçados a reduzir a área a tratar, tendo eliminado o concelho de Pampilhosa da Serra, por ser aquele que se encontrava mais afastado da base logística, a sede dos investigadores, apesar de ser o mais afetado por grandes incêndios florestais.

A serra do Açor localiza-se no sector intermédio da cordilheira central portuguesa, mais precisamente entre as serras da Lousã (1205m), a ocidente, e da Estrela (1993m), a oriente, as quais, no seu conjunto, constituem o mais importante conjunto montanhoso português e dividem Portugal em dois domínios climáticos diferentes: o Norte, mais atlântico, e o Sul, marcadamente mediterrâneo. Por sua vez, a serra do Açor é cortada pelo rio Ceira, que se desenvolve no sentido este-oeste, dividindo-a em dois blocos: o setentrional, que alcança 1342m, em São Pedro do Açor, e o meridional, a sul do rio Ceira, que culmina ainda a maior altitude, 1418m, no Picoto de Cebola.

Como sabemos, o relevo dificulta a atuação dos meios de combate às frentes de chamas, quer pelos declives acentuados que têm de vencer, quer pela sinuosidade das estradas que retardam a primeira intervenção.

Como nesta fase o tempo cronológico é um elemento crucial, se, porventura, se deixa que o incêndio evolua e passe a ser grande, depois o seu controle é bem mais difícil, como tem sucedido, com demasiada frequência, nestas áreas montanhosas, onde se localizam as aldeias estudadas (fig. 1).

Fig. 1 - Esboço hipsométrico e de localização da área de estudo, com referência às oito aldeias investigadas.

(Cartografia elaborada por Sofia Bernardino, adaptada da produzida pela Agência Portuguesa do Ambiente e pela Direção-Geral do Território).

Os incêndios florestais no período pós 1974 e os critérios de seleção das aldeias

A enorme extensão de áreas queimadas pelos incêndios florestais nas serras da Cordilheira Central portuguesa e, em particular na serra do Açor, acentuou-se a partir de meados dos anos setenta do século passado, ou seja, depois da chamada “Revolução dos Cravos” ou de “Abril de 74”, pelo que, no período compreendido entre 1975 e 1985, alguns municípios da serra do Açor viram a sua floresta devastada por grandes incêndios que dizimaram mais de 100% dessa área florestal, dado que alguma dela foi queimada mais do que uma vez. Assim, apenas numa década, de que já pouco se fala, a superfície florestal do concelho da Pampilhosa da Serra ardeu quase duas vezes (180,04%), em Arganil foram queimados 130,69% da área florestal e, em Góis, 106,63% (Lourenço, 1988).

A sobreposição, num único mapa, de todas as áreas queimadas no período compreendido entre 1975-2012, o último ano para que há cartografia disponível, torna a leitura difícil, razão que nos levou a separá-las pelas quatro décadas (fig. 2).

Assim, os primeiros grandes incêndios, na área em análise e com registo cartográfico, ocorreram no ano de 1975, nos concelhos de Pampilhosa da Serra e Arganil (fig. 2-A), onde, além da floresta, queimaram casas na aldeia de Cepos (concelho de Arganil), embora haja registos de incêndios anteriores na região, como o de 1961 (Lourenço, 2009, p. 9), que destruiu completamente a aldeia de Vale do Rio, no concelho de Figueiró-dos-Vinhos, a sul da área de estudo.

Mas, o primeiro incêndio que na serra do Açor reduziu a cinzas uma área superior a 10 000 ha (fig. 1-B), mais precisamente 10 927ha (Viegas, Lourenço *et al.*, 1988), teve lugar no mês de setembro de 1987, quando cercou 25 aldeias, de entre as quais o Piódão (concelho de Arganil) e a Gramaça (concelho de Oliveira do Hospital), e contornou mais de uma dúzia de outras, como foi o caso de Aldeia das Dez e Chão Sobral (concelho de Oliveira do Hospital), quatro das aldeias escolhidas para o estudo.

Três anos depois, em 1990, manifestou-se outro violento incêndio nos concelhos de Pampilhosa da Serra e Góis (fig. 2-B), tendo cercado as povoações de Malhada e Soito (concelho de Góis), onde, apesar dos esforços dos bombeiros, arderam algumas moradias.

Mais recentemente, no ano de 2005, um enorme incêndio, com 15 837 ha, voltou a devastar parte da área queimada em 1987 (Lourenço, 2007) e, além da habitual destruição da vegetação, voltou a cercar várias aldeias, entre as quais as já mencionadas do Piódão (concelho de Arganil), Gramaça e Chão Sobral (concelho de Oliveira do Hospital).

No ano de 2012, houve um novo incêndio, desta vez ao redor de Rio de Mel (concelho de Oliveira do Hospital) (fig. 2-D), tendo atingido casas situadas na interface urbano-florestal.

As oito aldeias selecionadas para desenvolver investigação de campo localizam-se nas serras de xisto da Cordilheira Central portuguesa (fig. 1), na parte oriental do distrito de Coimbra, e, apesar de uma ou outra nuance específica, são representativas das aldeias afetadas por incêndios florestais nas áreas montanhosas de Portugal, dado que, nos últimos quarenta anos, todas elas foram tocadas ou cercadas por incêndios florestais e, algumas delas, por mais do que uma vez.

Assim, a escolha destas aldeias baseou-se em vários aspetos dos quais:

- a) Cobertura de um período temporal relativamente longo, ou seja, desde que os incêndios florestais começaram a ser um problema grave em Portugal;
- b) Marcas deixadas no ambiente físico e, em particular, nas áreas de interface urbano-florestal, por incêndios de grande severidade;

c) Recorrência de ignições que provocaram grandes incêndios florestais, alguns deles catastróficos.

Fig. 2 - Distribuição dos incêndios florestais, nos municípios estudados da serra do Açor: A - de 1975 a 1984; B - de 1985 a 1994; C - de 1995 a 2004 e D - de 2005 a 2012.

(Cartografia elaborada por Sofia Bernardino: até 1980, com base em Sofia Oliveira (2008) e arquivo do NICIF; depois de 1980, com base nos dados oficiais do ICNF).

Deste modo, no concelho de Arganil, foram seleccionadas as aldeias de Cepos e Piódão; no concelho de Góis, as aldeias da Malhada e do Soito e, no concelho de Oliveira do Hospital, as aldeias da Gramaça, Chão Sobral, Aldeia das Dez e Rio de Mel (fig. 1) para nelas buscar a vocalização direta

dos idosos, personagens centrais do lugar e parcela expressiva da população local, que não só ouviu falar dos incêndios, mas também participou diretamente dos acontecimentos.

Conclusão

A abordagem geográfica realizada foi de imprescindível valor para propiciar a identificação das aldeias mais suscetíveis aos incêndios florestais, nas quais os investigadores puderam, depois, interagir com a comunidade local para a realização do estudo sociológico, confirmando haver ali a ideia de lugar, isto é, um processo social de territorialização, com forte vinculação identitária e moldado por um tempo histórico consideravelmente longo, uma vez que, muitas delas, remontam a várias centenas de anos.

Em todas elas se identificou um progressivo abandono dos campos em socalcos mais afastados das aldeias, por opção dos proprietários, pois a grande maioria deles encontra-se em idade avançada (com mais de 60 anos), o que apenas lhes permite cultivar as áreas mais próximas de suas casas (Lourenço, 2006).

Deste modo, com o declínio da atividade agrícola, o mosaico parcelário das áreas rurais empobreceu-se e os campos em socalcos, abandonados, propiciam um acréscimo da carga combustível, que, por sua vez, aumenta os riscos de ignição e de propagação de incêndios, pelo que a serra do Açor constitui um bom caso de estudo, materializado nas oito aldeias selecionadas.

Referências bibliográficas

- Lourenço, Luciano (1988) - Incêndios florestais entre Mondego e Zêzere no período de 1975 a 1985. *Cadernos de Geografia*, Coimbra, 7, 181-189.
- Lourenço, Luciano (coord) (2006) - *Paisagens de Socalcos e Riscos Naturais em Vales do Rio Alva*. Coletâneas Cindinicas VI. Núcleo de Investigação Científicas de Incêndios Florestais. Coimbra, 202 p.
- Lourenço, Luciano (2007) - *Riscos Ambientais e Formação de Professores*. Colectâneas Cindinicas VII, Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra, 223 p.
- Lourenço, Luciano (2009) - “Plenas manifestações do risco de incêndio florestal em serras do Centro de Portugal. Efeitos erosivos subsequentes e reabilitações pontuais”. *Territorium*, Revista da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, Lousã, nº 16, p. 5-23;
- Viegas, D. Xavier; Lourenço, L.; Neto, Luís; Pais, T.; Monteiro, J. P.; Ferreira, A. e Goulão, M. (1988) — *Análise do Incêndio Florestal ocorrido em Arganil/Oliveira do Hospital de 13 a 20 de Setembro de 1987*. Centro de Mecânica dos Fluidos, Coimbra, 102 p.

POR ENTRE BRASAS E FUMAÇAS: A IMPORTÂNCIA DA ABORDAGEM SOCIOLÓGICA DA MEMÓRIA SOCIAL DE IDOSOS PARA A COMPREENSÃO DE DESASTRES RELACIONADOS AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS EM PORTUGAL

Norma Valencio

Programa de Pós Graduação em Sociologia, Universidade Federal de São Carlos
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, Universidade de São Paulo
normaf@terra.com.br

Rosemeire Aparecida Scopinho

Departamento de Psicologia e NUESTRA,
Universidade Federal de São Carlos
scopinho@ufscar.br

Luciano Lourenço

Departamento de Geografia e CEGOT, Faculdade de Letras,
Universidade de Coimbra
luciano@uc.pt

RESUMO

O desvendamento da trama social implicada nas catástrofes é relevante para o aperfeiçoamento das políticas públicas no tema. Nessa trama social, incluem-se as especificidades do ponto de vista dos diferentes subgrupos sociais acerca de como vivenciaram a situação. A sociologia é uma disciplina fundamental para propiciar esse desvendamento. De um lado, os métodos próprios desta disciplina favorecem a identificação e a análise das características dos sujeitos em interação e a sua situação. De outro, esta disciplina propõe e ajusta, para cada contexto social específico, um esquema classificatório que organiza os elementos materiais e simbólicos que foram perturbados na catástrofe. Tendo isso em conta, este estudo apresenta aspectos das contribuições sociológicas, por meio do método da memória social, para o entendimento do drama de moradores idosos na vivência de incêndios florestais em oito aldeias do distrito de Coimbra, em Portugal.

Palavras-chave: Sociologia dos Desastres; Defesa Civil; Brasil.

Introdução

O debate sociológico sobre o tema dos desastres/catástrofes tem sido enfático quanto à importância que a escuta ativa dos grupos sociais afetados tem para o aperfeiçoamento das políticas públicas no tema. A tragicidade desse tipo de acontecimento se deve ao envolvimento de um dado *meio social* e que o vivencia em seu próprio *tempo social* (Quarantelli, 2005). Isso torna evidente que os esforços públicos para ampliar as possibilidades de compreensão sobre como esse meio social se organiza, funciona e elabora os seus sentidos sobre a vida e o mundo adicionam possibilidades de êxito às políticas postas em curso. Das (1995), apropriadamente, salienta que um evento crítico deixa vestígios incomodativos não apenas na organização comunitária e no embate político, mas também no corpo e na intersubjetividade. Isso provoca alterações na experiência social da vida quotidiana, incluso o aumento de tensões na relação direta com o meio técnico-operacional que atua nessas circunstâncias.

A situação dos diferentes subgrupos sociais envolvidos numa mesma catástrofe - não apenas em relação ao grau de exposição ao fator de perigo, mas também em relação à histórica vulnerabilidade correspondente à dimensão de classe, de gênero, etária, étnica, entre outros - suscita que cada um dos recortes acima construa, potencialmente, uma interpretação singular acerca dos acontecimentos. A partir de um nexo comum, cada sujeito individual ou coletivo

pode enfatizar um dado aspecto da situação, retribuindo o peso dos elementos decisivos que contribuíram para o seu drama em particular.

A busca por um aperfeiçoamento das políticas de proteção e defesa civil, visando torná-la mais eficaz, participativa e envolvida com o saber-fazer comunitário, pode se valer dos contributos das Ciências Sociais, especialmente, da Sociologia. Isso porque o objetivo desta disciplina é, em última instância, desvendar as lógicas subjacentes à estrutura e dinâmica social. De um lado, os métodos próprios desta disciplina favorecem a identificação e a análise das características dos sujeitos em interação num determinado contexto macro ou microssocial. De outro, no que tange às catástrofes, esta disciplina pode contribuir, entre outros, na proposição de esquemas classificatórios que favorecem a compreensão dos nexos entre os elementos materiais e simbólicos e as práticas dos sujeitos envolvidos. A fim de ilustrá-lo, este estudo parte de uma apresentação sucinta do método da memória social para focalizar a contribuição do mesmo no entendimento do drama vivido por moradores idosos em contexto de incêndios florestais em oito aldeias do distrito de Coimbra, em Portugal.

A importância da memória social de idosos

Quando se busca a *memória social* sobre acontecimentos do passado, é pertinente buscá-la junto a um sujeito social em particular, os idosos, porque são eles os *guardiões do passado* (Bosi, 1979). Os idosos aninham as suas experiências longínquas de vida e as tradições de sua comunidade de convivência de modo a insinuá-las como algo pulsante, vivo, alojado nos meandros do presente. Pela memória dos idosos é possível perceber as transformações ocorridas no espaço, na história, nas instituições, nos papéis sociais e no imaginário social ao longo das gerações, ao mesmo tempo em que se percebe a manutenção de certas crenças e costumes. Para Pollak (1992), a memória social é balizada por três elementos: *os acontecimentos* (que caracterizam a memória que herdamos do grupo ao qual pertencemos ou mesmo a memória dos acontecimentos que vivemos pessoalmente), *os personagens* e *os lugares*. Pois são exatamente esses três os elementos indispensáveis para construir uma narrativa bem estruturada sobre uma catástrofe.

Martins (2008: 129) salienta que a memória “(...) *se inscreve e se constrói no cotidiano. Ao mesmo tempo em que apreendemos a memória através do imaginário, do senso-comum, construímos memórias através de nossas relações cotidianas que se perpetuam nos gestos, sentimentos e atitudes*”. E a memória coletiva influencia e contempla as memórias individuais, pois “(...) *não há lembranças que não reaparecem sem que de alguma forma seja possível relacioná-las ao grupo*” (Halbwachs, 2006:40); isto é, para o autor, evocamos e articulamos outras memórias para referirmo-nos às nossas lembranças, aquelas que, aparentemente, são individuais.

A memória acerca de catástrofes vividas

A vivência de uma catástrofe por parte de uma comunidade é algo que permanece nítido na memória social local, posto seja um tipo de acontecimento desestruturador das rotinas da vida quotidiana. É na vida quotidiana que o espaço comunitário se apresenta como *espaço vivido* (Lefebvre, 1974) e os sujeitos exercitam uma autonomia relativa sobre a organização e o ritmo de sua sociabilidade corriqueira. A catástrofe, quando ocorre, desorganiza o espaço vivido e, além disso, dita uma nova dinâmica social emergencial, que busca mitigar o solapamento (em diversas gradações) das condições materiais de existência.

O sofrimento social multidimensional havido, decorrente dos danos e prejuízos materiais e imateriais, ativa sentidos compartilhados sobre essa experiência. A memória social de idosos sobre os acontecimentos afeitos à sua comunidade é um dos melhores recursos para resgatar a dimensão relacional do problema, dado que possa fluir de modo a imbricar aspectos sociopolíticos, socioculturais, socioambientais e psicossociais.

A memória de idosos aldeões em contexto de incêndio florestal

Embasando-nos em vários estudos geográficos realizados pelo Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais (NICIF), especialmente, na cartografia dos incêndios florestais ocorridos nas últimas cinco décadas no alto distrito de Coimbra (Lourenço 2006), foi possível identificar oito aldeias que foram particularmente sensíveis à ocorrência de incêndios florestais, a saber: no concelho de Arganil, as aldeias de Cepos e Piódão; no concelho de Góis, as aldeias de Malhada e Soito e, no concelho de Oliveira do Hospital, as aldeias de Gramaça, Chão Sobral, Aldeia das Dez e Rio de Mel.

Nas referidas aldeias, foram realizadas entrevistas individuais e coletivas com os moradores idosos, tentando buscar a sua vocalização direta sobre os piores incêndios florestais ao redor e de que tinham lembrança e em cujo contexto trágico os mesmos tinham participado. De tipo semiestruturadas, as entrevistas seguiram um roteiro temático que procurou resgatar as recordações acerca da vivência direta dos eventos assim como dos momentos que o precederam e sucederam, tratando especialmente das suas consequências no quotidiano do modo de vida aldeão. As entrevistas coletivas que possibilitaram a calibração das informações obtidas através dos diferentes discursos individuais acerca das *regularidades* e *especificidades* da vivência dos desastres/catástrofes relacionados aos incêndios florestais.

Paralelamente ao processo de agendamento e realização das entrevistas, observámos o quotidiano aldeão, o que permitiu apreender elementos importantes do modo de vida local, desde as formas de trabalho existentes, até aos costumes e tradições mantidas, passando pela organização dos diferentes espaços de vivência. Este recurso permitiu ficar a conhecer melhor as rotinas dos sujeitos e, ao mesmo tempo, confrontar discursos e práticas sociais.

Dentre os principais resultados obtidos na interlocução com os moradores idosos entrevistados, e que são reportados com maior detalhamento em Valencio, Scopinho e Lourenço (no prelo), destacam-se:

- a) uma produção discursiva que, por um lado, têm como referência as palavras vigília, alarme, combate, defesa e ajuda, componentes de uma prática ativa em prol da autoproteção e, de outro lado, apresenta palavras que revelam sentimentos de fragilidade, tais como aflição, medo e pânico;
- b) uma relação ambígua, ao mesmo tempo colaborativa e de conflito, com os técnicos e operacionais de combate aos incêndios. Por um lado, os moradores empenham-se no auxílio possível aos trabalhos de resposta aos incêndios - como através da comunicação aos setores competentes acerca dos primeiros focos de incêndio, alertando diretamente os vizinhos, fornecendo equipamentos de combate, cooperando no manuseio dos mesmos e em tarefas de alimentação e dessedentação das equipes exaustas, entre outros. Contudo, as comunidades sentem que sua colaboração é socialmente invisível;
- c) as tensões entre os critérios de salvamento e de evacuação impostos pelo meio técnico-operacional e os critérios comunitários, como ocorreu em Piódão, onde, num incêndio em

- 2005, houve desacordo entre combatentes e moradores na definição dos indivíduos que tinham condições para ajudar;
- d) as ações táticas de autoproteção comunitária frente ao perigo iminente, como ocorreu em Cepos e Malhada, onde os moradores se esconderam dentro de poças de água até que as labaredas passassem; e, por fim,
- e) a identificação de sujeitos que adotam práticas de risco, que vão desde os proprietários, agrícolas e florestais, que não limpam seus terrenos até os órgãos autárquicos (Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia) que não fazem a devida manutenção das estradas e vias públicas, passando, ainda, pelos insanos que, por divertimento ou sadismo, ateiam fogos pelo prazer de apreciar a movimentação das pessoas, dos bombeiros e outros agentes de proteção civil nas operações de combate.

Conclusões

Com a ilustração acima, consideramos que a abordagem sociológica, debruçada sobre o método da memória social de idosos, trouxe elementos preciosos para o debate sobre como superar as insuficiências das operações de combate aos incêndios florestais nas aldeias investigadas.

A nosso ver, a cultura institucional de planificação avança quando se instaura uma racionalidade dialógica com as comunidades que vivenciaram catástrofes. No geral, essas já se sentem ativamente envolvidas nas circunstâncias de catástrofe e muito apreciariam deixar de ser vistas apenas como vítimas no imaginário institucional. Quanto maior for a disposição institucional para elaborar medidas de prevenção, preparação, resposta e recuperação na tessitura integrada do saber-fazer técnico e comunitário, maiores serão as chances de evitação dos sentimentos comunitários de fragilidade e de insegurança quanto ao futuro, bem como as hipóteses de superação da sua invisibilidade social, quando no apoio às ações do meio-técnico operacional.

O repertório analítico das comunidades sobre os incêndios florestais que as afetaram no passado é, continuamente, remodelado na memória social local. A experiência de dilaceração circunstancial do espaço vivido é ressignificada tanto pelo extenso percurso de vida dos memorialistas quanto pela atualização constante do conjunto de regras e valores locais. Portanto, quanto mais perene for a relação institucional baseada numa escuta ativa às comunidades aldeãs, especialmente aos seus *guardiões da memória*, maior a possibilidade de apreensão técnica dos erros e acertos em cada episódio de combate ao incêndio e menos vulneráveis todos os envolvidos se sentirão.

Referências Bibliográficas

- BOSI, Ecléa (1979) - *Memória e sociedade: lembrança de velhos*. T.A. Queiroz Editor Ltda, São Paulo.
- DAS, Veena (1995) - *Critical Events: an anthropological perspective on contemporary*. Oxford University Press, New Delhi.
- HALBWACHS, Maurice (2006) - *A Memória Coletiva*. São Paulo: Centauro.
- LEFEBVRE, Henri (1974) - *La production de l'espace*. Paris: Anthropos.
- LOURENÇO, Luciano (coord.) (2006) - *Paisagens de Socalcos e Riscos Naturais em Vales do Rio Alva*. Coletâneas Cindinicas VI. Núcleo de Investigação Científicas de Incêndios Florestais, Coimbra. Disponível: www.uc.pt/fluc/nicif/Publicacoes/Colectaneas/Coletanea_Cindinica_VII [10 de julho de 2013]
- MARTINS, José de Souza (1998) - "O senso comum e a vida quotidiana". *Tempo Social*, Revista Soc. USP, 10(1), maio, São Paulo, p.1-8.

- POLLAK, Michael (1992) - “Memória e identidade social”. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, vol.5, n.10. p. 200-212.
- QUARANTELLI, Enrico L. (2005) - “A social science research agenda for de disasters of the 21st century: theoretical, methodological and empirical issues and their professional implementations”. In PERRY, RONALD W.; QUARANTELLI, ENRICO L. (Eds.) - *What is a disaster? New answers to old questions*. International Research Committee on Disasters, USA, p. 325-396.
- VALENCIO, NORMA; SCOPINHO, ROSEMEIRE AP.; LOURENÇO, Luciano (no prelo) - “Por entre brasas e fumaças: encontros e desencontros entre práticas sociais e racionalidades operantes de sujeitos envolvidos em contextos de incêndios florestais”. *Cadernos de Geografia*, Coimbra.

DIAGNÓSTICO DE RISCO DOS IMÓVEIS TOMBADOS EM BAURU/ SP/ BRASIL

Sérgio Ricardo Losnak

Departamento de Arquitetura, FAAC da Universidade Estadual Paulista de Bauru
sergiolosnak@gmail.com

Camila Santos Doubek Lopes

Departamento de Geociências, CCE da Universidade Estadual de Londrina
uel.camila@gmail.com

RESUMO

No Brasil, as políticas públicas de proteção ao patrimônio cultural estão relacionadas aos mecanismos de tombamento. No caso da cidade de Bauru/SP, o tombamento está associado a ações do poder executivo e do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural (CODEPAC). Foi observado empiricamente que essas ações não atingem os objetivos de preservação cultural, arquitetônica e histórica. Assim, este estudo diagnosticou a existência de risco da integridade física que venha ocasionar a descaracterização do bem tombado, bem como, os riscos provocados pelas resignificações e usos desassociados daqueles relativos aos da sua origem. Para tanto, foi realizada pesquisa bibliográfica exploratória e documental descritiva, bem como, visita técnica aos bens tombados que evidenciou a ocupação de 74% dos bens e sua relação com os riscos. Concluiu-se que: (i) o tombamento, quando cerceado de outros mecanismos proporciona riscos a integridade física do bem e a paisagem urbana; (ii) a ocupação dos imóveis não está associada à sua conservação e a minização dos riscos (iii) novos sentidos simbólicos atribuídos ao patrimônio ameaçam a identidade local.

Palavras-chave: riscos, vulnerabilidade, tombamento, patrimônio cultural, Bauru/SP.

Introdução

No Brasil, a política de preservação do patrimônio cultural é aplicada pelos poderes públicos, união, estados e municípios, que possuem legislações e metodologias específicas e seguem as orientações da Constituição Federal e parcialmente das convenções internacionais, sendo o mecanismo de tombamento o principal recurso utilizado (BRASIL, 2014). No município de Bauru/SP, o tombamento se dá por ações do poder público municipal em conjunto com a sociedade civil, por meio do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural - CODEPAC.

Em virtude da ausência de um diagnóstico preciso quanto à situação atual dos imóveis tombados, este trabalho propõe discorrer sobre a efetividade da política de preservação do patrimônio cultural do município, por meio da elaboração de um diagnóstico sobre as formas de uso, conservação, preservação e riscos físicos e simbólicos dos bens imóveis tombados.

Quanto à metodologia, foi realizada pesquisa quali-quantitativa, bibliográfica exploratória e documental em Processos de Tombamentos, Atas e legislações pertinentes ao CODEPAC, além de visitas técnicas a cada um dos bens.

Um bem histórico é aquele que recebe uma titulação pública e tem associado a ele reconhecimento de identidade de determinado grupo humano. As mediações no campo simbólico formadas por afetos, lembranças e memórias, quando se efetivam garantem ao bem determinado nível de preservação (CLAVAL, 2007). Quanto à preservação, mais especificamente de bem material, busca-se a manutenção da sua integridade física e de suas características originais, ao mesmo tempo que se procura tornar o bem acessível às pessoas, colocando-o em uma dimensão pública e coletiva para se estabelecer as diferentes mediações inerentes ao sujeito e ao objeto (BRASIL, 2004).

Como consequência das forças hegemônicas do capital especulativo imobiliário somado à ineficiência do Estado no cumprimento das legislações que disciplinam o crescimento da cidade, têm-se o constante aumento da população nas cidades brasileiras, juntamente com seu crescimento desordenado, gerando ameaças e riscos à integridade do patrimônio cultural.

Os diferentes riscos e ameaças que os bens culturais estão sujeitos não são exclusivamente associados aos fatores físicos da geografia do lugar mas também aos fatores socioculturais e econômicos (BRASIL, 2013). Para tanto a gestão de risco é imprescindível e envolve diferentes áreas do conhecimento e de campo de atuação profissional, a sinaliza como proteger de fato os bens de relevância para a humanidade e manter estes espaços de reafirmação identitária de modo a assegurar o direito à memória cultural (ZANIRATO, 2010).

A cidade de Bauru

Bauru teve sua formação inicial no período de desbravamento do interior do Estado de São Paulo. Seu embrião urbano nutria e garantia segurança para as ocupações de terras rumo ao oeste do estado por volta da segunda metade do século XIX. Em terras dos índios Kaingangues, o arraial árido, mais tarde conhecido como a Capital da Terra Branca, se transformou em município em 1896 (BAURU, 1997).

Como frente e suporte para ocupação do oeste, Bauru se tornou “chão de passagem” (SANT`AGOSTINHO, 1995), principalmente pela construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil - EFNOB (1905), que parte de Bauru e chega até a cidade de Corumbá, Estado do Mato Grosso Sul, divisa territorial com a Bolívia. Como também pela chegada dos trilhos de mais duas ferrovias que ligava a cidade ao Porto de Santos, a Estrada de Ferro Sorocabana (1904) e Estrada de Ferro da Companhia Paulista (1911), (SILVA, 1957). A cidade de Bauru abriga edificações expressivas com estilos variados como eclético *art deco*, modernas e contemporâneas, tombadas ou em estudo de tombamento pelo CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo - e CODEPAC.

O CODEPAC

Criado pela Lei Municipal nº 3.486, de 24 de agosto de 1992, com característica consultiva o CODEPAC é composto por 7 representantes da sociedade civil e 4 membros do executivo e tem a função de indicar e elaborar argumentação documental para tombamento que é efetivado por Decreto Municipal por parte do líder do executivo, que tem a prerrogativa de incluir e ou suprimir as proposições (CODEPAC, 2014).

A pesquisa - metodologia e resultados

A pesquisa se baseou na observação dos 35 imóveis tombados no município, comparando o estado atual com aquele registrado nos relatórios e fotografias presentes nos Processos de Tombamento, que datam de suas aberturas. Foi possível identificar o nível de ocupação, conservação e descaracterização externa de cada um dos bens (Tabela I) e apontar os riscos associados à materialidade e aos sentidos simbólicos relacionados à identidade da cidade (Tabela II).

Uso e abandono

Dos 35 imóveis estudados, 26 (74%) apresentam ocupação total de suas dependências, outros 3 (9%) possuem ocupação parcial e os outros 6 (17%) estão totalmente desocupados. Considerando o uso dos imóveis ocupados (26), constatou-se que a maioria, 23 (88%) desempenham a função

para a qual foram projetados e 3 (12%) abrigam outras funções de uso. Quanto ao estado de conservação dos imóveis, se apurou que 13 (37%) se encontram bem conservados, 9 (26%) em estado regular e 13 (37%) não apresentam algum tipo de conservação, comprometendo a preservação de suas características originais.

Quanto aos indícios de alterações das características originais dos imóveis, 19 (54%) não apresentam sinais significativos de descaracterização, porém os outros 16 (46%) apresentam intensas alterações. Outro resultado relevante aponta que, 66,7% dos bens parcialmente ou totalmente desocupados se referem às Estações Ferroviárias.

TABELA I - SITUAÇÃO DO BEM TOMBADO				
BENS TOMBADOS EM USO				
Bem	Uso atual	Conservação	Descaracterização	Riscos
Hotel Cariani	Hotel	Bom	Ausente	1;2;3;5;6
Hotel Estoril	Hotel	Ruim	Parcial	1;2;3;5;6
Casa Comercial - Sobrado do Calçadão	Comércio	Bom	Ausente	1;2;3;6
Antigo Palacete Pagani	Comércio	Bom	Ausente	1;2;3;6
Antigo Grupo Escolar Ernesto Monte	Comércio	Ruim	Parcial	1;2;3;5;6
Antiga Casa Savastano	Comércio	Ruim	Parcial	1;2;3;5;6
Antiga Farmácia Popular	Comércio	Regular	Ausente	1;2;3;6
Antiga Casa Lusitana	Comércio	Regular	Parcial	1;2;3;6
Edifício Brasil-Portugal	Moradia	Regular	Ausente	1;2;3;5;6
Edifício Abelha	Moradia	Bom	Ausente	1;2;3;6
Sede da Fazenda Divisa	Moradia	Regular	Ausente	1;2;3;6
Sede da Fazenda Val de Palmas	Moradia	Regular	Parcial	1;2;3;6
Igreja Santa Teresinha	Igreja	Regular	Ausente	1;2;3;6
Igreja Presbiteriana Independente	Igreja	Regular	Parcial	1;2;3;6
Capela da Santa Casa De Misericórdia	Igreja	Bom	Ausente	1;2;3;6
Igreja Tenrikyo	Igreja	Bom	Ausente	1;2;3;6
Antiga Casa do Superintendente da NOB	Escritório	Bom	Parcial	1;2;3;5;6
Antiga PRG-8 (atual TV TEM)	Escritório	Bom	Ausente	1;2;3;6
Casa Aliança Francesa	Escritório	Bom	Parcial	1;2;3;5;6
Portal de entrada do Cemitério da Saudade	Escritório	Regular	Ausente	1;3;6
Aeroclube de Bauru	Escritório e hangares	Ruim	Parcial	1;2;3;6
Fachada da Beneficência Portuguesa	Hospital	Bom	Parcial	1;2;3;6
Automóvel Clube de Bauru - Público	Sede da Orquestra	Bom	Ausente	1;2;3;6
Grupo Escolar Rodrigues de Abreu	Escola particular	Bom	Parcial	1;2;3;5;6
Palácio das Cerejeiras - Público	Prefeitura Municipal	Regular	Parcial	1;2;3;6
Quartel Militar - Público	Polícia Militar	Bom	Ausente	1;2;3;6
BENS TOMBADOS PARCIALMENTE EM USO				
Estação Val de Palmas	Desocupado/Invadido	Ruim	Parcial	1;2;3;5;6
Sede INSS	Desocupado/ Escritório	Ruim	Ausente	1;2;3;6
Est. da Cía Paulista de Estrada de Ferro	Desocupado/ Em obra	Ruim	Ausente	1;2;3;5;6
BENS TOMBADOS SEM USO				
Casas Geminadas do começo do Séc. XX.	Desocupado	Ruim	Parcial/critico	1;2;4;5;6
Antigo Hotel Milaneze	Desocupado	Ruim	Ausente	1;2;4;5;6
Estação Central da EFNOB	Desocupado	Ruim	Ausente	1;2;4;5;6
Estação de Tibiriçá	Desocupado	Ruim	Parcial	1;2;4;5;6
Estação Sorocabana	Desocupado	Ruim	Ausente	1;2;4;6
Estação Curuçá	Desocupado	Ruim	Parcial/critico	1;2;4;5;6

Riscos

A visita técnica realizada a cada um dos bens proporcionou, por meio da observação, identificar fatores que ofereçam algum tipo de risco à preservação do bem.

A possibilidade de risco de incêndio é comum a todos os imóveis, porém com graus distintos. O transporte de combustível por trem que ocorre as margens dos diversos prédios históricos é um dos fatores de maior risco.

O tráfego de veículo que impacta no bem tombado pode ser dividido em 3 níveis. O primeiro é aquele em que o bem se localiza em rua simples com pouco fluxo e à predominância de veículos leves, o segundo nível é aquele em ruas e avenidas com rotas de ônibus urbano e o último esta associado a proximidade da linha férrea, que em virtude de suas condições precárias apresenta um alto índice de descarrilamento de composições ferroviárias.

A contradição existente entre os riscos, do abandono e do uso, se dá a partir da constatação de que simplesmente o uso de um bem tombado não garante sua preservação. As alterações mais comuns encontradas foram relativas às esquadrias, pintura, volumetria e área envoltória. Já o estado de abandono, ou a ausência formal de uso, provoca uma degradação natural intensificada e grande incidência ocupações irregulares permanentes ou temporária que aumentam em alto grau o risco de alterações e depredações do bem.

Os fatores relacionados ao comprometimento estrutural do bem, são todos aqueles que de alguma forma interferem em suas características originais. Os fatores relacionados a força da natureza, tendo em vista a geografia da região estão relacionados as intempéries. Um dos imóveis esta localizado em área de inundação, agravando sua situação de risco estrutural.

A gestão do patrimônio cultural está associado às políticas publicas estabelecidas nas três instancias do Estado, mas é no município que de fato a preservação se efetiva. Assim, cabe a ele a implantação de políticas publicas relacionas à outros dispositivos de planejamento da cidade, com envolvimento da sociedade civil e da pratica sistêmica de educação patrimonial aos diferentes públicos que formam a cidade (CHAUI, 2006).

TABELA I - SITUAÇÃO DE RISCO			
RISCOS	NÍVEL	CAUSAS	CONSEQUENCIA
Comprometimento da edificação	1	Falta de conservação dos bens Intervenções inadequadas Uso de materiais diferentes aos originais Alteração na volumetria Alterações das esquadrias Vibrações causadas pelo tráfego de veículos e trens Ataques de insetos (cupim, broca, pomba) Desgaste natural pela intempérie	Perda total ou parcial do bem Perda das características originais do bem Perda da ambiência e transformação do entorno Perda de referências culturais
Incêndio	2	Conservação inadequada das edificações Ausência de estrutura e plano de combate a incêndios Falta de conservação da rede elétrica Ausência de vistorias e acompanhamento do estado do bem Transporte de combustíveis por trens Manobras e estacionamento de vagões de combustíveis. Acumulo de materiais e resíduos que possam propagar fogo Ocupação irregular	Risco de vidas Perda total ou parcial do bem Perda das características originais do bem
Uso	3	Alterações, ampliações e adaptações estruturais Falta de manutenção permanente Acumulo de resíduos e lixo Desconhecimento das referências históricas do bem Desconhecimento das normas, regulamentações e políticas de uso de bem tombado	Comprometimento em virtude da ausência de consciência sobre a relevância do bem Perda de referências culturais Construção de imagem negativa da gestão local do patrimônio
Abandono	4	Desconhecimento da possibilidade de adaptação do bem para outros usos Custo elevado da restauração Falta de política de estímulo a ocupação Desvalorização imobiliária	Ocupação irregular Degradação com ação do tempo Depredação
Trafego	5	Concentração do transporte coletivo por ônibus no centro da cidade Transporte de carga seca e combustíveis por trens	Vibrações que desagregam estruturas edificadas Poluição sonora Possibilidade de acidente e descarilamento
Gestão	6	Legislação e regulamentação ineficiente quanto aplicabilidade Ausência de Plano de gestão do patrimônio cultural Falta de fiscalização efetiva Ausência de educação patrimonial Ausência de inventário Ausência de plano de risco Inexistência da participação popular nos colegiados de gestão Conselhos de defesa do patrimônio consultivos Falta de procedimentos públicos que auxiliem proprietários quanto ao uso, conservação e restauração do bem.	Abandono Falta de apropriação, pertencimento e identificação simbólica do bem pela coletividade Alterações e modificações estruturais do bens por falta de desconhecimento e técnica adequada Desconstrução da identidade originária da cidade Atuação sem restrição da especulação imobiliária Conselho sujeito a interferência do poder público

Conclusões

Com base nos resultados alcançados, pode-se concluir que:

- A gestão do patrimônio tombado se mostra precária por não apresentar planejamento envolvendo ações que acompanhe sistematicamente cada um dos bens. A desocupação, ocupação e os riscos aqui apontados, requerem de início a realização de inventário e um Plano de Gestão de Risco, que possa ser aplicado pelo município de modo a garantir a identidade cultural da cidade.
- Outra situação que causa determinada vulnerabilidade à integridade do bem é a falta de uma estrutura técnica específica que dê sustentação às ações do conselho. Torna-se necessário a formação de uma equipe multidisciplinar que realize sistematicamente estudos pertinentes aos bens e que possa estabelecer uma relação mais próxima com seus proprietários e usuários, oferecendo assessoria e formação no que se diz respeito à política de preservação do Município.
- Apesar da existência de regulamentações que tratam de importantes pontos que possam vir a garantir a salvaguarda do bem, na prática, a legislação não garante sua preservação. O método legal acaba provocando uma precarização da posse e do próprio bem. O ato de tombar se mostra insuficiente, criando uma dicotomia entre a preservação por ato oficial e a preservação de fato.

Referências Bibliográficas

- BAURU, Prefeitura Municipal de. **Edição Histórica 81º anos**. Bauru: Focus, 1997.
- BRASIL. Ministério da Cultura. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. **Cartas patrimoniais**. Rio de Janeiro: IPHAN, 2004.
- BRASIL. Ministério da Cultura. Instituto Brasileiro de Museus. **Programa para a gestão de riscos ao patrimônio Musealizado Brasileiro**. Rio de Janeiro: IBRAM, 2013.
- BRASIL. Ministério da Cultura. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. , **Tombamento**. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=17738&sigla=Institucion&retorno=paginaInstitucional>. Acesso em 13 de maio de 2014.
- CODEPAC. Disponível em: <http://hotsite.bauru.sp.gov.br/codepac/>. Acesso em 13 de maio de 2014.
- CHAUI, Marilena. **Cidadania cultural, O direito à cultura**. São Paulo: Fundação Perceus Abramo, 2006.
- CLAVAL, Paul. **A geografia cultural**. 3. ed. Florianópolis: UFSC, 2007.
- SANT'AGOSTINHO, Lúcia Helena F. **Bauru, Chão de passagem: entreposto de valores na rota Atlântico - Pacífico**. São Paulo: Dissertação de Mestrado da FAU USP, 1995.
- SILVA, Alcides. **Roteiro Histórico: uma cidade e uma instituição**. Bauru: Tipografia Comercial, 1957.
- ZANIRATO, Sílvia Helena. **Experiências de prevenção de riscos ao patrimônio cultural da humanidade**. Revista Ambiente & Sociedade, v. XIII, n. 1, jan-jun. Campinas: UNICAMP, 2010.

RISCOS SOCIAIS E AS MOTIVAÇÕES DOS TERRITÓRIOS INTENCIONALMENTE DE RISCO: PERCEPÇÕES SOBRE O RIO DE JANEIRO E O DISTRITO FEDERAL

Érica Ferrer

Departamento de Geografia, Universidade de Brasília - UnB
ericafes@yahoo.com.br

RESUMO

A criminalidade e a insegurança são uma grande preocupação sentida nas cidades. Tal medo tem sido manipulado por empresas de segurança pública, lançamentos imobiliários e programas de governo para gerar lucro e votos. No entanto, tal insegurança coletiva deve ser trazida para o meio científico para que sejam estudados quais fatores causam o aumento do índice de homicídios, por exemplo. A falta de infraestrutura neste estudo se mostra como um causador desse aumento, porém o governo tem esse conhecimento e, em muitos casos, não o aplica. Assim, o conceito do território intencionalmente de risco visa propor uma reflexão acerca desse descaso governamental em certas áreas e o grande investimento em infraestrutura em outras regiões. Ainda, aborda as motivações que podem levar o governo a não direcionar políticas públicas em determinados territórios com risco social. Neste estudo são utilizados três bairros da cidade do Rio de Janeiro e três regiões administrativas do Distrito Federal.

Palavras-chave: território intencionalmente de risco, criminalidade, infraestrutura

Introdução

A violência é um problema muito discutido quando se debate sobre a gestão das cidades. No entanto, muitas vezes a segurança acaba sendo o ponto central discutido nos projetos de cidade. Mas será que colocar o tema da segurança pública em primeiro lugar pode estar relegando problema estruturais urbanos como a desigualdade social em último plano? Por que o governo (que sabe que a infraestrutura diminui os índices de criminalidade dos homicídios) não distribui a infraestrutura de forma menos desigual nos territórios?

Essas questões serão debatidas ao longo deste artigo de forma a esclarecer a problemática. Assim, serão expostos o ponto de vista histórico, a opção por um tipo específico de segurança e os dados que comprovam tal associação entre infraestrutura e criminalidade dos homicídios.

Os Riscos Sociais e o Território Intencionalmente de Risco

O Rio de Janeiro tem um projeto de segurança pública voltado para o turismo e para a elite. Assim, bairros da zona sul, como o Leblon são priorizados no investimento público possuindo tanto melhor infraestrutura quanto mais equipamentos de segurança pública. A cidade optou pelo turismo e pela atração de grandes eventos para aquecer sua economia, pois necessitou se refuncionalizar após a perda da função econômica para São Paulo e da centralidade política para Brasília. Desta forma, várias obras e projetos têm sido realizados para criar um ambiente voltado para os turistas, tais como: o Rio sem homofobia (projeto estatal), a Transcarioca, as intervenções urbanísticas nas favelas, as obras no Maracanã, o projeto Porto Maravilha e as UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora). Por outro lado, os subúrbios e favelas que estão distanciados do turismo não possuem tanto investimento de infraestrutura, como Madureira e Santa Cruz.

No Distrito Federal, a segurança pública tem um viés tanto de proteger a elite quanto tem um caráter político/estratégico de controle, principalmente na região administrativa de Brasília. Nesta região estão as sedes dos poderes nacionais (legislativo, jurídico e executivo), como o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal etc. A região administrativa de Brasília é tanto urbanisticamente quanto policialmente controlada de forma mais efetiva do que as outras regiões do Distrito Federal. Ainda é na região administrativa de Brasília que está a presença maior de funcionários públicos e de população com maior renda. Em outras regiões administrativas como Ceilândia e Taguatinga, tanto a segurança quanto a presença de uma população com maior renda não é tão observada.

Em ambas realidades a infraestrutura acaba sendo menos presente em territórios de populações mais pobres o que acaba por gerar maiores índices de criminalidade de homicídios como pode ser observado nas Tabelas I, II, III e IV.

Tabela I. Média anual de homicídios por 100 mil habitantes no Rio de Janeiro no ano de 2013 por AISP

(AISP 23) Leblon, Rocinha, Ipanema, Gávea, Jardim Botânico, Lagoa, São Conrado e Vidigal Média de 5,4 homicídios
(AISP 27) Santa Cruz, Paciência, Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Sepetiba Média de 37,92 homicídios
(AISP 9) Madureira, Campinho, Cascadura, Praça Seca, Quintino Bocaiuva, Vila Valqueire, Cavalcanti, Engenheiro Leal, Madureira, Turiaçu, Vaz Lobo, Bento Ribeiro, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz Coelho Neto, Colégio (Parte), Honório Gurgel e Rocha Miranda Média de 32,4 homicídios

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro, 2014.

Tabela II. Média anual de homicídios por 100 mil habitantes no ano de 2013

(RA 01) Brasília Média de 9,58 homicídios
(RA 03) Taguatinga Média de 17,52 homicídios
(RA 09) Ceilândia Média de 40,72 homicídios

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, 2014.

Tabela III. Infraestrutura na cidade do Rio de Janeiro

	Leblon	Madureira	Santa Cruz
População	46.044	50.106	217.333
Hospitais públicos	1	1	1
Delegacias	3	1	1
Teatros	6	1	0
Livrarias	10	4	3
IDH	0,967	0,831	0,742
Renda per Capita	5.805,42	980,13	509,71
Escolas e creches públicas	3	18	92

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Instituto Municipal Pereira Passos, Secretaria de Estado de Educação do RJ, Secretaria Municipal de Educação do RJ, Polícia Civil do RJ, Lista telefônica do RJ, 2014.

Tabela IV. Infraestrutura no Distrito Federal

	Brasília (RA 01)	Taguatinga (RA 03)	Ceilândia (RA 09)
População	208.666	199.715	402.729
Hospitais públicos	6	2	1
Delegacias	9	4	4
Teatros	8	1	1
Livrarias	70	16	5
IDH	0,936	0,855	0,784
Renda per capita	3.835,27	1.318,38	611,29
Escolas e creches públicas	85	55	89

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Codeplan, Seplan, Secretaria de Educação do DF, Secretaria de Saúde do DF, Polícia Civil do DF, Lista telefônica, Jornal Correio Braziliense, 2014.

Neste ponto, a geografia pode oferecer uma análise do fenômeno. García-Tornel pode explicar tal realidade através do sentido novo que dá para vulnerabilidade social sendo esta “a expressão do desequilíbrio ou desajuste entre a estrutura social e o meio físico, construtivo e natural que nos rodeia, de maneira que aparece como um conceito multidimensional que engloba simultaneamente fatores físicos e sociais e que ao mesmo tempo depende em linhas gerais, do tipo de intensidade da ameaça. Em consequência não tem valor absoluto” (GARCÍA-TORNEL, 2001, p. 108). Neste conceito o autor consegue inclusive unir geografia física e humana ao propor uma análise que toca mais a totalidade.

O mesmo autor afirma que “os territórios de risco vêm determinados por aquelas regiões planetárias onde o fato de ocorrer determinados fenômenos físicos ou biológicos, ou a presença de instalações perigosas são mais frequentes, de maneira que os riscos maiores têm espaços concretos, mais ou menos extensos, onde se manifestam preferentemente e aos que temos aludido para nos referir as suas características” (GARCÍA-TORNEL, 2001, p. 124). Tal conceito é aplicável neste artigo pois não seria só a “presença de instalações perigosas” que determinariam o território de risco, mas também a falta de “instalações seguras” (como a infraestrutura). Ainda, muitos desses espaços são criados de forma intencional (tanto a ação quanto a omissão do Estado são intenções). Dessa forma, que nasce o conceito de território intencionalmente de risco.

Assim, o território intencionalmente de risco seria aquele onde o governo não equipa o território com a infraestrutura necessária para aquela sociedade. As consequências seriam a criminalidade, a menor escolaridade, a desnutrição, a maior incidência de doenças etc.

As motivações do Território Intencionalmente de Risco

A ação e a omissão da decisão política refletem no espaço criando territórios intencionalmente de segurança e territórios intencionalmente de risco. Assim, surge a questão sobre qual seria a motivação para que sejam criados territórios intencionalmente de riscos.

Uma das motivações poderia ser a própria preferência em investir mais dinheiro público nos locais onde os moradores com maior força política (prefeitos, deputados, governadores, donos de grandes empresas, juízes) residem, pois muitos desses moradores que de fato escolhem (ou influenciam) onde investir o dinheiro público.

A questão imobiliária pode ser também uma motivação, pois manter certas áreas desvalorizadas (também por serem “territórios de risco”) mantém reservas territoriais que podem ser exploradas futuramente.

A indústria do medo também se beneficia desses territórios através de empresas de segurança, indústria armamentista, presídios e condomínios fechados (cada vez mais disseminados nas cidades).

Os fins eleitoreiros também são beneficiados, pois alguns candidatos políticos tem por pauta governamental apenas a questão da polícia intensiva nas ruas, de criminalizar ainda mais setores hipossuficientes da população (como os mais pobres que não têm acesso ao direito de se defenderem de forma efetiva).

Conclusão

Ao se discutir segurança pública é necessário observar que existe uma intencionalidade em manter certos territórios mais seguros que outros.

Logo, a responsabilidade existe quando a decisão política se omite nos espaços de população mais pobre e age nos espaços de população mais rica (ou nos territórios onde tem motivação econômica). Por isso, Estado deve se responsabilizar pelas consequências decorrentes dessa omissão. Ou seja, altos índices de homicídios em certos territórios são responsabilidade direta do Estado.

Assim, é necessário buscar formas mais efetivas de responsabilizar e fiscalizar o investimento público nos territórios para que tanto a desigualdade territorial quanto a insegurança pública em territórios dos mais pobres (ou o analfabetismo, a incidência de doenças, a mortalidade infantil) sejam diminuídas.

Bibliografia

- Farias, J. (2006) - *Cidades Negras: africanos, crioulos e espaços suburbanos no Brasil escravista do século XIX*. São Paulo, Ed. Alameda, 174 p.
- Fernandes, A. (2012) - *Processo Penal Institucional*. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 348 p.
- Foucault, Michel (1987) - *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Petrópolis, Editora Vozes, 262 p.
- García-Tornel, Francisco (1997) - Algunas cuestiones sobre Geografía de los Riesgos. *Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, Vol. I, n. 10, p. 1-5.
- Gross, P. (1998) - Ordenamento Territorial: El manejo de los espacios rurales. *Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales*, Vol XXIV, n. 73, p. 116-118.
- Santos, M. (2012) - *A natureza do Espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção*. São Paulo, EDUSP, 392 p.

POPULAÇÕES RURAIS E OS RISCOS FRENTE À EXPANSÃO DO TURISMO: VERTENTES SOCIOAMBIENTAIS E RESSIGNIFICAÇÕES DA RELAÇÃO ESPAÇO-NATUREZA

Germana Lima de Almeida

Universidade Regional do Cariri - URCA
germanalima@alu.ufc.br

Lea Carvalho Rodrigues

Universidade Federal do Ceará-UFC
leaufc@gmail.com

RESUMO

Guaramiranga é um município serrano situado a 110 quilômetros da capital do estado do Ceará (Brasil), essencialmente ligado à agricultura desde o século XIX até o final da década de 1980 quando envolvia ainda 93% de sua população nesta atividade. A partir de 1990 políticas públicas desestimularam o manejo agrícola convergindo estas populações para a atividade turística, alegando sua eficiência na geração de divisas e adequação aos novos preceitos de preservação ambiental. Após 24 anos de inserção do turismo, este artigo questiona a estratégia de sustentabilidade ecológica do modelo proposto - em diálogo com Diegues (1997) e Mowforth, Charlton e Munt (2008) -, contrapondo os benefícios anunciados às contradições advindas da atividade turística, sobretudo nos países do hemisfério Sul, que resultam, frequentemente, na degradação de espaços naturais e na segregação de suas populações locais, como observam Rodrigues e Alencar (2011), Ribeiro e Barros (1994), Lopez e Marin (2010).

Palavras-chave: Turismo, populações rurais, Guaramiranga (Ceará, Brasil), degradação ambiental, riscos sociais.

Introdução

No início da década de 1990, Giddens (1991) afirmava que vivemos num período de modernidade radicalizada, em que ocorre “um processo simultâneo de transformação da intimidade e de reorganização social global” (p.176), vivenciado num ambiente de riscos de alta-consequência. Nesta obra, claramente inspirada na Sociedade de Risco referida por Beck (2010), Giddens diz que “ameaças ecológicas são o resultado de conhecimento socialmente organizado, mediado pelo impacto do industrialismo sobre o meio ambiente material” (p.112), uma característica da contemporaneidade.

No mesmo período, juntamente às mudanças na esfera produtiva - redução das atividades primárias e ascensão do setor de serviços -, o turismo apontava como uma das atividades econômicas mais promissoras. Desde os anos 1970 esta atividade vinha sendo fortemente recomendada pelo Banco Mundial (BID) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BIRD), aos países do hemisfério Sul que dispunham de atrativos naturais. O turismo era apresentado como uma excelente estratégia de desenvolvimento e os recursos para o investimento nesta atividade eram disponibilizados por estas agências, com o intuito de atuar em parceria com os governos nacionais.

Passados mais de quarenta anos, esta atividade econômica realmente prosperou, a ponto de tornar-se a que mais cresce em âmbito mundial, suplantando os resultados da indústria automobilística e de bens duráveis (Rodrigues, 2014). A Organização Mundial do Turismo (UNWTON, 2012) informa que, mesmo no contexto de crise mundial, o turismo continuou crescendo. Para Lopez e Marín (2010) o turismo é uma indústria global, pois envolve uma ampla

e diversificada cadeia produtiva que articula países, economias, territórios e culturas, promovendo mobilidade crescente de capitais.

Em vista do exposto, o argumento deste artigo é que o turismo, assim como o industrialismo, impacta populações e meio ambiente e constitui um dos vetores de risco a se considerar, com importância, no cenário contemporâneo.

Como mostram Rodrigues e Santos (2010), o turismo, no Brasil, vem incentivando a especulação imobiliária em áreas litorâneas, afetando populações tradicionais bem como o ambiente. Ribeiro e Barros (1994) relatam, no caso mexicano, como populações indígenas mayas foram deslocadas de áreas atrativas ao capital turístico para locais interioranos, resultando em alterações linguísticas, no modo de vida, na organização social e na dieta alimentar. Mowforth, Charlton e Munt (2008) afirmam, ainda, que os benefícios para as populações desses países nem sempre se concretizam.

Neste artigo tomamos o caso específico de um município situado na região serrana do Ceará, com um passado marcado pela agricultura, e apreciamos os efeitos decorrentes da queda das atividades agrícolas e da ascensão do turismo na localidade.

Características do município de Guaramiranga e de sua população

Guaramiranga é um pequeno município brasileiro com 52 quilômetros quadrados de extensão e altitude máxima de 1.150 metros, situado a 110 quilômetros de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Ali, desde o século XIX e até os anos 1980 a atividade agrícola foi a principal atividade econômica, chegando a ocupar até 93% de sua população economicamente ativa, já que as especificidades da cafeicultura e da geomorfologia local demandavam um intenso contingente humano nas plantações.

A lógica sociocultural que estrutura as populações rurais, conforme Durham (1973) e Woortmann & Woortmann (1997), ressaltam a intensa coesão social destes grupos, acionando fortemente os laços de parentesco, as relações preferenciais e de reciprocidade no exercício de suas atividades produtivas. Tais características coadunam com um modelo de interação homem-natureza no qual o trabalho produz não apenas produtos para consumo e venda, mas também categorias sociais que, em sua ação simbólica, constroem saberes, signos, valores e sociabilidades.

Na década de 1990, contudo, a questão ambiental ganhou centralidade e atingiu as populações rurais da referida localidade. A criação de uma Área de Proteção Ambiental (APA) abarcou 92% do município e tornou-se o principal instrumento na resignificação da relação homem-natureza. A partir de então o foco era a conscientização quanto ao manejo da vegetação, ocorrendo a proibição de algumas práticas agrícolas, ao mesmo tempo em que eram estimuladas atividades diferenciadas, como: turismo, lazer, educação ambiental, etc. Dessa forma, destituiu-se o agricultor local de sua ancestral precedência sobre o uso, manejo e produção de saberes a partir da natureza, da vegetação e do espaço físico e social agrícola, historicamente constituído. O deslocamento das atividades agrícolas para as turísticas agiu diretamente na raiz cognitiva e subjetiva destas populações. A resignificação do uso da natureza - de um bem a ser trabalhado e socializado, para um bem a ser mantido intocado (Diegues, 2001), reformulou também a lógica das relações socioculturais, desencadeando um processo mais profundo de transformações.

Dentre as políticas públicas foi implantado um Hotel Escola para a capacitação da população na nova modalidade econômica - mas sem êxito, conforme pudemos constatar empiricamente (Almeida, 2014). Vale destacar que as dificuldades de adaptação de populações rurais às atividades urbanas haviam sido apontadas por Durham (1973), sob o argumento de que o modelo

sociocultural agrícola distancia suas populações do dinamismo exigido em sociedades urbanas capitalistas. A autora refere-se às relações de reciprocidade que cedem lugar, gradativamente, às relações formais próprias a um ambiente capitalista mais competitivo e individualista, bem como ao arcabouço cultural destas populações, frente a um sistema extremamente dinâmico e diversificado de ideias, trocas, hábitos, subjetividades e costumes. Constatamos que, quando se implementou o turismo em Guaramiranga, a imensa maioria desta população rural continuou desprovida de equipamentos e estratégias que lhes possibilitassem a imersão numa dinâmica capitalista mais intensa, ancorada em instituições pessoais.

Êxodo rural e conflitos socioespaciais: o novo espaço-natureza

A década de 2000 representou mais turbulências na dinâmica de vida destes grupos: enquanto a mídia noticiava um fluxo de visitantes de até seis vezes o número da população local, no período carnavalesco, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) detectaram um decréscimo populacional da ordem de quase 30% entre os anos 2006 e 2007, situação que se manteve nos anos seguintes. Este declínio reflete o aquecimento da atividade imobiliária decorrente do turismo, com a diminuição das terras arrendáveis e das condições de moradia para estas famílias.

Simultaneamente, diversos imóveis historicamente ligados à economia agrícola local foram reformulados por órgãos públicos ou investidores privados para sua inserção na atividade turística, como é o caso de uma casa de farinha transformada em restaurante, um convento transformado em pousada, um núcleo de casas comerciais demolido para construção de um teatro para realização de festivais, etc. Destacamos, ainda, que tais reformulações provocaram - devido a sua altitude, paisagem florestal e clima ameno numa região semiárida - uma evocação às paisagens de países de clima temperado. A maioria dos restaurantes e estabelecimentos implantados se valem de referenciais europeus, na arquitetura e na culinária, inclusive com a realização de festivais gastronômicos com pratos típicos de vários países.

Por outro lado, o festival de Jazz & Blues que ali se realiza anualmente no período do carnaval também se tornou um dos principais atrativos turísticos da cidade. O evento atrai visitantes de alto poder aquisitivo para usufruir da paisagem serrana que evoca o clima de países temperados o também um estilo musical estrangeiro. Esta criação de paisagens ou experiências exóticas, segundo Ribeiro e Barros (1994) são próprias do turismo e mudaram, além do espaço físico, também a imagem subjetiva (Urry, 2001) à qual este município passou a ser vinculado. Segundo Augé (1994), a acelerada reformulação espacial de lugares provoca certa *crise de sentido* em suas populações, pois estes espaços trazem em si características não apenas físicas, mas identitárias, relacionais e históricas com suas populações. Assim, a destituição destes imóveis de suas funções originais traz consigo a quebra desse referencial prístino.

Dadas as consequências da adequação dos equipamentos turísticos a áreas de preservação (Dias, 2003), foi observada em Guaramiranga a degradação do ecossistema, pois a agressão desencadeada pela potência acústica dos shows perturba a fauna local e também a poluição dos afluentes ou matas, pela visitação desordenada de turistas. Com o aquecimento do mercado imobiliário ocorre, ainda, flagrante desrespeito à legislação ambiental, com a construção de empreendimentos veranistas ou hoteleiros em áreas de preservação. Algumas destas ocorrências motivaram notificações do Ministério Público Estadual e Federal. Encontram-se, dentre os casos notificados, a devastação de uma encosta para a construção de um empreendimento residencial de alto luxo e o assoreamento de um rio para a construção de um conjunto de apartamentos.

Conclusão

Os dados apresentados corroboram nosso argumento de que o turismo apresenta-se como uma atividade de risco para as economias locais, as populações e o ambiente. Retomamos nossas reflexões iniciais para indicar algumas propostas que buscam amenizar a intensidade dos riscos. Giddens (1991) propõe retomar algumas utopias, que ele classifica como realistas, que possibilitariam um sentido de segurança ontológica e a expectativa de estar em um mundo sob controle humano. Para ele, devem ser colocados limites ao processo de acumulação capitalista e as formas de redução dos riscos deveriam ter uma base planetária. Também imagina um sistema geral de cuidado planetário com vistas à preservação do “bem estar ecológico do mundo”. De uma perspectiva mais prática, Veyret e Richemond (2007) afirmam a necessidade da gestão do risco, o que comporta a sensibilização para as ameaças, as estimativas de risco e a adoção de medidas para controlá-lo.

Bibliografia

- Almeida, G.L. (2014). *Das festividades aos festivais: uma etnografia sobre populações rurais e a inserção do turismo em Guaramiranga*. Monografia de conclusão do Curso de Ciências Sociais, Universidade Federal do Ceará, 137 p.
- Augé, M. (1994) - *Não lugares: uma introdução a uma antropologia da supermodernidade*. Campinas: Papirus, 111p.
- Beck, U. (2010). *Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade*. São Paulo: Ed.34, 384p.
- Dias, R. (2003) - *Turismo sustentável e meio ambiente*. São Paulo: Ed. Atlas.
- Diegues, A. C. S. (2001) - *O mito moderno da natureza intocada*. São Paulo: Hucitec, 169p.
- Durham, E. R. (1973). *A caminho da cidade*. São Paulo: Ed. Perspectiva, 245p.
- Giddens, A. (1991). *As consequências da modernidade*. São Paulo: Ed.UNESP, 177p.
- Lopez , A.; Marín , G. (2010) Turismo, capitalismo y producción de lo exótico. Una perspectiva crítica para el estudio de la mercantilización del espacio y la cultura. *Relaciones*, 123, p.219-258.
- Mowforth, M.; Charlton, C. & Munt, Ian (2008). *Tourism and Responsibility. Perspectives from Latin America and the Caribbean*. New York: Routledge, 338 p.
- Ribeiro, G. L.; Barros, F. L. (1994). A corrida por paisagens autênticas: turismo, meio ambiente e subjetividade na contemporaneidade. *Série Antropologia*, nº 379, Brasília, Ed. Universidade de Brasília, p. 2-25.
- Rodrigues, L. (2014). Turismo como estratégia de desenvolvimento *na América Latina: dilemas e perspectivas de um modelo excludente*. In Alba M.P.de Carvalho & Francisco Uribe X. de Holanda, *Brasil e América Latina: percursos e dilemas de uma integração*. Fortaleza: Ed. UFC, p.455-477.
- Rodrigues, L.C., Santos, P.A. (2012) Populações tradicionais, turismo e conflitos territoriais. Estudo etnográfico em Tatajuba, Ceará. In: MARANHÃO, Max Priorsky (org.) *Povos e Comunidades Tradicionais no Ceará*. Fortaleza, CE: Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Sociedade (GEPE/UECE), 2012, p.67-93.
- UNWTO (2012). *World Tourism Barometer*, vol.10, november/2012.
- Urry, J. (2001) - *O olhar do turista:lazer e viagens nas sociedades contemporâneas*. São Paulo, Studio Nobel, SESC, 231p.
- Veyret, Y. & Richemond, N.M. (2007). Representação, gestão e expressão espacial do risco. In Yvette Veyret (Org.), *Os riscos:o homem como agressor e vítima do meio ambiente*.São Paulo: Contexto, 2007, p.47-61.
- Woortmann, E.F.; Woortmann, K. (1997) *O trabalho da terra: a lógica e a simbólica da lavoura camponesa*. Brasília, Ed. Universidade de Brasília.

O IMPACTO SOCIAL DO BIOTERRORISMO

Gisélia Braga

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
giseliabraga@gmail.com

Paulo Campos

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
pacampos@netcabo.pt / paulocampos@inem.pt

Ana Mafalda Reis

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
docmaf@sapo.pt

Romero Bandeira

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
hmedcat@icbas.up.pt

RESUMO

Após os ataques terroristas de 11 de Setembro, os EUA sofreram uma vaga de incidentes bioterroristas associados a esporos de Carbúnculo. Estes actos tiveram repercussões notáveis na Europa. Embora não tenha sido identificado nenhum ataque bioterrorista dirigido à Europa, os países decidiram encontrar rapidamente meios para enfrentar este novo tipo de ameaça (Silva e Pires, 2009).

Portugal, não ficou indiferente a esta situação e em 2002 publicou a Lei de Combate ao Terrorismo, actualizada em 2003 pela Lei nº 52/2003 de 22 de Agosto. Salvaguardando, os casos de Bioterrorismo.

Segundo o CDC, Bioterrorismo é a libertação deliberada de vírus, bactérias ou outros microorganismos (agentes), utilizados para causar doença ou morte em pessoas, animais ou plantas. Já há muitos anos que são utilizadas armas biológicas, desde a utilização de cadáveres com Peste para atingir os inimigos, até aos dias de hoje que poderão ser utilizados agentes geneticamente modificados.

Os agentes utilizados como armas biológicas são seleccionados tendo em conta as suas características.

Um ataque bioterrorista afecta a sociedade tanto a nível social como psicológico e económico e prolonga-se no tempo. Será necessário tomar medidas para diminuir esse impacto e causar as menores alterações possíveis tanto a nível de profissionais de saúde como no funcionamento das instituições e mesmo do país.

Palavras-chave: Bioterrorismo, Doença, Stress. Painei: 3.5 -Riscos Sociais em Contexto de Crise Global

Introdução

Na realidade, logo após os ataques terroristas de 11 de Setembro, os EUA sofreram uma vaga de incidentes bioterroristas associados a esporos de Carbúnculo. Estes actos tiveram repercussões notáveis na Europa. Embora não tenha sido identificado nenhum ataque bioterrorista dirigido à Europa, os países sofreram uma forte pressão, na medida em que tiveram rapidamente de encontrar meios para enfrentar este novo tipo de ameaça (Silva e Pires, 2009). Portugal, não ficou indiferente a esta situação e em 2002 publicou a Lei de Combate ao Terrorismo, salvaguardando, os casos de Bioterrorismo.

O Bioterrorismo tem claras implicações na Saúde Pública pelo impacto resultante da libertação intencional de agentes biológicos com capacidade de replicação e facilmente propagáveis ou transmissíveis. Será necessário tomar medidas para diminuir esse impacto e causar as menores alterações possíveis tanto a nível de profissionais de saúde como no funcionamento das instituições e mesmo do país.

História do Bioterrorismo

A história da guerra biológica é quase tão antiga como a própria história da guerra. O incidente mais antigo documentado do uso de armas biológicas é entre 1500-1200 AC, em que as vítimas de Peste foram levadas para as terras dos inimigos.

Várias situações são descritas e de acordo com Sanches-Yáñez e Menjivar (2008), no séc. XVIII, durante a guerra franco-indígena (1754-1767), Sir Jeffrey Amherst, comandante britânico na América do Norte, sugeriu o uso deliberado da Variola para reduzir as tribos americanas. Em 24 de Junho de 1763, o capitão Ecuyer, um dos subordinados de Amherst, deu cobertores contaminados com o vírus da Variola aos nativos americanos. Tal acção foi seguida por uma epidemia de Variola entre as tribos indígenas, apesar do contacto entre colonos e nativos poder também ter contribuído para esta epidemia.

Ao longo dos anos vários países foram desenvolvendo programas de guerra biológica durante a I Guerra Mundial.

Em 1925, foi realizado o primeiro esforço diplomático com o objectivo de limitar a guerra biológica, através do Protocolo de Proibição do Uso de Gases Asfixiantes, Venenosos ou Outros e Métodos Bacteriológicos de Guerra durante os Conflitos, em Genebra. (Silva e Pires, 2009).

Em Julho de 1969, a Grã-Bretanha propõe ao Comité de Desarmamento da Organização das Nações Unidas (ONU) a proibição do desenvolvimento, produção e armazenamento de armas biológicas, prevendo inspecções em resposta a alegações de violações ao tratado (UNIFEST, 2009).

Em Abril de 1972 é realizada a validação do Tratado de Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenamento de Armas Biológicas e de Toxinas. O Tratado proibia o desenvolvimento, armazenamento de agentes biológicos ou toxinas em “quantidades não justificadas para fins profiláticos, de protecção ou pacíficos”.

A Comissão Especial da ONU no Iraque (UNSCOM) em 1996 destrói as instalações de pesquisa e produção de armas biológicas iraquianas, referem Silva e Pires (2009).

Porém, a história da ameaça biológica estava longe de ter terminado, semanas depois do ataque de 11 de Setembro de 2001, foram enviadas cartas contendo Carbúnculo, nos EUA, infectando algumas pessoas e criando pânico generalizado. Não se registaram ataques terroristas com Carbúnculo nem contaminações na Europa, se excluirmos uma carta detectada na Embaixada dos EUA em Viena de Áustria. (EUR-Lex, 2010).

Em Portugal, ocorram várias suspeitas de contaminação por Carbúnculo mas nenhuma foi confirmada.

Contudo, em todos os casos referidos, os agentes foram utilizados na forma em que surgem na natureza, com as limitações próprias do seu estado natural. Foi com o aparecimento da engenharia genética, no século XX, e o consequente desenvolvimento de novas ferramentas para analisar e modificar especificamente o material genético de um organismo, que se deu um aumento do risco de guerra biológica alertam Silva e Pires (2009).

Agentes Bilógicos Como Armas

No Bioterrorismo podem ser usados como armas, microorganismos ou toxinas de origem biológica, utilizados para infectar pessoas, animais ou plantas. Para um agente biológico ser usado como arma não basta ser muito tóxico e infeccioso, deverá ter a capacidade de prejudicar a saúde humana sob diversas formas, desde leves reacções alérgicas a situações médicas graves, que podem levar à morte. (CDC, 2009a).

O Center Disease Control (CDC) (2009b) classificou os agentes biológicos passíveis de serem utilizados como armas biológicas em três categorias (A, B e C), de acordo com os seguintes parâmetros: elevada mortalidade/morbilidade; infecciosidade; eficácia em baixas doses; múltiplas possibilidades de transmissão (aerossol, água, alimentos, insectos, etc.); fácil disseminação; difíceis de detectar, período de incubação curto; ausência de tratamento e sem imunização, entre outros.

Todas as doenças provocadas por estes agentes ainda existem na sua forma natural, excepto a Variola que em 1980, foi declarada erradicada pela OMS e a vacina foi retirada do plano de vacinação mundial (WHO, 2009a).

Impacto do Bioterrorismo

O National Research Council (2002) citado por Cunha (2005) salienta o facto de para além de um ataque de Bioterrorismo ser uma catástrofe, ser uma destruição severa que excede em muito a capacidade de resposta e os recursos psicossociais da comunidade afectada, Weisaeth (1995) citado por Cunha (2005); ainda tem o facto de ser um acto terrorista, cuja sua meta é incidir num estado de incerteza psicológica, vulnerabilidade pessoal e medo, a morte e a destruição. As reacções psicológicas que se seguem aos ataques terroristas são mais intensas e mais prolongadas que as reacções psicológicas que se seguem aos desastres naturais (Cunha, 2005).

O agente utilizado no ataque, geralmente é contagioso e produz vítimas que são observadas pelos outros; surgem respostas psicológicas devido ao medo dos agentes “invisíveis” e da contaminação. O pânico generalizado e a despesa precipitada em cuidados de saúde, a falta de confiança dos consumidores levou ao decréscimo do investimento com consequente queda generalizada dos mercados financeiros e também uma diminuição do número de viagens, marcam de forma evidente a economia de um país. Contudo as empresas farmacêuticas têm um acréscimo na sua produção, devido à procura de antibióticos e antidepressivos (Bandeira, 2006).

O fornecimento de informações precisas e a partir de fontes respeitadas é importante para diminuir a angústia.

Precauções Padrão, Precauções Adicionais e Equipamento de Protecção Individual (EPI)

Os agentes de Bioterrorismo, geralmente não são transmitidos pessoa a pessoa e a re-aerossolização destes agentes é improvável. Todos os doentes nas Unidades de Saúde, incluindo os doentes sintomáticos com suspeita ou confirmação de doença relacionada com Bioterrorismo, devem ser abordados utilizando as precauções padrão de forma a reduzir a transmissão de infecções de fontes reconhecidas ou não.

Para algumas doenças ou síndromas como a Variola e as FH, para além das precauções padrão devem ser utilizadas precauções adicionais, de maneira a reduzir a probabilidade de transmissão, estas referências foram citadas por English et al (1999).

O EPI é seleccionado tendo em conta o tipo de agente, o meio em que foi lançado e a proximidade com a ameaça. Como é difícil definir a Zona de Sinistro (Zona de perigo), visto que não é estática e as vítimas poder-se-ão deslocar; dever-se-á ajustar a cada situação. (PHTLS, 2007).

Conclusão

O Bioterrorismo já existe já há muitos anos contudo, “A ameaça das armas biológicas é real e está a aumentar, conduzida por descobertas científicas e convulsões políticas no mundo” (Miller et al, 2001).

Da maior importância na luta contra o Bioterrorismo é a detecção rápida de uma libertação e a transmissão imediata do alerta e de informações relevantes àqueles que têm a seu cargo a preparação da resposta adequada.

Os profissionais de saúde de primeira intervenção deverão manter um grande índice de suspeita para os agentes de Bioterrorismo, e estarem capazes de fazer um diagnóstico rápido e iniciar tratamento empírico precocemente.

Poder-se-à aquilatar, que Portugal tem feito alguns esforços, embora possam não ser os suficientes, para se preparar para enfrentar uma possível ameaça desta natureza.

Bibliografia

- Bandeira, R. (2006). A medicina de catástrofe face às doenças transmissíveis no século XXI (dados pessoais). III Congresso Nacional do Médico Interno. Porto.
- CDC. (2009a). Bioterrorism: overview. <http://www.bt.cdc.gov/bioterrorism/overview.asp>, acedido em Novembro de 2009.
- CDC. (2009b). Bioterrorism: Agents/Diseases. <http://www.bt.cdc.gov/agent/agentlist-category.asp>, acedido em Novembro de 2009.
- Cunha, S. (2005). Global Fear Epidemiology: the key consequence of terrorism. (dados pessoais). INEM. Porto.
- English, J., Cundiff, M., Malone, J., Pfeiffer, J., Bell, M., Steel, L., Miller, M. (1999). Bioterrorism Readiness Plan: A Template for Healthcare Facilities. APIC e CDC. p.33. www.cdc.gov/ncidod/.../13apr99APIC-CDCBioterrorism.PDF, acedido em Novembro de 2009.
- Miller, J, Engelbert, S., Broad, W. (2001). Micróbios: As armas biológicas e a guerra secreta da América. Terramar. p. 348.
- Pires, F., Silva, A. (2009). A utilização da engenharia genética na produção de armas biológicas. <http://www.revistamilitar.pt/modules/articles/article.php?id=347>, acedido em Fevereiro de 2009.
- PHTLS (2007). Mass destruction. In: MacSwain, N. (ed), National Association of Emergency Medical Technicians, 6ª Ed. Mosby/ELSEVIER. p. 506-527.
- Sanchez-Yáñez, J., Menjivar, G. (2008). Ataques biológicos contra la sociedad humana, ¿Ficción o realidad?. México. <http://www.monografias.com/trabajos62/ataques-biologicos-sociedadhumana/ataques-biologicos-sociedad-humana.shtml>, acedido em Dezembro de 2009.
- UNIFEST. (2009). Armas biológicas: histórico. http://www.virtual.epm.br/material/tis/currmed/temas/med3/t1a_2000/ArmasBiologicas/hist_frame.htm, acedido em Dezembro de 2009.
- WHO. (2009a). Smallpox. <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/smallpox/en/index.html>, acedido em Novembro de 2009.

A TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO: RISCOS ÀS COMUNIDADES DIRETAMENTE ATINGIDAS EM CABROBÓ (PE)/BRASIL

André Tomé de ASSIS

Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais
andretomeformiga@yahoo.com.br

Maria Aparecida dos Santos Tubaldini

Instituto de Geociências, Universidade Federal de Minas Gerais
ubaldini1@uol.com

Luciano Lourenço

Departamento de Geografia e CEGOT, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
luciano@uc.pt

RESUMO

A transposição do rio São Francisco é uma obra sob a responsabilidade do Ministério da Integração do Brasil, que pretende diminuir os problemas da seca na região nordeste do país, retirando água da bacia do rio São Francisco e a transportando por canais artificiais. A obra tem sua previsão de inauguração para 2015; durante a realização das obras populações rurais diversas, como indígenas, quilombolas e pequenos produtores familiares tiveram suas terras cortadas pelas obras e reclamam das alterações causadas em seus espaços de vivência e do risco de não terem acesso a água devido a especulação em torno da compra das terras por pessoas de fora do lugar e a expectativa da implementação de empreendimentos agrícolas de grande porte, além do receio de que uma grande obra de transposição possa fragilizar o rio São Francisco. Baseando-se na fenomenologia como método e na perspectiva do lugar, é possível inserir que esta obra de transposição carece de diálogo entre a comunidade atingida e sua equipe gestora.

Palavras-chave: Transposição, Rio São Francisco, Lugar.

Introdução

O rio São Francisco é um dos principais rios do Brasil, na época da colonização foi caminho para que os colonizadores ocupassem o interior do país, sendo considerado hoje o rio da integração nacional. Ao longo do seu curso foram realizados diversos empreendimentos, de construção de usinas hidrelétricas a grandes projetos de irrigação.

Esses empreendimentos muitas vezes são interligados e transformaram e continuam transformando a realidade do rio, dos ribeirinhos, de pequenas e grandes cidades. Alguns projetos envolvem questões de magnitude nacional, num país que tem um tamanho continental.

O rio São Francisco nasce no centro-oeste do Estado de Minas Gerais, atravessa diversos Estados brasileiros e tem sua foz no oceano Atlântico. É o maior rio totalmente brasileiro, nasce numa região de clima tropical, com grande quantidade de chuvas e passa pelo sertão nordestino, com a realidade da seca. Ao longo da história da implantação de grandes empreendimentos na bacia do rio São Francisco houve grandes polêmicas.

O “Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional” é um grande empreendimento sob a responsabilidade do Ministério da Integração Nacional do Brasil. A obra teria sua inauguração em 2015, onde seria assegurada a oferta de água em 2025, aos habitantes de municípios do Agreste e do Sertão dos Estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. (BRASIL, MI, O que é o projeto?, 2014).

As populações diretamente atingidas entendem o lugar onde elas vivem, e elas sabem trazer respostas para diversas questões. Historicamente no Brasil essas populações não são ouvidas de

forma correta no planejamento dos grandes empreendimentos, o que acarreta diversos problemas (ambientais, sociais, econômicos e culturais). A categoria Lugar na Geografia orienta para o recorte e a compreensão do espaço a ser analisado na voz dos moradores diretamente atingidos.

Segundo Coelho (2005) pode-se verificar análises equivocadas em torno da seca no nordeste, onde se apontam para vultuosos gastos de recursos públicos em benefício de grupos privilegiados. A retirada de água que acontece no rio São Francisco para outros programas, já estaria trazendo prejuízos e riscos para as populações ribeirinhas no curso natural do rio, e a água já não estaria sendo suficiente ou distribuída de forma regular. Haveria a falta de financiamento de projetos de irrigação para se utilizar terras cultiváveis no entorno do curso natural do rio São Francisco, e que em algumas dessas regiões já existe uma população carente que enfrenta graves problemas sociais, relacionados à seca. Ele diz da necessidade de revitalização do rio e a denúncia de que houve uma imposição do projeto, com violação da legislação.

Neste sentido, Castro (2011) também defende a necessidade de criação de programas de irrigação, tanto na bacia doadora quanto na receptora e uma revitalização do rio São Francisco que passaria por sérios problemas ambientais.

Esses dados já contrapõem os dados do Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 2014) que afirma que a obra apresentava um baixo custo em relação ao que se teria de economia com os gastos no combate a seca e que a retirada de água do rio São Francisco seria de apenas 1 % do total de suas águas não afetando gravemente o rio.

Com o objetivo de entender a transposição do rio São Francisco na voz dos diretamente atingidos na zona rural de Cabrobó, Pernambuco, foram entrevistados moradores que indicaram riscos que os mesmos podem estar correndo, caso não sejam observadas suas reais carências em torno da transposição.

Os Índios Truká e o seu Lugar: Captação das Águas para a Transposição

É em Cabrobó (PE) que está sendo construído o primeiro ponto de captação das águas do rio São Francisco para a transposição. E é bem nas terras dos índios Truká que se faz essa captação.

As Terras Indígenas dos povos Truká, Tumbalalá, Pipipan e Kambiawá, por sua proximidade com as obras do Projeto São Francisco, principalmente nos municípios de Cabrobó e Floresta, em Pernambuco, estariam amparadas por medidas e ações que visam minimizar as interferências negativas das obras durante o período de construção, ações previstas num programa de desenvolvimento das comunidades indígenas. (BRASIL, MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (2014), Programa 12 de apoio aos povos indígenas).

Já o Conselho Indigenista Missionário (2009), explica que o Projeto da Transposição representa uma invasão aos territórios dos povos indígenas Truká e Pipipã, uma vez que os territórios foram ocupados por homens do Exército Brasileiro, interditando acessos dos índios a suas terras. Os depoimentos disponibilizados pelo conselho demonstram que o cacique da tribo Truká também considera que seu território, juntamente com o de outras comunidades foi invadido.

O Conselho Indigenista Missionário (2009) sintetiza na publicação do produzido relatório denuncia recomendações dos povos indígenas em relação à transposição. Considera que a análise da implantação do projeto de transposição das águas do Rio São Francisco revela graves e sucessivas violações de direitos fundamentais reconhecidos aos Povos Indígenas em tratados internacionais e na própria Legislação Nacional, sobretudo na Convenção 169 da OIT e na Constituição Federal e recomenda ao Estado Brasileiro.

Os pequenos agricultores e os seus lugares de vivência cortados pelas obras da transposição
 Existe um receio de que grande quantidade água transposta possa ser encaminhada para grandes empreendimentos agrícolas, fazendo com que esses pequenos proprietários se tornem apenas mão de obra e não possuam mais acesso a terra.

O que se percebe é que realmente já existe uma especulação em torno da terra e muitos que perderam suas terras, já não conseguem comprar outras. Esses grandes empreendimentos podem como no caso do município vizinho, Petrolina, gerar empregos, mas em compensação, também pode gerar a expulsão de pequenos proprietários, como está acontecendo em Cabrobó.

Nas proximidades das margens do rio São Francisco e no lugar ocupado por um reservatório artificial da transposição: comunidades quilombolas

O espaço rural de Cabrobó é coberto por comunidades com tradições e culturas com características individuais, mas que possuem algo em comum, são pequenos produtores rurais. Ao longo do canal e das obras da transposição comunidades diferentes apontam problemas e necessidades em comum, porém elas possuem também especificidades nas suas características de grupo, que apontam para a necessidade de serem tratadas de forma específica.

Usando-se das teorias de Tuan (1983) entende-se o lugar através de um viés da psicologia onde o lugar possui características próprias que se distingue de outros lugares, pelas experiências vividas de seus habitantes e de seus sentimentos em relação ao lugar em que habitam.

Portanto, entende-se que ao longo de sua história, os índios, os pequenos produtores rurais e os quilombolas tiveram uma relação com especificidades de lida com a terra, uma relação que está relacionado ao sentimento particular de cada grupo, que possuem para com o lugar.

Todos eles com a transposição perdem um pouco do seu lugar, quando as obras da transposição ocupam fisicamente o lugar que é deles. Alguns foram reassentados, perdendo completamente o lugar que era deles, e agora passam pela reconstrução de um território, outros perderam parte deste lugar e lutam por suas questões e necessidades enquanto comunidades.

Os reassentados da Vila Junco

Segundo um entrevistado da vila, um grande reservatório para as águas que serão transpostas ocupou a terra onde eles moravam e plantavam. Sendo assim, eles foram realocados para a vila Junco, construída especificamente para eles. “Isso tudo por causa da transposição, porque lá na nossa comunidade, no Riacho Grande, será umas das bacias onde ficará o reservatório de água para irrigação”. Entrevistado X.

Segundo os moradores antes de serem realocados para a vila Junco, moravam na comunidade Riacho Grande, a comunidade deles tinha justamente este nome, por situar-se próximo ao riacho Grande. Com possibilidade de acesso a água conseguiam produzir naquela terra. Citam que tinham uma agricultura de subsistência, sustentável e de planejamento para a época da seca.

Atualmente se sentem desprovidos dessa capacidade de enfrentamento dos seus problemas pois não possuem acesso a terra e a água. Sobrevivem de uma espécie de mesada do governo (uma bolsa), um pequeno auxílio financeiro.

Segundo o Ministério da Integração Nacional (BRASIL, 2014) está previsto no projeto a entrega de um setor produtivo de no mínimo cinco hectares, sendo um irrigado. Destinado a produção agropecuária, um setor produtivo, que respeite a vocação de trabalho da comunidade.

Conclusão

As obras transposição do rio São Francisco geraram uma série de riscos sociais e ambientais aos moradores da zona rural do município de Cabrobó. Suas vozes merecem ser ouvidas, e ações devem ser colocadas em práticas pelos gestores das obras da transposição para amenizar tais riscos. Os moradores possuem apego e conhecimento acerca dos lugares que habitam, conhecimentos que merecem ser valorizados e que podem contribuir para ações concretas na transposição do rio São Francisco.

Bibliografia

- BRASIL. Ministério da Integração Nacional. (2014) *O que é o projeto?*. Brasília, DF. Disponível em: <<http://www.integracao.gov.br/pt/web/guest/o-que-e-o-projeto>>. Acesso em: 20 jan. 2014.
- CASTRO, César Nunes de. (2011). *Impactos do projeto de transposição na agricultura irrigada no nordeste setentrional*. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 39 p.
- CIMI, CONSELHO INDIGENISTA NACIONAL. (2009). *Povos indígenas do Nordeste impactados pela transposição do rio São Francisco*. Relatório Denúncia, 66 p. Disponível em http://www.cimi.org.br/pub/publicacoes/1241549933_relatapoimmetransp.pdf Acesso em: 10, janeiro, 2014.
- COELHO, Marco Antônio Tavares. (2005) *Os descaminhos do São Francisco*. São Paulo: Editora Paz e Terra, 272 p.
- SOUTO, Paulo. (2001). *Transposições do Rio São Francisco: Um projeto sem sustentação*. Brasília, DF. Discurso pronunciado pelo Senador Paulo Souto no Plenário do Senado Federal em 03/04/2001, 26p.
- TUAN, Y. F. (1980). *Topofilia - Um estudo da percepção e valores do meio ambiente*. São Paulo: Difel, 288p.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E RISCOS NATURAIS: PROBLEMAS SOCIAIS RELACIONADOS À DESERTIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB

Braulio José Carvalhal Luna

Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
bjcluna@hotmail.com

Rômulo Lima Silva de Góis

Univ. de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Bolsista da CAPES nº 1471-13-9
romulo.gois@yahoo.com.br

João Vitor Gobis Verges

Univ. de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Bolsista da CAPES nº 9719-13-0
vitorverges@gmail.com

RESUMO

Existem inúmeros indícios de que a mudança climática à nível mundial se apresenta de forma acelerada, fato que tem despertado o interesse da comunidade científica. Associada à essas mudanças, e potencializado pelas ações antrópicas, acrescenta-se o constante aumento da perda da qualidade produtiva dos solos pelo processo de desertificação. Exemplo desse processo ocorre no município de Cabaceiras-PB-Brasil, o que resulta em migração da população rural para os grandes centros urbanos. Neste processo, a pesquisa objetivou identificar os problemas sociais da população agrícola e como suas práticas tradicionais agravam o processo de desertificação. Nesse contexto, o trabalho tendo por base a pesquisa bibliográfica e dados secundários, visa traçar parâmetros de discursão entre a desertificação e os efeitos sobre a população economicamente vulnerável. Observou-se que as queimadas ainda constituem um processo no manejo dos recursos por parte dos agricultores, a monocultura e a consequente perda da biodiversidade restringem a utilização do solo para apenas um período do ano, tornando vulnerável nos demais períodos. A característica peculiar do ambiente com uma variação pluviométrica anual irregular é o fator agravante, e novas técnicas e alternativas ao uso do solo devem ser implementadas. Para além, políticas públicas locais, que possam designar partes territoriais através do ordenamento, visando entre outros fatores a organização e distribuição do espaço é outro fator que deve ser implantado.

Palavras-chave: Desertificação; Mudanças Climáticas; Riscos Sociais.

Introdução

Apesar dos sistemas humanos e naturais terem a capacidade de lidar com circunstâncias adversas, com a continuidade das mudanças climáticas a adaptação será necessária para manter esta capacidade (IPCC, 2014a).

Tendo como aspecto principal a mitigação, adaptação e resiliência nesse processo, inúmeras ferramentas políticas agem em determinadas regiões na pretensão de minimizar esses impactos, entre estes instrumentos podemos citar os Planos de Ordenamento e os Programas de incentivo dos Governos, compondo ações que buscam o uso racional do ambiente e a maximização do seu potencial produtivo.

Contudo, ferramentas políticas são utilizadas no município de Cabaceiras-PB-Brasil visando a minimização da perda da qualidade produtiva do solo pelo processo de desertificação, acentuado pelas frequentes ondas de calor proporcionadas pelas dinâmicas climáticas.

Nesse sentido a pesquisa objetivou identificar os problemas locais no âmbito social e ecológico e como ferramentas governamentais se efetivam no processo de adaptação do ambiente frente às dinâmicas climáticas tendo o Ordenamento do Território, um fator decisivo para esse processo. Para atingir tal objetivo, foram realizados levantamentos bibliográficos e de dados

secundários, que forneceram subsídios para discursão dos efeitos climáticos local sob a população economicamente vulnerável, identificando os programas que inserem-se localmente com o intuito de promover o desenvolvimento econômico por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável.

Enquadramento analítico

Ordenamento do Território

A afirmação de que as mudanças climáticas são um fenómeno global, e afetam, em teoria, um número elevado de espaços e pessoas, rege o contexto teórico predominante. Mesmo tendo em vista que mudanças climáticas apresentam certas configurações globais, elas manifestam-se, espacialmente, em aspetos e intensidades distintas.

Como exemplo, podemos destacar o processo de desertificação, que de acordo com a Convenção para o Combate à Desertificação das Nações Unidas (UNCCD), é conceituado como a degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e sub-húmidas secas, que resulta de vários fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades humanas.

Nesse contexto, o Ordenamento do Território (OT) surge como ferramenta crucial no processo de contribuição para aumentar a capacidade adaptativa das cidades e regiões face aos efeitos adversos das mudanças climáticas e atividades antrópicas, combatendo as ameaças e criando oportunidades.

Metodologia

Esta pesquisa se classifica como uma investigação de base teórica a partir de fontes primárias e secundárias, utilizando-se o método sistemático do conteúdo, através de levantamento bibliográfico de documentos oficiais e artigos.

O trabalho foi conduzido no município de Cabaceiras (07° 29' 20" Sul 36° 17' 13" Oeste), localizado na Mesoregião da Borborema e Microregião do Cariri Oriental, no estado da Paraíba, localizado na região Nordeste do território brasileiro, caracterizado pelo clima semi-árido e sujeito a estiagens prolongadas (IBGE, 2010). Composta de caatinga arbustiva, típica das regiões mais áridas do Nordeste, com cactos, arbustos e vegetação típicos

Figura 1 Mapa da Paraíba com destaque ao Município de Cabaceiras no estado da Paraíba.

Fonte: (Paraíba, 2009) adaptado pelos autores.

De acordo com o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2013 sua população era estimada em 5.319 habitantes, distribuídos em uma área territorial de 452,922 km², o índice de desenvolvimento humano municipal em 2010 era de 0,611 (Brasil, 2014).

Análise

Desertificação e os problemas locais

No ambiente estudado, os processos que ocasionam a perda produtiva do solo, apresenta-se em um processo acelerado, ocasionado principalmente pelo índice pluviométrico irregular, associados a processos antrópicos, como queimadas, encabeçamento ineficiente e ao decaimento do solo para construção civil.

Essas características são resultado, a longo prazo, de fatores políticos e econômicos, relacionados com políticas específicas para os setores agrícola e florestal. Roxo, Mourão, and Casimiro (1998), ao analisar casos semelhantes em Portugal entendem que as políticas induzem mudanças que acabam por serem expressadas e relacionadas espacial e temporalmente, o que nem sempre se concretiza em efeitos benéficos ao ambiente.

Como forma de minimizar esses problemas na região, as ações governamentais através de programas e planos, e nelas incluídas o ordenamento do território, objetivam o desenvolvimento regional em seus diversos aspectos. No entanto, um dos maiores desafios à observação dos impactos da nas zonas rurais diz respeito às questões importantes de detecção e atribuição desses impactos às mudanças climáticas (IPCC, 2014b).

Embora no meio acadêmico e científico seja evidente que certas práticas agrícolas acelerem os impactos negativos locais, ocasionados ou potencializados pelos regimes climáticos, é necessário, também, um processo de afirmação da educação ambiental e a associação entre novas técnicas potencializadoras da agroecologia, para que estas sejam adotadas com destreza pelos agricultores. Neste processo, haveria uma associação profícua entre o saber regional/local e as novas necessidades da abordagem climática global.

Os problemas na identificação consiste no fato de que a variabilidade e mudanças climáticas interagem com as pressões de subsistência existentes na zona rural, com a política econômica, a globalização, a degradação ambiental e questões de saúde, como tem sido demonstrado em diversos países (IPCC, 2014b).

Para limitar a vulnerabilidade, são necessários ações integradas que visam uma redução das múltiplas pressões não relacionados ao clima sobre os recursos naturais, nomeadamente, vegetação, solo e água, como por exemplo as queimadas, poluição da água doce, desmatamento, encabeçamento acima da capacidade de suporte. Neste caso, a integração efetiva entre as populações camponesas, mediando o acesso real às informações e técnicas, deve compor os planos e ações junto aos drivers das intencionalidades de mitigação e adaptação ao clima.

Programas governamentais locais - Território da Cidadania

Devido às características da região, no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e social, programas governamentais que procuravam promover o fortalecimento e desenvolvimento do território com o objetivo de diminuir as desigualdades regionais do país foram implantados de forma a firmar a gestão territorial.

Nessa perspectiva essas políticas públicas têm influenciado a região ao longo do tempo, refletindo diretamente nas atividades agropecuárias e nas dinâmicas populacionais locais. As políticas atuavam diretamente na alternância e convivência de culturas e o local ocupado pelo pequeno produtor (Caniello et al., 2011).

Figura 2 Influência das políticas no agreste Paraibano. Legenda: C - Campesinização; D - Descampesinização; R - Recampesinização. Fonte: Piraux e Miranda (2011, apud Caniello et al., 2011).

Nesse contexto o Governo Federal do Brasil lançou, em 2008, o Programa Territórios da Cidadania em diversas regiões do país, elencando entre outras a região analisada. O programa vem gradativamente atingindo seus objetivos que são de promover o desenvolvimento econômico e universalizar projetos básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável, considerando para o êxito estratégico a participação social e a integração de ações entre todas as esferas do governo (Brasil, 2014).

Conclusão

Os programas e ações do governo no município aumentam a comercialização da produção agrícola, mas no que concerne os problemas relacionados a perda da qualidade produtiva do solo, não apresentam maneiras efetivas de minimizar o aumento gradativo dessas áreas improdutivas. Para limitar a vulnerabilidade às ações antrópicas na região, são necessárias ações integradas, que visam uma redução das múltiplas pressões não relacionadas ao clima sobre os recursos naturais, como por exemplo as queimadas, poluição da água doce, desmatamento e encabeçamento acima da capacidade de suporte.

Referências Bibliográficas

- Brasil, M. F. (2014). Portal da Cidadania. Retrieved 09/06/2014, 2014, from <http://www.territoriosdacidadania.gov.br/>
- Caniello, M. d. M., Bastos, V. V. d. S., Martins, M. D. F., Piraux, M., Cantalice, L. R., Nunes, T. L., & Torres, J. V. O. (2011). Acompanhamento, monitoramento e avaliação da evolução e qualidade dos resultados do Programa Desenvolvimento Sustentável De Territórios Rurais - PDSTR no Território da Borborema (Paraíba) (C. d. A. e. I. d. T. d. Borborema, Trans.) (Vol. 1, pp. 189): Universidade Federal de Campina Grande.
- Ferrão, J. (2011). O ordenamento do território como política pública (Vol. 1): Ed. Fundação Calouste Gulbenkian.

- Ferrão, J. (2014). Alterações Climáticas e Ordenamento do Território. Universidade Nova de Lisboa: Slide de Aula.
- Ferrão, J., & Mourato, J. M. (2012). Evaluation and spatial planning in Portugal: from legal requirement to source of policy-learning and institutional innovation De la Evaluacion Ambiental Estrategica a la Evaluacion de Impacto Territorial: Reflexiones acerca de la tarea de evaluacion PUV - Universitat de València.
- IBGE, I. B. d. G. e. E. (2010). IBGE Cidades@. Retrieved 11 de outubro de 2013, 2013, from <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>
- IPCC, I. P. o. C. C. (2014a). Adaptation Needs and Options In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. (5). Retrieved from <http://www.ipcc.ch/>.
- IPCC, I. P. o. C. C. (2014b). Rural Areas In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. (9). Retrieved from <http://www.ipcc.ch/>.
- Paraíba, A. E. d. G. d. Á. d. E. d. P.-A. (Cartographer). (2009). Sistema de Coordenadas Geográficas - Microregiões da Paraíba. Retrieved from <http://www.aesa.pb.gov.br/>
- Roxo, M. J., Mourão, J. M., & Casimiro, P. C. (1998). Políticas agrícolas, mudanças de uso do solo e degradação dos recursos naturais - Baixo Alentejo Interior. Mediterrâneo, 12/13, 23.

A POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA (PNMC-BRASIL) COMO FATOR DE AGRAVAMENTO DE RISCOS SOCIAIS EM ASSENTAMENTOS RURAIS DE REFORMA AGRÁRIA: O CASO DO PONTAL DO PARANAPANEMA-SP

João Vitor Gobis Verges

Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, , Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Bolsista da CAPES nº 9719-130.
vitorverges@gmail.com

Braúlio José Carvalhal Luna

Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, , Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
bjcluna@hotmail.com

Rômulo Lima Silva de Góis

Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, , Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Bolsista da CAPES nº 1471-139.
romulo.gois@yahoo.com.br

RESUMO

A partir do ano de 2009 se estabelece no Brasil a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). As diretrizes gerais desta política designaram mecanismos territoriais de mitigação das ações dos Gases de Efeito Estufa (GEE), sendo uma das normativas o plantio de cana-de-açúcar em larga escala, visando a produção de etanol combustível. Neste contexto, este trabalho evidencia como as diretrizes gerais da PNMC se territorializaram na região do Pontal do Paranapanema-SP-Brasil, ampliando os riscos de vulnerabilidade social dos assentamentos rurais de reforma agrária. Para isso, realizou-se revisões bibliográficas e busca de dados primários e secundários sobre o impacto da PNMC no Pontal. Desse modo, observou-se que a partir de 2009 houve um aumento da produção de cana-de-açúcar na região baseado no “lobby” sucroalcooleiro, fato que fortaleceu a atividade monocultora e impactou negativamente os cultivos biológicos de alguns assentamentos, diminuindo a capacidade de participação destas populações em políticas agrícolas e concatenando a diminuição da renda, da produção e das condições de vida do campesinato. Este contexto forçou muitos dos assentados a se deslocarem para outras atividades econômicas, trabalhando em condições de precariedade nas usinas de açúcar e álcool ou em subempregos nas sedes urbanas dos municípios.

Palavras-chave: Políticas Públicas; Alterações climáticas; Espaço agrário; Campesinato.

Introdução

No cenário geral das discussões globais sobre o clima e os efeitos negativos da atuação econômica do capitalismo, surgem propositivas baseadas na mitigação da ação dos gases com efeito estufa (GEE). Este fato faz com que algumas políticas direcionadas sejam construídas em certos países, como a Política Nacional sobre Mudanças do Clima (PNMC), em 2009, no Brasil. Neste país, a cana-de-açúcar se configura como um elemento crucial na substituição de combustíveis fósseis. Assim, observa-se na região do Pontal do Paranapanema-SP um avanço significativo deste cultivo.

Nesta área, ocorreu o processo de afirmação territorial do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), buscando se colocar como agente produtivo e ocupar os espaços de terras não utilizados ou obtidos ilegalmente pelos grandes fazendeiros da região. Com isso, tem-se uma dualidade criada no Pontal, assentamentos rurais de reforma agrária de um lado e a produção monocultora da cana-de-açúcar, pelo grande capital aliados aos fazendeiros, do outro.

Sendo assim, este texto busca demonstrar aspectos que podem ser interligados à existência da PNMC e sua dinâmica no Pontal, fazendo com que o agronegócio da cana ganhe força e, paulatinamente, contribua para a precarização da vida do campesinato regional.

Para isso, estabeleceu-se a revisão bibliográfica, a leitura e interpretação de dados secundários e terciários, trabalhos de campo e análise, em termos de método, compostos via estruturas da dialética.

A conjuntura da formulação de ações voltadas às alterações climáticas globais e a instauração da Política Nacional sobre Mudanças do Clima (PNMC) no Brasil

Desde as três últimas décadas do século XX, o debate relacionado ao desenvolvimento econômico e seus entraves ambientais tomaram a pauta dos encontros e mecanismos de atuação produtiva e política nos âmbitos internacionais. Neste processo, a partir do relatório Brundtland (1987) e das intervenções do IPCC (1988/2007/2013), entre outros organismos, certos impactos sobre o ambiente foram conjugados numa escala mais ampla, nomeadamente no prisma do clima e de seus subsistemas.

Tendo isto em vista, as articulações políticas em torno dos países possuidores de aparatos de desenvolvimento poluentes fizeram com que algumas propostas para a contenção das emissões de GEE para a atmosfera fossem erguidas e, neste caso, se aproximassem das esferas limpas do desenvolvimento. Sendo assim, surgem, em alguns países, as políticas nacionais sobre as mudanças do clima ou, nomeadamente, às alterações climáticas antrópicas.

O caso brasileiro segue este contexto de desdobramento de ideias e intenções dos aparatos econômicos e políticos da conjuntura global. No ano de 2009, como fruto das afirmações e compromissos assumidos globalmente, instaura-se a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), com um enumerado de objetos que visam a diminuição geral das emissões de poluentes atmosféricos.

Dentro deste instrumento, figura um importante mecanismo de mitigação e adaptação às alterações climáticas - pelo impacto e substancialidade territorial - que é a produção de biocombustíveis renováveis para a substituição da energia com proveniência fóssil. Neste caso, tomando especificamente o Brasil, o Etanol é o elemento chave enquanto energia renovável e se retira através da cana-de-açúcar plantada em grandes áreas com base monocultora.

Como se pode observar, consta na PNMC brasileira as indicações para,

[...] Programa de Zoneamento da Cana-de-Açúcar - Visa fornecer ao governo federal as informações necessárias para que o País cresça no desenvolvimento da produção da cana-de-açúcar de forma sustentável e de acordo com cada estado da federação. Visa promover uma discussão sobre o desenvolvimento das culturas energéticas e de grãos (PNMC, 2009, p.69).

Neste sentido, o agronegócio sucroalcooleiro no Brasil ganhou enorme força conceitual e diretiva, visto que se alinha às principais medidas de controle do internacionalmente discutido *Global Warming*. Com este processo, temos uma dualidade criada pela caracterização territorial de uma política voltada ao ambiente e as perspectivas históricas ligadas à apropriação do território pelo grande capital em terras brasileiras.

Historicamente, como afirmam Fernandes (2007), Thomaz Jr (2013), Oliveira (2008) e Feliciano (2011), a concentração de terras no país está ligada à posse ilegal por parte de intentos monocultores. Este fato também é responsável pela expurgação da propriedade campesina e do trabalho familiar. Atualmente, a concentração de terras pelo agronegócio, e nele o sucroalcooleiro,

se mantém dentro das origens predatórias e centralizadoras da ilegalidade da posse das terras (THOMAZ JR, 2013).

A partir disto, tem-se a realidade territorial do Pontal do Paranapanema-SP, região em que o processo de afirmação da produção de cana-de-açúcar é uma realidade e que, no contexto da construção da PNMC, se observou um aumento da produção deste vegetal voltado à obtenção do Etanol e a precarização da vida e do trabalho nos assentamentos rurais de reforma agrária que circundam como vizinhança as áreas monocultoras.

O Pontal do Paranapanema-SP e a dualidade histórica entre campesinato e agronegócio: análise sobre a expansão da cana-de-açúcar e a fragilização dos atores sociais ligados ao campo.

No Estado de São Paulo, Brasil, configura-se uma região amplamente agredida ambientalmente pelos intentos de atores sociais que se territorializaram a partir da posse ilegal das terras, chamada Pontal do Paranapanema. Em contraponto aos proprietários ilegais, levantou-se no local, através do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a luta pela possibilidade do campesinato de trabalhar e sobreviver de seus cultivos, retirando, então, as áreas burladas pelos fazendeiros.

Neste processo, instaura-se, via luta social e Estado, os assentamentos rurais de reforma agrária, em que as famílias dos camponeses obtêm a permissão de residir e produzir em seu lote de terra, favorecendo o mercado regional e ampliando as condições de vida do campesinato. Entretanto, o jogo territorial e as nuances das conjecções de forças não permite o pleno funcionamento da regra geral dos assentamentos rurais.

De fato, como demonstra Massaretto Verges (2013), o avanço da cana-de-açúcar a partir do ano da criação da PNMC é inegável. Isto fez com que as práticas comuns em grandes plantios prejudicassem os intentos produtivos, ligados à agroecologia, dos assentamentos.

O modelo agroecológico prevê uma interação positiva entre meio ambiente e produtividade agrícola (ALTIERI, 2002). Neste passo, a dinâmica geral de produção se baseia nos produtos biológicos e na interação com o mercado regional. Entretanto, com a pulverização de agrotóxicos nas áreas monocultoras da cana, os cultivos dos assentados são, também, contaminados, perdendo seu valor comercial (BARRETO; THOMAZ JR, 2012).

Este tipo de acontecimento tem caracterizações econômicas importantes, pois impedem que os assentamentos rurais participem plenamente de projetos como o PAA (Programa de aquisição de Alimentos). Esta política pública visa comprar dos pequenos produtores rurais os resultados dos cultivos em seus lotes, bonificando a agroecologia. Entretanto, ao se identificarem com a contaminação de sua produtividade, são prejudicados economicamente e não podem se inserir no projeto com plenitude.

Outro fato são as ocorrências de parcerias entre usinas e assentados para a expansão do cultivo da cana-de-açúcar. Segundo estudos de Massaretto (2010), as usinas plantaram o vegetal em assentamentos rurais com recursos providos de empréstimos no nome dos assentados. No final da colheita, não houve pagamento efetivo sobre a cana plantada e, em muitos casos, não ocorreu a colheita, deixando os camponeses endividados e impossibilitados de se reestruturarem para se inserir no mercado regional novamente.

Estes fatores, em si, fazem com que a dificuldade e precariedade da vida levem os camponeses a se proletarizar como mão-de-obra barata dentro das próprias usinas e nas sedes urbanas dos municípios próximos, enquadrando-se no subemprego e no trabalho terceirizado (BARRETO; THOMAZ JR, 2012).

Conclusões

Visto o processo geral de afirmação da PNMC no Pontal do Paranapanema-SP, conjecturando um instrumento de força e ativação da produção de cana-de-açúcar, percebe-se que os desdobramentos deste modelo político-ambiental podem ser ineficazes em sua plenitude. Sendo assim, esta política, no caso desta abordagem local, busca privilegiar mecanismos de mitigação às alterações climáticas antrópicas globais, favorecendo a queda de emissão de Gases com Efeito Estufa (GEE), entretanto, é, também, responsável pela conjecturação da ampliação da precariedade da vida em assentamentos rurais de reforma agrária.

Bibliografia

- ALTIERI, Miguel. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. Guaíba: Agropecuária, 2002.
- BARRETO, Maria Joseli; THOMAZ JR, Antonio. Os impactos territoriais da monocultura da cana-de-açúcar no Pontal do Paranapanema-SP. In. Revista Pegada. Vol. 13. Nº2, 2012. P. 46-68.
- FELICIANO, Carlos Alberto . Pela retomada das terras públicas do Pontal do Paranapanema. Boletim Dataluta, v. 46, p. 02-5, 2011.
- FERNANDES, B. M. Territórios da questão agrária: campesinato, reforma agrária e agronegócio. In. Reforma Agrária, v. 34, p. 77-94, 2007.
- MASSARETTO VERGES, Nivea. Agroecologia: uma alternativa de desenvolvimento rural sustentável para os assentamentos rurais. Caminhos de Geografia (UFU), v. 14, p. 237-253, 2013.
- MASSARETTO VERGES, Nivea. Crítica à noção de multifuncionalidade rural em assentamentos rurais de reforma agrária no Pontal do Paranapanema-SP. Dissertação de mestrado. Presidente Prudente: UNESP, 2013.
- MASSARETTO, Nivea. Impactos do plantio de cana-de-açúcar no Pontal do Paranapanema-SP: alterações físico-químicas nos solos dos assentamentos rurais Santa Teresinha da Alcídia, Laudenor de Sousa e Vô Tonico. Presidente Prudente: [s.n.], 2010.
- OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino . Território de quem?. Revista sem Terra, v. 47, p. 17-31, 2008.
- THOMAZ JR, Antonio. O novo ambiente institucional na Agroindústria Canaveira Paulista e a luta pela terra. Uma peleja para a classe trabalhadora. Revista Pegada Eletrônica (Online), v. 14, p. 3-38, 2013.

CAPÍTULO 3.6

RISCOS DENDROCAUSTOLÓGICOS

(INCÊNDIO FLORESTAL)

AGRICULTURA TRADICIONAL DE CORTE E QUEIMA NO BIOMA DE MATA ATLÂNTICA (RJ) - BRASIL

Ana Valéria Freire Allemão Bertolino

Departamento de Geografia/FFP - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
anabertolino@uol.com.br

Isabel Linhares Pereira Soares

Departamento de Geografia/FFP - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
linharesgeo@hotmail.com

Lúcio José Sobral Cunha

Departamento de Geografia, Universidade de Coimbra, Portugal
lucio@uc.pt

RESUMO

A agricultura tradicional de corte e queima é responsável pela subsistência de 250 a 500 milhões de pessoas no mundo. O objetivo do trabalho é analisar a vulnerabilidade dos solos sob sistema de manejos distintos: sem cobertura (SC) e sistema de pousio/queima (PO). O estudo foi realizado em São Pedro da Serra, distrito de Nova Friburgo/Rio de Janeiro - Brasil. O monitoramento da sucção do solo foi feito por intermédio de blocos de matriz granular (GMS's) nas profundidades de 15 e 30 cm. A erosão foi mensurada utilizando parcelas de erosão de 20 m² e a pluviosidade foi obtida pela precipitação diária (24h), coletada por pluviômetros e pela estação automatizada MAWS. Os resultados demonstram que o sistema SC possui valores de potenciais matriciais próximo à saturação, enquanto que o sistema PO possui variações constantes de potenciais matriciais e baixas taxas de erosão, demonstrando uma drenagem eficiente quando comparado ao sistema SC.

Palavras-chave: pousio, queimada, comportamento hidrológico, erosão

Introdução

A agricultura de corte e queima (*slash-and-burn*) é o sistema agrícola mais extensivo do mundo e ocorre predominantemente em áreas de baixa latitude, sendo de grande importância na subsistência de 250 a 500 milhões de pessoas ao redor do mundo (Brady, 1996). O sistema de corte e queima (*slash-and-burn*) é praticado nas áreas florestadas, principalmente nas regiões tropicais (Valverde 1968, Bertolino & Bertolino, 2010), e provavelmente é a forma mais antiga da agricultura nas Américas (Barker, 2006). Apesar de seu caráter diversificado, tem como característica similar à utilização do corte da vegetação, uso do fogo e períodos de pousio da terra após a colheita.

Alguns autores afirmam que a falta de políticas de apoio, de financiamentos adequados e ineficácia na operacionalização, fazem com que alguns preservacionistas acusem a agricultura de corte e queima (*slash-and-burn*) de causar desmatamento em áreas tropicais.

Em ambientes tropicais montanhosos são poucos os estudos voltados para a agricultura de corte/queima e pousio na hidrologia superficial. O principal objetivo deste estudo é avaliar a vulnerabilidade de solos sob sistemas de manejo distintos: a) sem cobertura vegetal; b) área abandonada de corte, queima e pousio de 3-5 anos em São Pedro da Serra, município de Nova Friburgo - Sudeste do Brasil.

Área de estudo

O estudo foi desenvolvido no Campus Experimental, localizado na bacia do rio São Pedro em São Pedro da Serra, distrito de Nova Friburgo no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. A região apresenta

um clima Tropical de Altitude, com precipitação média anual de 1.279,8mm, caracterizado por verões quentes e chuvosos (novembro a março) e invernos amenos e secos (maio a agosto). Há um predomínio da declividade acima de 28% e os solos nas parcelas de erosão consistem em Cambissolos Háplicos.

A área de estudo está inserida em uma região caracterizada por ser essencialmente agrícola e a maior parte dos agricultores possuem a tradição de praticar o sistema de corte e queima (coivara). Após a criação da Área de Proteção Ambiental Estadual de Macaé de Cima em 2001, a legislação passou a proibir o corte da vegetação que alcançava o diâmetro de tronco acima de 5 cm, pois este era o parâmetro utilizado para considerar a área intocável e de preservação. Os agricultores passaram a diminuir o tempo de pousio e incorporar técnicas mais convencionais, como a substituição de pousio por sistemas sem cobertura vegetal e/ou pasto. A mobilização social e a luta das comunidades tradicionais por uma revisão no projeto inicial culminaram no decreto 6.660/2008, que revoga o primeiro e prevê a prática do pousio. Porém, a queimada e o corte da capoeira são fontes de muitos conflitos entre os agricultores e os órgãos de controle ambiental que consideram tais práticas uma agressão ao meio ambiente.

Estudo recente realizado por Souza (2014) na mesma região, demonstrou que as áreas de pastagens são geralmente compactadas e o pisoteio do gado vem acarretando ou intensificando processos erosivos na bacia do rio São Pedro da Serra. Diante disso, surge a preocupação crescente em relação a substituição de áreas que utilizam a técnica de pousio e queima (coivara) por áreas de pasto e/ou sem cobertura vegetal.

Materiais e métodos

Os estudos foram desenvolvidos na Estação Experimental de Pesquisa de Erosão (EEPE/SPS) de dezembro/2008 a julho/2011, analisando dois sistemas: sem cobertura (SC) e com pousio/queima de 3 a 5 anos (PO).

As parcelas de erosão possuem 20 m², delimitadas por chapas de aço galvanizadas e conectadas à caixas coletoras de 500 litros, a fim de mesurar as perdas de água e de solo por erosão superficial.

A dinâmica hidrológica do solo foi caracterizada pelo monitoramento dos potenciais matriciais da água no solo e da precipitação diária. Foram utilizados blocos de matriz granular em cada parcela nas profundidades 15 e 30 cm, com uma repetição para cada (Shock, 2003). A precipitação foi monitorada através de pluviômetros com 100 cm de diâmetro e uma Estação Meteorológica Automatizada THIES TLX-MET.

Resultados e discussões

Os resultados demonstram que a parcela sem cobertura vegetal (SC) e o sistema de pousio/queima (PO) apresentam valores de potenciais matriciais muito semelhantes e próximos da saturação (0 kPa) no início da instalação das parcelas. Os valores (kPa) vão se tornar distintos nos sistemas com o passar dos anos, principalmente a partir do ano de 2010. Isso ocorre devido ao crescimento e desenvolvimento da vegetação de capoeira na parcela PO (Figura 1).

Durante o estudo foram isolados dois períodos distintos: um período de maior ocorrência de chuvas (01 de outubro de 2010 a 29 de janeiro de 2011) e outro de menor ocorrência de chuvas (22 de maio a 28 de julho de 2011) (Figura 2).

No período úmido destaca-se o dia 12 de janeiro de 2011 com um total diário de quase 200 mm, um pouco mais da metade da chuva esperada para todo o mês. Verifica-se que o sistema SC

apresenta potenciais matriciais da água no solo, principalmente do dia 12 de novembro de 2011 a 23 de janeiro de 2011, variando de -4 kPa a -10 kPa, enquanto que o sistema PO, durante o mesmo período apresentou variações de -17 kPa a -145 kPa.

Figura 1: A) Total diário precipitado de outubro de 2008 a julho de 2011.
B) Potencial matricial diário de outubro de 2008 a julho de 2011.

O sistema SC apresenta-se próximo da saturação em grande parte do período, mantendo-se uniforme mesmo diante de variações pluviométricas, o que demonstra uma dificuldade de percolação da água dentro da matriz do solo. Já o sistema PO possui variações constantes com uma drenagem eficiente quando comparado a SC, mesmo nos períodos de concentração de chuvas.

No período seco, maio a julho de 2011, nota-se que ocorreram chuvas pontuais e apenas duas ultrapassaram 10 mm. Após um regime de menor quantidade de chuvas, o sistema PO, drenou de forma eficiente as chuvas do período anterior, variando em -142 kPa a -199 kPa, enquanto que SC variou de -9 kPa a -144 kPa, durante o mesmo regime pluviométrico.

De dezembro de 2008 a julho de 2011 houve um total pluviométrico de 5108,70 mm, e a parcela SC apresentou escoamento total de 1244,20 mm, enquanto que PO apresentou 15,30 mm. Em relação a perda de solo, SC apresentou 29,5 t/ha e PO apresentou 0,0089 t/ha.

Figura 2: A) Precipitação diária de outubro de 2010 a janeiro de 2011 B) Potencial matricial de outubro de 2010 a janeiro de 2011 C) Precipitação diária de maio a julho de 2011 D) Potencial matricial de maio a julho de 2011.

Verificou-se que a parcela SC apresentou perdas de água intensas, por não possuir a proteção natural da vegetação contra o impacto direto das gotas de chuva em conjunto com a declividade do terreno, o que tende a gerar uma velocidade maior da corrida da água na rampa, consequentemente intensificando a ação erosiva.

Já a parcela PO, por possuir vegetação de capoeira, responsável por proteger o solo da exposição direta dos agentes erosivos, dispersando a energia da água do escoamento superficial, no período analisado, apresentou perdas de água de 0,2 mm em dezembro de 2008 e 15 mm em janeiro de 2009, sendo que nos próximos meses até julho de 2011, apresentou perdas de água nulas ou inferiores a 1 litro.

Conclusão

A agricultura tradicional de corte e queima (*slash-and-burn*) apresentou uma drenagem eficiente quando comparado ao sistema sem cobertura vegetal.

A prática do manejo conservacionista de pousio mostra-se eficiente quanto à dinâmica da água em áreas de encostas íngremes e reforçam a problemática da exposição do solo as intempéries climáticas quando se faz uso de práticas agrícolas convencionais.

Agradecimentos

Ao CNPq, processo nº 483495/2013-1, à FAPERJ, processos nº E-26/111.548/2011, E-26/111.330/2013 e a bolsa de Mestrado de Isabel Linhares Pereira Soares E-26/100.728/2014.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela bolsa de Estágio Sênior no Exterior, nº processo BEX 3959-13-9.

Bibliografia

- Barker, G. (2006). *The agricultural revolution in prehistory: why did foragers become farmers?* Oxford, UK and New York, NY: Oxford University Press.
- Bertolino, A. V. F. A., Bertolino, L. C. (2010). Agricultura migratória e seus efeitos sobre o solo. In: *Agricultores e Território: Práticas e Saberes*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Trasso Comunicação, v.1, p. 51-72.
- Brady, N. C. (1996). Alternatives to slash-and-burn: a global imperative. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, v. 58, nº 1, p.3-11.
- Shock, C. C. (2003). Soil water potential measurement by granular matrix sensors. In: B.A. Stewart and T.A. Howell (Editors), *Encyclopedia of Water Sciences*. Marcel Dekker, pp. 899-903.
- Souza, J. M. (2014). *Transformações da Paisagem e sua relação com os Escorregamentos em São Pedro da Serra, município de Nova Friburgo/r R.J.* (Dissertação de Mestrado) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Programa de Pós Graduação em Geografia. 154 p.
- Valverde, O., 1968. Sistemas de roça (agricultura nômade ou itinerante). *Finisterra*, volume III, 6:225-239.

RISCOS DENDROCAUSTOLÓGICOS: PREVISÃO, PREVENÇÃO E CONSEQUÊNCIAS NO ESTADO DE RORAIMA, AMAZÔNIA, BRASIL

Antônio Carlos Ribeiro Araújo Júnior

Departamento de Geografia, Instituto de Geociências da Universidade Federal de Roraima. Especialista em Educação para a Gestão Ambiental (NUMA/UFPa)
mestrando do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais (PRONAT/UFRR)
aj_geo@hotmail.com

RESUMO

Os riscos ambientais estão cada vez mais presentes no existir do ser humano, ou talvez estejam de forma mais acintosas mostrando suas consequências sobre a sociedade, a qual é impactada por fenômenos nocivos como inundações, deslizamentos, incêndios, etc. No entanto, esclareça-se que os riscos ambientais e suas derivações, os desastres ambientais, só o são e existem como se vê devido à presença e/ou ação humana sobre a natureza. Assim, busca-se entender como os incêndios florestais ocorridos no estado de Roraima expõem seus habitantes a riscos chamados dendrocaustológicos, bem como analisar de que forma os trabalhos de previsão e prevenção acontecem, tendo como método a teoria dos sistemas, adotando-se como metodologia pesquisas bibliográficas e documentais, focando nos elementos (i) pluviometria, (ii) vegetação, (iii) seca e estiagem e (iv) defesa civil. De posse de dados pluviométricos e da tipologia biogeográfica do estado tem-se como premissa que o conhecimento sobre este risco é sabido, mas não há ostensividade nas ações, as quais são aparentemente emergenciais.

Palavras-chave: Pluviometria, vegetação, seca e estiagem, defesa civil

Introdução

De acordo com Veyret e Meschinat de Richemond (2007), há de se considerar que os territórios onde se verificam riscos, tanto naturais quanto tecnológicos ou sociais, são tributários de um passado nem sempre bem conhecido e notadamente de escolhas políticas ou econômicas cuja pertinência não pode ser compreendida senão no contexto de uma dada época.

Nesse sentido o trabalho tomará o uso do termo risco como uma categoria de análise que segundo Castro et al. (2005) está associada à priori às noções de incerteza, exposição ao perigo, perda e prejuízos materiais, econômicos e humanos em função de processos de ordem “natural” (tais como os processos exógenos e endógenos da Terra) e/ou daqueles associados ao trabalho e às relações humanas. O risco (lato sensu) refere-se, portanto, à probabilidade de ocorrência de processos no tempo e no espaço, não constantes e não-determinados, e à maneira como estes processos afetam (direta ou indiretamente) a vida humana.

Assim, busca-se entender como os incêndios florestais ocorridos no estado de Roraima expõem seus habitantes a riscos chamados dendrocaustológicos, bem como analisar de que forma os trabalhos de previsão e prevenção acontecem, tendo como método a teoria dos sistemas, adotando-se como metodologia pesquisas bibliográficas e documentais, focando nos elementos (i) pluviometria, (ii) vegetação, (iii) seca e estiagem e (iv) defesa civil.

Estiagem e seca: previsão e consequências

A estiagem está relacionada a baixa taxa de pluviosidade, a períodos chuvosos atrasados e/ou ausência de chuvas para períodos considerados “costumeiros”, as quais podem estar vinculadas a fenômenos atmosféricos globais, a exemplo do fenômeno conhecido como El-Niño.

O fenômeno estiagem é considerado existente quando há um atraso superior a quinze dias do início da temporada chuvosa e quando as médias de precipitação pluviométricas mensais dos

meses chuvosos permanecem inferiores a 60% das médias mensais de longo período, da região considerada (CASTRO, 2003).

As estiagens se comparadas às secas, caracterizam-se pela menor intensidade e por menores períodos de tempo. Assim, a forma crônica deste fenômeno é denominada seca (KOBAYAMA, et al., 2006). A seca, do ponto de vista meteorológico, é uma estiagem prolongada, caracterizada por provocar uma redução sustentada das reservas hídricas existentes (CASTRO, 2003).

O Atlas de desastres naturais do estado de Roraima considera que situações de secas e estiagens não são necessariamente consequências somente de índices pluviométricos abaixo do normal ou de teores de umidade de solos e ar deficitários. Pode-se citar como outro condicionante o manejo inadequado de corpos hídricos em uma bacia hidrográfica, resultados de ação antrópica desordenada no ambiente. As consequências, nestes casos, podem assumir características muito particulares, e a ocorrência de desastres, portanto, pode ser condicionada pelo efetivo manejo dos recursos naturais realizado na área (GONÇALVES, et al., 2004).

No entanto, na Região Norte do Brasil, percebe-se que as secas e estiagens estão principalmente relacionadas aos aspectos e fenômenos climáticos. As previsões de baixa pluviosidade são intensificadas quando há ocorrência do fenômeno que para Oliveira (2001) explica as anomalias do sistema climático sendo mundialmente conhecidas como El Niño e La Niña, representando uma alteração do sistema oceano-atmosfera no Oceano Pacífico tropical, e que tem consequências no tempo e no clima em todo o planeta. Nesta definição, considera-se não somente a presença das águas quentes da Corrente El Niño, mas também as mudanças na atmosfera próxima à superfície do oceano, com o enfraquecimento dos ventos alísios (que sopram de leste para oeste) na região equatorial.

Para Chechi e Sanches (2012) com esse aquecimento do oceano e com o enfraquecimento dos ventos, começam a ser observadas mudanças da circulação da atmosfera nos níveis baixos e altos, determinando mudanças nos padrões de transporte de umidade, e, portanto segundo variações na distribuição das chuvas em regiões tropicais e de latitudes médias e altas. Em algumas regiões do globo também são observados aumento ou queda de temperatura.

No estado de Roraima os índices pluviométricos mais baixos (gráfico 1) são registrados entre os meses de outubro a março (6 meses), abaixo dos 100 mm, os quais estão relacionados a fenômenos de estiagem e seca. Tendo em consideração que a maior parte dos incêndios ocorrentes no estado se não na porção norte, acredita-se que a alta estiagem, associada à característica biogeográfica de vegetação herbácea-arbustiva com folhagem adaptada a baixas taxas de água contribuem para a formação de um ambiente seco e propício a formação de focos de incêndio.

As características acima relacionadas corroboram com o gráfico 2, o qual demonstra que as ocorrências de incêndios estão dispostos no período outubro-março.

Fig 1 - Médias pluviométricas do período de 1991 a 2010, com base nos dados das Estações Pluviométricas da Agência Nacional de Águas (ANA), no Estado de Roraima. Fonte: ANA/SGH, 2010. Adaptado por CEPED UFSC, 2011.

Fig2 - Frequência mensal de estiagens e secas, no Estado de Roraima, período de 1991 a 2010.

Fonte: Documentos oficiais do Estado de Roraima, 2011 adaptado por CEPED UFSC, 2011.

Por conta dos desastres relacionados aos incêndios o ser humano foi afetado sendo registradas 100.657 pessoas afetadas, principalmente por conta da fumaça gerada da combustão de biomassa ressecada pela baixa umidade e precipitação, além do que houve registro de 1.213 pessoas enfermas, uma levemente ferida e duas mortes (gráfico 3).

Fig3 - Danos humanos ocasionados por estiagem e seca, no Estado de Roraima, período de 1991 a 2010

Fonte: Documentos oficiais do Estado de Roraima, 2011 adaptado por CEPED UFSC, 2011.

Percebe-se com isso que medidas devem ser adotadas pelo poder público para mitigação deste desastre e por meio da defesa civil ações foram desenvolvidas e são pensadas para lidar com este fenômeno.

Defesa civil e sociedade: prevenção a riscos dendrocaustológicos

Prevenir é a alternativa mais viável para se evitar com que eventos extremos possam incidir direta ou indiretamente sobre a população, bem como causar perdas naturais na fauna e flora.

Neste sentido, o corpo de bombeiros do estado de Roraima por meio da Defesa Civil vem desenvolvendo atividades para atuar frente a minimizar possíveis desastres de incêndio. Uma das ações a serem destacadas é a operação Roraima Verde, iniciada em 2010, a qual foi tema debatido no XII Fórum do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Distrito Federal ocorrido nos dias 28 e 29 de abril de 2010.

Segundo informações do site da Defesa Civil todos os anos o Corpo de Bombeiros, por meio da Defesa Civil, atua na prevenção e no combate aos incêndios florestais. Devido à estiagem em várias regiões do Estado e a evidência de acontecer um desastre ambiental parecido com os dos anos de 1998 e 2003, a Instituição implantou o Centro Integrado de Operações (CIMAN) para a mobilização de órgãos parceiros e evitar possível evento (DEFESA CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA, 2014).

Segundo o coronel Paulo Sérgio Santos Ribeiro, coordenador estadual da Defesa Civil (no ano de 2010), a implantação do CIMAN foi uma orientação do Programa Nacional de redução do uso do fogo (PRONAFOGO) nas áreas rurais e florestais, tendo como base a ferramenta de gestão de desastre, o Sistema de Comando de Incidente (SCI), o qual é uma metodologia prática e inovadora, que tem o objetivo de gerenciar, integrar e otimizar procedimentos operacionais em situações críticas a fim de proteger vidas, propriedades e o meio ambiente

Complementar a esta metodologia de ação cabe destacar a importância da participação da sociedade na prevenção de desastres oriundos de incêndios, predominantemente nas áreas rurais, mas que também afetam a população urbana por conta da fumaça gerada pela combustão de biomassa. A identificação de famílias mais carentes economicamente e com idosos e crianças é fundamental, pois verifica-se que são as faixas etárias mais afetadas por esse sinistro e tal identificação minimizaria os afetados pelas fumaças.

Conclusão

A sociedade ainda se encontra exposta aos riscos dendrocaustológicos no estado de Roraima, no entanto, ações vêm sendo desenvolvidas pelo estado por meio de órgãos públicos (Corpo de Bombeiros/Defesa Civil) no sentido de prevenir eventos extremos associados ao fogo, sendo importante frisar também que a participação da sociedade seria primordial para lidar com este fenômeno e a capacitação por meio de cursos, palestras e mini-curso é uma alternativa viável para se trabalhar com pessoas atingidas direta e indiretamente por estes eventos.

Bibliografia

- CASTRO, A. L. C. Manual de desastres: desastres naturais. Brasília (DF): Ministério da Integração Nacional, 2003.
- CASTRO, C. M. de., PEIXOTO, M. N. de O. e PIRES DO RIO, G. A. Riscos Ambientais e Geografia: Conceituações, Abordagens e Escalas. Anuário do Instituto de Geociências - UFRJ. Vol. 28-2 / 2005.
- CHECHI, L.; SANCHES, F. O. A INFLUÊNCIA DO ENOS (El Niño Oscilação Sul) NOS TOTAIS ANUAIS DE PRECIPITAÇÃO EM ERECHIM (RS) NO PERÍODO DE 1958-1981. REVISTA GEONORTE, Edição Especial 2, V.2, N.5, p.853 - 865, 2012.
- DEFESA CIVIL DO ESTADO DE RORAIMA. Disponível em < <http://www.defesacivil.rr.gov.br/not.php?id=41> >. Acesso em 01/09/2014.
- KOBIYAMA, M. et al. Prevenção de desastres naturais: conceitos básicos. Curitiba: Organic Trading, 2006. 109 p.

- GONÇALVES, E. F.; MOLLERI, G. S. F.; RUDORFF, F. M. Distribuição dos desastres naturais no Estado de Santa Catarina: estiagem (1980- 2003). In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE DESASTRES NATURAIS, 1., 2004, Florianópolis. Anais...
- Florianópolis: GEDN/UFSC, 2004. p.773-786. 1 CD-ROM.
- OLIVEIRA, G. S. O El Niño e Você - o fenômeno climático. Editora Transtec, São José dos Campos, 2001.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC). Atlas brasileiro de desastres naturais 1991 a 2010: volume Roraima. Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres. Florianópolis: CEPED UFSC, 2011.
- VEYRET, Y.; MESCHINET DE RICHEMOND, N. O risco, os riscos. In: VEYRET, Y. (Org.) Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente. São Paulo: Contexto, p. 23-79, 2007.

ENXURRADAS VIOLENTAS APÓS INCÊNDIOS FLORESTAIS. O EXEMPLO DE PRAIAS E PISCINAS FLUVIAIS DA BACIA DO RIO ALVA (PORTUGAL)

Luciano Lourenço

Departamento de Geografia e CEGOT, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra
luciano@uc.pt

Adélia Nunes

Departamento de Geografia e CEGOT, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra
adelia.nunes@fl.uc.pt

Joana Gonçalves

NICIF, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra
jhumanita_rita@hotmail.com

RESUMO

Partindo da análise da incidência e recorrência de incêndios florestais na bacia do rio Alva, descrevem-se alguns eventos violentos ocorridos na sua sequência, cuja resposta, tanto ao nível hidrológico como erosivo, afetou áreas muito para além dos limites das áreas queimadas. Procura-se, assim, inferir a importância que a destruição do coberto vegetal, conjugada com a ocorrência de chuvas intensas, pode ter no desencadear ou na intensificação de processos hidrogeomorfológicos (cheias, inundações e erosão de solos), tanto a seguir ao incêndio, como alguns meses após a sua ocorrência. A análise de vários eventos, que se manifestaram por enxurradas violentas, mostra que a suscetibilidade à manifestação dos riscos anteriormente referidos ocorre sobretudo na chamada ribeira de Alva, a montante da confluência com o rio Alvoco, bem como em duas outras sub-bacias, a de Pomares, situada ligeiramente a jusante dessa confluência, e a do Piódão, afluente do rio Alvoco.

Palavras-chaves: Incêndios florestais, Cheias e inundação; Erosão de solos; Bacia do Rio Alva, Portugal.

Introdução

Vastas áreas do território continental português têm sido afetadas por incêndios florestais, nestas últimas décadas. A bacia hidrográfica do rio Alva, por integrar amplos territórios serranos, do Açor e da Estrela, tem sido severamente afetada pelas chamas, sobretudo depois de 1975. Com a destruição do coberto vegetal pelo fogo, o solo fica exposto ao impacto direto das gotas de chuva e a sua capacidade de retenção e armazenamento de água reduz-se, devido à perda de matéria orgânica do solo, à diminuição da porosidade e ao aumento de substâncias hidrofóbicas, gerando-se assim quantidades de escorrência muito maiores (Nunes *et al.*, 2011/2; Prats *et al.*, 2013), as quais influenciam o caudal de base e as pontas de cheia nos cursos de água (Ferreira *et al.*, 2008), assim como diferentes intensidades nos processos erosivos.

Com o presente trabalho pretendem-se analisar alguns eventos severos ocorridos na bacia do rio Alva, na sequência de incêndios florestais, cujas implicações, tanto ao nível da resposta hidrológica como erosiva, não se limitaram à área percorrida pelas chamas, mas afetaram áreas muito para além dos perímetros dos incêndios. Por serem as que registaram maior recorrência não só de grandes incêndios florestais, mas também de manifestações hidrogeomorfológicas, dar-se-á particular ênfase às situações assinaladas nas bacias hidrográficas das ribeiras de Alva, Pomares e do Piódão, bem como do rio Alvoco e, em particular, às suas praias e piscinas fluviais.

A bacia hidrográfica do rio Alva: localização, incidência e recorrência de incêndios

Com uma área de aproximadamente 705 km², a bacia hidrográfica do rio Alva, assinala um gradiente altimétrico superior a 1900 m (fig. 1). Com uma forma alongada, é no *Alva superior* que se situam algumas das suas mais importantes sub-bacias, bem como a jusante, na margem esquerda, designadamente as das ribeiras de Pomares, Coja e Folques (Lourenço, 1986).

Fig. 1 - Localização da bacia hidrográfica do rio Alva e seu enquadramento hipsométrico (Fonte: J. Gonçalves, 2013).

Tendo por base os incêndios com dimensão superior a 10 hectares, no período compreendido entre 1974 e 2013, sobressai não só a vastidão das áreas ardidas (fig. 2), as quais perfazem cerca de 77 000 ha, mas também a reincidência de incêndios florestais, em especial nas bacias hidrográficas das ribeiras de Pomares e Piódão, com algumas áreas, durante este período, a arderam 6 vezes, como é disso exemplo o Monte do Colcurinho, e várias outras a serem incineradas cinco, quatro, três ou duas vezes (Lourenço e Nunes, 2014). Esta recorrência na incidência espacial de incêndios florestais mostra bem a suscetibilidade das áreas mais montanhosas da bacia do Alva à plena manifestação deste risco.

Fig. 2 - Áreas percorridas pelas chamas uma ou mais vezes, na bacia hidrográfica do rio Alva, no período de 1975 e 2013 (Fonte: Lourenço e Nunes, 2014, p. 51).

No período analisado destacam-se alguns anos, em particular os de 1987 e 2005, como tendo sido dos mais flagelados pelas chamas. Em ambos, grande parte da área ardida deveu-se a um único incêndio, de grandes dimensões: o primeiro decorreu entre 13 e 20 de setembro de 1987, designado por incêndio de Arganil/Oliveira do Hospital, tendo devastado 10 900 ha (Viegas *et al.*, 1988); o segundo deflagrou entre 19 e 24 de julho de 2005 e percorreu mais de 15 800 ha (Lourenço, 2007). Estes dois incêndios lavraram vastos territórios do Alva, com especial incidência nas bacias de Pomares e do Piódão. Os anos de 1990, 1992, 2010 e 2012 também registaram vastas áreas ardidas, superiores a 4 000 ha, sendo que os 2 últimos afetaram sobretudo as cabeceiras do rio Alva.

Depois das chamas, a recorrência de enxurradas violentas

Analisam-se, na sequência de grandes incêndios florestais, vários episódios pluviosos cuja intensidade, decorrente da concentração temporal e espacial, estiveram na origem de violentas enxurradas, que acabaram por afetar áreas muito além das percorridas pelos incêndios florestais.

A enxurrada de 23 de Junho de 1988 na ribeira de Pomares

Na sequência de quantitativos de precipitação elevados, que ultrapassaram 70 mm no posto de Arganil, tanto no dia 21 como no dia 23, foi precisamente no dia 23 de Junho de 1988, cerca de 8 meses após o grande incêndio de setembro de 1987, que as consequências hidrológicas e erosivas se vieram a demonstrar mais desastrosas. Os elevados quantitativos de precipitação, intensificados pelo efeito orográfico, pela incidência localizada e pela precipitação antecedente, afetaram em especial as cabeceiras das ribeiras do Espinho e da Sorgaçosa, subafluentes da ribeira de Pomares. As intensas chuvas associadas à destruição da vegetação pelo fogo, tiveram um impacto direto no volume dos caudais das ribeiras da área atingida, afetando com particular violência a aldeia da Sorgaçosa, onde a rotura de diques, a montante, conduziu as águas correntes para as antigas linhas de água, tendo destruído campos de cultura, danificado uma casa e deixado intransitável o largo da aldeia (Lourenço, 1988).

As enxurradas de 16 de Junho de 2006 nas bacias de Piódão e Pomares

No dia 16 de Junho de 2006, cerca de um ano após o incêndio de julho de 2005, ocorreu um episódio pluviométrico que originou severos prejuízos materiais e humanos, quer nas cabeceiras, quer nos vales localizados a jusante, não só em consequência da cheia e inundação mas também e sobretudo por causa da grande quantidade de materiais carregados (Lourenço e Nunes, 2014).

Dos 58 mm de precipitação registados no Piódão, em junho, 50% concentraram-se no dia 16 de Junho, sendo que 22 mm ocorreram entre as 17:00-18:00 h. Esta forte concentração espaço-temporal intensificou a atuação dos processos erosivos nas vertentes percorridas pelas chamas, tendo originado pontas de cheia nas ribeiras do Piódão e de Pomares e, depois, nos rios Alvoco e Alva, que, por isso, registaram inundações, sendo sobretudo afetadas as infraestruturas constituídas pelas piscinas e praias fluviais (Lourenço e Nunes, 2014).

A enxurrada de 14 de Julho de 2006 na bacia de Piódão

Cerca de um mês após o evento antes descrito, o cenário parece repetir-se e dotar-se ainda de maior violência, sobretudo na pequena bacia da ribeira do Piódão. De facto, o episódio pluvioso

do dia 14 de Julho foi mais concentrado e intenso do que o anterior, afetando sobretudo as cabeceiras da ribeira do Piódão (Pereira e Lourenço, 2007). A chuva aí registada no mês de Julho foi superior à de Junho, totalizando 95 mm. Todavia 70 mm caíram nos dias 13 e 14 de julho, respetivamente com 30 e 39 milímetros. A precipitação do dia 14 de Julho concentrou-se num único evento, que ocorreu entre as 16:00h e as 17:00h, com 14 mm, nos primeiros 30m, e 24 mm, na meia hora seguinte.

A elevada intensidade horária da precipitação desencadeou uma rápida resposta da ribeira do Piódão e a ocorrência de um pico de cheia, com consequências bastante graves, não só devido às inundações que provocou mas também devido à capacidade e competência desta linha no transporte de inertes. Neste segundo episódio, a piscina ficou completamente soterrada por já ter as comportas colocadas. Contudo, a maior diferença entre este episódio e o do mês anterior foi a perda de uma vida humana. Apanhado desprevenido pela tempestade e pela torrente que se gerou na ribeira, um transeunte foi arrastado pela ponta de cheia, tendo sucumbido e ficado soterrado.

A enxurrada de 31 de Agosto de 2010 no fosso do médio Alva

Em meados de Agosto de 2010, um violento incêndio percorreu cerca 4300ha com a maior parte da área ardida localizada na bacia do rio Alva. Na sequência desse incêndio, no dia 31 de Agosto e após um intenso episódio pluvioso, a resposta hidrológica das pequenas ribeiras foi imediata. Dados recolhidos no posto de Oliveira do Hospital mostram que ocorreram cerca de 42mm de precipitação, 31,2 mm dos quais entre as 15:00 e as 16:00h. A quantidade de chuva, caída num curto período de tempo e muito provavelmente intensificada pelo efeito orográfico do relevo serrano, desencadeou um intenso escoamento superficial, que rapidamente engrossou o caudal e gerou fluxos torrenciais em muitas das pequenas linhas de água afluentes do rio Alva.

Com o caudal foram transportados inertes vegetais deixados pela passagem do fogo mas também grandes quantidades de partículas minerais e cinzas. **No rio Alva, além do aumento instantâneo do caudal, a tonalidade das águas indiciava a enorme quantidade de cinza e partículas de pequena dimensão, tendo contaminado a captação de água da Senhora do Desterro, feita para abastecimento da população dos concelhos de Seia, Gouveia e Oliveira do Hospital, bem como afetou diversas infraestruturas situadas a jusante, designadamente praias e piscinas fluviais.**

Conclusão

A bacia do rio Alva emerge como um exemplo paradigmático onde se conjugam condições para a ocorrência recorrente de incêndios florestais, geralmente de grande dimensão, e, na sua sequência, para a manifestação de outros riscos, nomeadamente de cariz hidrológico, através de cheias e inundações, e de natureza geomorfológica, traduzida pela intensificação dos processos erosivos. A suscetibilidade à manifestação dos riscos anteriormente referidos parece ocorrer sobretudo no Alva Superior, a montante da confluência do Alvoco, bem como em duas outras sub-bacias, a de Pomares, situada ligeiramente a jusante dessa confluência, e a o Piódão, afluente ao rio Avoco.

Depois do flagelo das chamas, é sobretudo a ocorrência de elevados quantitativos de precipitação, quase sempre localizados e intensos, que agravam substancialmente os riscos de erosão pós-incêndio e estão na génese de outros fenómenos mais extremos, tais como fluxos de detritos, cheias e inundações após incêndios.

Há, portanto, necessidade de implementar medidas que visem não só a redução das áreas ardidas, mas também o desenvolvimento de métodos e ferramentas para identificar e quantificar os riscos inerentes às inundações e ao transporte de detritos gerados na sequência dos incêndios, assim como para melhorar as previsões da magnitude e recorrência destes fenómenos ao nível da bacia hidrográfica.

Bibliografia

- Ferreira, A. J. D.; Coelho, C. O. A.; Ritsema, C. J.; Boulet, A. K. e Keizer, J. J. (2008) - Soil and water degradation processes in burned areas: lessons learned from a nested approach, *Catena*, Vol. 74, p. 273-285.
- Gonçalves, J. (2013) - *Resposta fluvial a precipitações intensas/prolongadas após incêndios florestais. Exemplos da bacia hidrográfica do rio Alva*. Dissertação de Mestrado em Geografia Física, em Ambiente e Ordenamento do Território, apresentada ao Departamento de Geografia, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 100 p
- Lourenço, L. (1986) - *O Rio Alva: Hidrogeologia, Geomorfologia, Climatologia e Hidrologia*. Instituto de Estudos Geográficos, Faculdade de Letras, Coimbra, 162 p.
- Lourenço, L. (1988) - Lourenço, Luciano (1988) - Efeitos do temporal de 23 de Junho de 1988 na intensificação da erosão das vertentes afectadas pelo incêndio florestal de Arganil/Oliveira do Hospital, em *Comunicações e Conclusões*, Seminário Técnico sobre Parques e Conservação da Natureza nos Países do Sul da Europa, Faro, p. 43-77.
- Lourenço, L. (2007) - Incêndios florestais de 2003 e 2005. Tão perto no tempo e já tão longe na memória!, em *Riscos Ambientais e Formação de Professores*, Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra, p. 19-91.
- Lourenço, L. e Nunes, A. (2014) - O flagelo das chamas e a recorrência de eventos hidrogeomorfológicos intensos. O exemplo da bacia do rio Alva (Portugal). *Waterlat-Gobacit Network*, Working Paper, “*Water-related disasters: from trans-scale challenges to interpretative multivocality*”, Vol. 1 No 1, p. 43-90.
- Nunes, A., Lourenço, L., Vieira, A., Bento-Gonçalves, A. (2011-12) - ‘Self-prevention’: uma estratégia de prevenção de incêndios florestais na raia Ibérica. *Cadernos de Geografia*, 30/31, Faculdade de Letras, Coimbra, p. 99-106.
- Oliveira, S. L. J. (2008) - *Análise da frequência do fogo em Portugal Continental (1975-2005) com a distribuição de Weibull*, Tese de mestrado, ISA, UTL, Lisboa, Portugal.
- Oliveira, S. L. J.; Pereira, José M. C. e Carreiras, João M. B. (2011) - Fire frequency analysis in Portugal (1975-2005), using Landsat-based burnt area maps. *International Journal of Wildland Fire*, 21(1) p. 48-60.
- Pereira, N. e Lourenço, L. (2007) - Riscos de cheias e inundações após incêndios florestais. O exemplo das bacias hidrográficas das ribeiras do Piódão e Pomares, em *Riscos Ambientais e Formação de Professores*. Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra, p. 123-149.
- Prats, S. A.; Malvar, M.C.; Vieira, D. C. S.; Macdonald, L.; Keizer J.J. (2013) - Effectiveness of hydromulching to reduce runoff and erosion in a recently burnt pine plantation in central Portugal. *Land Degradation & Development*. DOI: 10.1002/ldr.2236.
- Viegas, D. X.; Lourenço, L.; Neto, L.; Monteiro, J. Paiva; Pais, T.; Reis, J.; Ferreira, A. e Goulão, M. (1988) - *Análise do Incêndio Florestal ocorrido em Arganil/Oliveira do Hospital de 13 a 20 de Setembro de 1987*. Centro de Mecânica dos Fluidos, Coimbra, 102 p.;

LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO COMO FACTOR CONDICIONANTE EN LA CATÁSTROFE DE VALPARAÍSO CASO VALPARAÍSO, CHILE CENTRAL

Luis Correa Jiménez

Corporación Nacional Forestal. Región de Valparaíso - Chile
luis.correa@conaf.cl

Miguel Castillo Soto

Laboratorio de Incendios Forestales. Universidad de Chile
migcasti@uchile.cl

RESUMEN

Habiéndose cerrado el fatídico balance del Incendio Forestal que afectó a la ciudad de Valparaíso (Chile Central) en el mes de abril de 2014, las cifras oficiales indican que se destruyeron aproximadamente 2.900 casas, fallecieron 15 personas, y fueron afectadas 965 hectáreas (937 de vegetación y 28 de superficie urbanizada), las lecciones aprendidas que nos dejó esta calamidad son muchas.

El presente artículo describe la dinámica de la ocupación territorial en la zona de interfaz de Valparaíso (Patrimonio de la Humanidad desde 2003), analiza las variables ambientales y las histórico-culturales, que han incidido en el actual patrón espacial de ocupación del territorio en dicha ciudad, presenta las causas (legales, administrativas y políticas) del deficiente ordenamiento territorial en la interfaz de la ciudad y demuestra que la ausencia de planificación territorial fue un factor decisivo en el grave daño producido por este incendio.

Palabras clave: (Incendio forestal, Interfaz, Valparaíso).

Introducción

Históricamente, los incendios forestales en Chile, han significado destrucción de vegetación y daño ambiental severo en casi todo el territorio nacional (exceptuando las áreas desérticas). Hasta hace pocas décadas, los incendios forestales generaban casi exclusivamente daños forestales, toda vez que se desarrollaban, se combatían y se controlaban en una ambiente preferentemente rural.

No obstante, en la actualidad esta situación está cambiando rápidamente, las urbanizaciones han avanzado hacia los sectores vegetacionales, esto sucede en zonas rurales (parcelas de agrado y segunda vivienda), pero también se manifiesta en la interfaz de los grandes centros poblados, donde la ocupación espontánea del territorio se efectúa con edificaciones de material ligero y sin planificación, y que corresponden a personas que carecen de las condiciones económicas para vivir en otros lugares. En este último caso, se configura una interfaz altamente propicia a los desastres naturales, como derrumbes, inundaciones e incendios forestales, y genera un alto grado de vulnerabilidad a las poblaciones que allí se han establecido.

En tal sentido, la ciudad de Valparaíso, es la que presenta los mayores grados de vulnerabilidad por incendios forestales en el país, es también la que ha sufrido la mayor cantidad de desastres de este tipo. Sin embargo, el último incendio catastrófico en Valparaíso, arrojó un balance extremadamente alarmante; se destruyeron aproximadamente 2.900 casas, fallecieron 15 personas, y fueron afectadas 965 hectáreas (937 de vegetación y 28 de superficie urbanizada).

División Administrativa de Chile

La organización territorial de Chile corresponde a un Estado Unitario, que se divide actualmente en quince regiones que a su vez se subdividen en provincias. Para los efectos de la administración local, las provincias se dividen en comunas.

Parte del territorio nacional es la región de Valparaíso, que cuenta con una superficie aproximada de 16.378 km², se ubica entre los 32° 02' y 33° 57' latitud sur, y desde los 70° 00' longitud oeste hasta el Océano Pacífico.

Los Incendios Forestales en Chile y en la Región de Valparaíso

Los incendios forestales en Chile son un problema en casi todo el territorio nacional, anualmente se registran 5.400 incendios, con una superficie afectada de casi 64.000 hectáreas (promedio últimos 10 años). Por su parte, la región de Valparaíso presenta promedios anuales de 847 incendios y casi 8.000 hectáreas dañadas (16% y 13 % del total nacional respectivamente).

La Comuna de Valparaíso. Historial de Incendios Catastróficos

Hasta hace pocas décadas, los técnicos planificadores y tomadores de decisiones políticas, consideraban solo dos dimensiones del territorio, la rural y la urbana. Actualmente se sabe que existe una faja intermedia denominada interfaz (urbano-rural o urbano-forestal, según se dé el caso), donde se combinan usos residenciales, productivos, recreativos, etc., en un ámbito con características rurales y con una vegetación forestal en su entorno.

En 1990 apareció en los países anglosajones un nuevo concepto denominado wildland-urban interface, WUI (Stewart et al., 2007). La definición de WUI fue desarrollada inicialmente en Estados Unidos con el fin de identificar aquellas zonas con un alto riesgo de incendios; the Wildland-Urban “Interface is the area where houses meet or intermingle with undeveloped wildland vegetation” (USDA y USDI, 2001).

La destrucción de viviendas en la interfaz de Valparaíso a consecuencia de los incendios forestales, es un tema relativamente nuevo (pocas décadas). Antes del año 2001, la quema de viviendas era un hecho eventual y aislado, teniéndose como referencia la destrucción de casas del año 1968 en la Población Gómez Carreño(200) y la del año 1994 en Rodelillo (56), sin embargo a partir del año 2001, este problema ha sido continuo, registrándose eventos todos los años, siendo los casos más dramáticos los del año 2003 en el Cerro Cordillera (34 casas) y Miraflores Alto (17); año 2004 Población Rapa Nui (18); año 2008 Cerro La Cruz (200); año 2012 Canal Beagle (77), año 2013 Rodelillo (309), El Vergel (30) y año 2014 Camino La Pólvara (2.900). Lo anterior se explica en parte por el desarrollo territorial que ha experimentado la ciudad de Valparaíso.

Figura 1: Aspecto de incendios forestales que han dañado casas en Valparaíso

Condiciones físicas particulares de la Interfaz en la ciudad de Valparaíso

La interfaz se presenta con numerosos ejes de quebradas y drenes de orientación Norte-Sur preferentemente, que aportan escorrentías superficiales para la consolidación de varios cursos de agua presentes en la ciudad. La interfaz es de gran complejidad topográfica, en su parte más alta se configura por sobre la cota de los 300 msnm y se desniva rápidamente hacia el nivel del mar en pocos metros, cuyo resultado son pendientes abruptas por sobre 80% en la mayoría de los casos.

La vegetación predominante en la interfaz corresponde a formaciones artificiales de eucaliptos (*Eucaliptus globulus*) y algunos vegetales de características arbustivas que inferen continuidad vegetacional (matorral esclerófilo achaparrado).

Figura 2: Configuración topográfica y la vegetación en la interfaz de Valparaíso

Edificaciones de material ligero: A través del tiempo, los asentamientos humanos fueron creciendo hacia la periferia de la ciudad, en su gran mayoría a partir de emplazamientos espontáneos (ilegales), los que se fueron urbanizando de manera gradual y sin mayor planificación. Este fenómeno de emplazamiento espontáneo ha continuado sin detenerse hasta hoy, y es así que en las laderas de los cerros, de muy alta pendiente y de muy alto riesgo para cualquier tipo de edificación, se fue configurando una trama de camino secundarios y senderos que permitieron la instalación de una infinidad de viviendas de construcción muy precaria y de material ligero.

La Ocupación Territorial en Valparaíso

A comienzos del siglo XVII, Valparaíso conformaba lentamente su fisonomía urbana, su población estaba compuesta principalmente por inmigrantes europeos, norteamericanos y los propios chilenos. En ese tiempo, su población ya había sufrido dos grandes terremotos y varias tormentas de lluvia y viento, que caracterizan los inviernos en esta zona geográfica. Hacia 1822, la actividad comercial de la ciudad, obligó a expandir sus límites hacia el norte, pero siempre en sectores planos. De 5 mil habitantes en 1810, pasa a 40 mil en 1842; para 1871 serán 70 mil los residentes.

A principios del siglo XX, y hasta 1930, Valparaíso aumentó su población y tuvo relevancia internacional como uno de los puertos más importantes en la cuenca oriental del Pacífico. A partir de 1990, con el advenimiento de la democracia, se comienzan a discutir otros temas, entre los cuales se destaca a Valparaíso en su calidad de ciudad patrimonial, es así que en el año 2003, Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, en 1992 Valparaíso tenía una Población de 277.880 habitantes, cifra que no experimentó una variación significativa en el año 2002, cuando la comuna registró un poco más de 278.000 habitantes. Para el año 2012, se ha estimado una población de 269.446, es decir, una baja en la cantidad de habitantes de la comuna (Estadísticas Comunales, Biblioteca Congreso Nacional).

A pesar que el número poblacional de la comuna de Valparaíso, no ha experimentado una variación significativa en 20 años, la ocupación territorial ha seguido un patrón espacial bien definido, en base a tres factores que se explican a continuación:

Avance de la urbanización de plan a cerro (norte a sur), hacia las áreas periféricas, alejamiento y abandono de la zona céntrica (casco histórico). Una vez que los espacios planos de la ciudad fueron ocupados, comenzó la construcción de emplazamientos hacia los cerros de Valparaíso, inicialmente respetando las normas de urbanización vigentes, pero luego en forma desordenada e informal. Esta expansión de las ciudades hacia la periferia de las mismas, tiene como consecuencia, un acercamiento poco prudente de las edificaciones hacia las áreas forestales, que son poco propicias para la construcción y provocan una alta vulnerabilidad en este aspecto.

Figura 3: Ocupación territorial hacia la periferia

Avance de las edificaciones a través de los lomajes de cerros, en forma de cuña. Como se mencionó, la interfaz de Valparaíso, presenta condiciones topográficas muy complicadas y poco seguras para la construcción de viviendas. El relieve corresponde a un complejo sistema de quebradas y lomajes de pronunciadas pendientes. Por tal motivo, las construcciones avanzan de norte a sur, por las cumbres de los cerros, generalmente con un camino precario como eje estructurante. Posteriormente, comienza la construcción en las laderas, lo que forma una figura de cuña, tal como se puede ver en la figura 4.

Figura 4: Ocupación en forma de cuña

Aumento de la densidad de viviendas en la interfaz: Las viviendas se fueron construyendo por grupos familiares en sitios con una superficie mínima, y a partir de dichos sitios y según el crecimiento familiar, se fueron agregando otras construcciones precarias conformando un conjunto habitacional con una gran cantidad de viviendas muy cercanas unas de otras. En la figura 5 (círculos rojos), se puede apreciar el cambio de densidad de viviendas.

Figura 5: Aumento de la densidad poblacional

Los Instrumentos de Ordenamiento Territorial en Chile

La planificación territorial en Chile es una materia que ha sido administrada tradicionalmente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, asignándose competencias legales a través de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC, Ministerio de Vivienda y Urbanismo). Dicho cuerpo legal considera a los denominados Instrumentos de Planificación Territorial (IPT), que a continuación se explican brevemente.

Plan Regional de Desarrollo Urbano: Corresponde a la Planificación Urbana Regional que orienta el desarrollo de los centros urbanos de las regiones. **Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano:** La Planificación Urbana Intercomunal regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana. **Plan Regulador Comunal:** Se entiende por Planificación Urbana Comunal aquella que promueve el desarrollo armónico del territorio comunal, en especial de sus centros poblados, en concordancia con las metas regionales de desarrollo económico-social. Es formulado en calidad de función privativa por la Municipalidad respectiva. **Plan Seccional:** En los casos en que, para la aplicación del Plan Regulador Comunal, se requiera de estudios más detallados, existen los Planos Seccionales. **Límite Urbano:** Es una línea imaginaria que delimita las áreas urbanas y de extensión urbana que conforman los centros poblados, diferenciándolos del resto del área comunal. Este límite define automáticamente la función y el uso que tendrá el suelo en cada sección.

Otras Consideraciones en Ordenamiento Territorial: Ninguno de estos IPT consideraba a los incendios forestales como un factor relevante en la ocupación del territorio, sin embargo, el gran incendio forestal que afectó a Valparaíso el 12 de abril del 2014, paradójicamente ayudó a acelerar el proceso de incorporación de esta variable de riesgo a estos instrumentos. Es así que en junio de este año, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, decretó la incorporación del riesgo por amenaza de incendios forestales, a los Planes Reguladores Comunales, siendo ésta una disposición normativa-obligatoria.

Conclusión

A continuación se mencionan los factores que posibilitaron el desastre. Si bien es cierto que estas condiciones están presentes en otras ciudades, en Valparaíso se manifiestan con más fuerza y se combinan de una manera especial: Debilidad en los Instrumentos de Planificación Territorial, no consideraban a los IF como factor de riesgo. Inadecuada ocupación del territorio. Mala calidad de las viviendas. Condiciones topográficas especiales de la interfaz de Valparaíso. Condiciones ambientales de extrema sequedad en época estival (típicos del ambiente mediterráneo).

Bibliografía

- Castillo, M., Correa, L. (2013) - Incendios forestales en Valparaíso-Viña del Mar. Una zona geográfica de extrema gravedad. Revista Chile Forestal 2013. Santiago. Chile.
- Consejo Monumentos Nacionales (2003). Declaración de Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad. Santiago. Chile.
- Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2014) - Ley General de Urbanismo y Construcciones. Biblioteca del Congreso Nacional. Santiago. Chile.
- Pedrerros, M. (2011) - Instrumentos de Planificación Territorial. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 17 p. Santiago. Chile.
- Stewart, S., Radeloff, V., Hammer, R., Hawbaker, T. (2007) - Defining the Wildland-Urban Interface. Journal of Forestry, p 201-207.

GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RIESGOS Y ACTUACIONES FRENTE A DESASTRES OCASIONADOS POR INCENDIOS DE INTERFAZ

Miguel Castillo S.

Laboratorio de Incendios Forestales. Universidad de Chile.
migcasti@uchile.cl

RESUMEN

En Chile, el problema de los incendios forestales se ha visto reflejado en los últimos años a una leve alza en el número promedio de eventos por año. Sin embargo el aspecto más preocupante ha sido el violento aumento de la severidad del fuego y las extremas condiciones de peligro que se presentan en muchas áreas del país. Lo anterior tiene múltiples explicaciones, desde aspectos meteorológicos, vegetacionales, de manejo de bosques, de legislación y pautas de ordenación del territorio, hasta la conducta irresponsable de personas que ocasionan incendios, y enormes debilidades que presenta el sistema legal de sanciones, que no promueve pautas estrictas para castigar a los responsables. Lo anterior, desde el punto de vista de la condición de Riesgo, permite identificar zonas particularmente sensibles al problema de los incendios y la posibilidad de la ocurrencia de graves desastres en zonas densamente pobladas que conviven con la interfaz de bosques. En este artículo se describe este problema, ilustrando aquellos aspectos que debiesen formar una adecuada planificación y gestión del territorio frente a la ocurrencia y propagación del fuego.

Palabras clave: gestión del riesgo, peligro de incendios, interfaz urbano-forestal, causas de incendios, planificación territorial

Introducción

En Chile, prácticamente la totalidad de los incendios que se producen son por actividad humana. En el cuadro 1 se expone una breve reseña estadística para otorgar un marco de referencia. En relación a los incendios de interfaz, éstos han ido en aumento hacia zonas de contacto con bosques y vegetación combustible que se localizan en el entorno de grandes centros urbanos. Una revisión general para la zona Central de Chile muestra la definición de áreas particularmente críticas de ocurrencia, y de densidad de incendios de interfaz. Los casos más graves se concentran en aquellas áreas de mayor concentración de población y que presentan condiciones topográficas y de vegetación que dificultan las labores de extinción frente a un potencial incendio. Sumado a ello se presenta el problema un crecimiento urbano en superficie y densidad que sobrepasa las capacidades de habitabilidad en zonas que no se encuentran pensadas para una expansión urbana tan acelerada. Uno de los aspectos que actualmente Chile se encuentra en profunda revisión, son los planes y programas de reconstrucción de viviendas sociales, que son aquellas que actualmente se localizan en áreas de alto peligro de incendios. Actualmente existen en Chile muchas zonas de interfaz que se encuentran en un precario nivel de planificación, y que poseen debilidades en la atención de emergencias producidas por la acción descontrolada del fuego.

Cuadro 1.- Estadísticas de ocurrencia de incendios forestales y superficies afectadas en Chile. Últimos 34 años. Fuente: Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2014).

Año	Nº Incendios	Sup (ha)	Promedio (ha)	Año	Nº Incendios	Sup (ha)	Promedio (ha)
1980	2.977	22.535	7,6	1998	5.332	90.888	17,0
1981	4.197	32.056	7,6	1999	6.831	101.691	14,9
1982	4.520	26.842	5,9	2000	5.252	17.183	3,3
1983	4.782	45.748	9,6	2001	5.376	10.921	2,0
1984	6.252	80.191	12,8	2002	6.701	90.069	13,4
1985	5.223	47.572	9,1	2003	7.572	41.988	5,5
1986	5.421	67.414	12,4	2004	6.430	50.687	7,9
1987	5.195	97.055	18,7	2005	6.653	65.300	9,8
1988	5.202	84.900	16,3	2006	5.396	19.322	3,6
1989	5.241	88.062	16,8	2007	5.143	43.384	8,4
1990	4.114	25.545	6,2	2008	6.975	42.037	6,0
1991	5.194	50.273	9,7	2009	6.157	64.223	10,4
1992	4.788	24.224	5,1	2010	4.069	58.364	14,3
1993	6.118	49.981	8,2	2011	4.952	47.035	9,5
1994	6.214	65.606	10,6	2012	5.509	90.279	16,4
1995	5.356	26.174	4,9	2013	5.651	17.109	3,0
1996	5.886	40.081	6,8	2014	6.264	105.993	16,9
1997	5.493	43.592	7,9	Media	5.498	53.552	9,6

Al revisar las cifras de ocurrencia y hectáreas afectadas, llama la atención que la temporada 2014 fue la que reportó la mayor cifra de daños en extensión de área quemada. Ello sucedió en gran medida por las severas condiciones de peligro que se acumularon tras una larga sequía que afectó a la región centro-sur de Chile por más de cinco años. Esta situación también tuvo consecuencias en el alza del nivel de riesgo y peligro de la propagación del fuego en zonas de interfaz. Como ha sucedido todos los años en el país, normalmente una proporción reducida de incendios se localizan en áreas de contacto urbano-forestal; no obstante, los sostenidos niveles de ocupación del suelo y la creciente demanda por bienes y servicios derivados de los bosques, dio como resultado un aumento en los niveles de severidad del comportamiento del fuego (figura 1), aún cuando las cifras de ocurrencia no han experimentado variaciones significativas en los últimos años, situándose en un promedio de 5.498 eventos por año a nivel nacional.

Figura 1.- Visión general de un sector afectado por el incendio de Valparaíso en abril de 2014. Se muestra la destrucción casi total en sectores de altas pendientes.
Fotografía: Conaf, 2014.

En el ámbito de la prevención de riesgos, la mayor parte de las disposiciones legales están orientadas a la investigación de causas de incendios y también en el análisis interno de aspectos preventivos locales, siempre basado en la coyuntura del momento, pero con escasos proyectos que aborden la educación sea preescolar, básica o media, como una vía fundamental para crear conciencia sobre la necesidad de proteger los recursos naturales renovables. Otra debilidad que se manifiesta en el ámbito de incendios es la escasa aplicación de las normativas vigentes respecto al manejo de la vegetación inflamable en zonas de interfaz y en la asignación de responsabilidades respecto a quién le compete ejecutar labores de construcción y manutención de cortafuegos como una medida necesaria para mantener controlado los niveles de peligro en la propagación del fuego. Estos antecedentes se encuentran informados con mayor detalle en Castillo (2012, 2013, 2014).

Organizaciones para la Protección Contra Incendios Forestales

Corporación Nacional Forestal (CONAF)

Desde su creación, en 1972, CONAF ha cumplido el rol de organismo técnico en protección contra incendios forestales. Le corresponde programar y ejecutar acciones que propendan a la protección de los recursos forestales, de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente. CONAF administra un Programa Nacional de Protección Contra Incendios Forestales, mediante la organización y funcionamiento de programas regionales mediante los cuales se llevan a cabo las principales acciones de prevención y combate bajo un régimen descentralizado y de alta autonomía.

Bajo su responsabilidad, le ha tocado coordinar innumerables incendios de interfaz de distintas magnitudes y escalas de complejidad, destacándose por la alta eficiencia en la asignación de tareas y protocolos de acción para hacer frente a complicados incendios. Los casos más destacados en Chile se concentran en las regiones de Valparaíso, Bío Bío y la Araucanía, todas caracterizadas por una alta ocurrencia de incendios de interfaz. A través de acuerdos de colaboración recíproca e instancias de coordinación, se llevan a efecto diversas acciones conjuntas tales como campañas de prevención, detección y operaciones de combate. Igualmente, los programas regionales de Protección de CONAF están integrados al Sistema de Planes ACCEFOP, cumpliendo la tarea de gabinete técnico en la coordinación operativa para situaciones de emergencia forestal que opera Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) en todo el país.

Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI)

Le corresponde canalizar los esfuerzos del Gobierno, a través del Ministerio del Interior, tanto en el ámbito nacional como regional, destinados a planificar y coordinar el empleo de recursos públicos con el fin de prevenir y atender las emergencias y desastres de origen natural o antrópico. Desde 1993, ONEMI aplica protocolos específicos para las situaciones de emergencia, basada en los principios de Ayuda Mutua y Uso Escalonado de Recursos, que sustentan al Sistema de Protección Civil. Destaca el Plan de Coordinación Operativa para Situaciones de Emergencia Forestal, y que esencialmente está referido a la prevención y combate de incendios forestales de magnitud, los que por su extensión o valores afectados, amenacen la vida, salud o bienes de las personas, centros poblados, obras públicas, bosques y áreas silvestres protegidas. Las Direcciones Regionales de ONEMI, con el apoyo de las autoridades de Gobierno Interior convocan

a las diversas organizaciones públicas que pueden colaborar en el control de las emergencias que se presentan, que incluyen a Carabineros, Fuerzas Armadas, Obras Públicas, Salud, entre otras, como así también aquellas otros servicios de utilidad pública como Cuerpos de Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil.

Policía Forestal de Carabineros

Es el organismo encargado de la investigación de causas de incendios y la fiscalización del cumplimiento de la legislación sobre incendios forestales y uso del fuego en zonas rurales. Le compete activa participación en situaciones donde la investigación en terreno resulta clave para dirimir y establecer eventuales responsables en la propagación del fuego. Existen casos en donde la actuación de la policía forestal ha aportado antecedentes respecto al origen del incendio y sus características originales en la propagación del fuego. La investigación de causas es clave para establecer eventuales responsables y apoyar a los procesos legales de identificación de culpables en una causa policial. En el caso de incendios de interfaz, la Policía Forestal ha permitido esclarecer variados casos de hechos intencionados que terminaron con el desarrollo de un grave incendio en la zona urbano-rural.

Compañías de Bomberos

Los bomberos han cumplido históricamente una importante labor en el combate de incendios forestales en sectores peri-urbanos de grandes ciudades, o de zonas rurales donde existe un alto riesgo a centros poblados. En el pasado incendio de Valparaíso (abril de 2014) desempeñaron una labor fundamental para que los daños producidos por la combustión masiva de casas, no hubiesen sido aún mayores. En Chile, las compañías de bomberos están integradas por voluntarios que incluso aportan cuotas personales en dinero para colaborar con su autofinanciamiento, porque la asignación que éstas organizaciones reciben desde el Estado es muy baja. Aún así, el cuerpo de bomberos de distintas compañías municipales destaca por su alto grado de compromiso con la protección civil, y se integran comúnmente a los operativos de extinción de incendios con otros organismos tales con CONAF, Carabineros, Fuerzas Armadas y voluntarios de otras instituciones de protección. En el contexto de la gestión institucional, las Compañías de Bomberos se encuentran consideradas transversalmente en todos los protocolos de protección y atención de emergencias en eventos de incendios de interfaz.

Otras Organizaciones Públicas y Privadas

Chile dispone de otras organizaciones que apoyan activamente a los sistemas de protección civil contra incendios de interfaz, y en general, en incendios forestales. Los planes de emergencias normalmente son atendidos directamente por ONEMI, quien se encarga de coordinar las acciones y tareas de Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Defensa Civil, Servicios Meteorológicos, Servicios de Salud, Clubes aéreos y el apoyo de los servicios públicos tales como electricidad y agua potable. En casos de alerta roja activada por incendios catastróficos, la condición de riesgo a la población civil se enfrenta mediante el funcionamiento de protocolos de intervención en forma gradual y progresiva, dependiendo de las demandas zonales y la disponibilidad técnica de recursos de extinción y presupuestos de emergencia. En el caso de las faenas de evacuación, también de reconstrucción y alertas sanitarias, se activan estas organizaciones para apoyar a las instituciones principales antes mencionadas. Este apoyo se verifica tanto a nivel nacional, en lo que respecta a la formulación de políticas, estrategias globales y en el diseño e implementación de acciones

técnicas específicas, como también en el ámbito regional, en el que mayormente está referido a acciones específicas de prevención y combate.

La planificación territorial: un complemento necesario

Chile presenta un alto estándar en cuanto a niveles de organización y atención de emergencias, incluso valorado a nivel internacional. Aún así, persisten serias deficiencias en aspectos de planificación territorial, labor que compete a las autoridades regionales encargadas de la gestión de espacios habitados en zonas de interfaz, particularmente los Municipios y Gobiernos Regionales. Dicho de otra forma, los esfuerzos en la gestión institucional que acá se han explicado, deben ir necesariamente coordinados con las actividades de distribución del espacio habitable mediante una adecuada planificación en Prioridades de Protección. Este aspecto se considera como una de las principales deficiencias, y en la cual existe mucha tarea por realizar. Como factor de riesgo permanente, se describen a continuación las principales referencias que debieran orientar una mejor gestión del riesgo de incendios.

Actualmente el país se enfrenta a una nueva temporada de incendios 2014-2015 con el desafío de incorporar mejoras al actual sistema de prevención y coordinación de tareas para el combate de incendios de interfaz, en atención a la fatal experiencia sucedida el pasado 14 de abril en Valparaíso. Por lo anterior, se considera que las instituciones del Estado acá descritas, han realizado sus acciones en concordancia con los actuales niveles presupuestarios, marco legal de acción y competencias profesionales que han puesto al servicio de la protección civil. Aún cuando en este ámbito también será necesario incorporar mejoras e innovación en conocimientos y pautas de acción, el problema de la protección y gestión del riesgo debe ir en función de las actuales políticas que se están aplicando al ordenamiento del espacio habitable.

Existen graves falencias en los planes comunales de ordenación, ya que la expansión inorgánica de la interfaz crece a mayor velocidad que la infraestructura de servicios básicos. Adicionalmente existe un problema de densidad poblacional que tampoco se ha contemplado dentro de los planes de expansión y carga potencial del suelo habitable. El tema sobre el tipo de viviendas a construir y el manejo de la vegetación combustible, sin lugar a dudas que aportarán a mejorar el entorno, pero son medidas que están lejos de ser la solución al problema de fondo.

Adicionalmente existen claras evidencias del aumento en la severidad del comportamiento del fuego y un incremento de la piromanía; junto a debilidades en el actual sistema legal de sanciones. Es urgente diseñar planes de preataque y de coordinación de tareas con los medios de combate aéreos y terrestres e intentar minimizar aún más los tiempos de respuesta en el arribo de los medios de extinción. Sin embargo, la precariedad de la red de caminos y la dificultad de acceso de camiones aljibe a los sectores amagados por el fuego atenta contra las mejoras. En forma paralela es necesario efectuar una revisión exhaustiva del estado de la vegetación de propietarios privados, por cuanto a través de esos terrenos se desarrollan muchos vectores de propagación del fuego. La erradicación de casas en muchas áreas de comprobado peligro es necesaria, y aunque sea una medida dolorosa y políticamente incorrecta, es el camino a seguir.

Para finalizar, es necesario señalar que estas medidas no competen necesariamente a la gestión institucional de los organismos de defensa acá descritos, pues ellos se encargan de la protección de la población que ya se encuentra instalada en zonas de riesgo. Aún así, siempre será necesario disponer de todos los antecedentes respecto a la localización y niveles de vulnerabilidad de la población sujeta al peligro en la propagación del fuego, de manera que las acciones a ejecutar

por parte de CONAF, ONEMI y organismos asociados sea aprovechada de la mejor forma posible.

Conclusiones

La gestión del territorio debe siempre cautelar en primera instancia, que los servicios ambientales y económicos sean garantizados para la población que vive en él. Esto considera también la protección contra el riesgo de fenómenos naturales y antrópicos, como es el caso de los incendios forestales.

La actual legislación chilena no es clara respecto a las políticas que se deben aplicar para la ordenación del espacio habitable, especialmente cuando la velocidad del crecimiento urbano supera la capacidad de respuesta en infraestructura para abastecer adecuadamente una demanda de ocupación, específicamente en lo referido a obras de caminos, fuentes de agua y una adecuada manutención de la vegetación localizada en zonas de interfaz. Este fenómeno se repite en la totalidad de las regiones de Chile Central, y se instala como un tema de discusión frente a las futuras normas y ordenanzas municipales, especialmente en períodos de alta ocurrencia de incendios forestales.

Bibliografía

- Castillo, M. (2014) Especialistas formulan serios reparos respecto a cómo se enfrentan los incendios. *El Mercurio de Valparaíso*. Noticia 6 de enero. Págs. 2 y 3.
- Castillo, M. (2013) Responsabilidad de las autoridades regionales por el grave problema de incendios forestales. *El Mercurio de Valparaíso*. Noticia 11 de marzo. Pág.8.
- Castillo, M.; Correa, L. (2013) Incendios forestales en Valparaíso-Viña del Mar. Una zona geográfica de extrema gravedad. *Chile Forestal*. N°366. Págs.42-44.
- Castillo, M; Julio, G. (2012) Forest fires in wildland-urban interface. Analysis and proposed actions. Case study: Central Chile - South America, *Wildfire and Community: Facilitating preparedness and resilience*, Springer, Ill., (hard) ISBN 978-0-398-08842-X (*paper*) ISBN 978-0-398-08843-9 (*e-Book*) ISBN 978-0-398-08844-6, Charles C. Thomas Publisher, Springfield - Illinois., 2012.
- Castillo, M.; Correa, L. (2012) Acciones para la disminución del peligro de incendios forestales. Estudio de caso. Provincia de Valparaíso, Chile Central. *Territorium*. 19, (95-100).

TRAGEDIA DE UN INCENDIO ANUNCIADO: EL CASO DE VALPARAÍSO, CHILE CENTRAL

Miguel Castillo S.

Laboratorio de Incendios Forestales. Universidad de Chile.
migcasti@uchile.cl

Luis Correa J.

Corporación Nacional Forestal. Región de Valparaíso - Chile
luis.correa@conaf.cl

RESUMEN

Cumplíéndose todo pronóstico de riesgo y peligro de incendios forestales, en el mes de abril de 2014 se produjo un grave y devastador incendio de interfaz, que incluso obligó al Gobierno de Chile a decretar el status de Estado de Catástrofe, para de esa manera activar los mecanismos de atención de emergencias y el apoyo en presupuesto necesario para poder mitigar las graves consecuencias del incendio. El balance final dejó como resultado 2.900 casas destruidas, 15 muertos, casi 1.000 hectáreas quemadas y enormes daños ambientales, todo producto de un descontrolado incendio de interfaz cuyo origen fue en zonas rurales. Este artículo describe y explica los acontecimientos y factores que promovieron el desencadenamiento de esta tragedia a la población civil. En la sección final del análisis se exponen las pautas técnicas que condicionan el nivel de riesgo en estas áreas y cómo debería enfrentarse el problema frente a potenciales incendios en el futuro.

Palabras clave: incendios forestales, interfaz urbano-forestal, protección civil, riesgo de incendios, propagación del fuego.

Introducción

Chile es un país de Sudamérica que se encuentra permanentemente afectado por incendios de interfaz urbano-forestal, especialmente en aquellas áreas en donde la presión por uso del suelo se ha hecho evidente frente a la creciente demanda de bienes y servicios derivados de los bosques y su entorno.

Aún cuando el sistema público y privado de protección contra incendios forestales en Chile ha presentado importantes mejoras en cuanto a nivel de conocimientos, desarrollo tecnológico, dotación de medios para la organización y combate de incendios, persiste el problema de la intencionalidad en la ocurrencia de graves incendios y en debilidades del sistema legislativo que sanciona delitos asociados al uso irresponsable del fuego, y también en las políticas territoriales destinadas a organizar la ocupación del suelo. Este último aspecto ha propiciado un fuerte aumento en los niveles de vulnerabilidad de muchas áreas de interfaz que se presentan en Chile, y que normalmente concentran los mayores daños a la calidad de vida de los habitantes. En general se evidencia un notable aumento en los niveles de gravedad y el comportamiento extremo del fuego en áreas de interfaz. El cambio climático también ha aportado a esta realidad, aún cuando no existen referencias científicas suficientes para demostrarlo, la tendencia es clara y evidente en zonas en donde antes no sucedían episodios tan severos de incendios.

Un riesgo anunciado que se transformó en catástrofe

El problema de los incendios forestales de interfaz en Chile pasó a cobrar mayor relevancia a consecuencia de un grave incendio ocurrido en Valparaíso el pasado 14 de abril de 2014. Se describe este caso como un incendio anunciado, por cuanto existían antecedentes fundamentados

que la gran acumulación de energía proveniente del material combustible vegetal y urbano iba a liberarse violentamente si se daban las condiciones meteorológicas y de predisposición al peligro en la propagación del fuego. Lamentablemente las advertencias iniciales no fueron suficientes para preparar adecuadamente los mecanismos de prevención de desastres. Como resultado, en aquel incendio se quemaron 2.900 viviendas, hubo 15 muertos, decenas de heridos y animales de propietarios muertos o gravemente heridos por el incendio. La superficie afectada fue de 965 hectáreas, que aunque al parecer puede considerarse pequeña en relación a otros incendios, tuvo niveles de severidad nunca antes visto en estas latitudes, por que pasó a ser el incendio más grave ocurrido en la historia de Chile.

Mediante distintos medios de evaluación geográfica, se ha constatado que si bien es cierto la interfaz urbano forestal de Valparaíso y Viña del Mar ha experimentado una expansión territorial hacia terrenos localizados en zonas altas de cerros, lo que se ha visto mayormente es el aumento en la densidad de casas por metro cuadrado de interfaz que se han ido construyendo en estas áreas, incluso afectadas por incendios en años anteriores. Mediciones efectuadas mediante visitas a campo y por medios satelitales muestran un aumento en la cantidad de metros cuadrados de construcción en una misma unidad de superficie, generalmente a base de materiales de construcción ligeros altamente inflamables. Mediciones efectuadas por Conaf y la Universidad de Chile, constatan la existencia de áreas particularmente críticas en donde deben concentrarse las labores de protección (figura 1). Estas áreas comprometen la interfaz de Valparaíso y Viña del Mar, más un territorio boscoso que necesariamente debe ser incluido en las labores de silvicultura preventiva. Referencias que respaldan este tipo de estudios pueden encontrarse en Castillo (2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

Figura 1.- Las zonas destacadas en rojo corresponden a las áreas de mayor peligro en la propagación del fuego, y que conectan directamente con áreas densamente pobladas.

Fuente: Los autores.

Las variables y factores de predisposición

Un análisis más detallado de la situación antes y después de incendios, demuestra que ciertamente hubo variables y factores del territorio que no fueron tratados con la debida seriedad, anticipación

y compromiso, principalmente por las autoridades regionales que disponían de toda la información histórica respecto a incendios de interfaz y también las consecuencias que trae consigo la propagación descontrolada del fuego a pocos instantes de su inicio. Por lo anterior, se enuncian y describen los principales aspectos que participan en el grado de severidad del comportamiento del fuego, y la vulnerabilidad de la población. Los comentarios aquí expuestos y las recomendaciones, se hacen en función de las experiencias obtenidas de sucesivos incendios históricos de similares características ocurridos en áreas de interfaz.

Vegetación combustible.

El manejo de la vegetación en zonas de interfaz es una actividad crucial en la gestión contra el fuego, pues permite aminorar el factor de peligro potencial producto de la combustión. Corresponde a una actividad que debe realizarse en forma anticipada, programada, sistemática y enmarcada dentro de las labores preventivas, lo cual supone un alto grado de organización y de asignación de presupuesto. Normalmente esta actividad es encomendada a los Municipios, quienes se encargan de disponer de todos los medios en terreno, basado en un estudio técnico respecto a las áreas, intensidades de intervención, ancho de despeje y criterios de altura de la vegetación y la pendiente del terreno. Corresponde básicamente a un cronograma de limpieza y corta de vegetación.

En el contexto de este artículo, lo que ocurrió fue que las labores sobre la vegetación fueron parciales e insuficientes, pues no fueron ejecutadas de manera oportuna, lo que llevó a un incremento violento de los niveles de peligro en el comportamiento potencial del fuego al no existir una barrera de corte de combustible. Adicionalmente en la zona de Valparaíso-Viña del Mar, se han identificado cientos de focos de micro basurales que se localizan en fondos de cerros y que se mezclan con vegetación densa, lo que actualmente agrava aún más la condición de peligro.

Topografía

Otro factor que se hace presente en la propagación de las llamas, es la pendiente del terreno, por cuanto se constituye en un factor topográfico que al combinarse con la acción favorable del viento, produce una inclinación de las llamas y con ello el rápido avance del fuego. En áreas escarpadas usualmente se instalan viviendas de material muy ligero y de alta inflamabilidad, lo cual favorece el abastecimiento de oxígeno y potencial calorífico necesario para ocasionar incendios explosivos que normalmente avanzan hacia las partes más altas de los cerros. En otros casos el viento errático permite que por la acción combinada de la topografía y vientos, se produzcan avances en retroceso, es decir, en el flanco contrario al eje de mayor velocidad de avance. Este factor evidentemente que no es posible controlarlo con tareas sobre modificación del paisaje, pero sí otorga la visión necesaria para poder establecer las áreas en las cuales se pueden establecer viviendas y en donde no se puede. Este ha sido un problema histórico en los incendios de interfaz pues la ocupación del suelo en áreas periféricas no ha considerado el factor topográfico en la propagación potencial del fuego.

Viento

Este factor es ciertamente uno de los más decisivos en la dirección de avance del fuego y en la tasa de avance cuando su acción se hace permanente en un tiempo prolongado. Es otro aspecto que tampoco puede ser controlado por el hombre en forma directa, pero sí considerado para el establecimiento de programas preventivos que busquen disminuir el peligro potencial de la propagación del fuego.

En el incendio de Valparaíso, se originaron rachas permanentes de vientos superiores a los 40-50 km/hora, que favorecieron la inclinación de las llamas, favoreciendo los principales frentes de avance del fuego. Ante tal fenómeno, las actividades de contención del incendio se vieron sobrepasadas por cuanto la tasa de avance en perímetro fue muy superior a la capacidad de respuesta de los medios de extinción.

En términos de planificación territorial, la variable de velocidad y dirección del viento y su acción en laderas, debe ser considerada para el establecimiento de áreas de mayor o menor peligro. Actualmente no se ha incluido este criterio, operando solamente los mecanismos de reacción frente a los principales vectores de avance del fuego.

La localización de viviendas e infraestructura básica

La instalación de viviendas debe efectuarse siempre cautelando en primer lugar la protección civil de la población. Luego de ello, es necesario realizar un análisis exhaustivo de las condiciones del entorno y su relación con la minimización de factores que puedan ocasionar algún grado de riesgo, en este caso, los incendios forestales.

Por lo explicado al inicio de este texto, el problema que ha sucedido en la gravedad de los incendios ha sido la escasa preocupación en materia de ordenación del espacio habitable y en la casi inexistente coordinación entre aumento poblacional y demanda de bienes y servicios básicos como agua, infraestructura vial y accesibilidad. Este es un problema actualmente sensible en muchas zonas de interfaz de Chile Centro Sur, pero que se ha hecho más evidente en el área de Valparaíso y Viña del Mar.

En relación a las viviendas, se han efectuado importantes avances tecnológicos en cuanto al desarrollo de prototipos de emergencia para su fácil instalación, como una acción mitigadora al daño producido por el fuego a muchas familias que lo perdieron todo. No obstante ello, no se ha resuelto el problema más de fondo, y que tiene relación con la aplicación de programas de erradicación y relocalización de familias hacia otras áreas con menor peligro de incendios. Como toda decisión, la voluntad política resolvería este tipo de temas, sobre todo cuando se trata de resguardar la protección civil.

Los tiempos de respuesta

Uno de los aspectos operativos que más incide en el éxito de las intervenciones de los medios de extinción a las áreas afectadas por el fuego es el tiempo de respuesta o llegada. En el incendio de Valparaíso, las severas condiciones de propagación y el combustible disponible, superaron toda posibilidad de ataque oportuno, por cuanto se desarrollaron múltiples frentes de avance del fuego. En este caso la oportunidad de respuesta sólo pudo manejarse con cierto margen de rapidez mediante el ataque masivo con medios aéreos.

Aspectos a considerar para una gestión futura del territorio

Como acciones a considerar para una gestión en este tipo de territorios, lo primero a considerar es la extracción de experiencias y lecciones de eventos ocurridos en el pasado. El incendio de Valparaíso y otros tantos que han ocasionado enormes daños, plantean oportunidades para revisar y mejorar los mecanismos de gestión y defensa. Se exponen brevemente los principales aspectos a considerar:

Aspectos de espacio y localización

Todo espacio habitable debe considerar una capacidad de carga que vaya en concordancia con el uso que se le otorgará al suelo. El crecimiento en área y perímetro va ligado directamente también a la calidad de los suelos, la posibilidad de adaptaciones a cambios en el uso mismo y en la integración de actividades que no pongan en riesgo la sustentabilidad habitable.

Aspectos estructurales y de servicios básicos

El crecimiento de la población y la demanda habitacional no debe superar en velocidad de desarrollo, a la infraestructura de servicios básicos tales como el abastecimiento de agua potable, red de grifos para la atención de emergencias, y una accesibilidad razonable para la entrada de los medios terrestres que se encargan de combatir el fuego. En el contexto del incendio acá analizado, estos aspectos se constituyeron en enormes debilidades, contribuyendo ciertamente en el aumento de los niveles de daño que se reportaron en la zona afectada por el fuego.

Consideración y estudio previo de las medidas técnicas a aplicar sobre la vegetación combustible

Es razonable pensar que la solución al problema pasa en gran medida por establecer grandes barreras de cortafuegos, podando y/o extrayendo masivamente especies arbóreas y/o arbustivas de alta inflamabilidad y que podrían constituirse en un peligro para la interfaz. Sin embargo, cualquier decisión técnica debe sustentarse en los costos y plazos de cumplimiento que este tipo de medidas genera al aplicarlas en terreno. Adicionalmente es necesario disponer de un equipo organizado para este tipo de tareas y un consistente programa de mantenimiento y supervisión de obras.

Otras consideraciones

Existen aspectos de coordinación, sectorización, protocolos, mecanismos de alerta y de actuación frente a emergencias que forman parte esencial de un programa de protección y defensa contra incendios. En cuanto a coordinación, resulta necesario diseñar y aplicar planes de preataque a distintas escalas geográficas, en cuyo caso es primordial establecer tareas y grados de responsabilidad para cada tipo de institución encargada de garantizar la protección de la población civil. En muchos casos las labores se realizan en forma paralela conforme se desarrolla el incendio, o el conjunto de eventos simultáneos. En este mismo punto, es primordial además establecer una evaluación previa de los sectores con mayor vulnerabilidad potencial a modo de proponer una sectorización y grado de priorización de actuaciones. En este ámbito la Corporación Nacional Forestal de Chile se encuentra en proceso de elaboración de Planes de Preataque y que tienen como objetivo planificar en forma anticipada y coordinada las acciones y estrategias a seguir frente a la declaración de emergencias. Para ello ya se dispone de mapas cartográficos con la calificación de las áreas prioritarias para la protección contra incendios de interfaz, construidas a base del análisis del riesgo, peligro y vulnerabilidad potencial.

Conclusiones

El incendio de Valparaíso fue calificado por los autores de este texto como un episodio anunciado, por cuanto se contaba con antecedentes suficientes que hacían suponer la ocurrencia de un incendio de características catastróficas. Como lección aprendida de esta experiencia puede

señalarse que la labor preventiva, la educación ambiental y el resguardo a la población civil no deben constituirse en esfuerzos aislados, sino que por el contrario, adecuadamente coordinados y con activa participación ciudadana. Es necesario asumir que los niveles de severidad de los incendios serán cada vez mayores conforme se confirman las evidencias del cambio climático, la expansión de territorios y la creciente demanda de bienes y servicios derivados de los bosques. Chile se encuentra en el inicio de un nuevo mandato presidencial y muchos proyectos institucionales que hacen pensar que se efectuarán importantes cambios para resguardar aún más el sistema de protección civil que actualmente opera en este país.

Bibliografía

- Castillo, M. (2014) Especialistas formulan serios reparos respecto a cómo se enfrentan los incendios. *El Mercurio de Valparaíso*. Noticia 6 de enero. Págs. 2 y 3.
- Castillo, M. (2013) Integración de variables y criterios territoriales como apoyo a la protección contra incendios forestales. Área piloto: Valparaíso - Chile Central. Tesis Doctoral. ETSIAM. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes. Córdoba - España. 247p.
- Castillo, M. (2013) Los incendios forestales aumentan y el cambio climático también. Columna de opinión. *Vida Actual. El Mercurio*. Noticia 14 de diciembre. Pág.6.
- Castillo, M. (2013) Responsabilidad de las autoridades regionales por el grave problema de incendios forestales. *El Mercurio de Valparaíso*. Noticia 11 de marzo. Pág.8.
- Castillo, M.; Correa, L. (2013) Incendios forestales en Valparaíso-Viña del Mar. Una zona geográfica de extrema gravedad. *Chile Forestal*. N°366. Págs.42-44.
- Castillo, M.; Garfias, R.; Julio, G.; Correa, L. (2013) Incendios forestales en Chile. Análisis general de riesgos. Capítulo Libro '*Riscos: Naturais, Antrópicos e Mistos*'. Faculdade de Letras. Pp.639-650. ISBN 978-989-96810-1-9.;p667-678. Universidade de Coimbra. Portugal.
- Castillo, M.; Molina, J-R; Rodríguez y Silva, F.; Julio, G. (2013) Fire vulnerability model in Mediterranean ecosystems of South America. *Ecological Informatics*. 13 (2013) 106-113. Elsevier.
- Castillo, M.; Julio, G. (2012) Forest fires in wildland-urban interface. Analysis and proposed actions. Case study: Central Chile - South America, *Wildfire and Community: Facilitating preparedness and resilience*, Springer, Ill., (hard) ISBN 978-0-398-08842-X (paper) ISBN 978-0-398-08843-9 (e-Book) ISBN 978-0-398-08844-6, Charles C. Thomas Publisher, Springfield - Illinois., 2012.
- Castillo, M.; Garfias, R.; Julio, G.; González, L. (2012) Análisis de grandes incendios forestales en la vegetación nativa de Chile. *Interiencia* 37(11) 796-804.
- Castillo, M. (2012) Identification and assessment of areas at risk of forest fire using fuzzy methodology. *Journal of Applied Geography*. 35(2012) 199-207. Elsevier.
- Castillo, M.; Correa, L. (2012) Acciones para la disminución del peligro de incendios forestales. Estudio de caso. Provincia de Valparaíso, Chile Central. *Territorium*. 19, (95-100).
- Castillo, M. (2012) Los incendios forestales en Chile. Un problema permanente y creciente. Ambiente Forestal. Revista de Extensión de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Vol.7, N°12. Págs.28-32.
- Castillo, M.; Julio, G.; Quintanilla, V. (2011) Vulnerabilidad y daño potencial ocasionado por incendios en áreas de interfaz urbano-forestal. Provincia de Valparaíso. Chile Central. *Territorium*. 18 (247-254).
- Castillo, M.; Garfias, R. (2010) Estudio del comportamiento del fuego mediante simulación de incendios forestales en Chile. *Geographicalia*. 58, (81-103).

MODIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES HIDRÁULICAS DOS SOLOS DA SERRA ALGARVIA DEVIDO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS

Rui Lança

Instituto Superior de Engenharia, Universidade do Algarve
rlanca@ualg.pt

Vera Rocheta

Instituto Superior de Engenharia, Universidade do Algarve
vrocheta@ualg.pt

Fernando Martins

Instituto Superior de Engenharia, Universidade do Algarve
fmmartin@ualg.pt

Helena Fernandez

Instituto Superior de Engenharia, Universidade do Algarve
hfernand@ualg.pt

Elisa Silva

Instituto Superior de Engenharia, Universidade do Algarve
esilva@ualg.pt

Celestina Pedras

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve
cpedras@ualg.pt

RESUMO

Os incêndios florestais produzem um solo extremamente seco coberto por cinza, resultante da combustão do coberto vegetal, que quando exposto a precipitações intensas pode dar origem a inundações extremas. As inundações após incêndio poderão estar relacionadas com a diminuição da capacidade de infiltração do solo, efeito resultante da colmatação e preenchimento por compostos voláteis dos poros e depósito da camada de cinza na superfície. Para caracterizar a condutividade hidráulica, k_s , e a sorvidade, S , foram realizados ensaios laboratoriais com um infiltrómetro de duplo anel em amostras de solo não perturbadas.

Para o efeito foram recolhidas 4 amostras não perturbadas de solo característico da serra algarvia, com as dimensões 50x50x25 cm. Sobre 3 amostras, foram colocadas diferentes quantidades de material combustível, conduzindo a diferentes quantidades de cinza. Posteriormente, foram realizados ensaios com um infiltrómetro de duplo anel na amostra de referência não ardida e nas 3 amostras afetadas pelo incêndio simulado em laboratório. Os resultados mostram diferentes valores de k_s , S e consequentemente diferentes valores da capacidade de infiltração do solo.

Palavras-chave: condutividade hidráulica; sorvidade; incêndio; solos ardidos.

Introdução

Os incêndios florestais induzem alterações no ciclo hidrológico através da diminuição da capacidade de infiltração do solo, aumento do volume e da velocidade do escoamento superficial, o que leva à diminuição do tempo de resposta da bacia hidrográfica e aumento do caudal de ponta de cheia. Estas alterações aumentam a vulnerabilidade de pessoas e bens às inundações.

A infiltração pode ser separada nos termos relativos à resposta curta e longa. A resposta curta depende da sorvidade, S , e reflete o potencial de capilaridade. A resposta longa depende da condutividade hidráulica, k_s , e reflete o potencial por gravidade (Philip, 1957; Smith, 2002). Estas relações podem ser modeladas pela equação de Richardson, contudo, a solução analítica

difícilmente obtém com exatidão a resposta de solos sujeitos ao calor, compostos químicos voláteis e cinzas geradas pelos incêndios florestais.

O calor a que o solo está sujeito durante um incêndio florestal é essencialmente gerado pela combustão da manta morta e pela vegetação de pequeno porte próxima da superfície (Ryan, 2002) e depende da carga de combustível e da duração da combustão. O fluxo de calor pode aumentar a repelência à água, na medida em que retira a água adsorvida no solo e volatiliza compostos químicos que penetram nos poros e condensam durante o arrefecimento, revestindo os mesmos. A cinza que se deposita na superfície também afeta a capacidade infiltração do solo.

O objetivo deste estudo foi a quantificação da variação da sorvidade e da condutividade hidráulica de um solo esquelético derivado de xistos, característico da serra algarvia, afetado por um incêndio em função de diferentes cargas de material combustível.

Instalações experimentais e procedimentos

Foram recolhidas 4 amostras de solo não perturbado na Serra do Caldeirão (coordenadas WGS84: 37°12'0.6''N; 7°55'32.5''W) e colocadas em caixas de chapa metálica com 50x50x25 cm. As amostras foram cortadas, confinadas lateralmente (Figura 1a) e cortadas pela base por cravação de estacas de madeira na horizontal (Figura 1b). Posteriormente, foi inserida a base da caixa, construída em chapa metálica perfurada, entre as estacas e a amostra de modo a permitir o transporte.

Figura 1 - Corte e preparação para transporte dos provetes

Os ensaios decorreram no Laboratório de Hidráulica do Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve. No Laboratório de Geotecnia desta mesma instituição determinou-se a granulometria do solo, verificando-se que este é constituído por 49% de cascalho anguloso, proveniente da erosão do xisto, 31% de partículas finas e 20% de areia. O ensaio granulométrico foi realizado após secagem do solo em estufa a 105°C±2°C, durante 24 horas. Recorrendo ao método “Loss-on-Ignition” determinou-se, de igual modo, a percentagem e a quantidade de matéria orgânica do solo (MOS) sobre 6 amostras, antes da combustão, tendo-se obtido uma média que ronda as 26,51gKg⁻¹, o que representa 2,65% em massa.

Os ensaios para determinação da condutividade hidráulica e sorvidade foram realizados sobre 4 amostras com diferentes massas de material combustível, *M*, constituído principalmente por estevas e tojo. Na amostra A não foi colocado qualquer tipo de material combustível, enquanto sobre as restantes foram incendiadas e queimadas as seguintes massas: *M* = 1 kg na amostra B, *M* = 2 kg na amostra C e *M* = 4 kg na amostra D. O Quadro I apresenta as variáveis características dos ensaios.

Quadro I - Variáveis características dos ensaios

Amostra	A	B	C	D
Material combustível total, <i>M</i> (kg)	0	1	2	4
Teor em água no solo após combustão (%)	2,49	2,02	1,73	1,55
Duração da combustão (min)	--	19	16	18
Temperatura máxima durante a combustão (°C)	--	> 300	> 300	> 300

A taxa de infiltração foi medida com recurso a um infiltrómetro de duplo anel (Figura 2a) com diâmetro interior 20 cm e diâmetro exterior 30 cm. Os anéis foram cravados até uma profundidade de 5 cm. Durante o ensaio foi mantida uma carga hidráulica constante sobre a superfície do solo de 3 cm, através de válvulas de nível, colocadas na alimentação ao anel interior e ao anel exterior (Figura 2b).

Figura 2 - a) Ensaio com um infiltrómetro de duplo anel;
b) esquema hidráulico dos ensaios

Foram realizadas medições do volume de água no reservatório que alimenta o anel interior a cada minuto durante a 1ª hora e a cada 5 minutos durante o resto do ensaio. Os ensaios tiveram durações aproximadas de 4 horas, instante a partir do qual a taxa de infiltração observada permaneceu aproximadamente constante.

Resultados e discussão

As taxas de infiltração observadas e as curvas $i = \varphi(t)$ obtidas por regressão logarítmica são apresentadas na Figura 3a. A Figura 3b apresenta as curvas de infiltração acumuladas, I , função da raiz quadrada do tempo, $t^{0.5}$. Da regressão polinomial de segunda ordem das curvas da Figura 3b, obtêm-se os valores da sorvidade, S , e condutividade hidráulica, k_s , atendendo a que (Moody et al. 2009):

(1)

Com o aumento do material combustível e consequente aumento da camada de cinzas depositadas sobre o solo, observa-se uma diminuição da condutividade hidráulica, devido à presença das cinzas e outros produtos resultantes da combustão, e um aumento da sorvidade, que se relaciona com diminuição do teor em água no solo devido às elevadas temperaturas a que este está sujeito durante o incêndio.

Figura 3 - a) taxa de infiltração, i ; b) infiltração acumulada, I como função da raiz quadrada do tempo, $t^{0.5}$

Os valores de condutividade hidráulica, k_s , e de sorvidade, S , estão apresentados no Quadro II. Os fatores da condutividade hidráulica, K_{ks} , e da sorvidade K_s , são função do material combustível, M , por unidade de área, $m = M/A$, e foram obtidos de acordo com, $K_{ks} = k_{s(m=x)}/k_{s(m=0)}$ e $K_s = S_{(m=x)}/S_{(m=0)}$ em que x representa um determinado valor de m . A aplicação dos fatores permitem corrigir os valores de referência de k_s e S dos solos não ardidos para solos ardidos em função de m .

Quadro II - Valores de condutividade hidráulica, k_s , e sorvidade, S , e respectivos fatores, K_{ks} e K_s

Provete	m (kg m ⁻²)	k_s (mm h ⁻¹)	S (mm h ^{-0.5})	K_{ks}	K_s
A	0	70.23	33.33	1.00	1.00
B	4	64.30	35.05	0.92	1.05
C	8	58.12	37.86	0.83	1.14
D	16	48.47	47.75	0.69	1.43

Os resultados obtidos para k_s e S poderão divergir dos resultados que se obteriam num ensaio de campo devido às diferentes condições de drenagem da base. Contudo é expetável que os fatores K_{ks} e K_s obtidos pelo rácio entre o respetivo ensaio e os resultados do ensaio de referência, amostra A, ambos realizados nas mesmas condições laboratoriais, traduzam o efeito da variação de k_s e S de forma eficiente. Serão necessários mais ensaios experimentais em laboratório e no campo para sugerir um previsor da variação da capacidade de infiltração do solo devido a um incêndio florestal.

Conclusão

As inundações pós-incêndio poderão estar relacionadas com a diminuição da capacidade de infiltração da água no solo, efeito quer da secagem do solo, quer da deposição de cinzas resultante da combustão do coberto vegetal. Este estudo permitiu caracterizar a condutividade hidráulica e a sorvidade do solo da serra algarvia antes e após um incêndio, em ensaios em laboratório, em amostras de solo não perturbadas com um infiltrómetro de duplo anel.

Os resultados mostram que o aumento do material combustível, consequente ao aumento da camada de cinzas depositadas sobre o solo, leva a uma diminuição da condutividade hidráulica e um aumento da sorvidade. Mais ensaios experimentais serão necessários para sugerir um previsor do efeito da massa de material combustível na capacidade de infiltração do solo após incêndio. Este tipo de estudo poderá assim contribuir para melhorar o conhecimento da resposta das bacias hidrográficas a precipitações intensas após incêndio.

Bibliografia

- Philip, J.R. (1957) - Theory of infiltration. In: Chow, V.T. (Ed.), Advances in Hydrosience, 5, New York . Academic Press, p. 215-296.
- Ryan, K.C. (2002) - Dynamic interactions between forest structure and fire behavior in boreal ecosystems, Silva Fennica, 36 (1), Vantaa, p. 13-39.
- Smith, R.E. (2002) - Infiltration theory for hydrologic applications. In: Smettem, K.R.J., Broadbridge, P., Woolhiser, D.A., (Eds.), Water Resources Monograph 15, American Geophysical Union, Washington, DC, 212 p.
- Moody, J.; Kinner, D. e Úbeda, X. (2009) - Linking hydraulic properties of fire-affected soils to infiltration and water repellency, Journal of Hydrology, 379, Philadelphia, p. 291-303.

ANÁLISE DE VULNERABILIDADE A INCÊNDIOS FLORESTAIS NA REGIÃO DO MINHO, PORTUGAL

António Bento-Gonçalves

Departamento de Geografia e CEGOT, Universidade do Minho
bento@geografia.uminho.pt

António Vieira

Departamento de Geografia e CEGOT, Universidade do Minho
vieira@geografia.uminho.pt

Adélia Nunes

Departamento de Geografia e CEGOT, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
adelia.nunes@fl.uc.pt

Luciano Lourenço

Departamento de Geografia e CEGOT, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
luciano@uc.pt

Sandra Oliveira

NICIF, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
sandra.oliveira@uc.pt

Fernando Félix

NICIF, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
ffelix@fl.uc.pt

RESUMO

A análise da vulnerabilidade é uma componente fundamental da avaliação de risco de incêndios, representando, em sentido lato, o potencial de perda de uma determinada área. No âmbito do projeto Europeu PREFER, está a ser desenvolvido um modelo de análise de vulnerabilidade para apoio à prevenção de incêndios na Europa Mediterrânea. A região do Minho, pelas suas características específicas e pela elevada incidência de incêndios florestais, é uma das áreas de estudo do projeto.

A abordagem conceptual da vulnerabilidade engloba três componentes: exposição, sensibilidade e capacidade de antecipação e resposta. Cada uma destas componentes foi, primeiro, analisada individualmente, através da agregação de variáveis estatísticas, cartográficas ou obtidas de imagens de satélite. Para além disso, foi também desenvolvido um mapa de valor económico dos elementos expostos, baseado em custos de recuperação de cobertura do solo e no preço dos alojamentos. O mapa de vulnerabilidade, resultante da integração e ponderação das diferentes componentes, mostra variações espaciais expressivas na região, indicando a necessidade de implementar medidas diversificadas para uma prevenção de incêndios mais eficaz.

Palavras-chave: exposição, sensibilidade, valor económico, vulnerabilidade

Introdução

Na Europa Mediterrânea, os incêndios florestais constituem um fator de preocupação, a nível da proteção florestal, mas também no que respeita à segurança das populações e da conservação dos seus bens (European Commission, 2012; Ganteaume et al., 2013; Oliveira, Lourenço, Pereira, & San-Miguel-Ayanz, 2013). Neste contexto, o desenvolvimento de ferramentas de apoio à decisão, para as diversas fases da gestão de incêndios, assume um papel fundamental. No âmbito do projeto europeu PREFER (“Space-based Information Support for Prevention and Recovery of Forest Fires Emergency in the Mediterranean Area”), a Universidade de Coimbra, em parceria com a Universidade do Minho, está a desenvolver um modelo de análise de vulnerabilidade, com o intuito de criar ferramentas cartográficas articuladas, para apoio à

implementação eficaz de medidas de prevenção de incêndios e preparação para situações de emergência. Em investigações recentes, o conceito de vulnerabilidade inclui múltiplas variáveis e componentes, refletindo diferentes dimensões: ambiental, social, económica e, até, institucional (Birkmann, 2007; Birkmann et al., 2013; Cutter, 2011; Cutter et al., 2008; Kumpulainen, 2006; Turner et al., 2003). O conceito de vulnerabilidade inclui também o nível de resiliência dos sistemas e comunidades, que deriva da capacidade destes lidarem com a ocorrência de um evento potencialmente danoso (Berkes, 2007; Lavorel, Flannigan, Lambin, & Scholes, 2006).

Este artigo descreve o modelo de análise de vulnerabilidade em desenvolvimento, tomando como exemplo a região do Minho, onde a interação dos sistemas antrópicos com as condições naturais contribui para uma elevada incidência de incêndios (Bento-Gonçalves, Vieira, Ferreira-Leite, Oliveira Martins, & Costa Silva, 2010; Nunes, Lourenço, Bento-Gonçalves, & Vieira, 2013). Os dados utilizados, as técnicas de processamento e a integração das variáveis são descritos. Os resultados preliminares da análise de vulnerabilidade para esta região, e alguns dos produtos cartográficos resultantes, incluindo o mapa de valor económico dos elementos expostos, são também apresentados.

Metodologia

A análise de vulnerabilidade integra três componentes: i) exposição - presença de pessoas, bens ou outros elementos em áreas sujeitas a um potencial incêndio; ii) sensibilidade - condições que reduzem ou aumentam a propensão dos elementos expostos para sofrerem determinado tipo e magnitude de danos; iii) capacidade de antecipação e resposta - atividades que aumentam a preparação, resiliência e capacidade de adaptação dos elementos expostos. A recolha de dados foi orientada por esta abordagem e, para cada componente, foram definidas variáveis que representam as diferentes dimensões da vulnerabilidade (ambiental, social ou económica). No quadro I, listam-se as variáveis disponíveis, até ao momento, e integradas na análise de vulnerabilidade para a região do Minho.

Quadro I - Parâmetros, dimensões e tipo de variáveis integradas na análise das componentes da vulnerabilidade a incêndios florestais

Parâmetros	Dimensão	Variáveis	Tipo
Exposição			
População	Social	Densidade populacional	Estatística
Uso/Cobertura do solo	Ambiental/Social	% Uso do solo, 6 categorias	Satélite; cartográfica
Áreas urbanas e edifícios	Social	Densidade de edifícios	Satélite; cartográfica
Infraestruturas	Social	Densidade de estradas	Satélite; cartográfica
Áreas naturais protegidas	Ambiental	% Ocupação por áreas protegidas	Cartográfica
Sensibilidade			
População	Social	% Idosos (> 65 anos)	Estatística
		% Pessoas com escolaridade primária	Estatística
		% Empregados setor primário	Estatística
Uso/Cobertura do solo	Ambiental/Social	Categorias de combustível florestal	Satélite; cartográfica
		Comportamento perante o fogo	Cartográfica
Áreas naturais protegidas	Ambiental	Número de classificações de proteção	Estatística; Car- tográfica
		Categoria IUCN (International Union for Conserva- tion of Nature)	
Capacidade de antecipação e resposta			
Infraestruturas	Ambiental/Social	% Estradas florestais por área florestal	Cartográfica
Recursos humanos	Social	Nº bombeiros por área florestal	Estatística

As variáveis foram transformadas em valores numéricos, sujeitas a análise multivariada, transformadas para uma escala comum (entre 0 e 1) e espacializadas à escala de 1 ha, através

de ferramentas SIG. A ponderação seguiu critérios específicos consoante a variável; por exemplo, a ponderação das categorias de cobertura do solo foi aplicada de acordo com a suscetibilidade a incêndios do tipo de vegetação correspondente, baseada em revisão de literatura {FormattingCitation}(Barros & Pereira, 2014; Carmo, Moreira, Casimiro, & Vaz, 2011; Moreira et al., 2011; Oliveira, Moreira, Boca, San-Miguel-Ayaz, & Pereira, 2013).

Posteriormente, as variáveis selecionadas para cada componente foram agregadas num índice composto, assumindo uma importância equivalente para cada variável e aplicando um modelo aditivo (correspondente à soma do valor final ponderado das diversas variáveis). O mapa de vulnerabilidade resulta da agregação dos três índices anteriores, tendo sido atribuída ponderação idêntica a cada componente.

O mapa de valor económico representa uma expressão monetária da importância dos elementos expostos, ou dos custos associados à proteção ou recuperação dos mesmos. Excetua-se, logo à partida, a vida humana, à qual não é possível atribuir um valor económico. Por esta razão, a análise de valor económico é considerada complementar à vulnerabilidade e é apresentada separadamente. As estimativas de valor económico foram baseadas nos custos de recuperação de cobertura do solo (com vegetação) e no preço dos alojamentos a partir de avaliação bancária.

Resultados preliminares

As figuras seguintes mostram cartograficamente os resultados obtidos com o modelo de vulnerabilidade. A componente da exposição mostra uma concentração dos valores mais elevados a nordeste da área de estudo, o que resulta, em parte, da localização de áreas florestais, com maior ponderação devido à suscetibilidade a incêndios, e de áreas naturais protegidas, nomeadamente o Parque Nacional da Peneda-Gerês (Figura 1).

Figura 1 - Mapas da localização da área de estudo (à esquerda), da componente da exposição (ao meio) e da variável ponderada da cobertura do solo (à direita)

A distribuição espacial da vulnerabilidade (Figura 2) mostra uma tendência semelhante, pela importância das áreas florestais e das áreas protegidas, evidenciando, no entanto, uma maior dispersão de valores, devido fundamentalmente à integração dos níveis de sensibilidade da

população (que afeta o padrão dentro destas áreas florestais e protegidas). O mapa de valor económico revela uma distribuição espacial substancialmente diferente, derivada dos custos mais elevados dos alojamentos em relação à cobertura do solo, estando, por isso, os valores mais elevados concentrados em áreas urbanas, com maior densidade de edifícios.

Figura 2 - Mapa de vulnerabilidade (à esquerda) e de valor económico dos elementos expostos (à direita)

Conclusão

A análise da vulnerabilidade é um aspeto fundamental para a prevenção de incêndios. A abordagem holística apresentada neste trabalho implicou a recolha, processamento e agregação de variáveis de natureza diversa, por forma a criar índices compostos que representam as três componentes intermédias da vulnerabilidade. Esta abordagem permite uma avaliação mais aprofundada das características e capacidades de cada área e o desenvolvimento de produtos cartográficos específicos como ferramentas de apoio à decisão. Desta forma, as medidas de prevenção e preparação para incêndios poderão ser melhor ajustadas às condições específicas de uma área, como é o caso da área protegida do Parque Nacional da Peneda Gerês, cujos níveis de exposição e de vulnerabilidade revelam uma necessidade de atenção particular.

Bibliografia

- Barros, A. M. G., & Pereira, J. M. C. (2014). Wildfire selectivity for land cover type: does size matter? *PLoS One*, 9(1), e84760. doi:10.1371/journal.pone.0084760
- Bento-Gonçalves, A., Vieira, A., Ferreira-Leite, F., Oliveira Martins, C., & Costa Silva, F. (2010). A desestruturação do mundo rural em áreas de montanha e o risco de incêndio - o caso da serra da Cabreira (Vieira do Minho). *Territorium*, 17, 109-117.
- Berkes, F. (2007). Understanding uncertainty and reducing vulnerability: lessons from resilience thinking. *Natural Hazards*, 41(2), 283-295. doi:10.1007/s11069-006-9036-7
- Birkmann, J. (2007). Risk and vulnerability indicators at different scales: Applicability, usefulness and policy implications. *Environmental Hazards*, 7(1), 20-31. doi:10.1016/j.envhaz.2007.04.002

- Birkmann, J., Cardona, O. D., Carreño, M. L., Barbat, a. H., Pelling, M., Schneiderbauer, S., ... Welle, T. (2013). Framing vulnerability, risk and societal responses: the MOVE framework. *Natural Hazards*, 67(2), 193-211. doi:10.1007/s11069-013-0558-5
- Carmo, M., Moreira, F., Casimiro, P., & Vaz, P. (2011). Land use and topography influences on wildfire occurrence in northern Portugal. *Landscape and Urban Planning*, 100(1-2), 169-176. doi:10.1016/j.landurbplan.2010.11.017
- Cutter, S. L. (2011). A ciência da vulnerabilidade: Modelos, métodos e indicadores. *Revista Critica de Ciências Sociais*, 93, 59-69.
- Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E., & Webb, J. (2008). A place-based model for understanding community resilience to natural disasters. *Global Environmental Change*, 18(4), 598-606. doi:10.1016/j.gloenvcha.2008.07.013
- European Commission. (2012). *Forest Fires in Europe , Middle East and North Africa 2012*. EUR 26048 (pp. 1-118). Luxembourg. doi:10.2788/58397
- Ganteaume, A., Camia, A., Jappiot, M., San-Miguel-Ayanz, J., Long-Fournel, M., & Lampin, C. (2013). A review of the main driving factors of forest fire ignition over Europe. *Environmental Management*, 51(3), 651-62. doi:10.1007/s00267-012-9961-z
- Kumpulainen, S. (2006). Vulnerability concepts in hazard and risk assessment. In P. Schmidt-Thomé (Ed.), *Special Paper 42* (Geological., pp. 65-74).
- Lavorel, S., Flannigan, M. D., Lambin, E. F., & Scholes, M. C. (2006). Vulnerability of land systems to fire: Interactions among humans, climate, the atmosphere, and ecosystems. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 12(1), 33-53. doi:10.1007/s11027-006-9046-5
- Moreira, F., Viedma, O., Arianoutsou, M., Curt, T., Koutsias, N., Rigolot, E., ... Xanthopoulos, G. (2011). Landscape-wildfire interactions in southern Europe: Implications for landscape management. *Journal of Environmental Management*, 92(10), 2389-2402.
- Nunes, A., Lourenço, L., Bento-Gonçalves, A., & Vieira, A. (2013). Três décadas de incêndios florestais em Portugal: incidência regional e principais fatores responsáveis. *Cadernos de Geografia*, 32, 133-143.
- Oliveira, S., Lourenço, L., Pereira, J. M., & San-Miguel-Ayanz, J. (2013). A ocorrência de incêndios florestais nos países do Sul da Europa. Distribuição espacial, factores estruturais e influência dos grandes incêndios. In A. Bento-Gonçalves & A. Vieira (Eds.), *Grandes Incêndios Florestais, Erosão, Degradação e Medidas de Recuperação dos Solos* (pp. 99-110). Guimarães: Núcleo de Investigação em Geografia e Planeamento, Universidade do Minho.
- Oliveira, S., Moreira, F., Boca, R., San-Miguel-Ayanz, J., & Pereira, J. M. (2013). Assessment of fire selectivity in relation to land cover and topography : a comparison between Southern European countries. *International Journal of Wildland Fire*. doi:http://dx.doi.org/10.1071/WF12053
- Turner, B. L., Kasperson, R. E., Matson, P. a, McCarthy, J. J., Corell, R. W., Christensen, L., ... Schiller, A. (2003). A framework for vulnerability analysis in sustainability science. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 100(14), 8074-9. doi:10.1073/pnas.1231335100

OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIOS NA INTERFACE URBANO-FLORESTAL

Emanuel Fidalgo

Corpo de Bombeiros Voluntários de Baião
emanuel.s.fidalgo@gmail.com

RESUMO

A maior frequência e severidade dos incêndios em áreas de interface urbano -florestal (IUF) em Portugal é um facto. Estas áreas resultam de duas situações distintas, por um lado, aquelas em que se verifica o abandono das atividades agrícola, silvícola e pastoril, verificando-se o aumento dos matos e o seu avanço sobre povoamentos urbanos. Por outro lado, aquelas áreas em que a expansão urbanística leva ao «avanço» das áreas urbanas (habitações, comércio, indústrias, etc.) sobre os subúrbios envolventes.

Ao contrário da atual resposta operacional aos incêndios em áreas de IUF, esta não tem necessariamente que ser idêntica a um incêndio florestal, nem se pode confundir um incêndio na IUF como um incêndio urbano a decorrer em simultâneo com um incêndio florestal. Deste modo, é apresentada em forma de reflexão mas também de proposta a abordagem a realizar pelos Bombeiros feita a partir do contributo de diversos Corpos de Bombeiros de Portugal Continental. A mesma abordagem foi elaborada para a caracterização da matriz humana inscrita pelas populações que vivem e percorrem estes territórios, apresentada pelo contributo pelos serviços municipais de proteção civil e dos gabinetes técnicos florestais.

Palavras-chave: Interface Urbano Florestal; Combate; Comunidades; Prevenção.

Introdução

Se por si só a manifestação de incêndios florestais acarreta risco para as populações, nomeadamente aquelas que vivem em espaços rurais, recentemente, a partir do início do século os incêndios têm cada vez mais aproximado de aglomerados populacionais, alguns deles de destaque nacional.

Esta problemática recente é transversal ao território nacional, ainda que com especificidades locais e que tem associados problemas característicos das áreas que se designam de interface urbano-florestal, que mais adiante se designará de IUF. Os territórios que apresentam estes aspetos, caracterizam-se pela promiscuidade entre solo classificado como urbano e florestal.

Bombeiros (in)formados, Bombeiros eficientes

A formação ministrada aos Corpos de Bombeiros (CB) relativamente aos incêndios, distingue-os claramente em duas grandes tipologias, os incêndios estruturais (urbanos, industriais, etc.) e os incêndios rurais (povoamento florestal, agrícola, etc.), não havendo referência para incêndios na interface urbano-florestal.

Deste modo, sempre que um incêndio assume características de incêndio na IUF em termos de classificação de ocorrência é-lhe atribuída a classificação «tipo» povoamento florestal, mato, agrícola, etc. e caso alguma infraestrutura fique destruída, é mencionada como consequência do incêndio florestal, ou então é considerada uma nova ocorrência do «tipo» urbano ou industrial.

Portanto, em alguns casos subsistem dúvidas quanto às características dos incêndios na IUF. De forma empírica e resultado da experiência e conhecimento do terreno da área de atuação própria de cada CB, na generalidade dos incêndios florestais que se aproximam de aglomerados populacionais, os CB's enviam meios que permitam realizar combate e também proteção de

infraestruturas. No entanto, em situações de maior exigência dos meios de combate, sobretudo quando ocorrem vários incêndios em simultâneo, tal não se verifica. Deste modo, os meios que se dirigem para a ocorrência e após reconhecimento inicial, ainda que fossem com a missão atribuída para combater o incêndio, por prioridades de atuação, acabam por ficar junto dos aglomerados em proteção, pois são em número insuficiente, deixando o incêndio evoluir livremente, ainda que por vezes, o incêndio não chegue a atingir esse aglomerado populacional ou infraestrutura.

A formação que os CB's recebem neste domínio, incide sobre as tipologias de incêndios estruturais e incêndios florestais. De lembrar que há um «*acentuado défice de instrução/ formação e de cultura de segurança nos bombeiros portugueses mormente nos CB's voluntários e municipais (não sapadores)*» (AMARO, 2012).

Por vezes, opções erradas ou precipitadas durante as operações em incêndios na IUF resultam da falta de protocolo quanto à tomada de decisão nestes cenários, nomeadamente ao nível do combate, proteção ou evacuação, uma vez que neste domínio são inexistentes.

Quanto às dificuldades sentidas pelos bombeiros no combate a incêndios em áreas de interface urbano-florestal, estas são de diversa ordem. Por um lado, o espectro estrutural visível no “desordenamento” do território, que resulta num intrincado padrão entre o edificado e o rural (florestal, agrícola ou inculto) e que condiciona todas as operações dos bombeiros e por outro, a solicitação múltipla e simultânea dos bombeiros. Assim se explica a grande dispersão de meios num incêndio, sobretudo quando se pretende defender infraestruturas. Outros problemas associados são os arruamentos inacabados ou sem saída, com reduzida dimensão e que dificultam as manobras e o cruzamento dos veículos de combate, ou quando são vias mais antigas (por vezes em terra batida), a falta de manutenção, os buracos e a vegetação a cobrir parte da via revestem-se de verdadeiras armadilhas, quer para os meios de socorro, quer para as pessoas que temem a fuga.

Mas não só o domínio público se reveste de dificuldades para os bombeiros. Por vezes, a incúria e descuido de proprietários permite a acumulação de resíduos de origem urbana (lixo doméstico, relva seca, etc.) e industrial (aparas de madeira, plásticos, etc.) próximo de infraestruturas que podem despoletar situações de maior intensidade do fogo e desse modo, dificultar a sua extinção, ou até promover a sua propagação a edifícios contíguos. Situações como estas acontecem essencialmente pela falta de civismo de alguns cidadãos, o não cumprimento dos dispostos legais, mas também pela ausência de sensibilização para uma «cultura do risco» e até a ausência de medidas punitivas, por vezes necessárias como solução de recurso.

A criação de uma nova tipologia de incêndio «Incêndio na Interface Urbano-Florestal» só por si, não trará qualquer vantagem, apenas uma designação diferente. Contudo, uma vez que os incêndios na IUF implicam uma abordagem diferente do que convencionalmente sucede nos incêndios florestais e também pelo aumento da sua recorrência, do risco acrescido e dos seus impactes cada vez mais avultados, entende-se pertinente a sua criação.

Esta designação tipológica seria uma forma de identificação clara e inequívoca de uma ação rápida e “musculada” (Figura 1), aliada à necessidade de mobilização de meios adicionais numa ação distinta, mas simultânea das operações de combate, proteção e evacuação.

Esta possível abordagem carece de uma capacidade acrescida de coordenação e cooperação com as forças de segurança, principalmente no que concerne a evacuação. Para tal, será fundamental a criação de um protocolo para bombeiros nestes cenários, à semelhança do que sucede nos incêndios florestais, incêndios urbanos ou no salvamento e desencarceramento,

permitindo que a atuação dos bombeiros seja rápida, segura e padronizada, evitando-se o imprevisto, nem sempre com bons resultados.

Figura 1 - Representação esquemática das ações a realizar num incêndio na IUF.

Comunidades (in)formadas, Comunidades resilientes

Apesar das dificuldades dos Municípios fazerem cumprir o DL 124/2006 ratificado pelo DL 17/2009, designadamente no que respeita à realização de faixas de gestão de combustível em torno de habitações e de aglomerados populacionais, e aos encargos financeiros daí resultantes, esta legislação é vista como estruturante na regulação no que concerne à proteção de pessoas e bens em caso de incêndio na interface urbano-florestal. É ainda entendida como fundamental na proteção passiva de edificações, facilitando o combate direto e desse modo garantindo maior proteção das infraestruturas, bem como uma redução significativa no tempo de extinção dos incêndios.

É por vezes subestimado a capacidade das populações realizarem a defesa das suas residências. Uma vez identificadas as populações mais expostas, poderiam realizar-se ações de formação sobre comportamento do fogo e seu combate. Deste modo, ao depararem-se com um incêndio essa comunidade saberia proteger-se, o que permitiria aos bombeiros manterem as suas posições de combate, evitando sobrecarregá-los e desmobilizá-los para realizarem a proteção. Os habitantes das áreas de IUF podem classificar-se relativamente ao período de permanência nas áreas de IUF, em quatro tipos: os moradores permanentes ativos (agricultura e floresta); os moradores permanentes ativos (sector secundário e terciário), ausentes no horário laboral; os moradores permanentes não ativos; e os moradores não permanentes (fins-de-semana e férias).

Estas quatro tipologias de moradores, com experiências e vivências diferentes vão reagir de maneira distinta ao fogo. Quem sempre viveu no espaço rural, ainda que a sua atividade não seja relacionada com a agricultura ou a floresta, está familiarizado com o fogo, até como prática corrente de destruição de sobranes, e ao deparar-se com um incêndio reage protegendo-se. Já o grupo de pessoas que apenas ocasionalmente vive neste território, terá maior dificuldade em avaliar o perigo e nem sempre agirá da forma mais correta, à semelhança dos não ativos, muitas vezes idosos e com mobilidade reduzida, ainda que conheçam melhor o comportamento do fogo.

Conclusão

Não havendo uma cultura do risco, nem tão pouco qualquer tipo de preparação e sensibilização das populações, não será fácil inverter a tendência que se adivinha no agudizar de situações de incêndios em interface urbano-florestal.

Verifica-se assim que as áreas de IUF têm aumentado, principal consequência da expansão das áreas urbanas e do surgimento de novas edificações, muitas delas desintegradas de qualquer plano de urbanização, isoladas em manchas florestais.

Se muitas vezes a manifestação do risco de incêndio florestal na IUF é inevitável, a recuperação das áreas ardidas deverá ser uma prioridade. Com uma política de ordenamento florestal, poderão corrigir-se factores condicionantes dos incêndios como as extensas áreas de monocultura de pinheiro ou eucalipto sem qualquer descontinuidade. Assim, mesmo que não se evite no futuro a sua ocorrência, pelo menos os seus impactes poderão ser minimizados.

Bibliografia

- AMARO, A. (2012). *O Socorro em Portugal*. Lisboa: Instituto de Direito Público.
- CASTRO, C. et al (2006). *Combate a Incêndios Florestais*. 3ª Edição. ENB: Sintra.
- LOURENÇO, L. (2006). “Incêndios florestais: algumas reflexões e mitos do combate” in *Territorium* 13, pp. 59-70. Coimbra.
- LOURENÇO, L. et al (2006). *Manual de Combate a Incêndios Florestais por equipas de Primeira Intervenção*. 3ª Edição. ENB: Sintra.
- MENDES, J.M.; TAVARES, A.T. (2009). “Building resilience to natural hazards. Practices and policies on governance and mitigation in the central region of Portugal” in *Safety, Reliability and Risk Analysis: Vol. 2, Theory, Methods and Applications*.pp. 1577-1584. Leiden: CRC Press/Balkema.

TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO REGIONAL DOS GRANDES INCÊNDIOS FLORESTAIS (≥ 100 HA) EM PORTUGAL CONTINENTAL, NAS ÚLTIMAS TRÊS DÉCADAS

Flora Ferreira Leite

Bolseira FCT, CEGOT, Universidade do Minho
floraferreiraleite@gmail.com

António Bento Gonçalves

Departamento de Geografia e CEGOT, Universidade do Minho
bento@geografia.uminho.pt

Luciano Lourenço

Departamento de Geografia e CEGOT, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
luciano@uc.pt

Adélia Nunes

Departamento de Geografia e CEGOT, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
adelia.nunes@ci.uc.pt

António Vieira

Departamento de Geografia e CEGOT, Universidade do Minho
vieira@geografia.uminho.pt

RESUMO

Temos assistido, ao longo dos últimos anos, a uma nova realidade em Portugal, no que respeita aos grandes incêndios florestais (≥ 100 ha).

Na última década registaram-se os incêndios florestais de maior dimensão no território português (FERREIRA-LEITE *et al.*, no prelo), apesar de não se ter registado a maior percentagem de grandes incêndios florestais (0,7), mas verificou-se maior área ardida (79%), o que significa que, em média, cada grande incêndio, nesta década, queimou mais do que os das décadas anteriores (672 ha). Isto resultou, por um lado, da redução do número de grandes incêndios florestais ao longo dos anos e, por outro, do aumento da área individual percorrida por cada um dos grandes incêndios.

Quando se analisa a distribuição espacial destes incêndios verifica-se que há distritos especialmente suscetíveis à sua ocorrência e desenvolvimento. É neste sentido que nos propomos analisar as tendências de evolução regional, no período de 1981 a 2013.

Palavras-chave: Portugal, grandes incêndios florestais, tendências, evolução.

Introdução

Quando se analisa a distribuição espacial dos incêndios em Portugal, verifica-se que há distritos especialmente suscetíveis à sua deflagração e outros mais favoráveis à propagação das chamas (NUNES, 2012; NUNES *et al.*, 2013). De qualquer forma, são conhecidas as dicotomias norte/centro vs sul e litoral vs interior, tanto no que se refere ao número de ocorrências como à área ardida (LOURENÇO *et al.*, 2012).

No caso particular das áreas ardidas, a propagação do fogo está sobretudo dependente de uma série de fatores físico-geográficos, como sejam as condições climático-meteorológicas e/ou a topografia (LOURENÇO, 1988, 1991; LOURENÇO e BENTO-GONÇALVES, 1990) e de fatores de natureza cultural e de índole socioeconómica, com consequências importantes ao nível do (des) ordenamento do território (BENTO-GONÇALVES, 2006; BENTO-GONÇALVES *et al.*, 2000; MOREIRA *et al.*, 2011), entre outros.

Ao longo das últimas décadas, a existência e a manutenção destes cenários proporcionou a propagação dos incêndios, e, assim sendo, a existência de GIF no nosso país.

Os grandes incêndios florestais em Portugal (1981-2013)

Com base nas estatísticas dos incêndios disponibilizadas *online* pelo ICNF, observa-se um cenário de aumento efetivo do número de GIF ao longo das últimas 3 décadas. Mas, se o aumento do número de GIF foi significativo, no que respeita à área ardida o acréscimo foi ainda maior (de 563 950 ha para mais do dobro, 1 164 748 ha), o que se refletiu no aumento da percentagem da área consumida pelos grandes incêndios e, por conseguinte, no acréscimo do valor da área média por GIF (FERREIRA-LEITE *et al.*, no prelo).

Assim, em termos gerais, nos últimos 30 anos, os GIF representaram uma pequena fração do número total das ocorrências registadas em Portugal (0,8%) mas, em contrapartida, foram responsáveis por 72,5% da área ardida (FERREIRA-LEITE *et al.*, 2013).

Tendências de evolução anual da área ardida em grandes incêndios, por distrito, entre 1981 e 2013

Comprovada a importância das áreas queimadas por GIF em Portugal, pretende-se analisar agora a sua distribuição espacial e detetar as tendências de evolução, no período de 1981 a 2013, na percentagem de áreas ardidas por GIF, relativamente à superfície de espaços silvestres, a nível distrital. Para o efeito, selecionou-se a linha de tendência (polinomial de 3 ordens) que melhor se ajustava à respetiva distribuição espaço-temporal.

Assim, através da configuração das linhas de tendência definidas para os distritos de Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal e Viana do Castelo (polinomial de 3 ordens), pese embora a desigual percentagem de área ardida em GIF, podemos identificar, para este conjunto de distritos, 3 fases de evolução. De uma forma geral, a década de 80 é coincidente com um nítido decréscimo da área ardida, seguindo-se, uma fase de acréscimo, compreendida entre o final dos anos 80 e o início da década de 90, sendo que o intervalo de anos entre 2003 a 2005 regista os valores mais elevados de área ardida. Finalmente, após este intervalo, parece delinear-se uma expressiva tendência de decréscimo até aos últimos anos analisados (fig. 1).

No caso dos distritos de Aveiro e Leiria, verificou-se uma evolução semelhante, igualmente com uma diminuição da área ardida no início dos anos 80, e um acréscimo nos anos seguintes, muito embora, neste caso, tanto a tendência de diminuição como a de aumento não tivessem sido tão vincadas como aconteceu nos outros distritos referidos. Aliás, observa-se mesmo uma aparente manutenção da linha de tendência durante as últimas duas décadas, com oscilações pouco significativas. É interessante notar ainda que, no conjunto destes distritos, embora seja evidente a fase final de decréscimo na evolução das áreas ardidas em GIF, o período de tempo em que se dá esta inversão, é ainda relativamente curto para afirmar que esta se irá manter, uma vez que pode resultar de circunstâncias conjunturais.

Já no distrito de Viseu, foi possível identificar uma tendência completamente oposta à anterior, ou seja, a década de 80 registou um acréscimo da evolução das áreas ardidas, com uma ligeira e gradual diminuição, a partir do início dos anos 90, e que se manteve até 2003, ano, a partir do qual, a tendência foi de novo de aumento. Nos últimos anos analisados, a linha de tendência tornou-se mais expressiva, no que ao aumento da evolução das áreas ardidas, no distrito, se refere (fig. 2).

Os distritos do Porto e Vila Real apresentaram uma tendência de acréscimo progressivo, ao longo do intervalo de anos analisado, que começa de forma expressiva, a partir do final da década de 80, com uma relativa manutenção dos valores de área ardida nos últimos 3 anos.

Fig. 1 - Evolução anual da % de território percorrido por GIF em nove distritos, entre 1981 e 2013, relativamente à sua superfície de espaços silvestres, e respetiva linha de tendência/regressão, traduzida em três fases: decréscimo-aumento-diminuição.

Também Braga e Bragança apresentaram uma evolução positiva, com um aumento progressivo da área ardida em GIF ao longo dos últimos 33 anos, assumindo estes distritos uma expressão exponencial.

Pelo contrário, Guarda e Coimbra apresentaram uma tendência de decréscimo das áreas ardidas em GIF. No caso da Guarda, a tendência de decréscimo, ficou a dever-se, sobretudo, às menores percentagens de área ardida assinaladas a partir do início do século XXI. Em contrapartida, Coimbra é o único distrito a delinear uma tendência claramente negativa no período de 1981 a 2013, no que à área ardida em GIF se refere.

Fig. 2 - Evolução anual da % de território percorrido por GIF nos restantes nove distritos, entre 1981 e 2013, relativamente à sua superfície de espaços silvestres, e respetiva linha de tendência/regressão.

Conclusão

Através da análise da configuração que as linhas de tendência foram adquirindo, para os diferentes distritos, podemos denotar desde logo, o carácter aleatório das áreas ardidas por GIF em Portugal. A confirmá-lo está o facto de que para todos os distritos a linha de tendência que mais se ajustou à distribuição espaço-temporal da informação, ou seja, aquela em que R^2 mais se aproxima de 1, foi a linha de tendência polinomial.

As configurações adquiridas pelas linhas de tendência dos diferentes distritos variam, no entanto, de forma significativa, sendo possível agrupar distritos com maior similaridade em termos de tendência de evolução, pesem embora as desiguais percentagens de área ardida.

Assim, merecem destaque as tendências de aumento nítido evidenciadas pelos distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Braga e Bragança, que em muito se ficaram a dever ao aumento da percentagem da área ardida nos últimos anos. Em contrapartida, os restantes distritos apresentam menores percentagens de área ardida nos últimos anos, o que se reflete numa tendência de decréscimo. Neste último conjunto, destaca-se o distrito de Coimbra que foi o único a delinear uma tendência claramente negativa ao longo do período 1981-2013.

Este tipo de análise é interessante na medida em que nos permite questionar sobre os diferentes comportamentos dos distritos, de forma a perceber se, por exemplo, as tendências negativas se

devem a medidas preventivas postas em prática, ou se essa tendência é mais resultado de muitos e grandes incêndios ocorridos no início do período estudado.

Bibliografia

- Bento-Gonçalves, A. (2006) - *Geografia dos incêndios em espaços silvestres de montanha - O caso da Serra da Cabreira*, Tese de Doutoramento, Universidade do Minho, 439 p.
- Bento-Gonçalves, A.; Vieira, A.; Martins, C.; Ferreira-Leite, F. e Costa, F. (2010) - A desestruturação do mundo rural e o uso do fogo - o caso da serra da Cabreira (Vieira do Minho). In *Caminhos nas Ciências Sociais. Memória, Mudança Social e Razão - Estudos em Homenagem a Manuel da Silva Costa*. Universidade do Minho, Braga, p. 87-104.
- Ferreira-Leite, F.; Bento-Gonçalves, A.; Lourenço, L.; Úbeda, X. e Vieira, A. (2013) - Grandes incêndios florestais em Portugal Continental como resultado das perturbações nos regimes de fogo no mundo mediterrâneo. *Silva Lusitana*, n.º Especial 1 - 9, p. 129-144.
- Ferreira-Leite, F.; Bento-Gonçalves, A. e Lourenço, L. (no prelo) - Os grandes incêndios florestais em Portugal - breve caracterização. *Méditerranée*, Presses Universitaires de Provence.
- Lourenço, L. (1988) ▫ Tipos de tempo correspondentes aos grandes incêndios florestais ocorridos em 1986 no Centro de Portugal. *Finisterra*, n.º 32, Lisboa, p. 251-270.
- Lourenço, L. e Bento-Gonçalves, A. (1990) - As situações meteorológicas e a eclosão-propagação dos grandes incêndios florestais registados durante 1989 no Centro de Portugal. In *II Congresso Florestal Nacional*, Porto, Portugal, p. 755-763.
- Lourenço, L.; Bento-Gonçalves, A.; Vieira, A.; Nunes, A. e Ferreira-Leite, F. (2012) - Forest Fires in Portugal, In Bento-Gonçalves, A.; Vieira, A. (Eds.) - *Portugal: Economic, Political and Social Issues*, Hauppauge, New York, Nova Science Publishers, p. 97-111.
- Moreira, F.; Viedma, O.; Arianoutsou, M.; Curt, T.; Koutsias, N.; Rigolot, E.; Barbati, A.; Corona, P.; Vaz, P.; Xanthopoulos, G.; Mouillot, F e Bilgili, E. (2011) - Landscape - wildfire interactions. In *Southern Europe: Implications for landscape Management. Journal of Environmental Management*, n.º 92, p. 2389-2402.
- Nunes, A. (2012) - Regional variability and driving forces behind forest fires in Portugal, an overview of the last three decades (1980-2009). *Applied Geography*, n.º 34, p. 576-586.
- Nunes, A.; Lourenço, L.; Bento-Gonçalves, A. e Vieira, A. (2013) - Três décadas de incêndios florestais em Portugal: incidência espacial e principais fatores responsáveis. *Cadernos de Geografia*, n.º 32, Faculdade de Letras, Coimbra, p. 133-143.

MEDIDAS MITIGADORAS DE EMERGÊNCIA, PARA PROTEÇÃO E FERTILIZAÇÃO DOS SOLOS RECENTEMENTE ARDIDOS, APLICANDO RESÍDUOS TÊXTEIS BIODEGRADÁVEIS

José Salgado

Núcleo de Investigação em Geografia e Planamento da Universidade do Minho
josecastrosalgado@gmail.com

António Bento-Gonçalves

Departamento de Geografia e CEGOT, Universidade do Minho
bento@geografia.uminho.pt

António Vieira

Departamento de Geografia e CEGOT, Universidade do Minho
vieira@geografia.uminho.pt

RESUMO

Segundo Silva (2009) é possível através de um processo de compostagem produzir um composto protetor e fertilizante para os solos, baseado em resíduos têxteis biodegradáveis. Além da mais-valia para os solos, este permitirá reduzir o custo de produção das empresas têxteis do Vale do Ave.

Assim, pretendemos estudar a eficácia destas medidas inovadoras, as suas vantagens e eventuais impactes negativos que a sua aplicação poderá ter nos solos e na redução da erosão hídrica.

Para tal, iremos testar, à escala da parcela, medidas mitigadoras inovadoras, para proteção e fertilização dos solos recentemente ardidos, aplicando para o efeito resíduos têxteis biodegradáveis (industriais) em composto com palha ou caruma.

Palavras-chave: Incêndios florestais, erosão, resíduos industriais, compostagem, mitigação.

Introdução

Desde os tempos mais remotos que o fogo é parte integrante dos ecossistemas. Sendo a sua origem contemporânea com as plantas terrestres, este terá desempenhado um papel preponderante no desenvolvimento dos ecossistemas. No entanto, nas últimas décadas, os incêndios têm assumido novas características, diferentes das que se podiam observar até então e cuja proporção se tornou numa séria ameaça ao desenvolvimento sustentável dos ecossistemas (Ferreira et al., 2010, Bento-Gonçalves, 2011). Assim, estes novos padrões de intensidade, de severidade, de recorrência e extensões de área ardidas podem causar danos irreversíveis nas áreas florestais do nosso país.

Estas mudanças no regime de incêndios podem afetar consideravelmente as propriedades físicas e químicas dos solos. Em termos físicos, podem originar uma modificação dos processos geomorfológicos que fomentam um aumento da erosão da camada superior dos solos, onde se localizam, na maioria dos solos portugueses, os únicos nutrientes existentes (Bento-Gonçalves et al., 2008; Ferreira et al., 2010; Ferreira-Leite et al., 2011, Shakesby, 2011).

Alterações químicas e físicas dos solos

No que diz respeito às alterações das propriedades químicas cristalinas dos minerais, estas ocorrem em temperaturas muito elevadas. A título de exemplo podemos referir que os minerais de argila sofrem estas modificações acima dos 500°C (Notario del Pino, 2009). Assim, só incêndios de intensidade muito elevada poderão originar alterações na estrutura mineral do solo. No entanto, verifica-se, a temperaturas muito inferiores, uma alteração complexa e por

vezes irreversível, a transformação/eliminação dos componentes orgânicos. Esta é a mais representativa das alterações induzidas pelo calor nos solos, pois a matéria orgânica apresenta maior sensibilidade à energia calorífica do que os minerais (González-Vila et al., 2009). Nem todos os elementos fundamentais para a sua recuperação dos ecossistemas desaparecem com os incêndios, componentes como o cálcio, magnésio, sódio e potássio só se volatilizam a temperaturas extremamente elevadas (mais de 800°C) o que raramente ocorre em incêndios florestais (Neary et al., 2008). No entanto, alguns componentes químicos imprescindíveis para a recuperação dos sistemas ecológicos, como o nitrogénio e o carbono começam a volatilizar a partir dos 200°C e desaparecem completamente por volta dos 500°C (De la Rosa et al., 2008). Isto significa que as cinzas produzidas em fogos de alta intensidade são muito pobres nestes elementos fundamentais para a recuperação dos ecossistemas.

É por isso necessário o desenvolvimento e implementação de medidas que promovam a redução destes impactes, as quais deverão integrar as estratégias de defesa e recuperação da floresta e do solo (Robichaud et al, 2008; Robichaud, 2009; Ferreira, et al., 2010; Bento-Gonçalves et al., 2012).

A compostagem e a sua utilização nas medidas mitigadoras

No Vale do Ave, as empresas têxteis enviam anualmente para os aterros sanitários milhares de toneladas de resíduos, o que, implicando elevados custos económicos, aumenta a debilidade competitiva deste setor. Silva (2009) estima que, só em empresas com produção de fio de algodão, são enviados para o aterro cerca de 3000 toneladas por ano de resíduos, originando um custo médio de aproximadamente 250 000 euros por ano. Além da questão económica existe ainda um elevado custo ambiental, pois estas toneladas de resíduos reduzem a duração de vida útil dos respetivos aterros levando à sua saturação prematura.

Segundo este mesmo autor é possível através de um processo de compostagem produzir um composto protetor e fertilizante para os solos, baseado em resíduos têxteis biodegradáveis. Tejada et al., (2003) testou, em campos de milho, um composto semelhante, preparado com resíduos de algodão obtendo resultados muito satisfatórios. Além da mais-valia para os solos, este processo permitirá, em simultâneo, reduzir o custo de produção das empresas do Vale do Ave e propiciar um destino alternativo e útil para os resíduos orgânicos, evitando a sua acumulação nos aterros sanitários.

A compostagem consiste na formação de um composto orgânico fértil através dum processo biológico de decomposição e de reciclagem de matéria orgânica contida em restos de origem animal e/ou vegetal. Silva (2009) define este processo como a transformação de resíduos sólidos biodegradáveis num produto designado por “composto” cuja finalidade é melhorar a fertilidade potencial dos solos, designando-se, por isso, também como corretivo orgânico. Assim, a compostagem permite a fertilização dos solos através de um processo natural que ajuda a devolver à terra alguns dos nutrientes necessários. Será ainda pertinente referir que este composto aumenta a capacidade de retenção de água, permitindo uma redução da escorrência superficial e consequentemente o controlo da erosão na camada superior dos solos.

Assim, através de um processo de compostagem pretendemos criar um composto baseado em resíduos industriais biodegradáveis (ex: algodão) que serão misturado com diferentes materiais para criar a proporção adequada, entre outros, de Carbono/Azoto. Este composto será aplicado em solos recentemente ardidos misturado com palha e/ou caruma dos pinheiros, usando a técnica conhecida por “mulsh”. O objetivo é estudar a sua capacidade de proteção aos solos

face à agressividade das primeiras chuvas que ocorrem, nos climas mediterrâneos, frequentemente nos meses que se seguem ao verão, ou seja, à ocorrência do próprio incêndio. Esta técnica (“mulsh” com palha ou caruma) já foi testada por diversos investigadores, revelando resultados muito positivos no período de tempo que se segue ao incêndio, mas perdendo eficácia quanto maior for este intervalo de tempo. Com a realização deste estudo, pretendemos testar a capacidade deste composto em regenerar os solos e aumentar a sua produtividade imediatamente após o incêndio. Pensamos ser possível, com a sua utilização, reduzir o período de tempo que decorre entre o incêndio e o aparecimento das primeiras espécies arbóreas cujo papel de retenção e de proteção dos solos é conhecido de todos. Pretendemos testar este “novo” composto ao nível da parcela, permitindo extrapolar os resultados para a escala da vertente.

Conclusão

Tal como acontece com a palha ou a caruma (mulch), um composto resultante da compostagem de resíduos têxteis biodegradáveis poderá aumentar a proteção do solo, evitando a desagregação e transporte dos materiais pelas chuvas intensas no período pós-incêndio. Outra mais-valia poderá ser a fertilização dos solos, que já são naturalmente pobres nas áreas de montanha e, como foi referido anteriormente, podem ser ainda mais empobrecidos, especialmente pelos incêndios de grande intensidade. Esta fertilização poderá reduzir o tempo necessário para o aparecimento do coberto vegetal, nomeadamente herbáceo, e por isso reduzir o tempo de exposição dos solos nus aos agentes erosivos.

A reutilização e valorização de alguns resíduos têxteis, que atualmente estão a ser encaminhados para aterros sanitários, poderão reduzir o impacto que a indústria têxtil tem no meio envolvente, neste caso no Vale do Ave. Além das questões ambientais, podemos referir um proveito económico pois o setor têxtil, predominante no vale do Ave e com debilidade competitiva, poderá minimizar os custos de produção poupando as despesas inerentes à limpeza destes resíduos.

Bibliografia

- Bento-Gonçalves, A. (2011). Geografia dos incêndios em espaços silvestres de montanha - caso da serra da Cabreira. Lisboa. FCG/FCT, Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Textos Universitários de Ciências Sociais e Humanas.
- Bento-Gonçalves, A., Vieira, A., Ferreira, A. J. D. & Coelho, O. A. C. (2008). Caracterização geomorfológica e implementação de um sistema integrado de informação, em ambiente SIG, no âmbito do projecto RECOVER (Estratégias de remediação de solos imediatamente após incêndios florestais). *Revista Geografia Ensino & Pesquisa*, 12: 1. 3721-3735.
- Bento-Gonçalves, A., Vieira, A., Úbeda, X. & Martin, D. (2012). Fire and soils: Key concepts and recent advances. *Geoderma*, journal homepage.
- De la Rosa J.M., et al, (2008). Use of pyrolysis/GC-MS combined with thermal analysis to monitor C and N changes in soil organic matter from a Mediterranean fire affected forest. *Catena* 74, 296-303.
- Ferreira, A.D., Alegre, S.P., Carvalho, T., Silva, J.S., Pinheiro, A.Q. & Coelho, C. (2010). Estratégias e técnicas de conservação do solo e da água após incêndios. In: *Ecologia do Fogo e Gestão de Áreas Ardidas*. Editores: Moreira, F., Carty, F.X., Silva, J.S. & Rego, F. ISAPress, 229-252

- Ferreira-Leite, F., Bento Gonçalves, A. J. & Vieira, A., (2011) - The recurrence interval of forest fires in Cabeço da Vaca (Cabreira Mountain - Northwest of Portugal). *Environmental Research* 11, 215-221.
- González-Vila F.J., et al, (2009). Transformaciones de la materia orgánica del suelo por incendios naturales y calentamientos controlados en condiciones de laboratorio. En: Cerdà A, Mataix-Solera J (Eds.), *Efectos de los Incendios Forestales sobre los Suelos en España. El Estado de la Cuestión visto por los Científicos Españoles. Càtedra de Divulgació de la Ciència. Universitat de València, Valencia*, pp. 219-267.
- Mataix-Solera J, Cerdà A, Arcenegui V, Jordán A & Zavala L.M., (2011). Fire effects on soil aggregation: A review. *Earth-Science Reviews* 109: 44-60.
- Neary, D. G., Ryan, K. C. & DeBano, L. F., eds. (2005). (revised 2008). *Wildland fire in ecosystems: effects of fire on soils and water*. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-42-vol.4. Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 250.
- Notario del Pino, J.S., (2009). Los incendios forestales en Canarias: una revisión. Causas, particularidades e impactos sobre el suelo. En: Cerdà A, Mataix-Solera J (Eds.), *Efectos de los Incendios Forestales sobre los Suelos en España. El Estado de la Cuestión visto por los Científicos Españoles. Càtedra de Divulgació de la Ciència. Universitat de València, Valencia*, 469-489.
- Robichaud, P., (2009). Post-fire stabilization and rehabilitation, in: Cerdà, A., Robichaud, P. (Eds.), *Fire Effects on Soils and Restoration Strategies*. Science Publishers, Enfield, New Hampshire, 299-320.
- Robichaud, P., Wagenbrenner, J. W., Brown, R. E., Wohlgenuth, P. M., Beyers, J. L., (2008). Evaluating the effectiveness of contour-felled log erosion barriers as a post-fire runoff and erosion mitigation treatment in the western United States. *International Journal of Wildland Fire* 17, 255-273.
- Shakesby, R.A., (2011). Post-wildfire soil erosion in the Mediterranean: Review and future research directions. *Earth-Science Reviews* 105, 71-100.
- Silva, A. (2009). *Valorização de resíduos têxteis*. Dissertação de Mestrado em Gestão Ambiental, Universidade do Minho.
- Tejada, M.; Gonzalez J.L., (2003). Effects of the application of a compost originating from crushed cotton gin residues on wheat yield under dryland conditions. *European Journal Agronomy* 19, 357-368.

EL PAPEL DE LOS INCENDIOS EN LA CONFIGURACIÓN DEL PAISAJE VEGETAL DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA Y PIRINEO ORIENTAL. PRIMEROS RESULTADOS DE UN ESTUDIO COMPARADO

Juan Carlos García Codron

Depto de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad de Cantabria
garciaj@unican.es

Anna Badia

sub-grupo GRAMP-FOC, Dep. de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

Maria Barrachina

sub-grupo GRAMP-FOC, Dep. de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

Virginia Carracedo

sub-grupo FUEMONT, Dep.Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad de Cantabria

Carmen Ceballos

sub-grupo FUEMONT, Dep.Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad de Cantabria

Raquel Cunill

sub-grupo GRAMP-FOC, Dep. de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

Concepción Diego

sub-grupo FUEMONT, Dep.Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad de Cantabria

Ignacio García Amorena

sub-grupo GRAMP-FOC, Dep. de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

Carolina Garmendia

sub-grupo FUEMONT, Dep.Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad de Cantabria

David Molina

sub-grupo GRAMP-FOC, Dep. de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

Jordi Nadal

sub-grupo GRAMP-FOC, Dep. de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

Joan Nunes

sub-grupo GRAMP-FOC, Dep. de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

Albert Pèlachs

sub-grupo GRAMP-FOC, Dep. de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

Aaron Pérez

sub-grupo GRAMP-FOC, Dep. de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

Ramon Pérez-Obiol

sub-grupo FUEMONT, Dep.Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad de Cantabria

Leonor de la Puente Fernández

sub-grupo GRAMP-FOC, Dep. de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

Domingo Rasilla

sub-grupo FUEMONT, Dep.Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad de Cantabria

Joan Maria Roure

sub-grupo GRAMP-FOC, Dep. de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

Joan Manuel Soriano

sub-grupo GRAMP-FOC, Dep. de Geografía, Universitat Autònoma de Barcelona

Maria Victoria Rivas

Iago Vázquez

sub-grupo FUEMONT, Dep.Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad de Cantabria

RESUMEN

Se presentan los primeros resultados de un estudio comparado sobre la evolución histórica de los incendios forestales en la montaña cantábrica y Pirineos (provincias de Cantabria y Lleida) recurriendo a la combinación de los resultados obtenidos mediante distintos tipos de indicadores (sondeos en turberas, arqueología, documentación de archivo, información actual, etc). Los datos que se están obteniendo, coherentes entre sí, demuestran que los incendios han sido continuos desde 6200 cal BP, coincidiendo con el inicio de las actividades agrarias, y que su repetición, que debe entenderse dentro de un complejo de prácticas destinadas al mantenimiento de las áreas de pasto pero que hoy resulta tremendamente problemática, ha sido uno de los principales factores de la construcción de los paisajes y de la actual diversidad de ambientes de nuestras áreas de montaña.

Palabras clave: incendio, montaña, paisaje, fuentes paleoambientales, fuentes documentales.

Introducción

Poblados desde la Prehistoria y soporte de actividades económicas muy diversas a lo largo del tiempo, la montaña cantábrica y el Pirineo oriental presentan unos paisajes que son el resultado de un complejo de interacciones ancestrales entre la sociedad rural y el medio natural. En ambas áreas, a priori poco propicias a los incendios por razones climáticas y biogeográficas, el fuego ha sido continuamente manejado por los sucesivos grupos humanos como herramienta para facilitar las roturaciones o el mantenimiento de pastos aunque también como instrumento de presión en los momentos de conflicto hasta el punto de convertirse, por su repetición, en un factor determinante en la génesis de los paisajes y ecosistemas de ambas regiones y en uno de los factores de riesgo más importante que tienen que gestionar las administraciones.

Sin embargo, el conocimiento de la evolución histórica de los incendios en estas áreas, sus características y su relación con las actividades humanas es muy incompleto y fragmentario ya que se basa en un reducido número de evidencias procedentes, en cada caso, de un único tipo de fuentes. De ahí que las reconstrucciones habituales recurran a extrapolar en el tiempo o en el espacio determinados tópicos y hechos “sabidos” y no resuelven muchos de los interrogantes que se plantean a escala regional. Y, si bien es cierto que existen algunos valiosos trabajos de carácter interdisciplinar e integrador, prácticamente no existe información para las dos zonas que nos ocupan.

En este trabajo se presentan los primeros resultados de un proyecto que persigue la reconstrucción e interpretación de la historia de los incendios forestales que se han venido produciendo en las áreas de montaña del Norte de la Península Ibérica a lo largo del Holoceno mediante el análisis de su distribución espacio-temporal y de su relación con las actividades humanas. Para tener elementos de contraste, se propone un estudio comparado de dos áreas distantes pero con características relativamente similares situadas en las cabeceras de los ríos Noguera Pallaresa y Garona en Lleida y en sector comprendido entre los valles del Pas y del Nansa en Cantabria.

Con objeto de poder abarcar toda la historia de los incendios asociados a prácticas agrarias, cuyo origen se presupone en el Neolítico, se recurre tanto a fuentes de información ambiental (testigos sedimentarios procedentes de turberas) como a fuentes históricas (documentales escritas y gráficas). De este modo, se están simultaneando técnicas analíticas (carbones sedimentarios, palinología, macrorrestos vegetales, isótopos del plomo y análisis de metales pesados) que aporten datos para los últimos 7000 años cal BP y documentación de archivo (desde la Edad Media), de hemeroteca (a partir del siglo XIX) y de bases históricas de datos de incendios (de mediados del siglo XIX hacia adelante).

La comparación entre las dos áreas, donde se presupone que los procesos humanos han sido semejantes aunque no necesariamente sincrónicos, facilita la interpretación de los resultados y la discriminación entre los procesos y tendencias generales, asociados al clima o a la dinámica de la vegetación, y los que son resultado de acciones antrópicas o de circunstancias locales.

Resultados

Se han analizado el registro polínico y los carbones sedimentarios (>150 μm) de los testigos obtenidos en las turberas de Bassa Nera (Naut Arán- Lleida) y de la Molina (Puente Viesgo- Cantabria). Los resultados revisten un gran interés ya que demuestran que, lejos de ser un fenómeno reciente, los fuegos, han sido recurrentes a lo largo de los últimos 6200 años en ambas áreas de montaña (figura 1).

Figura 1. Concentración de carbón sedimentario y porcentaje de polen arbóreo en los testigos de Bassa Nera (Lleida) y de la Molina (Cantabria).

Ambos testigos presentan una secuencia con dientes de sierra parecidos que denotan una alternancia de ciclos de mayor o menor intensidad. Sin embargo, mientras en Cantabria el periodo de máxima incidencia se sitúa entre 5600 y 2400 BP (Neolítico a primera Edad del

Hierro), éste se produce más tarde en el Pirineo donde los valores máximos se producen entre 2700 y 1400 BP (Edad del Hierro- Antigüedad) con un breve aunque significativo repunte medieval. Con posterioridad, los incendios siguen produciéndose en las dos áreas aunque su importancia es, comparativamente, muy inferior.

No es posible reconstruir las circunstancias precisas de estos fuegos históricos. Sin embargo, el hecho de que en ambas regiones aparezcan prácticamente al mismo tiempo que las primeras evidencias de actividades agrarias (Peña-Chocarro *et al*, 2005) y que las curvas presenten tendencias y puntos de inflexión que coinciden con algunos de los principales periodos o momentos clave de la Historia (Pèlachs *et al*, 2011), parecen demostrar el origen humano de los incendios (Pérez Obiol *et al*, 2011).

Lo mismo puede deducirse de la información que proporcionan los archivos a partir del final de la Edad Media. En este tipo de fuentes los fuegos se relacionan casi siempre con el normal manejo de los montes y de las áreas de pastos y, salvo contadas excepciones, aparecen mencionados como una práctica habitual y sin especiales connotaciones negativas.

Los incendios de época contemporánea nos resultan bien conocidos gracias a la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF). A través de ella sabemos que en Cantabria (figura 2), y en parte también del Pirineo, los incendios son invernales y prácticamente desaparecen en verano.

Esta distribución estacional, aparentemente anómala, encuentra su explicación en el calendario de prácticas ganaderas: el fuego es el medio habitualmente utilizado para regenerar los pastos y contener el avance de las plantas leñosas en las áreas de montaña y debe provocarse en invierno para dar tiempo a la recuperación de la hierba antes de la subida del ganado (Carracedo *et al*, 2009). Este calendario no es siempre fácil de mantener en unas montañas muy lluviosas y con abundantes nevadas por lo que la mayor parte de los incendios se producen bajo determinadas condiciones meteorológicas, coincidentes con situaciones estables o de vientos secos de tipo “föhn”, que, bien conocidas por los campesinos de la zona, son eficazmente aprovechadas por ellos para producir fuego de acuerdo con sus intereses (Rasilla *et al*, 2006).

Figura 2. Distribución mensual de los incendios en Cantabria en % sobre total anual para el periodo 1990- 2010. Fuente: material cedido por V.Carracedo (inédito)

Los datos sobre causalidad son igualmente expresivos ya que entre 1990 y 2010, el 85,2% de los incendios de causa conocida que se han registrado en Cantabria han sido intencionados y 13,8% resultado de negligencias (que, a su vez, tuvieron relación con quemas de pastos o de matorral en el 80% de las ocasiones). De hecho, los fuegos debidos a causas naturales son prácticamente inexistentes.

Todos estos incendios pastoriles se provocan hoy con la intención de controlar la composición y estructura de la cubierta vegetal y, probablemente, esto ha sido así desde el Neolítico. Tal como nos demuestran la mayoría de las turberas de montaña (Carrión, 2012) la aparición del fuego propició una dramática transformación de la cubierta vegetal al servicio de la ganadería que se traduce en una disminución de la proporción de polen arbóreo a favor del no arbóreo (figura 1) y una rápida expansión de taxones pirofitos como *Calluna*, *Ericaceae*, *Ulex* u otros, precisamente los mismos que hoy tienden a controlarse mediante el uso del fuego (y que, en algunos casos, constituyen hábitats prioritarios protegidos por las legislaciones europea, estatal y autonómicas).

A modo de conclusión

Los incendios forestales son unánimemente considerados como uno de los problemas más graves y uno de los factores de riesgo más importantes con los que se enfrentan las áreas de montaña del Norte de la Península Ibérica. Los daños que producen cada año, unidos a la alarma social que ocasionan, obligan a las administraciones a realizar fuertes inversiones para mantener las distintas labores de prevención y extinción máxime cuando buena parte de ellos afectan a espacios naturales protegidos o áreas consideradas de especial interés. Sin embargo, paradójicamente, los incendios han sido también uno de los principales factores intervinientes en la construcción de ese mosaico de unidades de paisaje que caracteriza a las montañas ibéricas y que valoramos como parte esencial de nuestro patrimonio lo que exige su toma en consideración no sólo como problema sino también como factor determinante del paisaje, del “medio natural” y de la biodiversidad.

Bibliografía

- Carracedo, Virginia; Domingo, F.; García Codron, J.Carlos; Diego, Concepción (2009) - Clima e incendios forestales en Cantabria: evolución y tendencias recientes. *Pirineos*, 35 (1-2), p. 553-560.
- Carrión, José S. coord. (2012) - *Paleoflora y paleovegetación de la Península Ibérica e Islas Baleares: Plioceno-Cuaternario*. Universidad de Murcia, Murcia, 972 p.
- Pèlachs, A.; Julià, R.; Pérez-Obiol, R.; Soriano, J.M., Bal, M.C.; Cunill, R.; Catalan, J. (2011) - Potential influence of Bond events on mid-Holocene climate and vegetation in southern Pyrenees as assessed from Burg lake LOI and pollen records. *The Holocene* 21(1): 95-104
- Peña-Chocarro, L.; Zapata, L.; Iriarte, M. J.; González Morales, M. y Straus, L.G. (2005) - The oldest agriculture in Northern Atlantic Spain: new evidence from El Mirón Cave (Ramales de la Victoria, Cantabria). *Journal of Archaeological Science*, 32, p. 579-587.
- Pérez-Obiol, R.; Bal, M.-C.; Pèlachs, A.; Cunill, R.; Soriano, J. M (2012) - Vegetation dynamics and anthropogenically forced changes in the Estanillos peat bog (southern Pyrenees) during the last seven millennia. *Vegetation History and Archaeobotany*. 21, 4-5, pp 385-396.
- Rasilla, Domingo. F.; García Codron, J.Carlos; Carracedo, Virginia; Diego, Concepción (2006) - Circulation patterns, wildfire risk and wildfire occurrence at continental Spain. *Physics and Chemistry of the Earth*, 35 (1-2), p. 553-560.

Esta investigación se está desarrollando en el marco de los proyectos CSO2012-39680-C02-01 (*“El uso del fuego y la conformación de los paisajes en la Montaña Cantábrica y el Pirineo Oriental: estudio comparado de su evolución histórica y tendencias actuales”*) y CSO2012-39680-C02-02 (*“Geohistoria ambiental del fuego en el Holoceno. Patrones culturales y gestión territorial desde el inicio de la ganadería y la agricultura en la Montaña Cantábrica y Pirineo”*) del Subprograma de Proyectos de investigación fundamental no Orientada del Plan Nacional de I+D.

A ATIVIDADE CINEGÉTICA E OS INCÊNDIOS FLORESTAIS

Ricardo Manuel da Costa Rodrigues

Departamento de Geografia, Universidade do Minho

ricardo_microdrigues@hotmail.com

António Bento-Gonçalves

Departamento de Geografia e CEGOT, Universidade do Minho

bento@geografia.uminho.pt

RESUMO

O homem sempre foi, por natureza, um caçador inato. O ato de caçar terá sido, em tempos ancestrais, uma das atividades fundamentais da nossa espécie, visando, fundamentalmente, a alimentação, o vestuário e a defesa do grupo.

Após a queda do regime, com a revolução de 25 de Abril de 1974, terminaram as coutadas e instaurou-se no nosso país o regime livre. Em 1986, com a entrada em vigor da lei n.º 30/86 voltámos a um regime misto, terrenos de caça condicionados e terrenos livres, e, pela primeira vez, torna-se obrigatório a realização de um exame para a obtenção de carta de caçador. Algumas destas alterações legislativas fizeram nascer um sentimento de revolta no seio dos caçadores.

A atividade cinegética, desporto praticado ao ar livre e principalmente em espaços silvestres, pode ser geradora de inúmeros conflitos, podendo ser responsável pela ocorrência de incêndios florestais.

O presente trabalho visa apresentar os primeiros resultados de um questionário realizado *online*, a 305 caçadores sobre a relação dos incêndios florestais e da caça.

Palavras-chave: Caça, incêndios florestais.

Introdução

Na Antiguidade Oriental, alguns povos Orientais praticavam a caça com a finalidade de preparar fisicamente os seus homens para a guerra. Já na antiguidade clássica, reis, imperadores, generais, entre outros, aparecem em escritos associados à caça por puro lazer ou para preparação militar (Rosado, António A. C., 2001).

Bastos, Mário em 2005 citando Juan Mateos (*Origem y dignidade de la caza*) diz: “*A dignidade da caça, nobre exercício, foi conhecida facilmente por ser acção própria de Reis e Príncipes que podia ensinar melhor a arte militar, teórica e prática. Os bosques eram as escolas, os inimigos as feras, e assim com razão é chamada a caça viva imagem de guerra.*” (Bastos, M. F. R., 2005)

Em 14 de agosto de 1974 foi publicado o D.L. n.º 354-A/74, que teve como objectivo a erradicação da ligação entre a posse das terras e a posse da caça, extinção dos aramados (Art.º 22º, n.º1) e modificação dos conceitos que davam ao proprietário da terra a propriedade da caça - no fundo, procedeu-se a uma democratização nacional da actividade cinegética. Este documento privilegia as áreas de terreno livre, restringindo o número de áreas privadas. No ano seguinte e com a aprovação do D.L. n.º 407-C/75 extinguem-se as coutadas, considerando livres os terrenos de caça, facto que marcou uma nova etapa na cinegética nacional.

Após a queda do regime e com a aprovação dos já citados decretos-lei, assistiu-se, um pouco por todo o país, ao que Mário do Carmo, em 2005, apelidou de um “Massacre Faunístico”. A ainda riqueza cinegética verificada antes de 1974 (sobretudo nas antigas coutadas e aramados) ficou então exposta a uma enorme “predação humana”, que invadiu a imensidão de terras francas, com exceção das reservas de ordenamento cinegético

entretanto criadas, dizimando enormes populações de espécies cinegéticas (Bastos, M. F. R., 2005).

Em 1986, entramos numa nova fase da história da caça em Portugal, com a aprovação da lei nº 30/86. Uma das principais alterações, se não mesmo a principal, foi a permissão para a criação de Zonas de Caça. Voltamos novamente a assistir em terras lusas a uma legislação cinegética onde vigoravam, em simultâneo, dois regimes, o regime cinegético Geral (*res nullius*) e o regime cinegético especial (Zonas de Caça, equiparado ao antigo regime de coutadas), iniciando-se assim o atual Ordenamento Cinegético.

Atualmente a caça é encarada como um desporto e/ou uma atividade ao ar livre e não como necessidade.

Zonas de Caça

Segundo a legislação em vigor (D. L. nº. 2/2011 que regula a Lei n. 173/1999) as Zonas de Caça em Portugal podem ser agrupadas em quatro tipos (Zonas de Caça Nacional, Zonas de Caça Turística, Zonas de Caça Associativa e Zonas de Caça Municipal) consoante a finalidade a que se destinam. Na actualidade, e segundo a FENCAÇA (Federação Portuguesa de Caça), o ordenamento cinegético cobrirá aproximadamente 90% dos territórios nacionais com aptidão cinegética.

Segundo o ICNF, na época de caça 2012-2013, existiam em Portugal continental 277123 caçadores, no entanto, apenas 47,13% destes (130595 caçadores), tiraram a respetiva licença de caça.

Incêndios florestais em Portugal

Fazendo uma abordagem retrospectiva aos dados referentes às ocorrências de incêndios florestais a nível nacional, entre 1990 e 2012, verificamos que o ano de 1995, com 34 116 ocorrências, representa o início de um período com valores elevados. Segundo os dados disponibilizados *online* pelo ICNF, para o período entre 1990 e 2012, verificamos um elevado número de deflagrações, traduzindo-se num total de 564875 ocorrências. Já no que concerne à área ardida total registada, no mesmo período, registou 2844390 ha, que corresponde a 1425644 ha de povoamentos e 1418746 ha de matos.

A distribuição das ocorrências e incêndio florestal não é uniforme, sendo maior nos concelhos mais urbanos e limítrofes, existindo uma correlação entre o número de habitantes e o número de ocorrências (Bento-Gonçalves, A., 2006).

Analisando as causas de incêndios florestais apuradas e segundo a codificação e definição das categorias das causas dos Incêndios Florestais a caça aparece quer nas causas relacionadas com o uso do fogo (causa 126 - penetração em áreas de caça) quer nas Estruturais (31 - conflitos de caça). Para o período entre 2003 e 2012, foram contabilizadas a nível nacional 794 (298 - 126 e 496 - 311) causas relacionadas com a caça (Fig. nº.1).

Figura 1 - Causas apuradas respeitantes à atividade cinegética (126 e 311), entre 2003 e 2012, em Portugal Continental
Fonte: ICNF (2013)

Resultados preliminares do questionário realizado *online* sobre a caça e os incêndios florestais

O questionário sobre a relação entre a caça e os incêndios florestais, realizado online, contou com a participação de 305 caçadores.

A faixa etária mais representada foi a dos 31-40 anos (35%), seguida de perto pela faixa dos 21-30 anos (22%) e dos 41-50 anos (21%), sendo que a esmagadora maioria (63%) é já experiente nesta atividade, ou seja, há mais de 10 anos que é portador de carta de caçador. Observamos que muitos dos caçadores não caça numa só região cinegética nem numa só Zona de Caça, sendo a região do Alentejo a mais procurada (50%), seguindo-se a região Centro (38%) e a região do Norte (35%) e as Zonas de Caça com mais afluência são as Associativas (65%) e as Municipais (49%). A maioria (65%) dos caçadores defende o Regime Cinegético Ordenado ao livre, apesar de expressarem o descontentamento no que se refere às taxas cobradas pelas Zonas de caça, já que 75% dos caçadores acreditam que estas limitam financeiramente o seu acesso aos caçadores mais carenciados.

Quando as questões passaram a abordar a temática dos incêndios florestais, 62% dos inquiridos acredita não haver relação entre a caça e os incêndios florestais, no entanto, 31% afirma existir afinidade, e desses, 65% dizem ser má essa relação. Somente duas pessoas (1%) dizem usar o fogo para o auxiliar na caça, todavia 5% dos inquiridos afirma conhecer alguém que utilize tal método.

Quando as questões se tornaram mais evidentes quanto à relação entre a caça e o uso do fogo, também o foram as respostas, pois 51% dos inquiridos diz conseguir identificar pessoas problemáticas na sua Zona de Caça, e desses, 61% consegue identificar mais de quatro pessoas problemáticas.

Os conflitos cinegéticos estão presentes na codificação e definição das categorias das causas de incêndios florestais (31 - conflitos de Caça), 46% inquiridos acreditam que esses conflitos

poderão traduzir-se em incêndios florestais. Curioso também é que 49 inquiridos (16%) dizem conhecer alguém capaz de provocar um incêndio florestal quando revoltado por motivos de caça. A esmagadora maioria dos caçadores (72%) acredita que as áreas limítrofes das Zonas de Caça poderão ser geradoras de conflitos.

Conclusão

A caça, atividade exercida maioritariamente em espaços silvestres, apresenta em Portugal um grande número de praticantes, apesar de se verificar a partir do ano de 2001 uma diminuição do número de candidatos à obtenção de carta de caçador e consequentemente a diminuição do número de caçadores nacionais.

O ordenamento cinegético (Zonas de Caça) teve o seu enceto no ano de 1988 e desde então tem aumentado, no intuito de ordenar a totalidade dos terrenos com aptidão cinegética. O acesso a essas Zonas de Caça acarreta custos a todos os caçadores, que estavam acostumados a uma realidade menos dispendiosa. Este facto, leva a revoltas e descontentamentos que poderão traduzir-se em conflitos, eventualmente geradores de incêndios florestais.

Entre 2003 e 2012, em Portugal, foram apuradas 794 causas de incêndios florestais relacionadas com a caça (311 e 126), ficando evidente que a atividade cinegética configura, apesar de minoritária, uma preocupante realidade.

Após a análise às respostas obtidas através do questionário realizado, verificamos a insatisfação dos caçadores relativamente às elevadas taxas pagas às Zonas de Caça, afirmando mesmo, uma larga maioria, que se trata de uma forma de limitar o acesso dos caçadores com menores rendimentos.

No que diz respeito ao uso de fogo, nesta atividade, essa prática não é assumida, apesar de 5% dos inquiridos conhecer alguém que empregue tal prática.

Pensamos que a problemática reside nos inúmeros conflitos que esta atividade possa acarretar. Mais de metade dos caçadores consegue identificar pessoas problemáticas nas suas Zonas de Caça, e destes, 61% consegue identificar mais de quatro caçadores. Praticamente metade dos caçadores (46%) afirma que os conflitos em torno da atividade cinegética se poderão traduzir em incêndios florestais, existindo ainda quem conheça alguém capaz de tal prática.

As constantes anexações e desanexações dos terrenos e as áreas limítrofes das Zonas de Caça são também apontadas como uma causa geradora de conflitos.

Poderão ser inúmeras as motivações que poderão gerar a ocorrência de incêndios, tendo nós realçado algumas que poderão estar relacionadas com a caça.

Pensamos que esta atividade pode, se bem gerida e praticada, ser uma forma de travar o aumento do flagelo dos incêndios, podendo mesmo os caçadores constituir verdadeiros guardas da natureza, uma vez que os incêndios são inibidores da prática da caça e destruidores do recurso paisagem natural, de que os caçadores são um dos principais usufruidores.

Bibliografia

- Bastos, M. F. R. (2005) - *O problema venatório no Alentejo: Caça, costumes e tensões sociais (1974-2000)*, Dissertação de Doutoramento em História Contemporânea, Universidade de Lisboa, 891 p..
- Bento-Gonçalves, António (2006) - *Geografia dos Incêndios em Espaços Silvestres de Montanha - O Caso da Serra da Cabreira*, Tese de Doutoramento, Instituto de Ciências sociais da Universidade do Minho, Braga, 438 p..
- Rosado, António A. C. (2001) - *Caça Miúda, a Política da Caça, Apontamentos*, Oeiras, António A. C. Rosado, 289 p..

TEOR DE MATÉRIA ORGÂNICA EM SOLOS ARDIDOS E NÃO ARDIDOS, NA SERRA DA PENHA (GUIMARÃES)

Rúben Torres

Departamento de Geografia, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho
rubenptorres@sapo.pt

José Rocha

Departamento de Geografia, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho
jmanuelfrocha@sapo.pt

RESUMO

Analisar o teor de matéria orgânica de um solo não queimado comparativamente a outro queimado, evidenciadas as vantagens e desvantagens que ocorrem em cada uma das situações.

Pressupõem diferenciar os solos em função da área ardida e não ardida na Serra da Penha, proceder-se-á a recolha e caracterização das amostras do solo, pretendendo-se com estas conhecer os efeitos dos fogos florestais na Penha, as alterações que provocam no solo, tentando compreender como ecossistema local desenvolve-se depois de serem afectados pelo fogo, pois os incêndios são uma temática essencial referir, uma vez que se tomam como condicionante do caso de estudo.

Palavras-chave: solo, fogo, incêndio florestal, matéria orgânica, Serra da Penha

Introdução

O estudo dos diferentes tipos e horizontes do solo é importante para compreender os efeitos do fogo sobre o solo, efeitos esses, que provocam alterações químicas e físicas nas propriedades dos mesmos com especial incidência para o horizonte A.

Além das alterações químicas e físicas dos solos é também importante compreender as consequências da intensidade e severidade dos mesmos, o impacto das cinzas nos solos e as possíveis consequências hidrológicas e erosivas após o fogo.

O caso de estudo incidiu na Serra da Penha, assim intentámos a caracterização desta, a qual sustenta-se numa concepção da geologia (litologia), do clima tendo por base dados médios mensais da temperatura e precipitação e do relevo que é elaborada com base na hipsometria, exposição e declive do local de estudo.

Através das amostras de solo, pretende-se conhecer os efeitos dos fogos florestais na Penha, as alterações que provocam no solo, tentando compreender como o ecossistema local se desenvolve posteriormente ao ser afectado pelo fogo e assim perceber o teor de matéria orgânica presente no mesmo.

Formação dos solos

A formação dos solos é condicionada por cinco principais factores, são eles o clima, a natureza dos organismos, material de origem, o relevo e a idade de formação geológica.

O clima é um factor que se deve por em evidência em relação a todos os outros, pois podemos ter diferentes tipos de solo derivados da mesma formação litológica, consoante o clima “Os elementos principais do clima - temperatura e humidade - regulam a velocidade e o tipo de meteorização das rochas (...)” (Lepsch, 1977).

A natureza dos organismos compreende: microrganismos, vegetais, animais e o Homem.

O material geológico do qual o solo origina é um factor de resistência à formação do mesmo, pois é passivo à acção do clima e dos organismos “O solo forma-se pelo metamorfismo das rochas da crosta terrestre (...)” (Lepsch, 1977).

O relevo, fruto de climas diversos resultantes da desigual distribuição no terreno da precipitação, luz, insolação e erosão promove nos solos diferenças facilmente perceptíveis. Devido à precipitação a água acumula-se nas partes mais baixas tendo como consequência directa a seca das áreas mais elevadas. A erosão impera consoante o declive, pois quanto maior a inclinação maior é a erosão diminuindo assim a qualidade do solo.

Figura 1 - Evolução dos solos - Lepsch 1976

Por último, a idade geológica representa a formação do solo em toda a sua evolução desde o Litossolo até ao Podzólo. Com a evolução temporal o perfil do solo vai ficando mais espesso fruto de erosão, no entanto este processo pode ser acelerado com a exposição de material à superfície através da erosão e transporte fluvial, vulcanismo e desabamentos este com influência directa e rápida na evolução dos solos.

Horizontes do solo

Num clima temperado como o português onde não temos grande oscilação climática ao longo do ano, a água infiltra-se com naturalidade no solo na vertical da superfície até as camadas inferiores. O perfil de um solo é obtido através de um corte vertical constituído por um conjunto de horizontes, no entanto o solo pode apresentar um ou vários horizontes. Abordando uma perspectiva simplificada do perfil dos solos, existem três horizontes.

O horizonte A denominado de *iluvium*, representa a camada superficial do solo, sendo constituído essencialmente por matéria orgânica muitas das vezes é localizada uma camada mais fina constituída pelo húmus e denominada de A_0 , é também a camada do solo mais fértil para as práticas agrícolas.

Figura 2 - Horizontes do Solo - Lepsch 1976

O horizonte B, possui uma cor bastante mais clara fruto de ser muito menos composição é maioritariamente de matéria mineral, sendo pouco fértil comparativamente com o horizonte superficial.

O Horizonte C, formado por fragmentos da meteorização mecânica e química, possui essencialmente matéria mineral e pouca matéria orgânica, consequência de se encontrar já muito próximo da rocha mãe onde o material se encontra pouco consolidado, é também a camada menos afectada por processos pedogénicos.

Rocha-mãe, situada a uma profundidade variável, intacta e impermeável com excepção para as partes facturadas.

Geologia

Litologia

A serra da Penha insere-se no Maciço Hespérico, unidade estrutural onde se encontram as rochas mais antigas (xistos, quartzitos, granitos e rochas metamórficas) na Península Ibérica, segundo a classificação de zonamento elaborado por Lotze em 1945 a área da Penha insere-se na Zona Centro Ibérica, sendo os granitos as rochas que predominam.

As Serras do Minho são constituídas maioritariamente por granitos, havendo também xistos e quartzitos estando estas serras alinhadas na direcção bética (ENE-WSW) sendo uma destas serras a Cabreira. Assim Serra da Penha é considerada um prolongamento da Serra da Cabreira, enquadrando-se assim nas características das serras minhotas (Oliveira, 2001).

Geomorfologia

A geomorfologia é resultado da ligação entre orientações do terreno, declives e a morfologia. A amplitude hipsométrica é de 418 metros tendo em consideração que a base da serra encontra-se a 195 metros e o topo a 613 metros, as áreas com altura inferior a 200 metros representa antes 0.4% da área da serra enquanto 23.6% da área está a mais de 450 metros de altitude.

Clima

O Clima do Noroeste Português caracteriza-se por um clima com grande influência marítima, sendo temperado e húmido. Com temperaturas médias anuais baixas que rondam os 14°C, a precipitação média anual é de 1000mm. Contudo, nesta região verifica-se variações udométricas de Oeste para Este significativas resultado das «(...) montanhas que, pelo interior, cingem estas regiões contam-se entre os lugares mais ricos de precipitação da Europa» (Ribeiro, 2000).

Em suma, é uma região geralmente de precipitação abundante que a caracteriza como uma região húmida, apresenta dez meses húmidos (Setembro a Junho) e onde se apenas registam geralmente dois meses secos (Julho e Agosto).

Caracterização dos Solos na Penha em áreas «ardidas» e «não-ardidas»

Descrição macroscópica

A primeira recolha (área delimitada a vermelho - Fotografia 1) foi efectuada em área ardida, que apresentava características como um declive entre os 8 - 16%, diversidade de espécies vegetais (arbóreas e vegetação rasteira) entre elas o eucalipto (*Eucalyptus globulus*) sendo esta a principal espécie arbórea presente, havendo também um reduzido número de carvalhos (*Quercus faginea*). A vegetação rasteira era composta pelo elevado número de fetos (*Pteridium aquilinum*) havendo também muito algum tojo (*Rubus sp*) e herbáceas.

Fotografia 1 - Recolha de solo em área ardida

A segunda recolha (área delimitada a azul - Fotografia 2) foi realizada numa área não ardida, possuindo características semelhantes às da primeira recolha. O eucalipto (*Eucalyptus globulus*) continua a ser a espécie arbórea dominante, existindo igualmente alguns carvalhos (*Quercus faginea*). A existência de um reduzido número de fetos (*Pteridium aquilinum*) em conjunto com alguma matéria morta (húmus) são factor a destacar pois constitui a principal diferença entra as duas áreas.

Fotografia 2 - Recolha de solo em área não ardida

Análise e resultados

Com base na amostra recolhida, a Tabela I elaborada demonstra que nos solos onde ocorreu um incêndio florestal, o teor de matéria orgânica presente no solo é superior ao de um solo onde não ocorreu qualquer incêndio. Assim, através da amostra podemos depreender que o solo posteriormente ao incêndio, se encontra em melhores condições para as práticas agrícolas pois o teor de matéria orgânica presente no solo ardido, é superior ao da matéria orgânica presente num solo cujo não ocorreu nenhum incêndio.

Tabela I - Resultados finais das amostras, após processos laboratoriais

	Amostra	1ª Pesagem (gr)	2ª Pesagem (gr)	Resultados (%)
Solo não queimado	1	13.53	11.56	85.4
	2	17.79	15.5	87.1
Solo queimado	3	10.86	8.08	74.4
	4	14.86	12.19	82

Como podemos observar na Imagem 8, após a passagem do material recolhido pelo forno à temperatura de 970º temos a redução da quantidade de solo derivado do desaparecimento de matéria orgânica. A tonalidade de cor da matéria mineral que perdura é também alterada adquirindo tons mais bastante mais claros.

Conclusão

Recorrentemente nos dias de hoje os estudo sobre os solos e as suas propriedades revelam-se fundamentais para a preservação da biodiversidade. Neste contexto, o estudo do impacto do incêndio nas características do solo permite perceber de que forma podem ser mitigadas após

a acção do fogo sobre o solo com o objectivo de recuperação a curto prazo das suas características.

Bibliografia

- Lepsh, Igo F. (1977); *Solos - Formação e conservação*; Editora da Universidade de São Paulo;
- Oliveira, Mariana Filipa (2001); *Modificações do uso do solo - A Serra da Penha* (Relatório Final de Investigação);
Secção de Geografia, Instituto de Ciências Sociais, UM; Guimarães;
- Ribeiro, Orlando; Suzanne, Daveau (Org., Comentário e Actualização); Lautensach, Hermann (2000);
Geografia de Portugal - A posição geográfica e o território; Vol. I, 5ª Edição, Edições João Sá da Costa,
Lisboa.

CAPÍTULO 4

APLICAÇÃO DO PLANEAMENTO/ PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO À GESTÃO DE RISCOS

DESASTRES NATURAIS E GESTÃO DE RISCO NO BRASIL: CARACTERÍSTICAS E CONTRIBUTOS PARA O ORDENAMENTO TERRITORIAL

Aline Pascoalino

Universidade Estadual Paulista - UNESP, Campus Rio Claro, Brasil
alinespascoalino@yahoo.com.br

Lutiane Queiroz de Almeida

Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, Brasil
lutianealmeida@hotmail.com

RESUMO

O estudo teve como objetivos verificar as características da gestão de risco e dos desastres naturais no território brasileiro, com ênfase nos de origem climática. Foram consideradas as bases de dados do EM-DAT e do Observatório Nacional do Clima e Saúde. No que tange à gestão de risco observou-se as propostas e ações destinadas à prevenção e recuperação perante desastres naturais. A sistematização dos dados permitiu verificar as diferenciações regionais na distribuição dos fenômenos desastrosos destacando-se a tipologia do desastre e suas consequências, áreas de maior prioridade para o direcionamento de investimentos públicos e a destinação orçamentária no processo de atuação do poder público pré e pós evento.

Palavras-chave: desastres, riscos climáticos, gestão ambiental, gestão da crise, mitigação.

Introdução

O mito de que no território brasileiro não ocorriam desastres naturais está sendo substituído nos últimos decênios pela preocupação de como gerir o território em situações pré e pós desastres. Esta postura segue devido a maior recorrência de eventos que resultam danos desastrosos à sociedade, o que revela a ineficiência dos processos gestores para antever situações potencialmente conflituosas. Neste início do século XXI os esforços têm convergido para o conhecimento da distribuição espacial dos desastres e seus respectivos danos, bem como para a sistematização de informações que possam ser utilizadas por pesquisadores e gestores, o que contribui à memória histórica dos eventos e à geração de uma cultura de risco, ainda inexistente no país.

No que tange à gestão de risco, um primeiro desafio constitui reconhecer as fragilidades existentes nos atuais 5.570 municípios, conforme as especificidades locais e regionais, para que possam ser criados bancos de dados que favoreçam todos os agentes envolvidos na prevenção dos riscos e na mitigação perante os desastres, além de dotar o território de infra estruturas de monitoramento em tempo hábil para se antecipar aos eventos, reduzindo impactos nas áreas de maior suscetibilidade. O que se observa no cenário brasileiro é a compreensão por diversas esferas da sociedade que é emergencial criar mecanismos gestores para que sejam implementadas medidas atreladas propriamente à gestão de risco e não dos desastres e da crise.

Os desastres naturais no território brasileiro

Registros fornecidos pelo EM-DAT (2014), referentes ao período de 1900-2014, revelam que eventos relacionados às inundações, aos movimentos de massa e às epidemias tiveram maior impacto em termos de danos humanos com maior fatalidade. As secas e as inundações, de grande notoriedade no território brasileiro, afetaram aproximadamente 68 milhões de pessoas nesse período (48 milhões pelas secas). No intervalo de 2000 a 2014 os desastres naturais de

origem climática compreenderam 69 ocorrências, entre situações de inundações/enchentes (75%), secas (12%), tempestades (9%) e temperaturas extremas (4%). Dentre os desastres naturais de maior impacto destacam-se as inundações com movimentos de massa da Região Serrana do Rio de Janeiro (janeiro/2011), com o maior registro de mortes, aproximadamente 900 óbitos. Os desastres relacionados ao incremento hídrico tiveram maior fatalidade, mas as secas e estiagens produziram maior dano econômico. Eventos de inundações corresponderam a 74% da parcela afetada e as secas 24%, em um total de 8.487.635 pessoas afetadas.

Em se tratando da repercussão dos danos climáticos na dimensão regional do território brasileiro, de acordo com um levantamento histórico realizado pelo Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres que culminou na sistematização do Atlas brasileiro de desastres naturais (CEPED/UFSC, 2012, p.91), verifica-se para o período de 1990-2010 aproximadamente 31.900 desastres no território nacional. O Nordeste, Sul e Sudeste do país apresentaram maiores taxas de ocorrência dos eventos, concentrando 94%. No que concerne aos danos humanos, quase 103 milhões de pessoas foram afetadas em duas décadas, com maior taxa para a região Nordeste (42%). A região Sul teve um terço das ocorrências (34%), com taxa de população afetada pouco superior à metade da região Nordeste (22%) e quase equivalente à da região Sudeste (21%).

Com base nos dados extraídos do Observatório Nacional de Clima e Saúde (2014), para o intervalo 2000-2013, verificou-se que a maior parcela de afetados por desastres relacionados aos eventos climáticos ocorreu no incremento das precipitações com inundações (28.583.993 pessoas afetadas). Esse tipo de evento foi a principal causa de impacto no Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste; enquanto na região Sul os desastres de causa eólica tiveram maior repercussão. Conforme a tipologia dos desastres, nas respectivas regiões, o Nordeste e Norte sofreram com intensa redução de chuvas, enquanto Sudeste e Sul também foram comprometidas por eventos de temperaturas extremas.

As regiões Nordeste e Sul apresentaram maiores taxas de afetados pela totalidade dos desastres (53% e 26%, respectivamente, com base em 62.755.730 pessoas afetadas). A região Nordeste concentrou maior ocorrência de feridos e enfermos, enquanto o Sudeste concentrou os óbitos. Na apreciação por Unidade Federativa, Ceará, Santa Catarina, Bahia e Rio Grande do Sul foram os mais afetados. O impacto na estrutura habitacional foi maior em Santa Catarina e Rio Grande do Sul (22% e 12% de 2.187.653 desalojados, respectivamente); e, Maranhão, Santa Catarina e Ceará (taxas entre 10% e 12% de 667.126 desabrigados). Os impactos à saúde foram mais significativos em Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Amapá (entre 10% e 18% de 41.301 feridos); Ceará, Pará e Rio Grande do Norte (entre 11% e 24% de 241.652 enfermos) e Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina (entre 10% e 33% de 1.279 mortos).

Características da gestão de risco no Brasil e contributos para o ordenamento territorial

Os riscos climáticos resultam de processos naturais e das ações de uso e ocupação territorial, desse modo desconsiderar uma dessas dimensões pode gerar consequências conflituosas. O risco consiste na probabilidade de que algum evento aconteça; na concretização do evento, a magnitude de seu impacto pode adquirir característica de desastre, especialmente no espaço urbano que por ser heterogêneo, densamente habitado e irregularmente ocupado potencializa os efeitos danosos.

Conforme Almeida e Pascoalino (2012) o maior desafio para as instâncias governamentais é que seja invertida a lógica de investimentos públicos, enfatizando-se o trinômio: previsão,

preparação e prevenção, o que significa análise de risco e popularização de uma cultura de risco e não uma cultura do desastre. A lógica prevalecente pode ser observada na destinação orçamentária para ações preventivas, emergenciais e de recuperação. Entre 2008 e 2011 apenas 35% do montante foi utilizado em prevenção e gestão de risco. A maior disparidade foi encontrada para o Estado de Santa Catarina, que em dezembro de 2008 teve 30% de seus municípios atingidos por desastres nos anos seguintes só 1,3% do orçamento recebido foi destinado à prevenção.

Em 2012 o Governo Federal lançou o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais (2012-2014). O plano propõe quatro vias de atuação: prevenção por meio da construção de obras estruturantes; mapeamento das áreas de risco; monitoramento e alerta promovendo a estruturação de uma rede nacional, e resposta a desastres por meio de medidas assistenciais e de reconstrução pós desastre (Brasil, 2014). Dentre 18,8 bilhões de reais a serem investidos, parcela de 15,6 bilhões de reais destinava-se às ações de prevenção.

Com base em informações obtidas junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI, 2014), verifica-se que as ações no ano de 2014 concentraram-se no auxílio emergencial financeiro e em ações da Defesa Civil, além de obras estruturantes (o que não deixa claro se preventivas ou remediadoras), com tímidos investimentos em mapeamento de áreas de risco e restabelecimento da normalidade em cenário de desastre. Tópicos como apoio a obras preventivas de desastres, mobilização e manutenção de grupo de apoio a desastres ou capacitação de agentes e comunidades em Defesa Civil seguiram sem nenhum tipo de investimento. Na distribuição orçamentária destinada à prevenção e recuperação de desastres fica claro que o montante investido no segundo caso é sempre superior ao primeiro.

Diante desse cenário sintetizam-se alguns delineamentos norteadores para reflexões sobre os desafios da gestão de riscos no território brasileiro, sinalizando para a carência de estruturas de governança voltadas para a informação e conhecimento do risco; o direcionamento eficiente de políticas públicas; a integração das dimensões escalares do espaço e das esferas do poder público; a prevenção e a resposta aos desastres e recuperação (Quadro I).

Quadro I - Principais desafios a serem trabalhados pela gestão de risco no Brasil.

Informação e conhecimento	<p>Maior cobertura territorial no mapeamento e reconhecimento das áreas de risco.</p> <p>Transparência nas informações coletadas pré e pós eventos que constituem a base para o trabalho de investigadores, gestores e técnicos que atuam na busca do conhecimento para redução de riscos e impactos.</p>
Direcionamento de políticas públicas	<p>Criação de um sistema eficiente e integrado para receber as informações sobre áreas de risco prioritárias e sobre os desastres naturais, aliado à organização e tratamento de dados que possam ser utilizados como base para o conhecimento da recorrência e intensidade dos eventos, indicando para onde as políticas públicas preventivas devem ser direcionadas.</p>
Integração das dimensões escalares	<p>Visão analítica sobre o território nacional de forma unificada, mas não livre das especificidades existentes nas demais dimensões escalares.</p> <p>Implementação de propostas políticas nas escalas - nacional, regional e local, a fim de gerir os riscos de acordo com as necessidades evidenciadas pela sociedade que os experiencia.</p>
Prevenção	<p>Operacionalização de um sistema gestor que priorize os riscos e não os desastres.</p> <p>Acompanhamento e monitoramento das áreas de risco.</p> <p>Capacitação profissional de agentes relacionados à prevenção de desastres.</p>
Resposta aos desastres e recuperação	<p>Agilidade e eficiência do sistema gestor perante situações de crise.</p> <p>Justiça na distribuição do orçamento destinado a esta finalidade.</p>

Org. Pascoalino e Almeida

A reprodução da postura vigente depara-se ainda com outros problemas que aliam o desconhecimento de áreas de maior risco à destinação final dos investimentos, demonstrando ineficiência na operacionalização da aplicação dos recursos, chocando a necessidade do recurso financeiro e o destino final do mesmo. Assim, enfrenta-se: ausência de conhecimento entre os

municípios que necessitam de recursos e os que recebem os recursos; concentração de recursos em algumas Unidades Federativas e a carência em outras; ausência de critérios técnicos para distribuição dos recursos orçamentários; falta de integração entre órgãos governamentais, o que inviabiliza a circulação de informações; carência na dotação de infra estrutura territorial adequada pré desastre; ausência de transparência de informações; ausência da valorização de uma cultura do risco; entre outros fatores que inibem a gestão de risco propriamente dita, envolvendo previsão, preparação e prevenção.

Conclusão

Constata-se que em um primeiro momento segue o processo de reconhecimento das áreas de maior recorrência de desastres no país, constituindo as bases de dados existentes ferramentas que esclarecem quais eventos são mais frequentes e a diferenciação regional destes, bem como de seus impactos em termos das Unidades Federativas. Ao apreciar medidas direcionadas à prevenção e recuperação de desastres verifica-se um distanciamento entre as ações implementadas e as ações propostas, o que continua a reproduzir a persistência da gestão dos desastres em lugar da gestão de risco, com uma estrutura pautada em ações emergenciais e de recuperação pós desastre, tendo como resultante maiores danos para a sociedade e para as finanças públicas.

Bibliografia

- Almeida, L. Q. de.; Pascoalino, A. (2012) - Riscos climáticos e a gestão do território no Brasil. In C. A. Silva, E. S. Fialho (Coords.), *Concepções e ensaios da Climatologia Geográfica*. (pp. 145-170). Dourados: UFGD Editora.
- Brasil (2014) - Plano Nacional de gestão de riscos e resposta a desastres naturais 2012-2014. *Ministério da Integração Nacional*. Disponível em: <http://www.mi.gov.br> [Acesso em 1 de setembro de 2014].
- CEPED/UFSC (2012) - *Atlas brasileiro de desastres naturais 1991 a 2010: volume Brasil*. Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres. Florianópolis: CEPED UFSC.
- EM-DAT (2014) - The International Disaster Database. *EM-DAT*. Disponível em: <http://www.emdat.be> [Acesso em 1 de setembro de 2014].
- Observatório Nacional de Clima e Saúde (2014) - Sistema de eventos extremos no Brasil. *Observatório Nacional de Clima e Saúde*. Disponível em: <http://climasaude.icit.fiocruz.br> [Acesso em 1 de setembro de 2014].
- SIAFI (2014) - Execução orçamentária e financeira. *Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI)*. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/carrossel-siafi-03> [Acesso em 10 de setembro de 2014].

INSERCIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO MANEIRO. ESTADO NUEVA ESPARTA.VENEZUELA.

María Gabriela Camargo Mora

Instituto de Geografía y Conservación de los Recursos Naturales,
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Los Andes, Venezuela
profesoracamargo@gmail.com

Beatriz Ávila Guerra

Alcaldía de Maneiro. Estado Nueva Esparta. Venezuela /
Dirección de Desarrollo Urbano
beatrizavilaguerra@gmail.com

RESUMEN

Se parte de la premisa que la ordenación del territorio y la planificación urbanística se convierten en instrumentos de la Gestión del Riesgo en todos los diferentes niveles territoriales, pero tiene especial relevancia en los niveles locales (municipios y ciudades), donde se materializa y se puede intervenir realmente el riesgo, mediante la planificación de acciones o actuaciones y de la aprobación de normativas legales e instrumentos para el control de la ocupación, además permite orientar inversiones articuladas y priorizadas según su contexto particular de amenazas y riesgos

Se presenta el Plan de Desarrollo Urbano Local de Pampatar - Los Robles (PDUL), como estudio de caso, donde se inserta la Gestión de Riesgo en la planificación urbanística. Este instrumento persigue transformar la intención en acción, visualiza los impactos y consecuencias de los acontecimientos en el futuro y permite influir en ellos mediante acciones. Persiguiendo generar cambios en el territorio. Se logra una visión global e intersectorial, donde se identifican tendencias y oportunidades, anticipa dificultades, trata de minimizar el grado de incertidumbre para el logro de los objetivos y para orientar los recursos requeridos en las acciones interinstitucional. Mediante la Zonificación del Uso del Suelo, aprobada como norma legal, se convierte en el instrumento para el control de la ocupación del territorio y para prevenir y mitigar el riesgo urbano.

Palabras clave: Territorio, Amenazas, Vulnerabilidad, Riesgo, Ordenación,

Introducción

El Territorio es el resultado de los intereses de los actores y en la medida que se ocupa se genera vulnerabilidad y riesgo. Estas dos variables son problema de la Gestión del Riesgo. Hasta ahora el riesgo se ha abordado de manera inmediata, en el momento de la emergencia (cotidiano) o de los desastres por amenazas naturales. Es necesario un cambio en el paradigma de la Gestión de Riesgos, pasar de la acción inmediata a la acción de prevenir y mitigar a mediano y largo plazo mediante la planificación y la capacitación. Es decir, anticipar dónde y con qué intensidad se encuentra la vulnerabilidad y el riesgo, para darle un tratamiento de condicionante en la ocupación del territorio y en el desarrollo de actividades económicas. En esta ponencia se persigue analizar la inserción de la Gestión de Riesgo en la Planificación Territorial del Municipio Maneiro como alternativa para mitigar y prevenir la vulnerabilidad a mediano y largo plazo.

La Planificación Territorial para la Gestión de Riesgo

La Planificación Territorial se convierte en un instrumento de la Gestión de los Riesgo en todos los diferentes niveles territoriales, pero tiene especial relevancia en los niveles locales (municipios y ciudades), donde se materializa y se puede intervenir realmente el riesgo,

mediante la planificación de acciones o actuaciones y de la aprobación de normativas legales y estrategias para el control de la ocupación, además permite orientar inversiones articuladas y priorizadas según su contexto particular de amenazas y riesgos

La planificación territorial forma parte de la planificación física, su objeto de análisis es el territorio. Persigue el estudio global e integral de los territorios, tanto a escala local (urbanística) como a escala regional, para orientar directrices y tomas de decisiones de carácter político y consensuado entre los diferentes actores que actúan en el territorio. (Rodríguez, s/f).

La Planificación Territorial recurre a diversos instrumentos territoriales como son normativa legal, organización institucional y planes. Los planes de ordenación del territorio a nivel municipal y de planificación urbanística a nivel de ciudad son instrumentos para regular la ocupación y administración del territorio, que se concretan en la zonificación del uso potencial del suelo considerando las condicionantes o limitantes por amenazas naturales o vulnerabilidad. Las zonificaciones son normas jurídicas de fiel cumplimiento por las organizaciones locales.

A partir de la aplicación de los instrumentos (normas, planes y organización institucional) todos los permisos para la construcción de edificaciones nuevas, remodelaciones e intervención de áreas públicas y privadas que se emiten por ingeniería municipal y por la oficina de control urbano deben tener incluida la variable riesgo.

Instrumentos territoriales de gestión: Plan de Ordenación del municipio Maneiro y el Plan de Desarrollo Urbano Local de Pampatar - Los Robles

El Municipio Maneiro y la conurbación Pampatar - Los Robles, localizados al sur este del Estado de Nueva Esparta, al norte de Venezuela (Figura 1). Los instrumentos territoriales en el Municipio Maneiro son base para la gestión en todos los niveles territoriales, pero tiene especial relevancia en los niveles locales (municipios y ciudades), donde se materializa y se puede intervenir realmente, mediante la planificación de acciones o actuaciones que orienten la ocupación del área urbana y las inversiones articuladas y priorizadas según su contexto particular de cada terreno o espacio público. Las inversiones municipales y en la ciudad, se definen, teniendo en cuenta la dinámica de concertación técnica, social y política durante la formulación de los instrumentos, es decir que son el producto de acciones participativas de los diferentes actores locales.

Figura 1. Localización del Municipio Maneiro

El Plan de Desarrollo Urbano Local de Pampatar - Los Robles (PDUL), y el Plan de Desarrollo y Ordenación de Maneiro (PDOT), tienen como propósito definir con precisión el desarrollo urbano de ciudad y del Municipio, en función de las condiciones y limitantes físico naturales, la población y base económica, expresando la correspondencia de la infraestructura y el equipamiento de servicios a dotar para la población estimada. Controlan la ocupación y administración de la ciudad a través de la **Zonificación del Uso del Suelo y las variables urbanas fundamentales**. Son instrumentos de planificación y ejecución de la inversión pública que tiene un carácter político y consensuado.

El Componente de Gestión de Riesgos en los planes territoriales locales

Los planes territoriales son un proceso que se lleva a cabo mediante etapas consecutivas e iterativas. Se inicia con el análisis de los territorios desde una visión global, integral e intersectorial, donde identifica tendencias y oportunidades. Luego mediante la prognosis se crean escenarios, anticipa dificultades, para finalmente formular propuestas que tratan de minimizar el grado de incertidumbre para el logro de objetivos y para orientar los recursos requeridos en las acciones interinstitucional. En los diferentes momentos de la planificación territorial se analiza la Gestión de Riesgos con una noción de propósito clara, como se muestra en la figura:

Figura 2. Momentos de la Planificación y la inserción del riesgo

Los desastres naturales, antrópicos o tecnológicos, son considerados en el PDUL y PDOT, como las amenazas que causan más interrupciones a la normalidad de la sociedad, debido a la destrucción de sus propiedades, infraestructura social y económica y pérdidas humanas. La gestión de riesgo de desastres es el término que se utiliza para prevenir o minimizar los efectos de los desastres.

En la realización de los planes se consideraron análisis, según la escala territorial, de la caracterización físico natural de las componentes geológica- geomorfológica, geo mecánica de los macizos rocosos en el territorio, estudios sísmicos, las evaluaciones de los estudios de la mecánica de suelos, hidroclimatológicos con énfasis en el análisis de las áreas de inundación y, en el aspecto socio económico densidad de población, tipología de las edificaciones y su

vulnerabilidad a los moviemientos sismicos, lineas vitales, entre otros, estudios fundamentales para orientar las estrategias para controlar la ocupación y administración del territorio, en especial en las areas de riesgo.

A partir de los estudios fisico naturales y socio economicos, **se delimitaron y definieron las áreas bajo amenazas naturales y la vulnerabilidad de la población, se analizo la intensidad y la evolución de los eventos y se localizaron espacialmente**, identificando las limitantes para la asignación de los usos potenciales del suelo o las potencialidades para el desarrollo de las infraestructuras, para el desarrollo de las actividades socio económicas y para las actuaciones a desarrollarse en la ciudad. El análisis permite definir con precisión **las restricciones, orientaciones, limitantes y potencialidades** en los usos urbanos para desarrollos de infraestructuras, actuales y potenciales, que garanticen que estas sean más seguras y estables.

A partir de la delimitacion y definicion de los riesgos y las vulnerabilidades defino una **zonificacion de amenazas o de peligro y otra de vulnerabilidad**. Dichas zonificaciones se visualizan espacialmente, a partir de planos o mapas temáticos que permitieron el análisis síntesis integrado. Estos dos mapas de zonificacion son base para generar un mapa de Zonificacion de Riesgos. Entre los mapas temáticos a utilizar se encuentran los mapas geológico, geomorfológico, drenaje superficial, zonificación geotécnica urbana local, zonificación de susceptibilidad. Estos mapas permiten la interpretación y extrapolación (prognosis) para crear escenarios futuros, que permiten prevenir y mitigar el grado de incertidumbre.

La zonificación de riesgo y la vulnerabilidad resultante, se consideran como variables condicionantes para la definición de la **Zonificación del Uso del Suelo y para las variables urbanas fundamentales**, instrumento jurídico donde se define el uso potencial y sus restricciones del uso, permitiendo así, orientar y controlar la ocupación y administración del territorio, y minimizar los riesgos.

Conclusiones

Los estudios de riesgo y de vulnerabilidad constituyen importantes herramientas para la reducción del riesgo, en la medida que sus resultados sean incorporados en la planificación y control urbano, es decir, que sean considerados en la definición de los usos potenciales en la ciudad y municipio.

Bibliografía

- Plan de Desarrollo Urbano Local de Pampatar - Los Robles (2012). Tomos I, II, III. Municipio Maneiro. Nueva Esparta. Venezuela.
- Plan de Ordenación del Territorio del Municipio Maneiro (2010). Municipio Maneiro. Nueva Esparta. Venezuela.
- Rodríguez M, Juan (s/f). Planificación Territorial y Urbanismo. Pasado, presente y futuro del planeamiento Urbanístico.
- Universidad Simón Bolívar. Instituto de Estudios Regionales y Urbanos. (2009). Diseño de Metodología para la Inclusión de la Variable Riesgo Ambiental en los Planes Urbanos. Caso de Aplicación: Santa Cruz de Mora, Estado Mérida.

A GESTÃO DOS RISCOS TECNOLÓGICOS COM EXTERNALIDADE NO ENTORNO: UM ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP / BR

Edson Aparecida de Araujo Querido Oliveira

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA da UNITAU
edson.oliveira@unitau.com.br

Delanney Vidal Di Maio Junior

Instituto de Aeronáutica e Espaço - IAE/DCTA
Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional pela UNITAU
delanneydvdj@iae.cta.br

Luiz Antonio Perrone Ferreira de Brito

Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Desenvolvimento Regional da UNITAU
brito@unitau.com.br

RESUMO

A presença dos riscos nas sociedades contemporâneas, dominadas pela incerteza e pela insegurança em razão da constante possibilidade de ocorrência de desastres ambientais e tecnológicos, cujos efeitos não são totalmente previsíveis, conduziu a importantes alterações nas principais instâncias responsáveis pelo desenvolvimento - ciência, tecnologia e política. Um dos desafios para atingir o almejado desenvolvimento regional sustentável diz respeito à adequada governança desses riscos. Este Artigo tem o objetivo de identificar se a Governança dos Riscos Tecnológicos gerados por uma instalação industrial de engarrafamento e distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) no Município de São José dos Campos é articulada com a participação dos diversos atores sociais envolvidos. Para tal, parte da análise crítica de um estudo de caso, infere sobre a ação de diversos atores sociais envolvidos na gestão municipal do ambiente construído, tendo como eixo estruturante o equacionamento dos Riscos Tecnológicos. Diagnosticaram-se os principais riscos tecnológicos decorrentes das atividades da indústria de petróleo e gás desenvolvidos no município; identificou-se a percepção de risco de atores sociais envolvidos; tipificou-se a relação entre esses atores; e propõem-se caminhos para melhoria do quadro identificado, com o efetivo engajamento das comunidades locais no processo decisório do desenvolvimento almejado e definição dos riscos aceitáveis.

Palavras-chave: Gestão. Risco Tecnológico. Percepção de Risco. Tomada de Decisão.

Introdução

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVale), criada pela Lei Complementar nº 1.166, de 9 de janeiro de 2012, localizada entre duas grandes metrópoles - São Paulo e Rio de Janeiro, é considerada um dos principais eixos de desenvolvimento do Estado de São Paulo. Este artigo apresenta subsídios à reflexão e busca de mecanismos democráticos e abrangentes para a gestão pública de riscos tecnológicos que muitas vezes transcendem os limites de um único município, caso dos oleodutos, gasodutos e poldutos da Região.

Diagnosticam-se os principais riscos tecnológicos decorrentes das atividades da indústria de petróleo e gás desenvolvidas no Município; identifica-se a percepção de risco dos atores sociais envolvidos; tipifica-se a relação entre esses atores; e a partir desses dados verifica-se a ação dos atores envolvidos no processo decisório do desenvolvimento almejado e da definição dos riscos aceitáveis, visando a governança das externalidades dos riscos tecnológicos.

Para estimular atividades que gerem externalidades positivas e controlar as que representam externalidades negativas é necessária a criação de políticas públicas que as regulem. Nesse

sentido é de fundamental importância a articulação dos diversos atores sociais interessados, tendo sempre como objetivo a busca do Pareto eficiente, que em tese é a situação econômica em que não seria possível melhorar as condições de um determinado agente sem impactar negativamente a situação de qualquer outro agente econômico.

Riscos Tecnológicos típicos da Indústria de Petróleo e Gás

Valle e Lage (2004) mencionam que a preocupação mundial com o planejamento urbano no entorno de instalações industriais que apresentam risco de ocasionarem acidentes ampliados aumentou após o acidente de Bhopal, Índia, ocorrido em 03 de dezembro de 1984.

Gurgel et al. (2009, p. 2028) asseveram que a indústria de petróleo e gás “constituem uma das atividades humanas de maior potencial poluidor”, tanto as áreas de exploração e produção (*Upstream*), como as áreas de transporte, refino e distribuição (*Downstream*).

A partir do referencial teórico estabeleceram-se os riscos tecnológicos causados por instalações de engarrafamento e distribuição de GLP, apresentados no Quadro I.

Quadro I: Riscos associados às bases distribuidoras de gás liquefeito de petróleo.

Riscos crônicos	Riscos agudos
G.1. Emissões descontinuas de vapores de hidrocarbonetos pelas válvulas de alívio (<i>vents</i>) dos tanques de armazenagem de GLP.	G.I. Vazamento de GLP, seguido de explosão e incêndio nas operações de carga e descarga de caminhões e vagões- tanque.
G.2. Emissões atmosféricas descontinuas originadas da carga e descarga de caminhões.	G.II. Vazamento de GLP, seguido de explosão e incêndio nos dutos de transporte do produto da refinaria até as bases gasíferas.
G.3. Tráfego intenso de caminhões nas vias que dão acesso às bases distribuidoras devido ao transporte rodoviário.	G.III. Vazamento seguido de explosão e incêndio nos tanques de armazenamento de GLP - incêndio em poça, BLEVE, bola de fogo.
G.4. Risco de poluição crônica devido ao transporte das borras oleosas de fundo de tanque e resíduos contaminados com óleos e graxas, destinados aos fornos das indústrias de cimento, que vêm incinerando tais materiais.	G.IV. Vazamento de GLP em algum ponto das instalações industriais: tubulações, válvulas, dutos, equipamentos.
G.5. Emissões atmosféricas provenientes da cabine de pintura dos botijões de GLP (venda no varejo).	G.V. Acidentes envolvendo o manuseio e transporte das borras oleosas de fundo de tanque e resíduos contaminados com óleos e graxas, destinados aos fornos das indústrias de cimento, que vêm incinerando tais materiais.
G.6. Lançamento nos corpos d’água de efluentes líquidos do sistema de tratamento dos vapores de tintas e solventes das cabines de pintura dos botijões de GLP.	G.VI. Acidentes envolvendo o transporte de GLP em caminhões tanque.

Fonte: Adaptado de Pedersoli (2007, p. 150).

Ainda nesse sentido, Duarte e Droguett (2012) corroboram que em função de lidar com grandes quantidades de substâncias altamente perigosas, eventuais vazamentos acidentais podem causar graves danos à sociedade e ao meio ambiente.

Métodos/Procedimentos

Para atingir os objetivos estabelecidos neste trabalho optou-se por efetuar uma pesquisa de campo, exploratória, com abordagens qualitativa e quantitativa, a partir de um estudo de caso.

O fluxograma apresentado na Figura 1 ilustra de forma simplificada, as etapas estabelecidas para consecução da pesquisa:

Figura 1: Esquema do Fluxograma das Etapas da Pesquisa.

Discussão e Resultados

Lideranças

Entrevistaram-se duas lideranças com forte influência na comunidade, para que se obtivesse a percepção do risco tecnológico a partir de formadores de opinião inseridos no grupo sujeitos da pesquisa. Na Figura 2 estão representados, de forma sintética, os aspectos que foram destaque nestas entrevistas.

Figura 2: Aspectos que foram destaque nas entrevistas com as Lideranças.

Órgãos Públicos

Os demais atores sociais consultados, representantes dos poderes executivo e legislativo municipal, representantes da Defesa Civil, e do órgão estadual responsável pelo licenciamento ambiental (CETESB), também conhecem os referidos riscos, porém atuam mais preocupados em atender a burocracia estabelecida do que realmente preocupados em equacionar os eventuais problemas percebidos / identificados.

A articulação entre os atores sociais consultados mostrou-se bastante frágil ao longo do tempo, ou seja, o parecer dos órgãos públicos envolvidos limita-se aos fatos concretos do momento da emissão de seus pareceres e não estão necessariamente ligados à dinâmica social do lugar.

Moradores

A partir da aplicação de questionários levantaram-se informações sobre a percepção de risco dos moradores do Bairro Jardim Três José; a amostra foi determinada por acessibilidade.

Na Figura 3 observa-se que 57,45%, dos entrevistados, acreditam que seja muito perigoso uma explosão; 25,53% perigoso; e somente 17,02% pouco perigoso. Esse último grupo relaciona o fato de as empresas serem seguras à legislação para aprovação do empreendimento, levando a crer que se está aprovado é por que é seguro, então uma explosão seria pouco perigosa. Já na Figura 4, percepção do risco em função da frequência de ocorrência de explosão nas companhias de GLP, 80,85 % consideraram pouco frequente; 17,02 % frequente; e somente 2,13 % muito frequente.

Figura 3: Distribuição de frequência x Percepção de Perigo - explosão GLP

Figura 4: Distribuição de frequência x Percepção de Risco - explosão GLP

A maioria dos fenômenos analisados está em conformidade com o comportamento esperado, de acordo com o embasamento teórico realizado, visto que quando um “Risco Tecnológico” gerado por um empreendimento é percebido como muito perigoso pelos atores sociais envolvidos, só se entende como socialmente aceito se a probabilidade de sua concretização for muito baixa, ou, em outras palavras, que ocorra de forma pouco frequente.

Conclusão

A principal conclusão desta pesquisa é a existência de vulnerabilidades institucionais e sociais, dentre as quais se destaca a falta de inserção do risco na cultura, gerando a não percepção das ameaças e das ações prospectivas mais consequentes.

Nas regiões onde o risco tecnológico se faz presente, a estrutura local de Defesa Civil pode fomentar a implantação da subpolítica proposta por Beck (2011), no sentido de enfrentar os riscos identificados.

As empresas não podem omitir os riscos extramuros potenciais, para que o poder público tenha informações adequadas que viabilizem o gerenciamento adequado do zoneamento do entorno. Pode-se afirmar que é pobre a Governança dos Riscos Tecnológicos identificados; neste sentido corroboram:

- O baixo conhecimento prévio dos reais problemas por parte significativa dos atores sociais consultados;
- A autorização do adensamento ocorrido no entorno do referido empreendimento sem levar em conta os Riscos Tecnológicos extramuros pré-existentes demonstra que os órgãos do poder executivo precisam ter maior capacitação de seus quadros técnicos para com propriedade poderem analisar tais propostas;
- A realização de exercício simulado na região sem o efetivo envolvimento da comunidade eventualmente afetada;
- A efetivação de obras para melhoria viária (executada na Av. Tancredo Neves) sem levar em conta a necessária manutenção da rota de fuga para os moradores do Bairro Jardim Três José caso ocorra um acidente maior nas instalações industriais de engarrafamento e distribuição de GLP.

Este estudo, de caráter exploratório, apresenta limitações, tanto da ótica do número de atores sociais abordados quanto do tamanho da amostra pesquisada, para que suas conclusões quanto à Governança dos Riscos Tecnológicos possa ser estendida de forma homogênea, como representativa do real processo de todo o Município; recomenda-se a realização de estudos futuros, tendo como foco o estudo de outros empreendimentos que também representem potencial Risco Tecnológico ao entorno.

Bibliografia

- Duarte, H. O.; Droguett, E. A. L. (2012) - Análise Quantitativa de Risco de uma Unidade de Recuperação de Enxofre em uma refinaria de petróleo. *GEPROS. Gestão da Produção, Operações e Sistemas*, v. 7, n. 2, p. 23-38;
- Gurgel, A. M. et al. (2009) - Framework dos cenários de risco no contexto da implantação de uma refinaria de petróleo em Pernambuco. *Ciênc. saúde coletiva*. v. 14, n. 6, pp. 2027-2038;
- Pedersoli, W. J. (2007) - *O bom uso do princípio da precaução: análise a partir do licenciamento ambiental da indústria de refino de petróleo e gás natural da Região Metropolitana de Belo Horizonte, MG, Brasil*. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, Universidade Federal de Ouro Preto, 246 p.
- Portier, C. J. (2009) - Approaches to Decision Making. In: *Environmental Health Sciences Decision Making: Risk Management, Evidence, and Ethics - Workshop Summary*. Washington: The National Academies Press. p. 9-13;
- Valle, C. E.; Lage, H. (2004) - *Meio Ambiente: acidentes, lições, soluções*. 2ª ed. São Paulo: Senac São Paulo, 256 p.;

MAPEAMENTO DE RISCOS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE CARAGUATATUBA-SP

Estéfano Seneme Gobbi

Faculdade de Geografia, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Brasil
estefano.gobbi@puc-campinas.edu.br

Francisco Sérgio Bernardes Ladeira

Universidade Estadual de Campinas, Brasil
fsbladeira@ige.unicamp.br

Marcelo da Silva Gigliotti

Universidade Estadual de Campinas marcelo.gigliotti@ige.unicamp.br

RESUMO

O intenso intemperismo verificado nas escarpas da Serra do Mar promove um grande desenvolvimento de material pedogenético que, associado a elevadas declividades e precipitações temporalmente concentradas são os principais fatores que desencadeiam movimentos de massa e depósitos gravitacionais na Planície Costeira de Caraguatatuba-SP e em tantas outras áreas do litoral brasileiro. Esses movimentos de massa orientam-se preferencialmente pelos canais de drenagem, que também concentram os maiores riscos no que concerne a corridas de lama, rolamento de blocos e inundações.

Movimentos de massa são processos inerentes à Serra do Mar e fazem parte da dinâmica natural das faixas litorâneas próximas ao Planalto Atlântico. As zonas de contato entre a Planície Costeira e as escarpas da Serra do Mar são áreas de suscetibilidade maior a esses desastres naturais, de maneira que sua ocupação deveria ser restringida, evitando assim a maior vulnerabilidade socioeconômica das pessoas e atividades que são verificadas nessas áreas. Entretanto, historicamente é na faixa litorânea que se concentra um grande contingente populacional e se desenvolve grande parte das atividades econômicas.

Palavras-chave: Mapeamento de Riscos, Planície Costeira, Escorregamento de Massa.

Introdução

A Planície sedimentar de Caraguatatuba é drenada em sua maior área pelo Rio Juqueriquerê (formado pelos rios Claro, Piraçununga e Camburu), e na porção setentrional pelos rios Santo Antônio, Lagoa e Guaxinduba, além de pequenos leitos d'água que correm diretamente ao oceano. Grande parte do aporte sedimentar aluvial que chega a planície se deve a área ainda menos antropizada do município (região SO), carreado pelos leitos do Claro, do Piraçununga e do Camburu (CRUZ, 1974).

Entretanto, as áreas mais ocupadas da Planície concentram-se nas bacias dos Rios Santo Antônio, Rio do Ouro, Ribeirão da Lagoa e Rio Guaxinduba, de maneira que eventos de escorregamento de massa como o ocorrido em 1967 sejam mais impactantes socioeconomicamente nessas áreas.

Em atividades de campo foram verificadas as áreas de contato entre a Planície Sedimentar e a Serra do Mar que, somadas aos dados altimétricos do Plano Cartográfico do Estado de São Paulo (1978) e às coletas de material pedológico por meio de tradagens (trado holandês) embasaram o delimitação das áreas de maior suscetibilidade a riscos associados a depósitos de movimentos de massa e inundações em ambiente SIG.

Caracterização da Área

A Planície Sedimentar de Caraguatatuba é drenada por quatro bacias hidrográficas (Juqueriquerê, Guaxinduba, Santo Antônio e Lagoa), além de pequenos cursos d'água que deságuam diretamente no Oceano Atlântico, como visualizado na Figura 1.

Figura 1 - Bacias Hidrográficas da Planície Sedimentar de Caraguatatuba

O Rio Guaxinduba é responsável pela drenagem de uma pequena área da Planície, constituindo uma das menores bacias hidrográficas de Caraguatatuba. Caracteriza-se por apresentar um vale de alvéolo interno já rebaixado, com cotas muito próximas as do nível do mar, percorrendo seu traçado em meio a formações arenosas originadas de depósitos marinhos e de seus próprios depósitos aluviais, já que se seu curso na planície não tivesse sido retificado para a praia Martim de Sá, deveria provavelmente apresentar um padrão anastomosado. Segundo Freitas (1959), as modificações climáticas ocorridas no quaternário propiciaram que a zona de contato entre a planície e as encostas da serra primeiramente sofressem um intenso intemperismo que posteriormente possibilitou a formação de largos alvéolos, caracterizando o padrão de drenagem atual do rio. O interflúvio com a bacia do Rio Santo Antônio é caracterizado antes de atingir a Planície, por cotas de 429 a 502, na forma de “rocha exposta em dente canino”, como trás Cruz (1974).

O Rio Juqueriquerê é formado na confluência do Rio Claro, Rio Perequê e Rio Tinga ou Camburu, ainda apresentando como importantes afluentes o Rio Perequê-Mirim, o Rio São Tomé, o Rio Piraçununga, o Ribeirão Pau-d’álho e o Córrego Canivetal (PLANO CARTOGRÁFICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1978). As áreas dos leitos dos rios limítrofes entre as maiores declividades das escarpas do cristalino e a grande planura da Planície Sedimentar traduzem-se em locais entulhados por blocos rolados ou carreados por forças fluviais/gravitacionais, de modo a se depositarem nestas áreas de contato e demarcando o início de um canal anastomosado e meandrante. Devem ser consideradas as hipóteses de evolução de dinâmica de deposição de

acordo com a evolução da drenagem, pois com a variação do nível do mar e a consequente mudança do nível de base, a erosão e a sedimentação fluvial tem seus padrões modificados. De acordo com Tesslet et al (2006), a área drenada pelos Rios Santo Antônio e Lagoa são naturalmente propensas a deposição de sedimentos, por conta da deriva sedimentar longitudinal, que se enfraquece e tende a depositar-se neste segmento costeiro.

Em consequência de chuvas torrenciais na região, em março de 1967, foram verificados um grande número de ocorrências de corridas de lama, porém de acordo com Petri & Suguio (1971) a montante predomina a ocorrência de matacões, enquanto que a jusante, são verificados seixos e areias, que tem sua granulometria reduzida a medida que o rio se aproxima do Atlântico. Este fato é explicado por Suguio (1980) pelo Santo Antônio possuir um canal anastomosado, de modo a ter sua energia de transporte reduzida abruptamente ao atingir a planície sedimentar.

Ainda sobre aquele evento, Cruz (1974) trás que o vale do leito principal que era da ordem de 10 a 20 metros passou a ter a largura de 60 a 80 metros depois da série de escorregamentos de 1967. A autora ainda trás que o interflúvio do rio já nas cotas menos elevadas da Serra Mar apresenta cotas de altitudes variáveis entre 200 e 250 metros.

O Rio Santo Antônio após recebem um imenso aporte sedimentar em um único evento e terem seus vales entulhados passaram a buscar um novo entalhe para seu talvegue, buscando desviar o curso dos novos taludes de detritos que ocupavam a área de suas bacias.

Resultados e Discussão

Ao serem realizadas tradagens e análises de solo nas áreas de contato das escarpas cristalinas da Serra do Mar e a Planície Sedimentar de Caraguatatuba foram verificadas evidências de escorregamentos de massa pretérito, assim com a presença de blocos rolados. Estas informações de campo, somadas às referências bibliográficas (Cruz, 1974; Gobbi, 2009; Gobbi & Ladeira, 2011 e Petri & Suguio, 1971) foram fundamentais para a confecção do Mapa de Riscos associados a Planície Sedimentar de Caraguatatuba (Figura 2). Há de se destacar também que, apesar de não serem encontradas evidências de Corridas de Lama nas atividades de campo, Cruz (1974) afirma que nos eventos de 1967 esse risco foi bastante intenso e verificado principalmente nas atuais áreas centrais do município (Bacia do Rio Santo Antônio). Desta forma, este risco, associado a configuração da drenagem também será contemplado.

Ao analisar as declividades para a área, nota-se que este fator é preponderante para a ocorrência dos escorregamentos de massa e que sua mudança apresenta-se de maneira gradual entre os 10 e 20 metros de altitude. A partir desta cota, a declividade verificada é bastante íngreme, de maneira a determinar que as altitudes superiores sejam áreas deflagradoras da movimentação de massa e as áreas limítrofes da Planície com as escarpas (cotas inferiores a 20 metros) estão mais suscetíveis a ocorrência de eventos associados a deposição dos escorregamentos de massa, assim como visualizado na Figura 2. A declividade acaba por influenciar também na formação do solo, pois modifica a dinâmica da água nos perfis de solo, alterando a pedogênese.

Para o risco de rolamento de blocos, a delimitação da área de riscos está associada, além do fator declividade, à hidrografia, pois esta tende a limitar o deslocamento dos matacões, que, ao atingirem o leito d'água, perdem a energia cinética da ação gravitacional e tendem a entulhar o canal (como demonstra a Figura 3), pois a energia fluvial dos rios na planície não são suficientes para a mobilização deste volume de material.

Mapa de Riscos associados a Planície Sedimentar de Caraguatatuba

Figura 2 Mapa de Riscos associados a Planície Sedimentar de Caraguatatuba

Considerações Finais

A delimitação da Planície apresentou como fundamental não para a determinação da área de estudos, como também para a verificação dos locais de maior concentração das atividades antrópicas e suas respectivas vulnerabilidades aos riscos do limite das escarpas com a planície. Esta delimitação deve-se a declividade verificada nessas áreas, já que à partir da altitude de 20 metros o terreno apresenta uma maior inclinação e demonstra-se mais susceptível a mobilização. Desta forma, as áreas mais próximas às cotas de 20 metros de altitude, assim como de maior

proximidade com cursos d'água apresentam-se de maior risco a sua ocupação, devendo ser evitadas para a construção de moradias e atividades comerciais.

Agradecimentos

Os autores agradecem a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP-07/53644-1) pelo financiamento da pesquisa, ao projeto “Estudos da previsibilidade de eventos meteorológicos extremos na Serra do Mar” (FAPESP-04/09469-0).

Bibliografia

- CRUZ, O. A Serra do Mar e o litoral na Área de Caraguatatuba-SP: Contribuição a Geomorfologia Litorânea Tropical. Tese de Doutorado (Doutorado em Geografia). FFLCH - USP. São Paulo-SP. 1974.
- FREITAS, R. O. Roteiro da 5ª excursão: litoral norte do estado de São Paulo - Ilhabela a Ubatuba. In: 13º Congresso de Geologia de São Paulo. 1959. p. 24.
- GOBBI, E. S. Depósitos gravitacionais, marinhos e fluviais e a evolução geomorfológica da planície sedimentar de Caraguatatuba-SP. Dissertação (Mestrado em Geografia). Instituto de Geociências. Universidade Estadual de Campinas. Campinas-SP. 2009.
- GOBBI, E. S., LADEIRA, F. S. B. Proposta para mapeamento de riscos associados a movimentos de massa e inundação: o caso de Ubatuba, SP. In Revista Geociências, v. 30 nº 3. p.445-456. São Paulo-SP. 2011.
- PETRI, S. & SUGUIO, K. Características granulométricas dos escorregamentos de Caraguatatuba, São Paulo, como subsídio para o estudo da sedimentação neocenozóica do sudeste brasileiro. In: Congresso Brasileiro de Geologia (25). São Paulo-SP. 1971. p.71-82.
- PLANO CARTOGRÁFICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - Escala 1:10.000. 1978.
- SUGUIO, K. Ambientes de Sedimentação e fácies sedimentares. In: Rochas Sedimentares: propriedades, gênese, importância econômica. São Paulo-SP. 1980. Edgar Blücher. p. 305-389.
- TESSLER, M. G., GOYA, S. C., YOSHIKAWA, P.S., HURTADO, S. N. Erosão e Progradação do Litoral do Estado de São Paulo. In MUEHE, D. (org) Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro. 1ª ed. Brasília-DF: Ministério do Meio Ambiente, 2006. p. 297-346.

GRANDES PROJETOS DE INVESTIMENTOS HIDRELÉTRICOS (GPIH) E RISCOS TERRITORIAIS: O RIO ARAGUARI(MG)-BRASIL

Hudson Rodrigues Lima

Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia/MG, Brasil
hrlima@eseba.ufu.br

Vicente de Paulo da Silva

Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia/MG, Brasil
vicente@ig.ufu.br

RESUMO

O rio Araguari, em Minas Gerais, é o sexto em capacidade de geração de energia elétrica do Brasil. Nele localizam-se seis aproveitamentos hidrelétricos. É um rio com grandes áreas apropriadas por empreendimentos, impondo intensas transformações territoriais. Ainda é reduzido o número de investigações sobre os riscos que a construção das barragens trouxe e traz às populações. É preciso identificar quais são as medidas efetivas de segurança e prevenção de tragédias à vida humana e toda espécie de vida. O ponto de partida: pesquisa de mestrado finalizada no ano de 2013, orientada pelo Prof. Dr. Vicente de Paulo da Silva. Identificou-se grande insatisfação com a atuação do poder público e do empreendedor na área de entorno dos reservatórios. Instigou-nos a proposição de nova investigação para apurar essas insatisfações à luz dos perigos porque passam as pessoas e ambientes. O trabalho é preliminar e pretende-se trocar ideias com o grupo de investigadores da temática dos riscos, a fim de identificar os perigos e a situação da gestão dos riscos em territórios de hidrelétricas.

Palavras chave: perigos em hidrelétricas, energia hidrelétrica, grandes projetos de investimento, riscos em hidrelétricas, segurança em hidrelétricas

Introdução

Em pesquisa realizada nos anos de 2011 e 2012 no Programa de pós-graduação do Instituto de Geografia (IG) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) focalizamos dois empreendimentos hidrelétricos localizados no rio Araguari (MG), denominados de Complexo Energético Amador Aguiar, para compreender o que o Setor Elétrico Brasileiro (SEB), vem chamando desde o início da década de 1990 de política de sustentabilidade.

A referida investigação centrou a atenção na Área de Entorno (AE) dos dois reservatórios do Complexo Energético Amador Aguiar, abrangendo os municípios de Uberlândia, Araguari e Indianópolis no Estado de Minas Gerais, Brasil. Buscou-se nos levantamentos de dados bibliográficos, documentais e em narrativas de pessoas, evidenciar o discurso de sustentabilidade nos negócios do Consórcio Capim Branco Energia (CCBE) e nas legislações das Prefeituras Municipais e sua territorialização na AE do Complexo Energético Amador Aguiar.

No cruzamento de dados de discursos e práticas corporativas, municipais e das comunidades atingidas/afetadas, explicitou-se o esvaziamento de sentido de uma ideia, a de desenvolvimento sustentável, apontando a necessidade do Poder Público e da Iniciativa Privada estabelecer relações de poder democráticas e participativas nas definições e execuções de programas, projetos, planos e ações que efetivamente construam um desenvolvimento territorial saudável, respeitando a vida humana, a vida dos animais e dos vegetais.

Foi a partir da realização desse trabalho que nos propusemos a realizar desdobramentos dos resultados obtidos, no sentido de identificar e mapear riscos e perigos que possam ameaçar o bem-estar das pessoas residentes e dos ambientes nas AE dos reservatórios de Aproveitamentos Hidrelétricos (AHE) não só os referenciados na pesquisa, como também em todos os outros

empreendimentos que atingem e afetam o rio Araguari e, conseqüentemente, podem causar riscos à vida em seu mais amplo sentido.

O rio Araguari

O rio Araguari conta hoje com seis AHE, sendo duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e quatro Usinas Hidrelétricas (UHE), em uma extensão de 475 km, abrangendo 16 municípios, dos vinte localizados em sua bacia de contribuição e com população aproximada de 1,2 milhões. Se considerados este conjunto de AHE, os mesmos tornam-se um mega-projeto de investimento, o que abre frentes de pesquisa para identificar perigos, riscos e vulnerabilidades, bem como frentes de trabalho que possam também identificar a *capacidade de resposta* (associada a uma vulnerabilidade), *ajustamentos* e *capacidade de absorção* das comunidades atingidas, no caso os eventos citados, categorias de análise estas propostas por Hogan e Marandola Jr. (2005), como forma de se estabelecer uma política consistente de segurança em hidrelétricas.

Os referidos eventos hidrelétricos foram e são pesquisados pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Riscos e Grandes Empreendimentos (NEPERGE) do Instituto de Geografia (IG) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), cabendo ressaltar os trabalhos por ordem de localização das nascentes à foz do rio Araguari: Damasceno (2011), Silva (1995, 2004), outra autora Silva (2012), Bernadelli (2012), Silva (2011), Parreira (2008) e Lima (2010, 2013).

Além dessas pesquisas vinculadas ao NEPERGE/IG/UFU, na consulta das teses defendidas no Programa de pós-graduação do IG/UFU, criado em 1997, identificou-se até 04 de setembro de 2013, quinze pesquisas de mestrado e duas de doutorado que possuem como foco, investigações sobre AHEs ao longo do rio Araguari.

Em levantamento estimativo, por falta de dados exatos fornecidos pelos empreendimentos e mesmo pelo poder público, é próximo a 700 km² a área inundada da Bacia Hidrográfica apenas ao longo da calha do rio. Por esses dados é possível dimensionar os perigos, riscos e vulnerabilidades porque passam as pessoas e municípios atingidos pelos eventos em foco.

Junta-se a esta informação que segundo dados extraídos de relatórios da Aneel (2011), o rio Araguari é o sexto curso d'água brasileiro com maior número de AHE e nono maior em aproveitamento hidrelétrico, o que reafirma a necessidade de haver pesquisas que investiguem os perigos que as barragens e seus efeitos significam para as Área de Entorno, bem como para as suas Áreas de Influência e que se explicita ou se proponham políticas de segurança em relação aos riscos.

Por uma identificação e gestão de riscos no rio Araguari

Uma análise detida da relação dos GPIH com o Poder Público e principalmente entre estes dois entes com as comunidades atingidas e/ou afetadas não é nada sinérgico e muito menos um ordenamento do território que valorize a capacidade endógena das comunidades e estratégia *bottom-up* (de baixo para cima) para usar o termo empregado por Ortega (2008) de participação nos rumos do planejamento e organização do território. O que predomina em um setor econômico como o é o da energia elétrica para o Estado Brasileiro, é sem dúvida a utilização de interesses exógenos às comunidades e uma estratégia de ação *top-down* (de cima para baixo), o que geralmente acarreta acirramento de conflitos de interesses entre as três partes envolvidas: comunidades atingidas, poder público e GPIH.

Apesar dos discursos que indicam a participação democrática de diferentes seguimentos sociais e seus interesses antagônicos os dados obtidos na investigação realizada, indicam que por mais que um AHE traga benefícios diretos e indiretos para o público, ainda é o setor privado o grande beneficiário da apropriação do espaço.

Como exemplo ilustra-se o investimento que foi realizado no gerenciamento de riscos. Ele se aproxima de zero em relação ao total investido em outros setores, por exigência legal. Geralmente o pouco que se investe é voltado para a segurança da barragem em si, desde a sua obra de engenharia até a segurança mesma da barragem depois que entra em operação. Nos relatórios produzidos pelas empresas que gestam os GPIH não se vê investimento efetivo no gerenciamento de riscos e perigos que efetivamente ameaçam as pessoas e o ambiente.

Em muitos trabalhos acadêmicos que em suas escolhas teórico-metodológicas diagnosticam sérios problemas socioespaciais em áreas de GPIH, há exclusão explícita das possíveis situações de riscos e perigos que tendem a agravarem o ambiente natural e a qualidade de vida humana sem que se aponte para políticas necessárias de segurança e gestão dos riscos.

Em todo este contexto a ameaça que podemos vislumbrar é a de que o Setor Econômico de Energia parece demonstrar um crescimento exponencial em relação à demanda de geração e de consumo de energia elétrica, não só no Brasil como também no mundo. Sejam quais forem as fontes de geração de energia, o fato é que ela direta e indiretamente são responsáveis pela “produção” de riscos e perigos na forma de redes que perpassam pelo esgotamento de bens naturais, perdas de biodiversidade, imposição de vulnerabilidades sociais a atingidos e afetados, que em efeito de propagação atingem territórios rurais e urbanos, sem que se apresente explicitamente essas informações, exceto de forma ainda bastante isolada e nebulosa.

Ainda por concluir

É um desafio para os trabalhos acadêmicos dialogar entre campos disciplinares que tratem dos riscos e perigos em várias dimensões e escalas. Na Geografia, particularmente, o maior desafio é considerar ao mesmo tempo as dimensões naturais e sociais e, por isso, o conceito de vulnerabilidade transita com mais fluidez as análises sobre os perigos e riscos por ser um conceito complementar a este. Segundo Marandola Jr e Hogan (2005), a vulnerabilidade é mais simbiótica na relação sociedade-natureza, relação essa muito preciosa aos geógrafos. Sendo assim, identificar as vulnerabilidades em GPIH torna-se uma forma de buscar respostas a perigos iminentes ou não, o que amplia a capacidade do poder público e empreendedores, de diminuir perdas e salvar vidas humanas e outras formas de vida.

Almeida (2011, p.93), apresenta uma categorização dos tipos de vulnerabilidade, que defendemos como sendo tipos de perigo, aplicados aos estudos dos fenômenos naturais que podem contribuir para o aperfeiçoamento dos Estudos de Impacto Ambiental de GPIH, conforme consta no Quadro I. Esses seriam caminhos a serem seguidos a fim de se construir outro tipo de planejamento e ordenamento dos territórios atingidos por GPIH, na perspectiva de políticas de segurança.

Quadro I -Tipos de vulnerabilidade aplicados aos estudos dos fenômenos naturais

TIPO DE VULNERABILIDADE	CARACTERÍSTICAS
Vulnerabilidade física (ou estrutural, ou corporal)	Concentram-se na análise das construções, das redes de infraestrutura e do potencial de perdas humanas.
Vulnerabilidade humana ou social	Avalia os retornos de experiência sobre as capacidades de resposta, adaptações, comportamentos e suas consequências socioeconômicas e territoriais. Acrescenta-se ainda a percepção das ameaças ou da memória do risco, o conhecimento dos meios de proteção, os tipos de comportamentos potenciais.
Vulnerabilidade institucional	Vulnerabilidade institucional Trata da capacidade de resposta das instituições diante da crise; funciona como fator indireto da vulnerabilidade social.
Vulnerabilidade ambiental e patrimonial	Analisa os danos sobre os componentes ambientais - vegetação, solos, recursos hídricos, fauna, e aspectos culturais provocados por fenômenos naturais.
Vulnerabilidade funcional e econômica	Avalia as disfunções no que tange às atividades econômicas, rupturas nas redes de comunicação e transporte, entre outros.

Fonte: ALMEIDA, 2011, p.93 (apoio em Leone e Vinet - 2006)

Para Ladeira, Espósito e Naghettini (2007, p.2) “As metodologias de análise de risco não são determinísticas e devem contemplar cenários de incertezas nas diversas fases da vida de uma barragem. Essas incertezas estão associadas a ameaças, que se puder ser quantificadas estarão aptas a serem gerenciadas por análise de risco.” Nota-se no posicionamento dos pesquisadores que não existe intervenção humana sobre o espaço e o território isenta de perigos e incertezas. É fato que nem a natureza e nem o humano são perfeitamente previsíveis, sendo assim, são passíveis de riscos, perigos e vulnerabilidades que merecem atenção e uma resposta efetiva de segurança.

Faltam projeções confiáveis e efetivas sobre o impacto de um possível rompimento de uma das barragens. Citamos apenas este aspecto que envolve riscos e perigos com o rompimento de uma das barragens que no chamado “efeito cascata” desses AHE’s do rio Araguaí, podem atingir espaços e territórios da Região Hidrográfica do Rio Paraná. Na mesma linha de raciocínio, com certeza outros riscos e perigos podem ser identificados e mapeados no que se relaciona à perda da biodiversidade, dos deslocamentos compulsórios ou não de pessoas e dos consequentes desenraizamentos culturais, econômicos e sociais. A ciência tem muito a contribuir com essa discussão.

Bibliografia

- Almeida, Lutiane Queiroz. (2011) - Por uma ciência dos riscos e vulnerabilidades na Geografia. *Revista Mercator*, vol. 10, n.23. Fortaleza, Editora da Universidade Federal do Ceará, p. 83-99
- Bernadeli, Camila. (2012) - *Os efeitos socioespaciais das Usinas Hidrelétricas Amador Aguiar I e II: o assentamento Vida Nova em Uberlândia-MG*. Uberlândia, Programa de pós-graduação do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, orientador: Prof. Dr. Vicente de Paulo da Silva, 101 p.
- Damasceno, Isabelle Aparecida. (2011) - *A PCH Pai Joaquim no contexto de Grandes Empreendimentos Hidrelétricos no rio Araguaí*. Uberlândia, Programa de pós-graduação do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, orientador: Prof. Dr. Vicente de Paulo da Silva, 57 p.
- Lima, Hudson Rodrigues. (2010) - Inventário paisagístico socioespacial do alto curso do rio Araguaí (Bacia hidrográfica do rio Paranaíba-Paraná) em Minas Gerais. *Anais III Encontro latinoamericano Ciências Sociais e Barragens*. Belém, Universidade Federal do Pará, 28 p.
- Lima, Hudson Rodrigues. (2013) - *Território e políticas de “sustentabilidade” no complexo energético Amador Aguiar - rio Araguaí/MG*. Uberlândia, Programa de pós-graduação do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, orientador: Prof. Dr. Vicente de Paulo da Silva, 218 p.

- Marandola Jr. Eduardo. Hogan, Daniel Joseph. (2005) - Vulnerabilidades e riscos: entre geografia e demografia. *Revista Brasileira de Estudos da População*, vol. 22, n. 1, São Paulo, Abep, p. 29-53
- Ortega, Antonio César. (2008) - *Territórios deprimidos: desafios para as políticas de desenvolvimento rural*,. Campinas, Editora Alínea; Uberlândia, Edufu, 240 p.
- Silva, Andreia. (2012) - *Usina Hidrelétrica de Miranda e mudanças socioespaciais em Indianópolis-MG*. Uberlândia, Programa de pós-graduação do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, orientador: Prof. Dr. Vicente de Paulo da Silva, 218 p.
- Silva, Vicente de Paulo da. (1995) - *Destruição e reconstrução simbólica em tempos de modernização*. São Paulo, Programa de pós-graduação da Universidade de São Paulo, 120p.
- Silva, Vicente de Paulo da. (2004) - *Efeitos Sócio-espaciais de Grandes Projetos em Nova Ponte - MG: Reorganização do Espaço Urbano e Reconstrução da Vida Cotidiana*. , Programa de pós-graduação da Universidade de São Paulo, 220p.

AVALIAÇÃO DO RISCO NO MUNICÍPIO DE BENGUELA, ANGOLA

Wladimir Borges Estevão

Ministério da Educação, Benguela, Angola
wladimirestevao2012@hotmail.com

Alexandre Oliveira Tavares

Centro de Estudos Sociais e Dep. Ciências da Terra da Universidade de Coimbra
atavares@ci.uc.pt

RESUMO

Os riscos materializam processos ou acções, naturais ou tecnológicos, que adquirem relevância socio-económica e que têm expressão territorial, os quais condicionam as políticas públicas e a qualidade de vida dos cidadãos. Com este trabalho identificam-se os processos perigosos, de origem natural e tecnológica que afectam a população do município de Benguela, Angola. Faz-se de seguida uma avaliação do grau de risco para os principais processos, utilizando a probabilidade e gravidade dos impactos associados. Foram identificados 13 processos principais de perigo, de origem natural e tecnológica, com impacto e danos materiais e humanos no município de Benguela. Na análise do grau de risco recorreu-se à matriz harmonizada utilizada pela ANPC e à matriz das três variáveis (Standards Australia, 2004). Como base na classificação do grau de risco evidenciaram-se os galgamentos costeiros, a seca e abaixamento dos níveis de águas, os acidentes ou incêndios com material eléctrico, em resíduos ou edifícios habitacionais e os acidentes rodoviários. Apresentam ainda graus elevados as cheias e inundações, as tempestades e trovoadas com chuvas intensas, a par da instabilidade de taludes e arribas.

Palavras-chave: Riscos naturais, riscos tecnológicos, grau de risco, Benguela, Angola.

Introdução

Os riscos materializam processos ou acções, naturais ou tecnológicos, que adquirem relevância sócio-económica e têm expressão territorial, constituindo a análise e gestão dos riscos fora de acção e decisão integrantes das actividades em sociedade (Cantos e Ayala-Carcedo, 2002). Nas sociedades atuais verifica-se um aumento da consciência individual e coletiva quanto aos potenciais perigos, por parte dos cidadãos, técnicos, cientistas e agentes políticos, os quais se organizam cada vez mais em torno desta problemática (Tavares *et al.*, 2014). Estes intervenientes procuram através do ordenamento e planeamento, bem como nas instituições da protecção civil, melhorar a capacidade de gestão dos riscos.

Em Angola o crescimento das grandes cidades, em particular após a independência, devido a factores de atracção e segurança, a par do êxodo rural, coloca novos problemas na gestão do espaço urbano, assim como na segurança das comunidades e cidadãos. Os impactos dos processos naturais e tecnológicos têm vindo a adquirir maior importância social e institucional, em resultado das consequências e da recorrência dos acidentes e desastres, em que o município de Benguela é um exemplo.

Área de Estudo

A área de estudo, o Município de Benguela, localiza-se na província de Benguela, em Angola, a qual se situa na zona litoral centro. O município ocupa uma área de 2.100 km² (Figura 1). A população está estimada em 887.756 habitantes, com uma densidade populacional de 355,7 hab/km² (PDMB, (2012).

Figura 1 - Localização da área de estudo

O Município dispõe de Serviços de Proteção Civil e Bombeiros, o qual conta com sete viaturas operacionais de combate a incêndios, quatro lanchas, duas motas aquáticas e um barco, assim como os serviços de emergência médica do INEMA. Os Serviços de Proteção Civil estão dotados de um Sistema de Aviso Prévio (SAP) para controle e alerta de riscos de inundação, e contam ainda com o serviço Praias Seguras de Angola (PSA), que é executado por mergulhadores e nadadores-salvadores

Metodologia

A avaliação dos principais perigos e impactos associados baseou-se em recolhas de campo sobre registos históricos de ocorrências de acidentes naturais e tecnológicos em várias áreas do município, assim como nas reconstituições e percepções dos diferentes agentes da proteção civil ou de responsáveis, directos ou indirectos, pela gestão ou comunicação do risco, para os quais foram aplicados questionários abertos.

Após a análise foi avaliada a gravidade e a probabilidade de ocorrência para cada um dos processos perigosos presentes, naturais e tecnológicos. Utilizaram-se matrizes de análise de risco que permitem graduar o nível do risco a partir das suas componentes fundamentais: a previsibilidade do evento de risco se vir a concretizar e as suas potenciais consequências Coelho (2007). Para esta análise utilizou-se a metodologia apontada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil de Portugal no caderno técnico PROCIV9 (ANPC, 2009). Para complementar a avaliação utilizou-se a metodologia das Três Variáveis HB205-2004 (Standards Australia, 2004), que inclui como parâmetros de análise as Consequências (C), a Exposição (E) e a Probabilidade (L).

Avaliação e Análise do Risco

A base de dados elaborada para os processos perigosos no município de Benguela, fez ressaltar os elevados danos e perdas pessoais e materiais associados às cheias e inundações, tempestades e trovoadas com chuvas intensas, incêndios em habitações e outros edifícios e acidentes de viação.

Foi ainda revelada a importância dos danos materiais associados aos galgamentos costeiros e secas. As cheias e inundações são sistematicamente referenciadas pelos elevados impactos sociais, com o aparecimento de elevado número de desalojados e perdas materiais em habitações e na agricultura, mas também com vítimas mortais e feridos. As perdas humanas foram particularmente relacionadas com as quedas de barreiras, taludes ou muros, com acidentes ferroviários, ou com acidentes com material eléctrico. A sinistralidade rodoviária emerge como o principal riscos do município dada a frequência e os elevados impactos, com feridos, vítimas mortais e danos materiais.

As margens do rio do Cavaco, o Bairro do Calomburaco, o Bairro do Cotel, o Bairro da Calomanga e o Bairro da Seta, assim como a vala de Coringe, a Praia Morena e a Caota, são as áreas mais expostas aos riscos naturais e tecnológicos no município.

Na Tabela I aparecem identificados os graus de risco para cada um dos principais processos naturais para o município de Benguela, segundo a matriz da ANPC (2009). É de realçar o grau elevado ou extremo para cinco dos seis processos analisados, apresentando os graus mais elevado as secas, com as consequências associadas ao abaixamento dos níveis de água nos rios, valas e poços, assim como os galgamentos costeiros. Salienta-se como moderados os processos de erosão ravinante presentes em algumas arribas e vertentes, como as localizadas na zona do S. António.

Tabela I - Grau de risco para os processos naturais pela matriz ANPC (ANPC, 2009).

Processo	Gravidade	Probabilidade	Grau de risco
Cheias e inundações	Acentuada	Média-alta	Risco Elevado
Tempestades e trovoadas com chuva intensa	Acentuada	Média-alta	Risco Elevado
Secas e abaixamento dos níveis de água	Acentuada	Elevada	Risco Extremo
Galgamentos costeiros	Acentuada	Elevada	Risco Extremo
Instabilidade de taludes e arribas	Acentuada	Média-alta	Risco Elevado
Erosão de ravinas	Reduzida	Elevada	Risco Moderado

Na Tabela II surgem os resultados para os processos ou acidentes tecnológicos analisados com a matriz da ANPC (2009). Salientam-se os graus extremos para os acidentes rodoviários, assim como os relacionados com os acidentes ou incêndios com material eléctrico, originados por curto-circuitos, por manuseamento indevido aquando de ligações a fontes de distribuição eléctrica, por electrocução associada à queda de cabos e postes eléctricos ou por contacto com fontes ou cabos/fios de corrente eléctrica. Os incêndios em habitações ou em depósitos de resíduos mal acondicionados/lixos, resultam do fogo para cozinhar e iluminar, ou decorrente de curto-circuitos ou sobrecarga dos sistemas ou do uso indevido.

Tabela II - Grau de risco para os processos ou acidentes tecnológicos pela matriz ANPC

Processo	Gravidade	Probabilidade	Grau de risco
Acidentes rodoviários	Crítica	Elevada	Risco Extremo
Acidentes ou incêndios com material eléctrico	Acentuada	Elevada	Risco Extremo
Incêndios de resíduos ou edifícios habitacionais	Acentuada	Elevada	Risco Extremo
Contaminação de solos e cursos de água	Moderada	Elevada	Risco Elevado
Contaminação marítima	Moderada	Média-alta	Risco Elevado
Contaminação atmosférica	Reduzida	Elevada	Risco Moderado

A análise do risco segundo a matriz das três variáveis (Standards Australia, 2004) aparece representada na Tabela III.

Tabela III - Grau de risco segundo a matriz das três variáveis.

Processo	Consequências C	Exposição E	Probabilidade L	Score	Grau de Risco
Cheias e inundações	50	2	3	300	Elevado
Tempestades com chuvas intensas	50	2	3	300	Elevado
Secas e abaixamento dos níveis de água	25	2	6	300	Elevado
Galgamentos costeiros	50	2	6	600	M. Elevado
Instabilidade de taludes e arribas	50	1	2	100	Moderado
Erosão de ravinas	5	2	6	60	Baixo
Acidentes rodoviários	50	10	10	3000	M. Elevado
Acid. ou incêndios com mat. eléctrico	50	2	3	300	Elevado
Incêndios em resíduos ou ed. habitac.	50	2	3	300	Elevado
Contaminação de solos e de águas	15	3	6	270	Moderado
Contaminação marítima	15	2	3	90	Moderado
Contaminação atmosférica	1	6	10	60	Baixo

Sobressaem pelo grau muito elevado os galgamentos costeiros e os acidentes rodoviários. Com grau elevado de risco aparecem as cheias e inundações, tempestades e trovoadas com chuvas intensas, acidentes ou incêndios com material eléctrico e os incêndios em resíduos ou edifícios. Os problemas de contaminação e a instabilidade de taludes, arribas e quedas de muros apresentam grau de risco moderado, em função do baixo valor ou das consequências, ou da exposição ou da probabilidade. O valor mais baixo de grau de risco está associado à erosão ravinantes de arribas e vertentes.

Conclusões

Em síntese, o município de Benguela apresenta elevados a muito elevados graus de risco em processos, quer naturais, quer tecnológicos. As duas metodologias de avaliação do grau de risco fizeram salientar pelas classes muito elevadas ou extremas os galgamentos costeiros ou calemas e os acidentes rodoviários. As duas metodologias salientam os graus moderados ou baixos para os processos de erosão ravinante e para a contaminação atmosférica por poeiras. Genericamente pode-se dizer que a matriz utilizada pela ANPC origina valores mais elevados de grau de risco, quando se compara com os resultados da matriz das três variáveis.

Os únicos processos que apresentam graus de risco afastados nas duas matrizes, são a instabilidade de taludes e arribas, a contaminação de solos e águas, e a contaminação marítima. De acordo com os elevados ou muito elevados graus de risco encontrados para o município de Benguela, faz sentido desenvolver acções de prevenção, redução e mitigação do risco, para aumentar o grau de segurança das populações.

Referências Bibliográficas

- ANPC (2009). *Cadernos Técnicos PROCIV 9. Guia Para Caracterização de Risco no Âmbito da Elaboração de Planos de Emergência de Protecção Civil*. Autoridade Nacional de Protecção Civil, Lisboa 28p.
- Cantos, J. & Ayala-Carcedo, F. (2002). *Riesgos Naturals, Conceptos Fundamentals y Clasificación*. In Ayala-Carcedo, Francisco & Cantos, Jorge (Ed.) - *Riesgos Naturales*, Ariel Ciencia, Barcelona, pp. 41-73.
- Coelho, J.M. (2007). *A Matriz Harmonizada de Risco ``O Canivete Suíço `` dum sistema integrado de Gestão do Risco Industrial*). Riscos Públicos e Industriais vol. 1, Edições Salamandra, Lisboa.
- PDMB, (2012). *Plano Director Municipal de Benguela. Regulamento. Proposta do Plano*. Governo Provincial de Benguela Direcção Provincial do Ordenamento do Território, Urbanismo e Ambiente. Documento Reservado.

Standards Australia. (2004). *HB205-2004 OHS Risk Management Handbook*. Sydney, Standards Australia.

Tavares, Alexandre Oliveira; Santos, Pedro (2014). Re-scaling risk governance using local appraisal and community involvement. *Journal of Risk Research*, 17, 7, 923-949.

ORDENAMENTO TERRITORIAL E GESTÃO DE RISCOS NA REGIÃO DO LITORAL NORTE DE SÃO PAULO - BRASIL

Humberto Gallo Junior

Instituto Florestal - SMA/SP, Brasil

hgallojr@ig.com.br

Débora Olivato

Secretaria Estadual de Educação - SP, Brasil

debora.olivato@gmail.com

RESUMO

A região do Litoral Norte de São Paulo está situada no domínio da Mata Atlântica e possui cerca de 80 % de sua área protegida por Parques Estaduais criados na década de 1970. O Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Norte, publicado em 2005, define as diretrizes de uso e ocupação do solo. O mapeamento de áreas de risco efetuado em 2006 pelo Instituto Geológico de São Paulo identificou diversas áreas em situação de risco a deslizamentos, queda de blocos e inundações. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi fazer uma correlação entre os instrumentos de ordenamento territorial e a gestão de riscos na região. Foi efetuada a análise dos marcos legais vigentes e sua correlação com a estrutura de gestão de riscos e dinâmica de ocupação, com estudo de caso na bacia hidrográfica do Rio Indaiá, município de Ubatuba - Brasil - SP. Verificou-se que embora o tema dos riscos ambientais seja importante para a região, ele não é priorizado na gestão territorial. A implantação pelo poder público de conjunto habitacional e creche em área de risco na bacia estudada evidencia este problema. A criação dos Parques Estaduais foi fundamental para a conservação de áreas frágeis na escarpa da Serra do Mar. Porém, com a implantação de diversos empreendimentos previstos para a região, espera-se o aumento da população com tendência à ampliação da ocupação de áreas de risco. Os municípios envolvidos não estão estruturados para suportar esta demanda, o que contribui para o agravamento da questão.

Palavras-chave: ordenamento territorial; gestão de riscos; Litoral Norte de São Paulo.

Introdução e Objetivos

A região do Litoral Norte de São Paulo compreende os municípios de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela, passou por uma intensificação do processo de ocupação a partir da década de 1950. De acordo com Raimundo (2007), a abertura da rodovia BR-101 na década de 1970, interligando Santos ao Rio de Janeiro, desencadeou processos de re-territorialização na região, culminando com a ascensão do turismo como atividade econômica preponderante.

Em 1977, no período de intensas discussões internacionais sobre a problemática ambiental, foram criados os Parques Estaduais da Serra do Mar, de Ilhabela e da Ilha Anchieta, recobrando em torno de 80% da região.

No ano de 2004 foi instituído o Zoneamento Ecológico Econômico do Litoral Norte (SÃO PAULO, 2005), com objetivo de disciplinar o uso e ocupação da terra.

Em 2006 foi publicado o mapeamento das áreas de riscos associadas a processos de deslizamentos e inundações do município de Ubatuba (SÃO PAULO, 2006).

A região apresenta elevada fragilidade ambiental e atualmente há uma perspectiva de uma ampliação acelerada da ocupação em virtude de empreendimentos de grande magnitude que estão sendo implantados, como o Projeto de Exploração de Gás de Mexilhão, as obras do Pré-Sal, a ampliação do Porto de São Sebastião, entre outros.

O objetivo deste trabalho foi fazer uma correlação entre os instrumentos de ordenamento territorial e a gestão de riscos na região, a partir da análise e correlação entre os marcos legais

vigentes, com a realização de estudo de caso na bacia hidrográfica do Rio Indaia, localizada no município de Ubatuba (Figura 1).

Figura 1 - Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Indaia no município de Ubatuba-SP. Elaboração Fabio Pincinato, 2012.

Resultados

O Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Norte (SÃO PAULO, 2005) compreende cinco zonas no setor terrestre, sendo as zonas 1 e 2 voltadas à conservação dos ecossistemas naturais ou pouco alterados, a zona 3 correspondente às áreas rurais e as zonas 4 e 5 abrangendo áreas com características efetiva ou potencialmente urbanas (Figura 2).

Figura 2 - Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral Norte. Fonte: São Paulo (2005)

No estudo preparatório para este Zoneamento foi incluído um inventário de movimentos gravitacionais de massa, elaborado pelo Instituto Geológico, com dados levantados pelas Defesas Cíveis - municipais e estaduais - no período de 1988 e 2001.

Na área da Bacia Hidrográfica do Rio Indaiá estão registradas quatro áreas sujeitas a escorregamento de solo, e uma área de escorregamento de solo e bloco de rocha.

Dentro do contexto de estudo geral do Zoneamento, há um sub-capítulo denominado “riscos ambientais”, onde são destacados os riscos provenientes de postos de abastecimento de combustíveis e empresas de saneamento básico, como também as atividades vinculadas ao terminal de Petróleo e Gás da Petrobras e ao Porto de São Sebastião.

Atualmente o Zoneamento está em processo de revisão, existindo uma forte pressão dos municípios e alguns segmentos para ampliação das zonas passíveis de adensamento urbano e também para a abertura da possibilidade de atividades industriais, o que levaria à forte descaracterização da região.

Embora os mapeamentos realizados pelo Instituto Geológico de São Paulo no ano de 2006 apontem diversas áreas em situação de risco a inundações e escorregamentos, a questão não tem sido contemplada de forma satisfatória nas discussões de revisão do Zoneamento.

Do ponto de vista da gestão de riscos, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (BRASIL, 2012) apresenta uma série de orientações para elaboração dos planos da defesa civil nas diversas escalas espaciais (federal e estadual, e em municípios prioritários inseridos no cadastro nacional). O município de Ubatuba está inserido no Plano Preventivo de Defesa Civil - específico para Escorregamentos nas Encostas da Serra do Mar, redefinido pelo Decreto No. 42.565 de 1/12/1997 (SÃO PAULO, 1997). O Plano é acionado no período de verão, que concentra os maiores índices pluviométricos e apresenta maior possibilidade de ocorrência de escorregamentos e inundações.

Verificou-se que o município de Ubatuba não está devidamente estruturado para lidar com a questão dos riscos ambientais, em virtude da falta de infra-estrutura, recursos financeiros e pessoal.

O estudo realizado na Bacia do Rio Indaiá permitiu constatar a existência de ocupações em áreas com restrição legal, incompatíveis com as normas estabelecidas pelo Zoneamento Ecológico-Econômico. Verifica-se o avanço das construções no sentido do Parque Estadual da Serra do Mar, cujo limite é a cota de 100 m de altitude.

Na entrada do bairro do Taquaral, esta sendo construído um conjunto habitacional popular com 144 apartamentos (de execução da Secretaria Estadual da Habitação em parceria com a Prefeitura Municipal de Ubatuba), e uma escola de educação infantil - creche municipal (de execução do MEC em parceria com a Prefeitura Municipal), ambos localizados na várzea do rio Indaiá (fotos 1, 2 e 3). A Escola Municipal Prof. José Souza Simeão, principal ponto de referência para a comunidade, também está localizada nesta área. Essa área foi considerada como de alto risco a inundação no mapeamento realizado pelo Instituto Geológico (SÃO PAULO, 2006), conforme Figura 3.

Considerações Finais

Conforme assinalado por Gallo Jr *et al* (2011), o Zoneamento Ecológico Econômico Estadual deve ser tomado como principal instrumento de ordenamento territorial na região do Litoral Norte de São Paulo, de forma a viabilizar a conservação de ecossistemas de grande importância no contexto da Mata Atlântica. O processo de revisão deste marco legal deve incorporar as

Foto 1: Entrada do bairro do Taquaral. Observa-se a Escola Simeão à direita e o conjunto habitacional em construção ao fundo. Débora Olivato - 30/01/2013

Foto 2: Área de alto risco de inundação - E.M. Simeão -, com conjunto habitacional e creche em construção. Débora Olivato. - 30/01/2013

Foto 3: Construção da Creche em área de alto risco de inundação no bairro do Taquaral. Humberto Gallo Junior - 25/01/2013

Figura 3. Áreas de Risco da bacia hidrográfica do Rio Indaiá, segundo o mapeamento do Instituto Geológico de São Paulo (SÃO PAULO, 2006). Organização: Fábio Pincinato, 2011.

informações relativas às áreas de risco, essenciais para a delimitação das zonas e estabelecimento de diretrizes e regras de ocupação.

Referências Bibliográficas

- BRASIL. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm. Acesso em: 10/04/2013.
- GALLO JR. *et al.* Políticas ambientais e ordenamento do território na região do Litoral Norte de São Paulo, Brasil. In: Anais do XIII Encontro de Geógrafos da América Latina (EGAL). San José, Costa Rica: 2011, 10p.
- RAIMUNDO, S. 2007. As ondas do Litoral Norte (SP): Difusão espacial das práticas caiçaras e do veraneio no Núcleo Picinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar (1966-2001). Tese de Doutorado. UNICAMP - Instituto de Geociências. Campinas-SP, 304p.

SÃO PAULO. Decreto nº 42.565 de 01 de Dezembro de 1997. Redefine o Plano Preventivo de Defesa Civil - PPDC específico para Escorregamentos nas Encostas da Serra do Mar, e dá outras providências.

Disponível em: < www.jusbrasil.com.br/busca?q=Decreto...São+Paulo&c>. Acesso em: 02/04/2013

SÃO PAULO, Governo do Estado, Secretaria e Meio Ambiente - CPLEA, 2005. Zoneamento Ecológico e Econômico do Litoral Norte. São Paulo, SMA/CPLEA, 56p.

SÃO PAULO. Secretaria do Meio Ambiente. Instituto Geológico - IG. Mapeamento de áreas de risco a escorregamento e inundação. Relatório: Município de Ubatuba. Volume 1, 2006. Disponível em http://www.sidec.sp.gov.br/producao/map_risco/uploads/doc1350328738.pdf. Acesso em: 22/04/2013.

MAPEAMENTO DA FRAGILIDADE DO MEIO FÍSICO COM BASE EM ANÁLISE MULTICRITÉRIO EM SIG

Marta Foeppel Ribeiro

Departamento de Geografia Física, Universidade do Estado do Rio de Janeiro
mfoeppel@gmail.com

Vivian Castilho da Costa

Departamento de Geografia Física, Universidade do Estado do Rio de Janeiro
vivianuerj@gmail.com

RESUMO

A criação de áreas protegidas representa uma estratégia para a preservação de remanescentes de vegetação e para a manutenção da biodiversidade e do equilíbrio ambiental. Na vertente leste do Maciço da Pedra Branca (Município do Rio de Janeiro, RJ, Brasil), situa-se um remanescente de Mata Atlântica em área urbana, inserido no Parque Estadual da Pedra Branca. Nas duas últimas décadas, a área do entorno imediato do parque vem sofrendo progressivo desmatamento para inserir novas áreas construídas. Uma das consequências é a ocorrência de movimentos de massa. Este artigo objetiva avaliar as condições de fragilidade do meio físico na área estudada como parte da metodologia de identificação de áreas com alto risco de ocorrência de movimentos de massa. O estudo utilizou o Geoprocessamento em análise multicritério para a geração do mapa do Fator de Fragilidade do Meio Físico, considerado satisfatório e disponibilizado aos gestores do parque, contribuindo para o seu plano de manejo do parque.

Palavras-chave: Unidade de Conservação, Condicionantes ambientais, Geoprocessamento, Fragilidade do Meio Físico.

Introdução

Como consequência da tendência global de crescimento populacional em áreas urbanas, as questões relacionadas aos riscos ambientais ganham destaque crescente. Isso decorre, principalmente, do processo de urbanização acelerado e desorganizado, sem obedecer a critérios ambientais e sem ser acompanhado pelo planejamento urbano, acarretando efeitos como a fragmentação da cobertura vegetal e a ampliação das áreas de ocorrência de movimentos de massa, por exemplo.

A implantação e a gestão de áreas protegidas no Brasil, como as unidades de conservação, representa uma estratégia adotada para a manutenção do equilíbrio de processos físicos e ecológicos, para a preservação de remanescentes de vegetação e para a conservação da biodiversidade (VITALLI *et al.*, 2007,).

Na vertente leste do Maciço da Pedra Branca, localizado no Município do Rio de Janeiro (RJ, Brasil), situa-se um remanescente de Mata Atlântica, localizado no Parque Estadual da Pedra Branca. Nas duas últimas décadas, a área do entorno imediato do parque vem sofrendo progressivo desmatamento para dar lugar a novas áreas construídas, acarretando a ocorrência de movimentos de massa.

Este artigo tem como objetivo principal avaliar as condições de fragilidade do meio físico na área de estudo, como parte da metodologia de identificação de áreas com alto risco de ocorrência de movimentos de massa. Para atingir esse objetivo, foi realizado um diagnóstico ambiental, por intermédio da elaboração de diversos mapas temáticos digitais, que representavam condicionantes ambientais considerados na análise multicritério de fragilidade do meio físico quanto à ocorrência de movimentos de massa. Foi utilizado o Geoprocessamento

para realizar o diagnóstico ambiental e a análise multicritério referente à Fragilidade do Meio Físico.

Localização da área de estudo

A área de estudo, delimitada em vermelho na Figura 1, abrange a vertente leste do Maciço da Pedra Branca e parte da baixada urbanizada no seu entorno (Município do Rio de Janeiro - RJ, Brasil). A cota altimétrica de 100 metros nesse maciço determina o início do Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB), criado em 1974.

Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo, na vertente leste do Maciço da Pedra Branca, Município do Rio de Janeiro, RJ

As encostas no entorno do PEPB vêm sofrendo pressões antrópicas cada vez mais intensas, as quais contribuem para o aumento do risco de ocorrência de movimentos e massa, entre eles os deslizamentos (OLIVEIRA, 2005).

Os deslizamentos são processos físicos naturais, caracterizados pelo deslocamento nas encostas de uma massa formada por solo/rocha/detritos sobre um embasamento, em geral sob condições de saturação hídrica CHRISTOFOLETTI (1980). Entretanto, esses processos podem ser induzidos, ou seja, decorrentes da ação antrópica.

Quando são estudados e conhecidos os condicionantes naturais e antrópicos desencadeadores de movimentos de massa, torna-se mais fácil propor ações e medidas corretivas ou preventivas, capazes de evitar, minimizar ou controlar esses processos. Diversos autores apontam os seguintes condicionantes para o desencadeamento de movimentos de massa: estrutura geológica, tipo de materiais (solos, rochas e detritos), declividade, geometria e orientação de encostas, depósitos existentes e presença de descontinuidades, umidade antecedente e escavação da fauna no solo, intensidade e distribuição das precipitações, formas de uso do solo, cobertura vegetal e vulnerabilidade da ocupação

VEYRET e ROCHEMOND (2007) afirmam que, para melhor estudar e entender o risco de ocorrência de movimentos de massa, é importante considerar a sua componente espacial por meio do mapeamento dos condicionantes ambientais.

O uso do Geoprocessamento permite análises integradas sucessivas que conduzam a deduções quanto à extensão territorial e quanto às possibilidades de associações causais entre variáveis ambientais (XAVIER-DA-SILVA, 1999). O Sistema de Análise Geoambiental - SAGA, desenvolvido no IGEO/UFRJ, realiza análises espaciais, por meio de procedimentos como: *Assinatura Ambiental*, que permite, a partir da localização de uma dada informação, estabelecer prováveis associações causais entre variáveis ambientais; e *Avaliação ambiental direta*, que possibilita obter mapas de risco, por meio da superposição dos vários planos de informação e da atribuição de pesos e notas aos vários parâmetros e atributos neles contidos (XAVIER-DA-SILVA, *op.cit.*). .

Metodologia

Os procedimentos metodológicos adotados permitiram gerar, por meio do uso do Arcgis (ESRI, EUA), versão 10, os mapas temáticos digitais dos condicionantes ambientais de fragilidade do meio físico. Além desses mapas, também foi gerado um mapa com a distribuição das cicatrizes de deslizamentos desencadeadas em 1996, estabelecendo-se para cada uma delas uma área de influência de 100 metros (*buffers*). Em seguida, foram realizadas assinaturas ambientais por meio do SAGA/UFRJ, buscando-se identificar as correspondências espaciais entre as cicatrizes e *buffers* e as características geológicas, geomorfológicas, pedológicas, entre outras.

Além disso, por meio do geoprocessamento também foram executadas as análises multicritério (*avaliações ambientais diretas*) quanto à fragilidade do meio físico, como parte da metodologia de identificação de áreas com alto risco de ocorrência de movimentos de massa. Para melhor estabelecer uma estrutura lógica de média ponderada para executar essas avaliações, foi criada uma árvore de decisão (Figura 2), a qual representa um instrumento de análise da importância relativa de parâmetros usados na sua construção.

Figura 2 - Árvore de Decisão norteadora das análises de multicritério

Nas análises multicritério foi aplicado o Método *Delphi*, por meio do qual foram feitas consultas a especialistas, de modo a viabilizar as atribuições de “pesos” aos mapas temáticos dos condicionantes ambientais relacionados à fragilidade do meio físico (Quadros I e II) e de “notas” às respectivas classes da legenda de cada um dos mapas considerados (Quadro III).

Quadros I e II - Exemplos de pesos atribuídos a alguns mapas temáticos que compuseram as análises multicritérios para determinação dos fatores constituintes da Fragilidade do Meio Físico

FATOR GEOMORFOLÓGICO	
Mapa Temático Digital	Peso (0 a 100 %)
Geometria de Encosta	40
Orientação de Encosta	40
Proximidade de rios	20

FATOR DE FRAGILIDADE DO MEIO FÍSICO	
Mapa Temático Digital	Peso (0 a 100 %)
Fator Morfoestrutural	35
Fator Pedo-topográfico	35
Erosividade	30

Quadro III - Exemplos de notas atribuídas às categorias da legenda do Mapa de Declividade, componente da análise multicritério do Fator Topográfico

Mapa de Declividade	
CATEGORIAS	NOTAS (0 a 10)
0 - 3 %	0,0
3 - 8 %	2,0
8 - 20 %	4,0
20 - 45 %	7,0
45 - 75 %	10,0
75 - 100 %	10,0
> 100 %	10,0
Área fora de análise	B

Resultados obtidos

O Gráfico 1 representa o exemplo de um dos resultados do procedimento de assinatura ambiental das cicatrizes de deslizamentos e *buffers*, distribuídos por bacias hidrográficas, com o mapa temático de declividade. É possível observar que a maior parte dessas cicatrizes foi desencadeada em áreas cuja declividade varia de 45 a 75 %. e não em encostas com declives acima de 100%.

Gráfico 1 - Assinatura Ambiental das cicatrizes de movimentos de massa com faixas de proximidade de 100 metros em relação à Declividade.

O resultado final foi o Mapa de Fator de Fragilidade do meio físico (Figura 3), gerado a partir da análise multicritério, que considerou os mapas de erosividade e dos fatores Morfoestrutural e Pedo-topográfico (Figura 2).

Figura 3 - Mapa do Fator de Fragilidade do meio físico

A Figura 3 evidencia o predomínio de notas altas (8, em lilás e 9, em cinza) em relação à fragilidade do meio físico na vertente leste do Maciço da Pedra Branca. Tal aspecto pode ser explicado, de um modo geral, pela inter-relação entre os condicionantes ambientais existentes nas áreas caracterizadas pelas referidas notas: uma composição litológica predominantemente gnáissica e granítica, cortada por linhas de fratura, coberta por solos suscetíveis à erosão (como os argissolos), em condições de declives acentuados e de altimetria elevada.

Conclusão

Para lidar com a questão da Fragilidade do Meio Físico em análises de risco de ocorrência de movimentos de massa é fundamental realizar estudos sobre os fenômenos, suas causas, localização espacial, análise de ocorrências do passado, e possíveis consequências. Nesse sentido, é essencial a construção de uma árvore de decisão, considerando-se a associação de dois a três temas relacionáveis que possam compor fatores (Figura 2), o que possibilita ter um melhor controle das combinações entre pesos e notas, feitas por geoprocessamento, que geraram as maiores notas de risco dentro do espaço classificatório.

O mapa final de Fragilidade do Meio Físico foi considerado um resultado satisfatório, que está à disposição dos gestores do parque, contribuindo para a implementação do seu plano de manejo.

Bibliografia

- Christofoletti, A. (1980) *Geomorfologia*. 2. ed. São Paulo: E. Blucher.
- Oliveira, R. R. de (Org.). (2005) *As marcas do homem na floresta: história ambiental de um trecho urbano de mata atlântica*. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 232 p.

Veyret, Y.; Richemond, N. M. de. (2007) Definições e Vulnerabilidades do Risco. In: Veyret, Y (Org.). *Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente*. São Paulo: Contexto, pp. 25-46.

Vitali, P. de L.; Zakia, M. J. B.; Durigan, G. (2009) Considerações sobre a legislação correlata à zona-tampão de unidades de conservação no Brasil. *Ambiente & Sociedade*, Campinas, v. 12, n. 1, p. 67-82, jan. / jun.

Xavier-da-Silva, J. et al. (1999) *Curso de Especialização em Geoprocessamento:*

Unidades Didáticas. Rio de Janeiro: LAGEOP, Unidade 95, v. 4.

A FORMALIDADE E O RISCO: UMA RELAÇÃO TÊNUE ENTRE FORMAS DE OCUPAÇÃO EM SALVADOR - BAHIA, BRASIL

Plínio Martins Falcão

Departamento de Geografia, Instituto Federal da Bahia - IFBA
Grupo de Pesquisa *Terra&Mar* - CNPq / IFBA - Campus Salvador
pliniomf@gmail.com

RESUMO

Salvador, com quase 3 milhões de habitantes, persiste no problema de pessoas que vivem em áreas suscetíveis, a exemplo de encostas, morros ou áreas instáveis. Todavia, um fato observado leva a crer que nesta cidade onde tantos processos espaciais e sociais se interrelacionam, é possível notar uma paridade entre o dito formal e informal pelo planejamento, num local excêntrico no que tange formas de ocupação e topografia. Este trabalho teve como objetivo apresentar um panorama do risco na lógica da construção formal em Salvador, identificando áreas e construções suscetíveis, que inexplicavelmente passaram por alguma instância do planejamento urbano, permitindo o uso de áreas suscetíveis ou sem adequação para ocupar de modo mais seguro. A metodologia utilizada consistiu em levantamento bibliográfico, uso de cartografias, imagens e trabalhos de campo, o que permitiu, dentre os resultados, uma sistematização e coletânea por meio do recorte imagético de áreas de instabilidade de encostas.

Palavras-chave: Ocupação formal; Risco; Encostas; Salvador.

Introdução

Com mais de 200 milhões de habitantes (IBGE, 2014) o Brasil se caracteriza como um país urbano, cuja população está em torno de 80% concentrada nas cidades. Estas correspondem aos espaços de maior dinamismo na realidade nacional, visto que a aglomeração de pessoas e a evolução dos diversos setores socioeconômicos impulsionam uma infinidade de atividades que tornam estes espaços polarizantes no que tange a atenção e concentração de cidadãos. São nesses espaços urbanos mais ocupados e / ou adensados, por sua vez, que se encontram os principais problemas da ordem socioambiental.

Este trabalho teve como objetivo apresentar um panorama do risco na lógica da construção formal em Salvador, capital da Bahia, identificando áreas e construções suscetíveis, que, inexplicavelmente, passaram por alguma instância do planejamento urbano, permitindo o uso de áreas suscetíveis ou sem adequação para ocupar de modo mais seguro. A metodologia utilizada consistiu em três etapas: (a) pesquisa bibliográfica; (b) análise de documentação cartográfica; (c) trabalhos de campo, que permitiram a construção de um conjunto de imagens que definem o tema tratado.

Salvador: ocupação e áreas de risco

Fundada em 29 de março de 1549 para ser a primeira capital do Brasil, por uma ação e decreto imperial do Estado português com a igreja católica, estabeleceu-se numa área de visão privilegiada do sítio, com o intuito de assegurar o controle contra ataques oriundos da área marítima. Sua localização inicial alude ao seu próprio processo de urbanização ao longo dos últimos quatro séculos: no topo da escarpa da falha de Salvador, que atualmente corresponde ao limite físico entre as chamadas Cidade Alta e Baixa.

Mapa 1 - Localização de Salvador...

A história urbana mostra que Salvador, desde cedo, apresentou uma ocupação densa das áreas bordejantes à Baía de Todos os Santos, permanecendo as áreas de vale sem aproveitamento ou apenas voltadas às práticas de subsistência local. No entanto, progressivamente a expansão foi se interiorizando com dois períodos de destaque na espacialização: a metade do século XIX (readequação da Barra, Rio Vermelho, Amaralina, vias centrais antigas como Baixa dos Sapateiros, Dique, Itapagipe, Pirajá e Largo do Tanque) e do século XX (abertura das avenidas de vale como Centenário, Nazaré, Mário Leal Ferreira / Bonocô).

Processos formais de ocupação em áreas suscetíveis

Ainda que a engenharia, bem como o planejamento de cidades, nas últimas décadas tenham avançado consideravelmente sobre a qualidade das técnicas voltadas à construção, é possível dizer que algumas áreas são ocupadas, no caso do tecido urbano de Salvador, por meio uma especulação imobiliária espacial que não tece observações quando se trata de considerar a suscetibilidade a deslizamentos em algumas áreas íngremes. É certo que numa cidade cuja população norteia os 3 milhões de habitantes (IBGE, 2014), as demandas por uso e ocupação do espaço se acentuam na medida que os terrenos nas áreas centrais e planas foram ficando mais caros.

No entanto, o que se tem visto nos últimos anos é uma expressa invasão (no sentido de ocupar) a áreas que, teoricamente, seriam inviáveis para a construção, sobretudo, de estruturas com elevadas e pesadas. Valer-se pelas altas tecnologias da engenharia civil tornou-se aposta para o mercado imobiliário soteropolitano, haja vista a necessidade de construção de tantos novos edifícios a suprir uma demanda de classe média crescente, sobretudo na última década. Nessa corrida entraram os empreendimentos que vão de médio a elevado padrão, importando basicamente as relações de comercialização e serviços diretamente associados.

Todavia, as questões ambientais, que perpassam a dinâmica da natureza e a participação do homem enquanto sujeito social, destoam das práticas alusivas apenas à dinâmica de manutenção de um dos mercados mais pujantes na economia das grandes cidades brasileiras, que é a construção civil. Em paralelo, e no caso específico da capital soteropolitana, sucumbe à crítica o planejamento da cidade, que em todas as versões dos seus planos diretores, desde a década de 1970, manteve-se alóctone ao processo de ocupação de encostas, seja de modo irregular ou - como na atualidade - formalizado. Daí então que parte dos problemas são visualizados na ótica das ocupações de encostas por famílias de baixa renda, cuja associatividade entre a geologia local, tipologia de solos (pedologia) da capital, declividades, os índices pluviométricos em torno de 2000mm anuais e as construções realizadas sem o uso adequados de técnicas, podem resultar mais facilmente em desastres, partindo do princípio de que se tratando de áreas íngremes, todos estão suscetíveis. Ainda assim, os ditames da formalização pregada pela engenharia e pelos planos diretores, mesmo quando cumpridas, não eximem diversos cidadãos da sua condição de vulnerabilidade ou mesmo de risco. (Figura 1)

Dessa forma, o que se verifica em Salvador, na atualidade, é que embora muitas áreas cujo relevo íngreme denotam situação de risco em ocupação, diversas edificações de padrão residencial foram construídas nessas áreas, com o aval do poder público pautado na legislação vigente, cujas restrições recaem apenas sobre algumas áreas, como os terrenos em topo das escarpas de falha, que historicamente já são densamente ocupadas pelas classes menos abastadas. Em diversas partes da cidade é possível verificar como construções ditas formais se mesclam a uma situação de suscetibilidade que não se diferencia tanto dos panoramas normalmente observados e criticados, ainda que as técnicas de engenharia tenham sido aplicadas. (Figura 2)

Fig. 1 - Construções formais em Salvador - Bahia

Fonte: Falcão, Plínio (2014)

Fig. 2 - Construções formais em Salvador - Bahia

Fonte: Falcão, Plínio (2014)

Muito embora exista um estado da arte com relação às situações de vulnerabilidade e riscos em áreas íngremes da capital baiana, os estudos ainda não se voltaram para essa complexidade de que mesmo os estratos mais equilibrados do ponto de vista da renda, ocupam espaços que, variavelmente, poderiam ser evitados. Brandão e Olmos (1981) apresentaram um esquema com as áreas instáveis quanto a movimentação do solo na cidade de Salvador, agrupando estas em três categorias: (i) Área da escarpa de falha (Falha de Salvador), (ii) As avenidas de vale e (iii) Áreas ocupadas por camadas de baixa renda.

Entretanto, são em vários pontos dessas áreas, na atualidade, onde estão cravadas diversas estruturas, edificações e/ou empreendimentos que, salvo as técnicas de engenharia, se justapõem às mesmas condições naturais que tornam a vulnerabilidade crônica, a exemplo do tipo de solo, as infiltrações e moldes de escoamento superficial provenientes dos níveis de precipitação. Tais fatos comprovam a necessidade de ajustamento das questões pertinentes ao planejamento da cidade, com vistas a uma atenção mais minuciosa aos modos de uso de áreas ainda desocupadas, mas que poderão, num futuro próximo, vir a atender às demandas do capital imobiliário, criando novas vulnerabilidades na capital.

Conclusão

O século XXI é marcado por diversas transformações no planeta, tendo a questão ambiental se tornado mais evidente no que tange às mudanças naturais e antropogênicas. O foco do presente texto é chamar atenção para algumas questões que norteiam o pensamento urbano e ambiental, com foco nas questões de risco e vulnerabilidade em áreas íngremes da cidade de Salvador, já que a capital integra a lista de uma das cidades mais excêntricas no que tange às formas de ocupação, devido seu contexto social e peculiar topografia.

Sendo assim, verificou-se que mesmo os próprios processos formais de uso do espaço se submetem, por diversas questões, a áreas que, tolerantemente, não deveriam ser ocupadas e aedificadas.

Bibliografia

BRANDÃO, M.A.; OLMOS, S.A. (1981) *Encostas*. Por que e onde caem. Salvador: Oceplan - PMS / GESEC.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2014) *Censo demográfico* - Estimativas populacionais.

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br> Acesso em: 20 de julho de 2014.

Agradecimentos

Ao INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - IFBA, instituição na qual o autor atua como docente e pesquisador do seu quadro permanente.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO FACE ÀS DINÂMICAS CLIMÁTICAS: COMPARAÇÕES ENTRE O PROJETO ORLA BRASILEIRO E O PROGRAMA BUYOUT ESTADUNIDENSE

Rômulo Lima Silva de Góis

Univ. de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Bolsista da CAPES nº 1471-13-9
romulo.gois@yahoo.com.br

João Vítor Gobis Verges

Univ. de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Bolsista da CAPES nº 9719-13-0
vitorverges@gmail.com

Braúlio Luna

Universidade de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
bjcluna@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho propõe um diálogo sobre o ordenamento do território para o ambiente costeiro e sua relação direta com os riscos ocasionados pelas dinâmicas climáticas, partindo de uma análise comparativa entre o Plano *Buyout* dos Estados Unidos e o Projeto Orla brasileiro. A metodologia utilizada compreende a análise e revisão de levantamento de dados bibliográficos sobre dinâmicas climáticas, ordenamento do território, erosão marítima e planos de gestão de costa. Fez-se, ainda, pesquisa legislativa e uma análise comparativa de instrumentos dos planos mencionados. Atinge como principal resultado a conclusão de que a congregação do Projeto Orla brasileiro com o programa *Buyout* estadunidense traria maior efetividade à gestão do litoral face às dinâmicas climáticas, pois quando a implantação de política pública preventiva não se apresenta mais como promotora de adaptação possível ao aumento do nível do mar e da erosão marítima, a mesma deve considerar soluções mais coercivas por parte do Estado e, frente a estas problemáticas, o Programa *Buyout* apresenta maior robustez e eficácia no funcionamento adotado.

Palavras-chave: Riscos; Planejamento Costeiro; Erosão Marítima; Políticas Públicas.

Introdução

As zonas urbanas detêm historicamente função contributiva para garantir descobertas, avanços científicos e alterações progressistas nas relações humanas como espaços excepcionais do encontro, da comunicação, do intercâmbio e concentração de informações.

Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE (2006), as cidades constituem centros da economia global, sendo responsáveis por grande parte da produção nacional de cada país, da inovação e emprego, constituindo, ainda, os principais pontos de entradas dos fluxos de capitais globais e de cadeias de suprimentos transnacionais.

Em artigo divulgado pela OCDE (2008), considerando 136 cidades portuárias, o número da população suscetível à elevação do nível do mar, nestas, pode chegar a 40 milhões de pessoas. O valor total de prejuízos projetados foi estimado em US\$ 3 trilhões de dólares, o que correspondeu a 5% do PIB global em 2005.

Projeções ainda da OCDE (2008), demonstram que no final do século, o total da população exposta poderia triplicar para cerca de 150 milhões de pessoas, sendo os prejuízos projetados estimados em mais de 36 trilhões, cerca de 9% do PIB mundial do ano de 2005.

Jamet e Corfee-Morlot (2009) estimam que as ações políticas no presente, apesar dos custos elevados, devem ganhar prioridade porque diante de um quadro de grandes incertezas, o que limita o risco maior no futuro é tornar prioritário o combate e ações no presente.

Neste sentido, este artigo objetiva, de modo amplo, fazer uma análise sobre a importância do Ordenamento do Território e sua relação direta com as dinâmicas climáticas, recorrendo sobre a capacidade adaptativa das cidades litorâneas que constituem um dos centros receptores dos maiores prejuízos advindos dos azares climáticos, da expansão do nível do mar e da erosão marítima.

Por objetivos específicos, almeja-se demonstrar como a delimitação de políticas públicas acertadas e uma gestão integrada para ordenar o uso e a ocupação do solo nas cidades litorâneas e nas suas faixas territoriais junto aos mares como contributo para adaptação às nuances climáticas, trazendo como eixo investigativo um diálogo entre o Projeto Orla brasileiro e a implantação do Zoneamento Ecológico-Econômico nos planos de gestão da Costa e o Plano *Buyout* dos Estados Unidos como modelo de adaptação transformacional quando das adaptações às dinâmicas climáticas já não são suficientes.

O Projeto Orla brasileiro e o desenvolvimento do Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro.

No Brasil, envolvendo as esferas Federais, Estaduais e Municipais, foi estabelecido um programa de gerenciamento costeiro, no que corresponde ao ordenamento do território, denominado Projeto de Gestão integrada da Orla Marítima = Projeto Orla. Este objetiva, entre outras metas, a valorização de ações inovadoras de gestão voltadas ao uso sustentável dos recursos naturais e da ocupação dos espaços litorâneos e o desenvolvimento de mecanismos de participação e adequação social para sua gestão integrada (BRASIL, 2006).

A construção e efetivação deste projeto acontece em oficinas municipais e estaduais, articulando os atores locais e os responsáveis pela composição das ações. As oficinas objetivam a sensibilização social sobre os fundamentos do Projeto Orla, a construção de diagnóstico juntamente com a classificação e delimitação da orla, os cenários futuros para mesma, a sistematização dos quadros de problemas e as linhas de ação voltadas ao enfrentamento e a instalação de instrumentos para uma gestão sustentável através de meios e cronogramas específicos (BRASIL, 2006).

Para além da participação dos agentes envolvidos, surge via legislação (Decreto Federal brasileiro nº 4.297/2002) o Zoneamento Econômico Ecológico Costeiro (ZEEC), com a finalidade de reconhecer os limites e as áreas pertencentes à linha de costa e subsidiar os contornos gerais do ordenamento do território em costa brasileira. Este surge como medida de Ordenamento do Território que se apresenta como meio de articulação e coordenação da tomada de decisões políticas, no qual a previsibilidade do processo de planejamento participativo e colaborativo do território passa a ajudar na criação de visões partilhadas com minimização de conflitos de interesses na construção de um futuro comum, possibilitando convergências e novas coligações de interesses.

O Programa Buyout estadunidense como Política Pública territorial de adaptação transformacional.

Se por um lado o Projeto Orla brasileiro surge como instrumento de Ordenamento do Território que considera a complexidade social e a importância de uma visão integrada entre Planos de Gestão da Orla marítima e a delimitação de Zoneamentos Especiais de uso e ocupação do território, sob outro prisma existem situações emergenciais e limitrofes onde políticas públicas passam a agir de modo mais coercitivo para possibilitar uma adaptação transformacional da

sociedade evitando os impactos crescentes das alterações climáticas e dos eventos extremos associados a elas, como o Programa Buyout estadunidense.

O Programa Buyout consiste na aquisição de propriedades imobiliárias litorâneas e ocorre quando um Órgão Público negocia diretamente a compra dessas propriedades com seus proprietários privados. A aquisição da propriedade compensa o proprietário com uma porcentagem muito próxima ao valor de mercado do imóvel e também pode cobrir os custos de realocação e pode ser realizado de forma voluntária ou coercitiva com desapropriação direta da propriedade delimitada

Conforme Conrad et al (1998), mais de 20 mil voluntários se submeteram ao programa deixando suas propriedades e passaram a aderir-lo por três princípios básicos: recebem assistência significativa e valor de compra justo; enxergam a política pública como utilização eficaz dos fundos públicos pois alivia os gastos na reparação dos danos e impactos provocados pelos eventos extremos; sentem-se agentes preservadores do ambiente, pois veem suas propriedades serem revertidas permanentemente em espaços de lazer e em zonas de proteção ambiental.

O Ordenamento do Território pensado sistematicamente com o programa de compras de imóveis em situações de riscos pela administração pública demonstra caracterizar forte política pública de adaptação às dinâmicas climáticas e eventos climáticos extremos, sendo adotado em espectro e alcance consideráveis em alguns Estados norte-americanos.

Conclusão

Pode-se concluir que a análise das dinâmicas climáticas nas cidades litorâneas demonstra como os cidadãos, empresas e agentes políticos destas possuem uma clara opção de desenvolvimento que poderá agravar, ou de maneira distinta, limitar os danos que as dinâmicas climáticas poderão produzir no futuro.

Para um contexto de corresponsabilidade e governança em vários níveis de atuação, demonstra que através do planejamento urbano proativo e gestão das propriedades terrestres de modo eficaz, pode-se reduzir a exposição da população urbana e das infraestruturas a potenciais inundações costeiras.

Um olhar integrado, mais amplo e estratégico, como no Projeto Orla brasileiro, não deverá ser centrado apenas no vetor de ação sob a perspectiva humana de utilização do território costeiro, mas sim deverá partir do reconhecimento de que aspectos como os impactos das dinâmicas climáticas, dinâmicas do litoral, riscos naturais, não só compreendendo as interações terra-mar, mas sim necessitando de intervenções coordenadas ou mesmo integradas a serem desenvolvidas para espaços adequados que não se limitem apenas as características morfológicas dos centros urbanos litorâneos, mas em estratégias de intervenção para um salto que pense as cidades litorâneas como cidades que cooperam com o mar e com os recursos marinhos.

A estratégia de Ordenamento do Território no litoral adotada pelo Projeto Orla e as delimitações das ZEEC, apresentam caráter preventivo e podem ser desenvolvidas instrumentalmente, caso necessário, através de medidas que vão desde a implantação de infraestruturas leves que visam à proteção costeira de inundações provocadas pela subida do nível do mar, tempestades associadas a tufões, até medidas que pensem uma nova relação entre essas infraestruturas, a sociedade no meio urbano litorâneo e os ecossistemas correlacionados, mas que deve ser repensada para agregar intervenções mais rígidas como a desapropriação direta ou indireta por meio de instrumentos legais, como no programa estadunidense *Buyout*.

Se por um lado o Projeto Orla brasileiro leva em conta a análise das formas de uso e ocupação do território, características físicas, socioeconômicas e socioambientais do território costeiro e passa a ser instrumento de subsídio da formulação de propostas para a destinação social, econômica e ambiental de cada área da Zona Costeira, por outro lado, o Programa *Buyout* estadunidense apresenta-se como instrumento que deve ser utilizado em momento mais emergencial onde situações limítrofes passam a exigir políticas públicas mais coercitivas que possibilitem uma adaptação transformacional da sociedade, evitando os impactos crescentes dos eventos climáticos associados.

Numa perspectiva comparada, a combinação do Projeto Orla brasileiro para delimitação e análise territorial com a implantação dos ZEEC e Plano de Gestão Costeira combinados com a utilização do programa *Buyout* estadunidense em fase posterior, onde a implementação de política pública preventiva não se apresenta como promotora de adaptação possível à sociedade vulnerável pode constituir solução a ser considerada para enfrentar as problemáticas que envolvem o aumento do nível do mar e da erosão marítima, num contexto que é preciso pensar e projetar cidades urbanas que cooperem com o mar e com o ambiente.

Desta feita, recomendam-se no âmbito científico abordado pesquisas futuras direcionadas a escolha de alternativas para integrar um projeto ao outro e fazer análises econômicas, principalmente referentes a custo/benefício do Programa *Buyout*, levantando dados relevantes sobre o andamento das desapropriações já realizadas.

Referências

- Assistência de Mitigação de Risco. Introdução ao Programa Buyout. Disponível em <http://www.fema.gov/application-development-process/hazard-mitigation-assistance-property-acquisition-buyouts>
- Code of Federal Regulations, disponível em <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2002-title44-vol1/content-detail.html>
- CONRAD, D.R. MCNITT, B. STOUT, M. *Higher Ground: A Report on Voluntary Property Buyouts in the Nation's Floodplains, A Common Ground Solution Serving People at Risk, Taxpayers and the Environment*, National Wildlife Federation, Washigton D.C. Disponível em http://www.nwf.org/pdf/Water/199807_HigherGround_Report.pdf
- JAMET, S. e MORLOT-CORFEE, J. *Assessing the Impacts of Climate Change: A Literature Review*. ECD Economics Departament Working Papers. 2009.
- OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. *Competitive Cities in the Global Economy*. OECD Publications, Paris. 2006.
- OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. *Observer* nº 260, Março de 2007. 2007b.
- Projeto Orla - Fundamentos para uma gestão integrada, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Brasília, 2006.
- Projeto Orla - Guia de implementação, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Qualidade Ambiental; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria do Patrimônio da União, Brasília, 2005.
- Projeto Orla - Manual de Gestão, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Brasília, 2006.

REABILITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE V. N. DE GAIA. UM PROJETO DE PROTEÇÃO CIVIL

Salvador Almeida

Comandante Bombeiros Sapadores e Proteção Civil de Vila Nova de Gaia
salvadorpfalmeida@gmail.com

RESUMO

O Centro Histórico de V. N. de Gaia é um documento vivo das condições de vida e das técnicas de construção de gerações ancestrais representativo de valores culturais, por constituírem uma memória coletiva, não se podem perder por incúria ou desleixo.

É necessário chamar a atenção para as questões sanitárias, qualidade de vida, condições de habitabilidade, parques e zonas de lazer, turismo e segurança contra risco de incêndio, para promover uma prevenção e proteção mais eficazes na defesa do nosso Património Histórico e Cultural, numa conjugação da arquitetura e da engenharia tendo como base a organização social das suas gentes.

A resposta constitui o presente Projeto de Proteção Civil, com propostas de medidas preventivas, mitigadoras, com Planos de Prevenção e Atuação, salientando-se o Projeto Industrigaia, Plano 3P, Plano de Intervenção dos Bombeiros, Plano de Atuação em Cheias e Inundações, na certeza de que é uma tarefa de todos e para todos, sem esquecer as urgências ambientais.

Palavras-chave: Centro Histórico, Riscos, Prevenção, Planos e Reabilitação.

Introdução

O Centro Histórico de V. N. de Gaia objeto deste projeto é uma área com cerca de 152 ha e corresponde à Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística, conforme é definido no DR n.º 54/97, de 19 de Dezembro, É uma área urbana a renascer que, face à excelente localização e elevados valores paisagísticos, se tornou um espaço de lazer e diversão qualificada, à qual se associam as Caves do Vinho do Porto (mais de 600 mil visitantes ano). Em 2006, foi apresentado um MasterPlan Cidade de Gaia - Estudo de Enquadramento Estratégico para a Revitalização do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia. Está bem patente a vulnerabilidade dos habitantes do Centro Histórico e a amplificação social face às suas características sociais (pobreza e má qualidade da habitação) e o risco em que vivem (risco de incêndio e derrocadas) (Cutter et al, 2000).

Ao longo dos últimos 20 anos aconteceram muitos incêndios urbanos e industriais, cheias e inundações, deslizamentos, derrocadas, abatimentos e que me levam a afirmar que o Centro Histórico, uma área com fortes inclinações e os arruamentos íngremes e estreitos, apresentam elevados riscos hidrológicos, geomorfológicos, risco de incêndio pelo que podemos considerar este espaço como uma Bacia de Riscos (Rebello, 2001a), pelo que o estudo geográfico das ocorrências mais graves impõe-se no sentido de procurar todas as causas e permitir à engenharia a busca de novas soluções (Rebello, 1994). Como sugere (Cutter et al, 2000) os riscos interagem com processos culturais sociais e institucionais de tal modo sobre qualquer resposta pública o que nos ajuda a melhor interpretar as perceções do público e no fim de contas a ter as respostas dos políticos para o risco e perigo da sociedade.

O trabalho que aqui se apresenta está organizado em três Capítulos.

No primeiro Capítulo caracteriza-se o Centro Histórico no contexto do Concelho de Vila Nova de Gaia, recorrendo à cartografia existente, definindo a sua localização, estudando o uso e

ocupação do solo, o edificado, a rede viária, o seu parque habitacional, os aspetos geomorfológicos e geologia, o clima, a sua hidrografia e hidrogeologia, a análise socioeconómica.

No segundo Capítulo são tratados em pormenor os riscos mais importantes, nomeadamente riscos hidro-geomorfológicos e risco de incêndio.

Riscos hidro-geomorfológicos analisou-se:

As características do coberto vegetal, o estado do edificado, o estudo da permeabilidade atual do subsolo rochoso e o estudo dos declives;

Fez-se um levantamento das cheias ao longo dos últimos 250 anos, criou-se uma base de dados com todas as ocorrências (cheias e inundações) e elaborou-se uma Carta de Risco para previsão e mitigação das Cheias e Inundações;

Levantamento e análise das manifestações de instabilidade geomorfológica dos últimos 20 anos georreferenciadas num SIG. Elaborou-se uma Carta de Risco face a deslizamentos, derrocadas e outros acontecimentos - ocorrências em Infraestruturas e Vias de Comunicação.

Figura 1 - Carta de Risco - Deslizamentos e Derrocadas em Infraestruturas e Vias de Comunicação

Figura 2 - Carta de Risco de Cheia da Orla Fluvial

Risco de incêndio analisou-se:

Levantamento e análise de vários incêndios devastadores da década de 70, 80 e 90 do século passado e a história dos incêndios dos últimos 20 anos georreferenciadas num SIG. Elaborou-se uma Carta de Risco de Incêndio e apresenta-se um conjunto de propostas para mitigar o risco, mas essencialmente, medidas de prevenção do risco e preparação do socorro.

Figura 3 - Carta de Risco de Incêndio

O terceiro capítulo é dedicado à elaboração de Planos de Emergência. A base de trabalho para minimizar o risco ou mesmo evitar o perigo deverá ser o Planeamento de Emergência e quanto menor for a dimensão da área da análise das vulnerabilidades, melhor será o resultado obtido (Alexandre, 2005).

Assim, partir do Planeamento Municipal (167 Km²) para uma área micro (1,52 Km²) e elaborar um Plano Especial de Emergência (alínea C- Artigo 3º, resolução nº 25/2008 de 18 Julho) que é um instrumento adequado e necessário (nº 3 - Artigo 2º, Resolução nº 25/2008 de 18 Julho) é uma preocupação diária no âmbito das responsabilidades que exerço na proteção civil municipal (artigo 14º - Lei nº 65/2007) e é uma obrigação:

- O Plano de Proteção Civil que é um Plano Especial, enquadrado pelo n.º 2 artigo 50º da Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, e na alínea c) do Artigo 3º da Resolução n.º 25/2008, de 18 de Julho.
- O Plano de Intervenção dos Bombeiros, destina-se aos Agentes de Proteção Civil, nomeadamente aos Corpos de Bombeiros de acordo com a alínea a) Artigo 46º da Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho.
- O Plano de Intervenção na Salvaguarda do Património - Plano 3P que se destina aos Agentes de Proteção Civil, nomeadamente os Bombeiros (alínea a), Artigo 46º da Lei n.º 27, de 3 de Julho) e aos gestores do património.
- O Plano Municipal de Prevenção e Atuação das cheias no Douro de V. N. de Gaia é um plano que se aplica à Orla Fluvial do Rio Douro dando ênfase ao Centro Histórico e representa um conjunto de normas e regras de procedimento.
- O Projeto Indústriagaia é um projeto fundamental na defesa do Centro Histórico e de todo o concelho de Vila Nova de Gaia que permite aos Agentes de Proteção Civil (Bombeiros), ter informações ao minuto, via rádio quando se deslocam para a ocorrência, dos riscos existentes, das instalações, das fontes de energia, meios de proteção existentes, sistemas de extinção, abastecimento de água e riscos acrescidos.

Conclusão

Riscos de Cheias e Inundações

Como vamos mitigar os impactos materiais e sociais devido às cheias?

Com a correta ocupação do leito de cheia protegendo e conservando o mesmo, interditando a sua impermeabilização, cumprindo-se o D.L. 468/71 de 5 de Novembro, o D.L. 89/87 de 26 de Fevereiro, o D.L. 166/2008 de 22 de Agosto e a Portaria 788/2009 de 28 de Julho e o Plano Municipal de Prevenção e Atuação de Cheias no Douro de V. N. Gaia, dando-se assim total cumprimento à diretiva europeia (European Commission, 2010), fazendo uma análise de risco baseada em dados quantitativos face aos impactos e extensão geográfica afetada.

Como medida fundamental para cumprirmos a sequência **Prevenção - Preparação - Resposta - Recuperação/Reabilitação**, devemos realizar um exercício anual, em Outubro, pois sem dúvida que toda a orla fluvial do rio Douro e muito especial o Centro Histórico são lugares muito vulneráveis, mas nem sempre as populações os aceitam como tal, isto é, *os lugares mais vulneráveis do ponto de vista geofísico não se integram sempre com as populações* (Cutter et al, 2000) e, considerando que vulnerabilidade significa perda, *a assunção que a vulnerabilidade é uma condição social, uma medida de resistência da sociedade ou resiliência a perigos* (Blaickie et al, 1994), o cidadão comum tem tendência para esquecer os riscos de baixa probabilidade de ocorrência, mas com grandes impactos nas suas vidas.

Manifestações de instabilidade geomorfológica

O trabalho apresentado evidencia que toda a orla fluvial de V. N. Gaia e principalmente no Centro Histórico a instabilidade geomorfológica é uma realidade e teve nos últimos anos impactos significativos sobre o ponto de vista económico, social e ambiental.

A Escarpa da Serra do Pilar é Reserva Ecológica Nacional pelo que todas as construções deverão ser demolidas cumprindo-se o estabelecido no D.L. 309/93 de 2 de Setembro.

Risco de Incêndio

Hoje como ontem a prevenção tem que ser o passo principal na preservação do Centro Histórico. Deverá ser promovida com toda a urgência a recuperação do edificado. Para diminuir os seus impactos no futuro é preciso reduzir a vulnerabilidade social e aumentar a resiliência aos incêndios com a melhoria das condições sociais e padrões de vida no Centro Histórico. *Os incêndios são neutros e daltónicos, os seus impactos, no entanto, não são* (Cutter, S., 2006).

Elaborou-se o Plano de Intervenção dos Bombeiros, apoiado no Projeto Indústriagaia e Plano 3P, para salvaguarda do património, definindo para as várias áreas e quarteirões, medidas simples de atuação para os Bombeiros.

Ao longo dos séculos, aconteceram cheias destruidoras ocasionadas pelo rio Douro. Há forte probabilidade de sofrer derrocadas provenientes das suas encostas, pois são áreas de muito alta susceptibilidade a movimentos de vertente. Tem uma probabilidade de risco de incêndio muito elevada, pelo que a implementação do Plano de Proteção Civil para o Centro Histórico, que coordena técnica e operacionalmente todos os agentes de proteção civil, englobando os riscos que enunciei é uma medida imperiosa, para enfrentar de forma consciente o aumento dos fenómenos que foram descritos, pois, por vezes, pessoas leigas têm falta de informação dos riscos.

Porém a sua conceptualização dos riscos é muito mais rica que a dos peritos e refletem preocupações que são tipicamente omissas na avaliação dos especialistas (Slovic, P, 1987).

O Centro Histórico de Vila Nova de Gaia merece o esforço de todos os agentes de proteção civil, pois o *objetivo da gestão dos riscos e das crises é, sem dúvida, a redução das vulnerabilidades* (Lourenço, L., 2003).

Bibliografia

- ALEXANDER, David (2005); "Towards the development of a standard in emergency planning". *Disaster, Prevention and Management*. 14(2) pp. 158-175.
- BLAIE, Pier; CANNON, Terry; DAVIES, Ian; WISNER, Ben (1994); *At Risk, Natural hazards, people 's vulnerability and disasters*. Routledge, London, pp. 284, 23 figuras e 4 tabelas.
- CUTTER, Susan L.; MITCHELL, Jerry T.; SCOTT, Michael S. (2000); "Revealing the vulnerability of people and places. A case study of Georgetown Country, South Carolina". *Annals of the Association of American Geographers*, 90(4), pp. 713-737.
- CUTTER, Susan L. (2006); "The Geography of Social Vulnerability: Race, Class and Catastrophe".)
- European Commission, Commission Staff Working Paper (2010); "Risk assessment and mapping guidelines for disaster management". Brussels.
- LOURENÇO, Luciano (2003); "Análise de riscos e gestão de crises. O exemplo dos incêndios florestais". *Territorium*, (10), pp. 89-100.
- MasterPlan Cidade de Gaia (2006); "Estudo de Enquadramento Estratégico para a revitalização do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia". Parque Expo.

REBELO, Fernando (2003); “Riscos Naturais e Ação Antrópica Estudos e Reflexões”. *Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 2 pp.286, 2ª edição revista.*

SLOVIC, Paul (1987); “The preception of risk”. 236, pp. 280-285.

CONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - AVALIAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM UMA BACIA HIDROGRÁFICA TRANSFRONTEIRIÇA IBÉRICA

Teresa Albuquerque

Instituto Politécnico de Castelo Branco, CIGAR, Portugal
teresa@ipcb.pt

Margarida Antunes

Instituto Politécnico de Castelo Branco, CIGAR, Portugal
imantunes@ipcb.pt

Fátima Seco

Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugal
mf.seco@gmail.com

RESUMO

A bacia hidrográfica do rio Águeda é uma bacia transfronteiriça, entre Portugal e Espanha, com potenciais fontes de contaminação, destacando-se as mineiras e agrícolas. Para o estudo em análise, foram recolhidas 75 amostras de água georreferenciadas, em maio de 2012, dentro de uma malha previamente estabelecida. Determinaram-se parâmetros físico-químicos e teores de sulfato e cálcio, uma vez que são estes os predominantemente associados à contaminação agrícola. Neste trabalho apresentam-se mapas de distribuição geoquímica para o sulfato e o cálcio, utilizando a krigagem gaussiana com transformação inversa, para a identificação espacial das zonas de maior potencial de contaminação agrícola. A avaliação da vulnerabilidade intrínseca foi obtida através do índice DRASTIC Pesticida, apresentando zonas de vulnerabilidade moderada a elevada. A sobreposição dos mapas de distribuição e de vulnerabilidade permitirá a identificação de áreas de maior risco para a contaminação.

Palavras-chave: água subterrânea; geoestatística; krigagem Gaussiana; mapas estimados; índice Drastic

Introdução

A análise de riscos ambientais é um ponto-chave na otimização do planeamento dos recursos naturais, permitindo uma gestão focada na atenuação ou minimização de prejuízos (e.g. Guerreiro e Pereira, 2002; Scribd, 2013).

O presente trabalho, inserido no projeto POCTEP Águeda, tem como principal objetivo, a análise e caracterização espacial das águas subterrâneas da bacia hidrográfica do rio Águeda, nomeadamente a influência das atividades antropogénicas associadas predominantemente à agricultura (Sánchez et al, 2013).

Avaliação da Vulnerabilidade intrínseca - DRASTIC Pesticida

A vulnerabilidade intrínseca representa a capacidade natural de um sistema aquífero em receber e transmitir substâncias potencialmente contaminantes, ao longo do tempo. No presente trabalho foi adotado o índice DRASTIC Pesticida (Aller, 1987), uma vez que apresenta o sistema de ponderação mais adequado às variáveis em estudo, com uma melhor resposta em zonas de agricultura intensiva, com recurso à utilização de pesticidas e, ainda, a aplicação de sulfatos.

A metodologia DRASTIC utiliza 7 parâmetros: profundidade do aquífero (D), recarga (R), material do aquífero (A), tipo de solo (S), topografia (T), material da zona vadosa (I) e condutividade hidráulica (C). Cada um destes parâmetros é ponderado tendo em consideração a sua influência na propagação e dispersão de poluentes (Aller et al., 1987; Albuquerque et al., 2013).

Amostragem

O planeamento da amostragem é um dos passos mais importantes na construção de cartas de variabilidade espacial (ISA, 2013). Na verdade, o desenho dos pontos de recolha, permitiu assegurar uma amostragem estatisticamente sólida (Fig. 1), possibilitando a captação da variabilidade espacial, para os dois atributos em estudo e para diferentes classes de distância. Com esta distribuição é possível recorrer a metodologias geoestatísticas para a construção dos mapas estimados na distribuição de teores (Saito e Goovaerts, 2000).

Figura 1. Desenho de amostragem na bacia hidrográfica do rio Águeda.

Na área em estudo foram selecionadas e recolhidas 75 amostras de água subterrânea (poços), ao longo de uma rede com uma quadrícula equidistante de 7,5 km (Fig. 1). A recolha de amostras decorreu durante o mês de maio de 2012. Em cada um dos 75 pontos selecionados, foram determinados “in situ” os principais parâmetros físico-químicos: oxigénio dissolvido (DO), pH, potencial de oxidação-redução (ORP), condutividade elétrica (CE) e temperatura. Ulteriormente, as amostras de água recolhidas foram acondicionadas e transportadas para os laboratórios do Instituto de Recursos Naturais e Agro-Biologia (IRNASA - CSIC) de Salamanca (Espanha). Neste laboratório foram determinados os teores de cálcio (Ca) e de sulfatos (SO_4^{2-}). As técnicas analíticas incluíram a cromatografia iónica, absorção atómica.

Metodologia

A avaliação da vulnerabilidade de um aquífero permite a definição de áreas mais ou menos vulneráveis à contaminação por atividades antropogénicas. A construção de mapas de

vulnerabilidade constitui uma importante ferramenta de apoio à otimização da exploração de recursos hídricos e, desta forma, no planeamento territorial.

O índice DRASTIC pesticida foi o adotado, para avaliação da vulnerabilidade intrínseca. A utilização de ferramentas SIG, nomeadamente o recurso ao raster calculator (Arcmap 10, ESRI), permitiu afetar as respetivas ponderações, no subsequente cálculo dos índices finais (Albuquerque et al., 2013).

O mapa obtido ilustra a heterogeneidade de vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas na bacia hidrográfica do rio Águeda (Fig.2).

Fig.2. Mapa do índice DRASTIC Pesticida na bacia hidrográfica do rio Águeda.

As zonas de vulnerabilidade moderada a elevada localizam-se, preferencialmente na zona central da bacia e coincidem com explorações mineiras de Sn-W e de U, com elevados teores de metais pesados associados e, também, com áreas de exploração agrícola massiva e criação de gado. A zona mais vulnerável corresponde ao extenso aquífero sedimentar terciário e área urbana e agrícola, desenvolvida na planície de Ciudad Rodrigo (Fig. 2).

Construção de mapas estimados - Krigagem gaussiana

A incorporação da estrutura espaço-temporal dos atributos em análise (cálcio e sulfatos), para a construção de cartografias estimadas, torna-se essencial na seleção das metodologias a adotar, onde a visualização da incerteza espacial associada à estimativa, permite uma análise crítica das representações obtidas.

A modelação geoestatística iniciou-se pelo estudo variográfico experimental, ao longo das principais direções e subsequente ajuste de modelo teórico, ao variograma experimental omnidirecional, uma vez que não foi possível modelar a anisotropia geométrica, para as duas variáveis. A krigagem gaussiana foi utilizada como interpolador otimizado, permitindo a

atenuação dos valores extremos. O recurso ulterior à operação de transformação inversa, permitiu a representação dos resultados finais no real intervalo de valores da amostra (e.g. Albuquerque et al., 2013). No passo seguinte e recorrendo à utilização de um Sistema de Informação Geográfica (ArcMap 10, ESRI) foi possível construir mapas de distribuição de teores (Soares, 2006).

De um modo geral, a zona com os valores mais elevados para os parâmetros físico-químicos analisados coincide com a parte central da bacia hidrográfica (Ciudad Rodrigo).

Figura 3. Mapas estimados para o cálcio e sulfatos na bacia hidrográfica do rio Águeda.

De destacar, a zona de vulnerabilidade intermédia a elevada, na parte norte da bacia, correspondendo a características intrínsecas associadas à presença de calcários carsificados. Nesta área, as atividades humanas são reduzidas ou praticamente inexistentes (Fig. 2).

Conclusão

O presente trabalho permitiu estudar a distribuição espacial de diferentes parâmetros físico-químicos na bacia hidrográfica do rio Águeda, com particular destaque para o cálcio e sulfatos. Estes parâmetros indicam uma relação clara com as atividades antropogénicas, predominantemente agrícolas, concentradas na zona central da bacia hidrográfica e coincidindo com o extenso aquífero de materiais detriticos de idade Terciária (Ciudad Rodrigo). Esta zona corresponde à maior área urbana e industrial existente na bacia hidrográfica do rio Águeda.

A interpolação realizada por krigagem gaussiana, recorrendo ulteriormente à transformação inversa, permitiu, por um lado, atenuar o peso dos valores anómalos e, por outro, obter uma representação correspondente ao espaço original e, desta forma, construir mapas onde os valores estimados podem ser experimentalmente validados (Saito e Goovaerts, 2000). A validação dos resultados obtidos revelou-se adequada, e permitindo, desta forma, a definição de uma futura rede de monitorização específica e mais adequada.

Bibliografia

Albuquerque, M. T. D., Sanz, G., Oliveira, S.F., Martínez-Alegría, R., Antunes, I. M. H. R. (2013). Spatio-Temporal Groundwater Vulnerability Assessment - A Coupled Remote Sensing and GIS Approach for

- Historical Land Cover Reconstruction. *Water Resource Management* 27, pp 4509-4526. DOI:10.1007/s11269-013-0422-0; IF 2.259.
- Aller, L., Bennet, T., Lehr, J.H., Petty, R.J., Hackett, G. (1987). DRASTIC: a standardized system for evaluating ground water pollution potential using hydrogeologic settings. U.S. Environmental Protection Agency (Eds.), EPA/600/2-87/035, Oklahoma, 641 pp.
- Guerreiro, N., Pereira, P. B. (2002). Poluição e qualidade da água. Instituto da água/Direção de Serviços do Planeamento. Lisboa: Ministério das Cidades Ordenamento do território e ambiente.
- ISA, (2013). Teoria de Amostragem [online]. Available from: http://www.isa.utl.pt/dm/mestrado/2009-10/UCs/ta/seb_amost1.pdf [Accessed 25 october 2013].
- Saito, H., Goovaerts, P. (2000). Geostatistical interpolation of positively skewed and censored data in a dioxin contaminated site. *Environmental Science & Technology*, 34 (19): 4228-4235.
- Sánchez-González, S., García-Sánchez, A., Caravantes, P., Rodríguez-Cruz, M. S., Sánchez-Martín, M. J. e Rodríguez, I.S.R. (2013). Caracterización y análisis de impactos ambientales en la cuenca del río Águeda. In: Francisco Campos Sánchez-Bordona (Ed). Cuenca del río Águeda un território para dos Países. Servicio de Publicaciones. Universidad Europea Miguel de Cervantes Valladolid, pp 35-64.
- Soares, A. (2006). Geoestatística para as ciências da terra e do ambiente. 2ª Ed. Lisboa: IST.
- Scribd (2013). Análise de Riscos Ambientais e Lógica Fuzzy [online]. Available from: <http://www.scribd.com/doc/4809204/Analise-de-Riscos-Ambientais-e-Logica-Fuzzy> [Accessed 28 october 2013]

DESENVOLVIMENTO DE UM WEBSIG SOBRE INVESTIGAÇÕES APLICADAS A INCÊNDIOS FLORESTAIS

Nuno Simões

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve
nuno_simoes58@hotmail.com

Helena Fernandez

Instituto Superior de Engenharia, Universidade do Algarve
hfernand@ualg.pt

Fernando Martins

Instituto Superior de Engenharia, Universidade do Algarve
fmmartin@ualg.pt

RESUMO

Após o incêndio florestal de Tavira - São Brás de Alportel, que ocorreu a 18 Julho de 2012, têm sido desenvolvidas várias investigações científicas neste caso de estudo. Por forma a estudar este incêndio, foram utilizadas ferramentas computacionais de Detecção Remota, de Sistemas de Informação Geográfica, de Bases de dados, entre outras. A monitorização do coberto vegetal e a descrição da erosão hídrica pós incêndio foram exemplos aplicados neste caso de estudo, tendo sido publicados a nível nacional e internacional.

No presente trabalho será apresentada uma fase preliminar de um WebSIG que irá conter os dados já publicados referentes a este caso de estudo. Posteriormente será ampliado a nível nacional, de modo a conter os resultados das diversas investigações realizadas na temática de incêndios florestais e os seus efeitos nos solos. Este WebSIG, será disponibilizado à comunidade científica e à sociedade em geral.

Na conceção deste sistema serão utilizados softwares de código aberto e livre: o *MapServer* como servidor de mapas; o *Quantum GIS* (QGIS) como software de SIG *desktop*; e como servidor o Web Apache.

Palavras-chave: WebSIG; Incêndios Florestais; Efeitos nos Solos.

Introdução

Os incêndios florestais, a nível nacional, são uma das maiores catástrofes que devastam o país, destruindo grandes áreas de mato, principalmente em períodos de temperaturas elevadas. Nestas condições, os incêndios florestais alteram verdadeiramente a paisagem por onde se desenvolvem e alastram.

Em Portugal, com o objetivo de minimizar os impactos negativos dos incêndios florestais, vários centros de investigação científica realizam trabalhos nesta área temática. Nos últimos anos algumas melhorias têm sido notadas mas, mesmo com inúmeros esforços ainda não se encontrou uma solução para este problema.

Em investigações mais recentes começou-se a utilizar os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e a Detecção Remota como recurso informático de elevada importância no planeamento de medidas de prevenção, no combate aos incêndios florestais e em monitorizações pós-incêndio. Estes dois recursos permitem a realização de uma gestão mais sustentável para o combate de incêndios florestais.

De um modo geral, os SIG foram influenciados pela internet no acesso aos dados espaciais, na disseminação da informação espacial e no seu processamento. Atualmente existem aplicações que distribuem dados espaciais para os utilizadores através de uma página Web, facilitando assim, o modo de partilha destes dados espaciais. Estas aplicações são denominadas por WebSIG que representam um método praticamente sem custos que se tornou bastante utilizado a nível mundial (Peng e Tsou, 2003 e Bonnici, 2005).

Este trabalho consiste no desenvolvimento de um WebSIG para investigações científicas aplicadas a incêndios florestais. Esta aplicação permitirá ao utilizador visualizar, interagir e efetuar o *download* dos dados espaciais utilizados nestes trabalhos.

No presente trabalho apenas serão apresentados os dados espaciais resultantes das investigações realizadas no incêndio florestal de Tavira - São Brás de Alportel, que ocorreu a 18 Julho de 2012 (Figura 1). A monitorização do coberto vegetal e a descrição da erosão hídrica pós incêndio foram exemplos aplicados, tendo sido publicados a nível nacional e internacional (Baptista *et al* 2013; Simões *et al* 2014).

Figura 1 - Localização do incêndio de Tavira - São Brás de Alportel.

Futuramente, pretende-se atualizar este WebSIG com informação obtida a partir das investigações realizadas noutras regiões de Portugal, na temática dos incêndios florestais e seus efeitos nos solos. Este WebSIG será disponibilizado à comunidade científica e à sociedade em geral.

Metodologia

O WebSIG foi desenvolvido através de softwares e pacotes código aberto e livre, sendo necessário um conjunto de ferramentas que melhor se adaptam às necessidades e aos meios disponíveis: servidor web, servidor de mapas, suporte para *Hypertext Preprocessor* (php) e para *Common Gateway Interface* (CGI) e um conjunto de bibliotecas que permitem o uso e o tratamento de dados espaciais.

Como servidor web utilizou-se o *Servidor Web Apache* e como servidor de mapas o *Mapserver*, que tem como função principal disponibilizar dados e mapas na internet, podendo também, ser utilizado como ambiente de desenvolvimento para construções de mapas interativos antes de os publicar.

As configurações dos serviços de dados e de mapas no software *Mapserver* são efetuadas em ficheiros específicos, designados por *mapfiles*. A extensão destes ficheiros denomina-se por *.map*, e é nestes mesmos ficheiros que são inseridos códigos a ser interpretados posteriormente. Através do *plugin RT MapServer Exporter*, instalado no software *Quantum GIS* (QGIS), utilizado ao longo deste trabalho geraram-se os ficheiros *mapfiles* com informação dos layers a disponibilizar, bem como as parametrizações para a produção e distribuição dos mapas.

Para a realização deste trabalho, utilizou-se o modo *Mapscript*, devido ao facto de poder criar aplicações mais robustas através de várias linguagens de programação, para além da sua linguagem base C.

Para facilitar o processo de instalação do *Mapserver* no Windows, utilizou-se o pacote **MS4W**. Este pacote tem incorporado todas as dependências do *Mapserver*, tais como o Apache, *php*, e livrarias (exemplo: Proj4, OGR e GDAL).

Para criar o *interface* para o utilizador do *WebSiG*, utilizou-se o *framework* do *Mapserver* denominado por **p.mapper**, no qual foi necessário adequar o código e outras configurações de modo a atingir o pretendido.

O conjunto de dados utilizados neste *WebSiG* encontram-se em formato *shapefile* e no formato *raster*. Os dados em formato *shapefile* englobam os temas: países, concelhos de Portugal (Concelhos), as cidades das áreas de estudo (Cidades), os rios principais incluídos na área de estudo (Rios) e ainda a delimitação do incêndio florestal de Tavira-São Brás de Alportel (Incêndio).

Os dados matriciais (*raster*) estão divididos em duas categorias: a monitorização do coberto vegetal e a análise da erosão hídrica de pré e pós incêndio. Esta informação foi obtida com base em imagens de satélite para os períodos de Abril de 2012, Dezembro de 2012, Março de 2013 e Novembro de 2013 (Baptista et al 2013 e Simões et al 2014)

Resultados e Discussão

O *WebSiG* apresenta uma plataforma bastante interativa, que permite ao utilizador realizar várias tarefas (Figura 2). Existe a tabela de conteúdos com as diversas *layers* que o utilizador pode ter acesso (Figura 2 - A). Há a possibilidade de o utilizador interagir com o mapa através dos diversos controlos disponíveis: *Zoom out*, *Zoom in*, *Zoom to selected*; *Pan*; *Identify*; *Measure*; *Scale*, entre outros. Também poderá ter acesso à informação, do layer que estiver selecionado (Figura 2 - B). O utilizador pode visualizar no canto inferior esquerdo do *WebSiG* as coordenadas respetivas desse local (Figura 2 - C).

Figura 2 - *WebSiG* de incêndios florestais. a) Tabela de conteúdos; b) Controlos; c) Escala e coordenadas da localização do cursor.

Conclusão

Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento de um WebSIG acerca de investigações realizadas a incêndios florestais. Este WebSIG, ainda está numa fase incipiente pretendendo-se aperfeiçoar a sua estrutura. A metodologia utilizada para esta conceção permite construir interfaces bastante atrativas e funcionais.

Neste WebSIG apenas foram apresentados os resultados de diversas investigações realizadas no incêndio de Tavira - São Brás de Alportel 2012. Contudo, pretende-se expandir esta plataforma a outras investigações científicas realizadas a incêndios florestais e seus efeitos nos solos, decorridas em Portugal e no Mundo. Esta plataforma também poderá vir a ser incluída numa página de internet, tornando-se assim uma mais dinâmica e útil para, investigadores e interessados, nesta área, que é deveras importante para os cidadãos.

Bibliografia

- Baptista, E., Simões, N., Martins, F., Paixão, H., Jordán, A., Zavala, L. Monitoring vegetation cover after the Tavira - São Brás de Alportel 2012 wildfire (Southern Portugal). 10/2013; In: VII Encontro de Geografia Física e Ambiente - Grandes Incêndios Florestais, Erosão, Degradação e Medidas de Recuperação de Solos, At Guimarães, Oral presentation
- Baptista, E., Simões, N., Martins, F., Paixão, H., Jordán, A., Zavala, L., 2013. Chove e não trás Guarda-Chuva, Erosão Hídrica Pós-Incêndio - Caso de estudo Incêndios Tavira-São Brás De Alportel Julho de 2012. 10/2013; In proceeding of: VII Encontro de Geografia Física e Ambiente - Grandes Incêndios Florestais, Erosão, Degradação e Medidas de Recuperação de Solos, At Guimarães. Atas poster session
- Bonnici, A. (2005). WebGIS Software Comparison Framework. Geomatics Dpt., Sir Sandford Fleming College.
- Peng, Z. & Tsou, M. (2003). Internet GIS: Distributed Geographic Information Services for the Internet and Wireless Networks. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Simões, N., Martins, F., Paixão, H., Jordán, A., Zavala, L., 2014. Monitoring vegetation cover in the postfire in Tavira - São Brás de Alportel (Southern Portugal). EGU General Assembly 27 - 2 May 2014. At Vienna. Austria. Poster session

A GESTÃO RISCO NO TERRITÓRIO, O CONTRIBUTO DOS PLANOS REGIONAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

Teresa Cravo da Fonseca

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa
t.fonseca@campus.ul.pt

Eduarda Marques da Costa

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa
eduarda.costa@campus.ul.pt

José Luís Zêzere

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa
zezere@campus.ul.pt

RESUMO

A gestão do risco tem-se configurado como um domínio de crescente preocupação para as sociedades. A sua integração no planeamento e gestão do território tem-se revelado uma prioridade inevitável.

Neste princípio é importante reconhecer qual o caminho que Portugal tem feito na abordagem da integração do risco nas políticas de ordenamento e gestão do território. O presente trabalho demonstra alguns dos resultados em discussão em dissertação de doutoramento, focando-se este artigo na demonstração do contributo dos planos regionais de ordenamento do território na gestão do risco. A abordagem consiste na análise dos planos de ordenamento de nível regional e através destes eixos estratégicos, compreender a integração do vector risco na gestão do território em Portugal.

Palavras-chave: Risco; Planeamento; Portugal

Introdução

Os processos de ordenamento e planeamento do território em Portugal têm sido acompanhados por mudanças significativas ao longo das últimas décadas, quer nas suas orientações, quer no modelo de governação das intervenções estruturais, marcados pela introdução de diversificados instrumentos de orientação internacional, europeia e nacional. A gestão do risco, seja ele de génese natural ou antrópica, tem-se configurado como um domínio de crescente integração na gestão do território. Adicionalmente, os temas e desígnios ligados à proteção do solo e dos recursos naturais permitiram ao longo das últimas décadas a implementação de medidas preventivas, diminuindo a susceptibilidade a determinados perigos bem como a vulnerabilidade dos territórios e populações.

Neste contexto é importante reconhecer o caminho que Portugal tem feito na abordagem e integração do risco nas políticas de ordenamento e gestão do território, nomeadamente à escala regional, bem como compreender a dimensão das políticas e instrumentos que enquadram as questões da prevenção e gestão do risco. A presente comunicação, constitui um pequeno ensaio metodológico no sentido de demonstrar o desenvolvimento de abordagens integradoras entre instrumentos e objetivos, passando este nível de análise pelo apuramento da integração do risco no ordenamento do território através dos instrumentos de escala regional, onde se delineiam as estratégias locais com real impacto no território. Por esta via pretende-se potenciar a compreensão da integração do vector risco na gestão do território em Portugal.

Metodologia

A metodologia utilizada baseou-se na construção de matrizes de referência construídas através das seguintes etapas: a) levantamento dos temas, desígnios, objetivos ou objetivos estratégicos

previstos nos instrumentos de planeamento regional do território - Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) (ver Tabela I) - que contribuam direta ou indiretamente (Cumpre; Contribui; Contribui parcialmente; Não Aplicável (NA)) para a gestão do risco (Misto/ Ambiental; Natural; Tecnológico) e/ou para a resiliência; b) expressão dos resultados numa tabela de concordância; c) interpretação dos resultados.

Para o efeito o instrumento de avaliação descrito tem como objetivos: i) reconhecer o contributo dos PROT para a integração do vector risco (ver Tabela II); ii) reconhecer a tipologia de risco que revela maior relevância nos instrumentos de gestão do território; iii) reconhecer o contributo dos PROT para a resiliência do território e suas sociedades.

Tabela I - Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) analisados

INSTRUMENTO	DATA	NÍVEL	TIPO DE INSTRUMENTO
PROT da Região do Norte - Proposta de Plano	Dezembro de 2009	Regional	Desenvolvimento territorial
PROT da Região do Centro - Proposta de Plano	Maio 2011	Regional	Desenvolvimento territorial
PROT da Área Metropolitana de Lisboa - Proposta Técnica Final	Novembro de 2010	Regional	Desenvolvimento territorial
PROT da Região do Oeste e Vale do Tejo	Resolução do Conselho de Ministros N.º 64-A/ 2009	Regional	Desenvolvimento territorial
PROT da Região do Alentejo	Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2010	Regional	Desenvolvimento territorial
PROT da Região Algarve	A Resolução do Conselho de Ministros n.º 126/2001, de 14 de Agosto	Regional	Desenvolvimento territorial

A gestão do território e a gestão do risco em Portugal

Os processos de ordenamento e planeamento do território em Portugal têm sido marcados pela introdução de diversificados instrumentos de orientação internacional, europeia e nacional. Estes instrumentos fizeram-se acompanhar por mudanças significativas nas orientações e no modelo de governação das intervenções estruturais ao nível nacional, nomeadamente nas estratégias de ordenamento e gestão do território. [1] Num quadro de mudanças de orientação do modelo de gestão territorial surge no início da década de 2000 a procura de um modelo mais sustentável de evolução da sociedade. Este alicerça-se na preocupação dominante face ao conjunto de oportunidades, mas também de ameaças, que afetam o conjunto do tecido social, a estrutura das atividades económicas e o equilíbrio ambiental., através da adoção por Portugal da “Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável - ENDS 2015” inserida numa iniciativa global, iniciada com a Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento (CNUAD). [3]

Neste sentido, Portugal viria a reconfigurar o seu *modus operandi* nas práticas de governação do território, que passaram a incluir, direta ou indiretamente, a gestão do risco. Podemos identificar um conjunto de instrumentos que, ao longo do tempo, incluíram o risco como elemento integrante da estratégia de ordenamento, seja como fator de proteção do solo, água e seus ecossistemas, seja na vertente, mais atual, da identificação da susceptibilidade e vulnerabilidade dos territórios. O melhor exemplo observa-se com a inclusão do vetor - risco - no modelo territorial do PNPOT, que veio estabelecer a gestão preventiva dos riscos como uma prioridade essencial na política de ordenamento do território e de integração obrigatória nos instrumentos de planeamento e gestão territorial. Em particular, o PNPOT obriga à definição das áreas perigosas, dos usos compatíveis e das medidas de prevenção e mitigação dos riscos, em sede de PROT, PMOT e PEOT. As orientações do PNPOT configuram uma mudança no paradigma dominante na abordagem aos riscos, com a evolução de uma cultura de reação («resposta à catástrofe») para uma cultura de prevenção («evitar e mitigar o risco»), na linha

das orientações internacionais mais recentes, nomeadamente o acordo de Hyogo para 2005-2015 [5] [6]. Neste contexto, objetivava-se que os instrumentos de planeamento e gestão territorial de «nova geração» viessem garantir a correta utilização do recurso território, salvaguardando o direito à segurança das populações, através da prevenção e minimização dos riscos. [6] A marcar esta tendência, destaca-se a elaboração do Plano Setorial de Prevenção e Redução de Riscos (PSPRR), atualmente em curso. [2]

O contributo dos PROT para a gestão do risco

A Tabela II sintetiza os resultados obtidos acerca da contribuição dos Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) para a gestão do risco. Os PROT do Norte, do Oeste e Vale do Tejo (OVT) e o do Alentejo são os que, na análise aos objetivos contemplados, no grupo de normas específicas ou domínios selecionados, se distinguem com a maior percentagem de cumprimento no que toca às orientações/normas/regulação do risco. Por sua vez, os PROT do Centro, do Algarve, do Norte e da AML definem o maior número de objetivos que contribuem para a gestão do risco. De modo indireto, identificam-se os PROT do Algarve, do Alentejo e o da AML com objetivos que contribuem parcialmente para as questões da gestão do risco no território, isto é, há normas específicas que apesar de não se relacionarem diretamente com o risco podem contribuir indiretamente para a prevenção ou mitigação dos riscos (ex. turismo, energia, infraestruturas, etc.). Quanto ao tipo de riscos para os quais os PROT cumprem, contribuem; ou contribuem parcialmente para a respetiva gestão no território, verifica-se que, com exceção dos PROT do Alentejo e o do Algarve, que dão primazia aos riscos naturais identificando-se a maior percentagem de diretrizes, os restantes direcionam-se para todos os riscos ambientais/mistos. Adicionalmente, os riscos tecnológicos posicionam-se para todos os instrumentos com a menor percentagem de diretrizes. No que respeita à importância das medidas para a incrementar a resiliência dos territórios, destacam-se os PROT do Oeste e Vale do Tejo (OVT), do Norte e o do Alentejo, com uma percentagem significativa de objetivos que beneficiam esta componente.

Tabela II - Contribuição dos PROT para a gestão do risco

				ANÁLISE POR PROT - Percentagem (%)							
				Riscos Ambientais, Naturais e Tecnológicos				Tipo de Risco		Resiliência	
PROT	N.º de grupos de normas específicas/ domínios analisados	Total objetivos analisados	Total objetivos c/ cumpre, contribui ou contribui parcialmente	Cumpr	Contribui	Contribui parcialmente	Não Aplicável (NA)	Misto/Ambiental	Natural	Tecnológico	
NORTE	3	166	99	27%	20%	12%	40%	63%	49%	15%	
CENTRO	13	246	154	20%	27%	16%	37%	70%	42%	6%	
AML	4	301	160	9%	20%	25%	47%	52%	48%	4%	
OVT	3	267	158	25%	17%	17%	41%	50%	51%	20%	
ALENTEJO	4	351	204	16%	17%	25%	42%	57%	58%	15%	
ALGARVE	13	317	237	21%	26%	27%	25%	57%	60%	5%	

Conclusão

Na análise efetuada, verificamos que a matéria do risco está de forma direta ou indireta integrada em todos os instrumentos regionais, não obstante da fase temporal em que foram desenvolvidos. Em análises desenvolvidas aos instrumentos de carácter nacional, pudemos ainda comprovar que temas e desígnios ligados ao desenvolvimento do território e coesão territorial, o provimento de infraestruturas e equipamentos promovendo a coesão social, a qualidade e eficiência da gestão territorial, têm contribuído fortemente para o processo de integração da gestão do risco na gestão do território, na sequência de orientações nacionais

estruturantes como a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS) e o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT). [4]

Contudo, a sua transposição para a escala regional, confronta-se com vários constrangimentos, que resultam da integração diferenciada no tempo, em territórios com características distintas e com estádios de desenvolvimento diferentes, que condicionam as prioridades de gestão do território. Por estes motivos, o País confronta-se com diferentes níveis de integração de políticas e estratégias ao nível regional. Neste contexto, a avaliação dos instrumentos nacionais, regionais e municipais, através de índices de monitorização - os designados fatores críticos - é indispensável, para que se analise a eficácia e eficiência das práticas de gestão do risco no território.

Urge deste modo proceder à avaliação de instrumentos de base que configuram a gestão do risco através da gestão do território, bem como a criação de novas práticas de gestão e regulamentação sobre o risco, fortalecendo deste modo a proteção e segurança dos territórios e das suas populações.

Bibliografia

- Costa, Eduarda Marques da (2006). «O Ordenamento à Escala Europeia» Geografia de Portugal, Vol. IV, Circulo de Leitores, pp. 260-267
- DGTOU - <http://www.dgotdu.pt/>
- ENDS 2015 (2007) PIENDS - Plano de Implementação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Presidência do Conselho de Ministros Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2007. Diário da Republica, 1.ª série - N.º 159 - 20 de Agosto de 2007
- Fonseca, Teresa; Costa, Eduarda Marques da (2013). «O contributo dos programas de ordenamento do território para a gestão risco». IX Congresso da Geografia Portuguesa - Geografia: Espaço, Natureza, Sociedade e Ciência. Associação Portuguesa de Geógrafos. Dezembro 2013. pp. 662-668
- ISDR (International Strategy for Disaster Reduction), 2005. World Conference on Disaster Reduction, 18-22 January 2005, Kobe, Hyogo, Japan. Proceedings of the Conference Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters, United Nations. Geneva
- Zêzere, José Luís (2007). «Riscos e ordenamento do território». Inforgeo, Julho 2007, pp. 59-63

AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS NO APOIO AO PLANEAMENTO E GESTÃO FLORESTAL: RECUPERAÇÃO DA ÁREA ARDIDA NO BALDIO DE MOIMENTA - CABECEIRAS DE BASTO

Ana Leite

Escola Superior Agrária de Ponte de Lima - Instituto Politécnico de Viana do Castelo
anactleite@hotmail.com

RESUMO

O presente trabalho insere-se no desenvolvimento de conhecimentos técnicos e académicos ao nível do planeamento e gestão sustentável dos espaços florestais. A investigação possui um carácter, numa primeira fase, crítico e assertivo acerca das problemáticas inerentes às alterações climáticas, às suas consequências nos espaços florestais e às medidas conhecidas para salvaguardar estes espaços; e numa segunda fase, a realização de um Plano de Gestão Florestal numa área reconhecida como terreno baldio, localizado em Moimenta - Cabeceiras de Basto e cujo histórico se relaciona com inúmeros incêndios ocorridos nos últimos anos.

Para a realização do projeto final, associado a esta investigação, tornou-se necessário proceder a vários estudos que de uma forma sucinta e prática classificassem o espaço em relação à sua perigosidade de ocorrência de incêndio, de movimentação de vertentes e erosão hídrica, utilizando os sistemas de informação geográfica como ferramentas de trabalho. Os produtos finais caracterizados pelas cartas de risco de incêndio florestal, risco de movimentação de vertentes e risco de erosão hídrica permitem assim tirar conclusões acerca da perigosidade da área em várias vertentes práticas e fazer escolhas mais assertivas para medidas que podem vir a ser implementadas no espaço.

Os principais resultados indicam a possibilidade de serem implementadas medidas eficientes e atividades diferenciadas numa área tão diminuta, como é o caso. No espaço em estudo, que possui na sua totalidade 131,44 hectares, seria possível aplicar a promoção de atividades lúdicas, rentáveis para o Estado e que salvaguardem as áreas florestais de fenómenos naturais nefastos.

No final da investigação compreende-se que seria imprescindível que o Estado, enquanto entidade responsável, tivesse a gestão e o planeamento florestal como uma prioridade, dentro das suas ações governamentais, implementando atividades concretas que salvaguardassem a floresta e promovessem a biodiversidade.

Palavras-chave: alterações climáticas, ação antrópica, fenómenos naturais, planos organizacionais, ordenamento do território.

Introdução

O presente trabalho tem o seu âmbito investigacional a gestão e planeamento de espaços florestais, considerando por um lado, uma organização bibliográfica que aborda várias temáticas integrantes e por outro lado, o caso concreto do terreno baldio de Moimenta, localizado na freguesia de Cavez, pertencente ao concelho de Cabeceiras de Basto e trata-se de uma área ardida, cuja recuperação está dependente das ações da entidade estatal responsável, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Assim, com o objetivo primordial da investigação em realizar um Plano de Gestão Florestal para a área em estudo, foram analisados três tipos de riscos associados a fenómenos naturais: risco de incêndio, o risco de movimento de vertentes e o risco de erosão hídrica.

Riscos Ambientais no Planeamento e Gestão Florestal

As alterações climáticas e os fenómenos associados têm provocado, ao longo dos anos, degradações constantes no meio ambiente, tendo consequências notórias na diminuição da

qualidade de vida do ser Humano, nomeadamente na saúde, bem-estar social e na geração de riqueza. Por essa razão, torna-se crucial proteger os ecossistemas agro - florestais, trabalhando em prol do meio ambiente diminuindo assim, os efeitos das alterações climáticas no planeta e salvaguardando a saúde do ser Humano (Monbiot, 2007).

A nível europeu conhecem-se várias medidas e inúmeras associações não-governamentais que têm como principais objetivos a proteção da floresta e a promoção ativa de biodiversidade. Portugal, não sendo indiferente a todas as alterações que se fazem sentir, também está aliado a muitas dessas atividades, no entanto verifica-se a existência de algumas lacunas na gestão dos espaços florestais, sendo assim importante que haja uma maior consciencialização por parte dos principais atores na salvaguarda da floresta, não só pela sua importância ambiental mas também pela posição que este sector ocupa no mercado nacional.

O Deputado Abel Baptista, vice - presidente da Comissão de Agricultura e Mar, do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, referiu ao investigador que “a floresta portuguesa ocupa 38% do território nacional, com 3,45 milhões de hectares e é a 12ª maior área florestal da União Europeia, sendo que 23% desta área é protegida”. Se, por um lado, se considera uma mais-valia para o país que as áreas florestais nacionais sejam tão valorizadas, por outro seria imprescindível que a gestão e o planeamento destes espaços estivessem à altura desta valoração. Não obstante à legislação que já existe e que é utilizada na gestão dos espaços florestais, o investigador reconhece que alguma desta legislação pode ser considerada como desatualizada para o que é a realidade a nível florestal. Para tal torna-se necessário uma atualização de algumas medidas e a promoção da aplicação de medidas diferenciadas que beneficiariam a área florestal nacional.

Metodologia e Resultados

Para realizar o Plano de Gestão Florestal realizaram-se alguns estudos com intuito de obter a avaliação do terreno acerca de alguns fenómenos naturais.

Avaliação do Risco de Incêndio Florestal

A avaliação do Risco de Incêndio Florestal foi realizada através de uma metodologia criada pela Autoridade Florestal Nacional em 2012, onde o estudo é feito através do cruzamento de quatro pressupostos principais: Probabilidade, Suscetibilidade, Vulnerabilidade e Valor Económico. Desta forma, foi possível concluir que no terreno em estudo, apesar da perigosidade associada aos incêndios ser elevada, pelo histórico associado, o risco de incêndio é praticamente inexistente, como se verifica na figura 1.

Figura 1 - Carta final de risco de incêndio florestal

Avaliação do Risco de Movimentação de Massas

A avaliação do Risco de Movimentação de Massas teve como pressuposto a metodologia de Dan Balteanu, Viorel Chedes, Mihaela Sima e Petru Enciu. Nesta metodologia os principais pressupostos ponderados foram: a precipitação média mensal da estação meteorológica de Cavez, a litologia, a sismicidade, a topografia do terreno e a suscetibilidade de ocorrência do fenómeno, tendo em conta a carta de ocupação e uso do solo. Como resultado, apresenta-se uma área onde o risco de movimentação de vertentes é parcialmente elevado, como está ilustrado na figura 2.

Figura 2: Carta final do risco de movimentação de massas.

Avaliação do Risco de Erosão Hídrica

Para a obtenção do estudo acerca da probabilidade de ocorrência de erosões hídricas no terreno em estudo, adaptou-se a metodologia de Wischmeier & Smith (1995), a partir da Equação Universal de Perdas de Solo (USLE):

$$A = R \times K \times LS \times C \times P$$

Nesta metodologia, os pressupostos assumidos foram as variáveis da equação de USLE:

R - Agressividade climática

K - Erodibilidade do solo

LS - Topografia do terreno

C - Coberto vegetal

P - Práticas de conservação do solo

Após consideração dos pressupostos e respetivos cruzamentos de dados foi possível conhecer a carta final de risco de erosão hídrica onde se pode considerar como muito reduzido, tal como se verifica na figura nº 3.

Figura nº 3: Carta final do risco de erosão hídrica.

Plano de Gestão Florestal

Após todos os estudos individuais dos riscos ambientais associados, realizou-se um plano de gestão florestal, tendo em atenção a suscetibilidade da área de estudo face a ocorrência dos fenómenos estudados e às valorações que lhe foram aplicadas.

O plano de gestão florestal visa obter um conjunto de medidas a aplicar num prazo de três anos. Estas medidas têm como objetivo um planeamento florestal dinâmico, promovendo a salvaguarda da floresta atendendo à biodiversidade da flora e da fauna, e promover atividades rentáveis, mobilizando a economia nacional e impulsionando a empregabilidade.

Na figura nº 4 é ilustrado o plano de gestão florestal criado, fazendo referência às atividades propostas.

Figura nº 4: Plano de Gestão Florestal.

Assim, todas as medidas implementadas surgem, principalmente, baseadas no uso múltiplo da floresta:

1. Limpeza dos espaços - Limpeza realizada em parceria entre o ICNF e a CMCB pelo facto de se verificar que existem espécies invasoras e matos.
2. Criação e manutenção dos acessos - Medida implementada pela CMCB e surge da necessidade de criar melhores acessos para carros dos bombeiros.
3. Arborização - A arborização pretende-se que seja realizada em parceria entre o ICNF e a CMCB e tem como principais espécies arbóreas: *Pinus sp.*, *Quercus sp.*, *Castanea sativa*, *Prunus avium*, *Laurus nobilis* e *Acer pseudoplatanus*.
4. Implementação de um viveiro - Nesta medida pretende-se produzir espécies para uso no espaço e para venda. O viveiro estaria, assim, ao encargo da CMCB.
5. Iniciação à atividade apícola - Atividade crucial por possuir rentabilidade económica. As colmeias seriam geridas pelas organizações de produtores de mel da região.
6. Recuperação da casa do guarda-florestal e criação de um trilho pedestre - onde a CMCB poderia promover atividades de turismo rural.

Conclusão

Com a presente investigação pretendeu-se ter postura crítica e assertiva acerca da gestão e planeamento florestal a nível nacional, e desta forma, mostrar soluções para a floresta desenvolvendo um plano de gestão florestal.

Assim, é possível concluir que até numa pequena área é possível implementar diversas medidas que respondam a uma gestão sustentável dos espaços florestais, sendo somente necessário fazer remodelações na legislação existente, onde deveria estar implícito a obrigação das entidades e dos privados a aplicação do uso múltiplo da floresta, independentemente da natureza e da escala associada a qualquer área de trabalho.

Bibliografia

Monbiot, G., 2007. Calor, como impedir o planeta arder. Via Óptima, 292 pp.

ANÁLISE DE SUSCEPTIBILIDADES E O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO À ESCALA MUNICIPAL - APLICAÇÃO AOS CONCELHOS DE ARRUDA DOS VINHOS E VILA FRANCA DE XIRA

Inês Bruno

Instituto Superior de Educação e Ciências
inesbruno@yahoo.com.br

Henrique Vicêncio

Instituto Superior de Educação e Ciências
henrique.vicencio@gmail.com

RESUMO

É cada vez mais frequente ouvir o relato da ocorrência de fenómenos perigosos e seus danos socioeconómicos o que se deve, em parte, a um aumento da frequência e intensidade de alguns fenómenos naturais extremos. Conjugado com esta realidade, o aumento da exposição das populações a estes fenómenos revela a importância do ordenamento do território na gestão da interação homem/espaco natural.

Apresenta-se uma metodologia que identifica as melhores opções para a ocupação do território tendo em vista a segurança de pessoas e bens, aplicada aos concelhos de Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira. Concluiu-se que a superfície sujeita a interdições ou condicionalismos é de 47% e de 93% das superfícies dos concelhos (Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira, respectivamente), e que o número de edifícios localizados em áreas com restrições na ocupação do solo é 1.722 em Arruda dos Vinhos e 34.407 em Vila Franca de Xira.

Palavras-chave: Ordenamento do Território; Suscetibilidades; Riscos.

Introdução

Portugal está sujeito de forma diversa aos perigos naturais e tecnológicos que podem originar catástrofes e não apresenta um ordenamento territorial que tenha em conta a identificação e caracterização dos riscos. Esta situação, associada a outros fatores, tem contribuído para um aumento dos danos socioeconómicos associados à ocorrência de catástrofes.

Os possíveis impactos nas estruturas já construídas em áreas de perigo deverão ser mitigados com o recurso a sistemas de monitorização, alerta e aviso, preparação para a resposta, informação e envolvimento da população em exercícios.

Metodologia

A metodologia de análise do território compreendeu 4 passos: 1 - Identificação das fontes de perigo; 2 - Definição do número de classes de permissão; 3 - Obtenção da matriz final; 5 - Classificação para uma nova escala de permissões e obtenção do mapa final. Este método utiliza um elevado número de dados ponderados em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (Çabuk, 2001; Çabuk et al., 2006; Riad et al., 2011).

A identificação das fontes de perigo consistiu na pesquisa e consulta de Planos Diretores Municipais, Planos Municipais de Emergência e base de dados de ocorrências da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Foram consideradas quatro classes de permissão para as fontes de perigo que traduzem a aptidão do território para a ocupação, tabela I.

Tabela I - Tabela de permissões

Classes de permissão	Características
Interdito	Não é permitida a construção de estruturas. Perigo de morte ou danos irreversíveis para a saúde.
Permissão de 3.º grau	Fortes limitações à construção de estruturas. A sua ocupação requer obrigatoriamente medidas de mitigação e a aplicação de sistemas de monitorização, alerta e aviso.
Permissão de 2.º grau	Existem limitações à construção de estruturas, para as quais poderão vir a ser necessárias medidas de prevenção/mitigação. É necessário parecer/autorização da administração.
Permissão de 1.º grau	É permitida a construção de estruturas.

A atribuição de pontuações às classes de permissão torna-se fundamental no cruzamento de dados e construção final do mapa de permissões. As fontes de perigo apresentam diferentes unidades de medida pelo que se optou por atribuir diferentes pontuações às classes de permissão, tabela II.

Tabela II - Classificação das permissões

Classes de permissão	Pontuação
Interdito	0
Permissão de 3.º grau	1
Permissão de 2.º grau	2
Permissão de 1.º grau	3

Aplicou-se esta pontuação a cada uma das fontes de perigos identificados, obtendo-se um conjunto de matrizes que, por multiplicação, deram origem a uma matriz reclassificada segundo critérios e valores da tabela III, de modo a obter-se a matriz final.

Tabela III - Classificação das permissões

Limites de reclassificação (resultado da multiplicação)	Intervalo de valores das células da matriz resultante da multiplicação	Valor das células da matriz final
A - Pelo menos um multiplicador corresponde à existência de interdição à construção de estruturas (zero).	{resultado de A}	0
B - Todos os multiplicadores correspondem à menor classe de permissão à construção de estruturas (um).	[resultado de B, resultado de C [	1
C - Todos os multiplicadores correspondem a uma classe intermédia de permissão à construção de estruturas (dois).	[resultado de C, resultado de D [	2
D - Todos os multiplicadores correspondem à maior classe de permissão à construção de estruturas (três).	{resultado de D}	3

A matriz final permitiu a construção de um mapa com quatro classes de permissão.

Aplicou-se esta metodologia aos municípios de Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira, vulneráveis a cheias, inundações, incêndios florestais, e deslizamentos de terras apresentando ainda estabelecimentos Seveso em áreas urbanizadas.

Foram identificadas 6 fontes de perigo em Arruda dos Vinhos e 11 em Vila Franca de Xira, tabela IV.

Tabela IV - Fontes de perigo e riscos associados

Fontes de perigosidade	Risco associado
Aeródromos e instalações de apoio à aviação civil	Queda de aeronaves nas áreas com ocupação humana;
Áreas com risco de erosão do solo	Perda excessiva de solo por ação do escoamento superficial e Instabilização de vertentes;
Estabelecimentos com produtos explosivos	Perdas expectáveis em pessoas e bens situados em áreas próximas destes estabelecimentos em caso de acidente;
Estabelecimentos com substâncias perigosas	Efeitos danosos na população e bens por explosão ou fuga de materiais tóxicos;
Estuário e respetiva faixa de proteção e sapais,	Inundação de estruturas existentes, a médio e longo prazo em consequência das alterações climáticas;
Explorações de extração de massas minerais (pedreiras)	Impactos negativos provenientes do ruído, poeiras e efeitos das explosões produzidas;
Gasoduto	Possíveis danos em estruturas e em pessoas resultantes de perfuração do gasoduto e/ou consequente explosão;
Incêndios florestais	Danos cíclicos na população e património;
Margens e cursos de água	Eventuais cheias e respetivos danos resultantes;
Riscos geotécnicos	Possíveis danos em estruturas e em pessoas;
Zonas ameaçadas pelas cheias/inundações	Possíveis danos em pessoas e bens causados por eventuais cheias ou inundações.

Em função das suscetibilidades existentes, aplicaram-se os critérios da tabela I aos dois concelhos, tendo-se obtido os resultados constantes da tabela V.

Tabela V - Fontes de perigo, áreas de suscetibilidade, classes de permissão e pontos de permissão dos concelhos de Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira

Fontes de perigo	Áreas de suscetibilidade	Classes de permissão	Pontos de permissão
Aeródromo Alverca	Zona Geral de Proteção	2.º grau	2
Áreas Risco de Erosão	Áreas Risco de Erosão	Interdito	0
Estabelecimentos Produtos Explosivos	Zona de Proteção	Interdito	0
Seveso - Arruda dos Vinhos	0-122 metros	Interdito	0
	122-154 metros	Interdito	0
	154-410 metros	3.º grau	1
Seveso - Vila Franca de Xira	Possível Morte	Interdito	0
	Efeitos Irreversíveis	Interdito	0
Estuário, Faixa de Proteção e Sapais	Estuário, Faixa de Proteção e Sapais	Interdito	0
Pedreiras	Pedreiras	Interdito	0
Gasodutos	0-10 metros	Interdito	0
Incêndios Florestais	Perigosidade Alta e Muito Alta	Interdito	0
Margens e Cursos de Água	Margens e Cursos de Água em Espaço Urbano	2.º grau	2
	Restantes Margens e Cursos de Água	Interdito	0
Riscos Geotécnicos	Áreas Desaconselháveis à Construção	3.º grau	1
	Áreas Muito Condicionadas à Construção	2.º grau	2
Zonas Ameaçadas Cheias - Arruda dos Vinhos	Zonas Ameaçadas Cheias em Espaço Urbano	2.º grau	2
	Restantes Zonas Ameaçadas Cheias	Interdito	0
Zonas Ameaçadas Cheias - Vila Franca de Xira	Zonas Ameaçadas Cheias em Solo Urbano Edificado	2.º grau	2
	Restantes Zonas Ameaçadas Cheias	Interdito	0

Após a multiplicação das matrizes correspondentes a cada tipologia de fontes de perigo, reclassificaram-se os valores de cada elemento da matriz final. A tabela VI mostra os intervalos utilizados na reclassificação das escalas de permissões.

Tabela VI - Valores utilizados na reclassificação para os dois concelhos

Intervalos de permissão		Classe final de permissão	
Arruda dos Vinhos	Vila Franca de Xira		
0	0	0	Interdito
[1, 64 [	[1, 2.048 [	1	3.º grau
[64, 279 [	[2.048, 177.147 [	2	2.º grau
279	177.147	3	1.º grau (sem restrições)

Após a reclassificação dos resultados obtidos calcularam-se as áreas interditas ou condicionadas à construção e somaram-se, para cada concelho.

Resultados

Verificou-se que o concelho de Vila Franca de Xira apresenta 93% do seu espaço territorial com restrições, sendo esse valor de 47% para Arruda dos Vinhos, figura 1.

Sobrepondo-se áreas com restrições às áreas urbanizadas verificou-se a existência de inúmeros edifícios localizados em áreas com restrições à construção. Arruda dos Vinhos apresenta 1.722 edifícios localizados em áreas com restrições (17% dos edifícios existentes) e Vila Franca de Xira apresenta 34.407 edifícios (75% dos edifícios existentes no concelho).

Figura 1 - Distribuição da área do concelho por classes de permissão

Conclusões

Esta metodologia permitiu identificar um elevado número de estruturas em áreas com restrições à construção, o que na eventualidade de ocorrência de perigos naturais ou tecnológicos poderá contribuir para danos sociais e estruturais avultados. Salienta-se que a existência de restrições no plano formal, sob a forma de leis, não tem impedido a edificação nessas áreas, pelo que se deve questionar a eficácia e utilidade que a legislação preventiva tem tido nas últimas décadas em Portugal. A metodologia desenvolvida e os resultados obtidos podem ser utilizados pela administração central e local no planeamento da ocupação do território a várias escalas, bem como pelas companhias de seguros na identificação de áreas de maior exposição e de maiores perdas potenciais. É importante realçar que existem áreas significativas nos dois concelhos que podem ser ocupadas na construção de edifícios sem pôr em perigo a população, permitindo assim uma poupança nas fases de preparação, resposta e recuperação face a uma catástrofe.

Bibliografia

- Çabuk, A. (2001) - A Proposal for a Method to Establish Natural-Hazard-Based Land-Use Planning: the Adapazari Case Study. *Turkish Journal of Earth Sciences*, 10, 143-152.
- Çabuk, S. N., Döğeroğlu, T., Çabuk, A. (2006). Using GIS Capabilities for Strategic Environmental Assessment Studies: Eskişehir Mass Housing Project. Comunicação apresentada no 4th GIS Days in Türkiye. Istanbul, Turquia.
- Riad, P. H., Billib M. H., Hassan, A. A. & Omar, M. A. (2011). Overlay Weighted Model and Fuzzy Logic to Determine the Best Locations for Artificial Recharge of Groundwater in a Semi-Arid Area in Egypt. *Nile Basin Water Science & Engineering Journal*, 4, 24-35.

ANÁLISE DE RISCOS AMBIENTAIS E A INSTALAÇÃO DE UMA ZONA EMPRESARIAL NO INTERIOR DE PORTUGAL

Margarida Correia Marques

Unidade de Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real
mcm@utad.pt

Cristina Sá

Unidade de Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real
cristinaflipasa@gmail.com

Cristiana Rodrigues

Unidade de Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real
cristiana1990@gmail.com

Ana Margarida Mascarenhas

Unidade de Ambiente, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real
ana.mascarenhas1990@gmail.com

RESUMO

No âmbito do Plano Regional de Desenvolvimento Integrado (PRDI) está prevista a instalação de uma zona empresarial onde será construída uma metalomecânica e/ou uma agroindústria, no território que abrange os concelhos de Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de Paiva. Neste contexto, desenvolveu-se o presente estudo com o objetivo de selecionar locais alternativos para a sua implantação, que apresentem menos potenciais impactos negativos significativos no ambiente. A Análise de Riscos Ambientais de estabelecimentos industriais em fase de pré-projecto foi relevante para a tomada de decisão. Este processo de análise incluiu quatro etapas distintas e sequenciais: Caracterização Ambiental do Território, Caracterização do Projeto, Análise Preliminar dos Riscos Ambientais e Seleção das Áreas de Aptidão Potencial.

Palavras-chave: Análise de Riscos Ambientais, Zona Empresarial, Metalomecânica, Agroindústria, PRDI

Introdução

Os riscos ambientais de um estabelecimento industrial resultam da relação entre a probabilidade de ocorrência de um determinado cenário de acidente e as consequências negativas do mesmo sobre o meio natural, humano e socioeconómico em que este se vai inserir (UNE 150008:2008). No âmbito do Plano Regional de Desenvolvimento Integrado (PRDI) que está a ser desenvolvido pela Unidade de Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto, desde outubro de 2013, na sequência de um pedido da empresa EGSP - Energia e Sistemas de Potência, Lda., está prevista a instalação de uma zona empresarial onde será construída uma metalomecânica e/ou uma agroindústria. Com este estudo pretende-se criar conhecimento sobre o território em causa a nível ambiental, social e económico, bem como, analisar os riscos nas fases de construção, exploração e desativação das indústrias referidas, com vista à seleção dos locais alternativos para a sua implantação.

De realçar que o termo indústria se refere a todas as atividades operacionais diretamente relacionadas com o funcionamento da instalação, excluindo, desta forma, as atividades indiretas como o transporte de material de e para fora da unidade.

Caracterização Ambiental do Território

O território em estudo localiza-se nas regiões Norte e Centro de Portugal Continental e consequentes sub-regiões Douro e Dão-Lafões (NUT III), sendo constituído pelos concelhos de Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de Paiva (Figura 1). Perfazendo uma área de 151195ha, tinha 62363 habitantes residentes, em 2011 (INE, 2011) e uma densidade populacional de 305 habitantes km², em 2012.

Segundo o Estudo Diagnóstico realizado por Correia Marques *et al.* (2014), embora no território em análise se verifique a existência de solos maioritariamente com aptidão florestal, os matos representam 41% da sua ocupação. Este facto deve-se essencialmente à falta de gestão dos espaços florestais, que tem como principal consequência a ocorrência de incêndios que todos os anos afetam extensas áreas. Observa-se ainda que as restrições mais relevantes ao uso do solo são o regime de temperaturas, o risco de erosão e os obstáculos físicos. A rede viária apresenta um traçado fortemente influenciado pela topografia irregular do espaço geográfico, por vezes, propiciando certa morosidade nas ligações entre os aglomerados e, igualmente, dificultando a edificação de novos traçados e/ou a manutenção dos já existentes.

Figura 1: Localização dos concelhos em estudo em Portugal Continental (Correia Marques *et al.*, 2014).

Estes autores constaram, também, que o território em estudo é bastante rico em recursos geológicos e, no que concerne à sismicidade histórica, esta foi mais elevada (intensidade máxima de 6) no concelho de Tarouca e em parte dos concelhos de Castro Daire e Moimenta da Beira. A rede hidrológica é extensa e existe um elevado número de nascentes naturais, nomeadamente na Serra de Leomil (Serra da Nave), na Serra de Montemuro e Serra da Lapa. As captações públicas e privadas para serviço público são feitas com furos, depósitos ou albufeiras.

Parte do território em análise sobrepõe-se ao Sítio de Importância Comunitária (SIC) Serra de Montemuro (PTCON0025), classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto; e ao SIC Rio Paiva (PTCON0059), classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000, de 5 de julho. No entanto, fora destas áreas protegidas, detetou-se também a ocorrência de zonas com presença de valores de conservação no que respeita à flora e vegetação. As classes de elevado e de muito elevado valor, que se constituem como as áreas mais sensíveis, ocupam cerca de 10% da área de estudo.

O envelhecimento, o progressivo abandono das terras e das aldeias têm conduzido a problemas graves de ordem social, económica e ambiental, que no seu todo se pode considerar como um problema de sustentabilidade. Este processo que continua ativo, conduziu e continua a conduzir a uma simplificação da Paisagem e, consequentemente, a uma perda de qualidade visual e de identidade que a caracterizava.

Caracterização do Projeto

A caracterização do projeto (indústria do setor da metalomecânica ou agroindústria) engloba a sua descrição, a identificação e quantificação das substâncias perigosas que irão ser manuseadas e/ou armazenadas, bem como, a identificação das fontes de risco. Na descrição do projeto privilegiou-se a apresentação das características que podem ser relevantes em termos de riscos ambientais durante o funcionamento da atividade. O estudo detalhado do processo industrial, nomeadamente os modos de transporte e manuseamento de matérias-primas, as unidades de armazenamento de substâncias perigosas, a existência de catalisadores, de unidades de vapor a alta pressão e de bombas e compressores, os pontos de eletricidade de alta voltagem e o processo de gestão de resíduos industriais, possibilitam determinar fontes internas de risco na instalação industrial.

A partir da análise das potencialidades agrícolas e económicas do território em estudo optou-se pela implantação de uma agroindústria com um período de funcionamento anual, com variados tipos de transformação (a nível da alimentação, cosmética e medicina) de diversos hortofrutícolas. Adicionalmente neste estabelecimento industrial serão desenvolvidas atividades de investigação, de prestação de serviços e de formação (CAE 10, CAE 20, CAE 21 e CAE 72).

Relativamente à indústria metalomecânica, a opção foi a implantação de um estabelecimento industrial para fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos, bem como, de máquinas e equipamentos n.e (CAE 25 e CAE 28).

Análise Preliminar dos Riscos Ambientais

A análise de riscos de estabelecimentos industriais recai na identificação das fontes de risco e respetivas causas, das consequências resultantes da probabilidade de ocorrência de um cenário de acidente industrial e a vulnerabilidade inerente a esta ocorrência (população, atividades socioeconómicas instaladas, qualidade visual e do ambiente). Esta informação vai ser determinante aquando da atribuição da valoração que se efetua na próxima e última etapa deste processo.

Os cenários de acidente são definidos a partir de técnicas como o HAZOP - *Método Hazard and Operability*, as Árvores de Falhas, o FMEA - *Failure Mode and Effect Analysis* (Capela e Correia Marques, 2013). O cálculo da probabilidade, sempre que possível, assenta na análise estatística do registo histórico de acidentes que ocorreram em instalações industriais similares. A gravidade das consequências é calculada de acordo com a norma UNE 150008:2008. De forma a facilitar a

seleção dos riscos toleráveis desenvolve-se uma análise quantitativa de riscos mediante a aplicação da matriz de riscos (ISO/IEC 31010:2009).

Seleção das Áreas de Aptidão Potencial

Após a realização sequencial das três etapas acima descritas e a partir das cartas/mapas síntese elaboradas, referentes aos fatores ambientais estudados - Clima e Qualidade do Ar, Solos e Geologia, Recursos Hídricos e Resíduos, Flora e Vegetação, Paisagem, Floresta, Agricultura, Ocupação do Solo e Condicionantes -, procede-se à identificação dos parâmetros, dos critérios e da valoração considerada na ponderação de cada uma destas cartas/mapas. A cada carta/mapa temático, transformado numa malha ortogonal com 25m de lado, é seguidamente atribuído, a cada quadrícula, os valores da valoração estabelecida. Por fim, através da intersecção das cartas/mapas obtém-se o somatório das malhas, quadrícula a quadrícula, que se reclassificou em quatro classes homogéneas: baixa, média, elevada e muito elevada aptidão potencial para a instalação de determinada atividade e estruturas edificadas a ela associada, tendo como resultado final o Mapa Síntese da Aptidão Potencial.

Conclusão

O enquadramento geográfico dos estabelecimentos industriais no território em estudo, em fase de pré-projecto, é relevante para a tomada de decisão relativa à seleção das áreas que apresentem menos potenciais impactes negativos significativos no ambiente, população e património, para implantação destes empreendimentos. Uma vez que a Análise de Riscos Ambientais incide sobre as condições anormais de funcionamento das instalações industriais (que estão na origem de acidentes industriais), é fundamental que na caracterização do projeto sejam identificados todos os compostos potencialmente perigosos para a saúde humana e para o ambiente.

O cruzamento da informação criada a nível da Caracterização Ambiental do Território, Caracterização do Projeto e Análise Preliminar dos Riscos Ambientais permite definir a vulnerabilidade aos riscos tecnológicos e o grau de desenvolvimento que o estudo terá de atingir, no que diz respeito à análise quantitativa de riscos, em fase de Estudo de Impacte Ambiental.

Bibliografia

- Capela, S.; Correia Marques, M. (2013) - Guia Metodológico para a Elaboração e Avaliação do Fator Ambiental Análise de Riscos em Estudos de Impacte Ambiental. Caso de Estudo - Indústrias do Sector da Transformação e do Subsector da Produção de Eletricidade de origem térmica. In: Borrego, C.; Miranda, A. I.; Arroja, L.; Fidélis, T.; Castro, E. A.; Gomes, A. P. (Eds) - Repensar o Ambiente: Luxo ou inevitabilidade? 10ª Conferência Nacional do Ambiente/XII Congresso Nacional do Ambiente, 6 a 8 de novembro de 2013. Aveiro, Universidade de Aveiro, ISBN: 978-989-98673-0-7, p 466-471.
- Correia Marques, M.; Jorge, J.; Lobo, S.; Sá, C.; Mascarenhas, A.M.; Rodrigues, C.; Seixas, V.; Mesquita, S.; Branco, I.; Ferreira, P.; Magalhães, M.; Leite, S.; Costa, P.; Rosa, F.; Hipólito, F.; Fraga, H.; Silva, A.; Martins, A.; Baptista, J.; Gonçalves, J.; Aranha, J.; Barros, N. (2014) - *Plano de Desenvolvimento Regional Integrado - Aguiar da Beira, Castro Daire, Moimenta da Beira, Sátão, Sernancelhe, Tarouca e Vila Nova de Paiva: Estudo Diagnóstico*. Vol. I. Vila Real, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 805 p.
- INE - Instituto Nacional de Estatística (2011): Censos 2011 (XV Recenseamento Geral da População) (V Recenseamento Geral da Habitação). http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos2011_apresentacao Consult. 18 de novembro de 2013.

ISO/IEC 31010:2009 (2009) - *Risk Management - Risk Assessment Techniques*. Switzerland: International Organization for Standardization, 192 p.

UNE 150008:2008 (2008) - *Análisis y Evaluación del Riesgo Ambiental*. Madrid, AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación, 46 p.

CAPÍTULO 5

ANÁLISE E PREVENÇÃO DE RISCOS NAS ORGANIZAÇÕES DE DEFESA/PROTEÇÃO CIVIL

A IMPORTÂNCIA E O CONTRIBUTO DAS UNIDADES LOCAIS DE PROTEÇÃO CIVIL PARA O PROCESSO DE PLANEAMENTO E GESTÃO DA EMERGÊNCIA. O CASO DE ESTUDO DO MUNICÍPIO DE CÂMARA DE LOBOS (ILHA DA MADEIRA).

Ricardo Gomes

Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM
ricardo.gomes@procivmadeira.pt

Uriel Abreu

Câmara Municipal de Câmara de Lobos
protecaocivilmunicipal@cm-camaradelobos.pt

RESUMO

A coexistência entre o meio biofísico e a intervenção antrópica propicia o estabelecimento de uma relação dinâmica bidirecional, cujo equilíbrio depende, à escala local, da definição de um quadro estratégico de referência, da implementação de mecanismos programáticos e da adoção de políticas sectoriais ajustadas ao planeamento urbanístico e ordenamento do território, bem como à gestão da emergência.

No concelho de Câmara de Lobos (ilha da Madeira), a manifestação de processos de perigosidade com potencial destrutivo apresenta, predominantemente, uma distribuição espaço-temporal circunscrita à “bacia de risco” do Curral das Freiras (freguesia), devido à existência de um conjunto de constrangimentos associados ao quadro geográfico, particularmente a diversidade de fatores biofísicos desencadeantes (morfologia, declives, etc.) e distúrbios antrópicos que potenciam o agravamento da magnitude e, consequentemente, da severidade dos fenómenos, promovendo a intensificação do grau de vulnerabilidade e exposição da população.

Considerando estes pressupostos, pretende-se discutir o papel, potencialidades e vantagens das Unidades Locais de Proteção Civil (ULPC), no âmbito das políticas regionais e estratégias locais no domínio da segurança e proteção civil, e procede-se à justificação da pertinência de implementação de uma ULPC na freguesia do Curral das Freiras.

Palavras-chave: Unidades Locais de Proteção Civil; Planeamento e Gestão da Emergência; Fatores de Risco; Câmara de Lobos.

Introdução

O município de Câmara de Lobos (Figura 1) localiza-se no sector centro-ocidental da ilha da Madeira, e possui, de acordo com os limites definidos pela DGT (2009), uma área total de 52km² e um perímetro de 46km distribuídos por cinco freguesias: Câmara de Lobos, Estreito de Câmara de Lobos, Jardim da Serra, Quinta Grande e Curral das Freiras. No contexto da Região Autónoma da Madeira (RAM), detém uma elevada representatividade económica e populacional, registando uma população de 35.659 habitantes (INE, 2011) e uma acentuada densidade populacional (685,7hab/km²).

A análise hipsométrica ao concelho de Câmara de Lobos permite evidenciar uma morfologia extremamente acidentada com uma altitude média de 787m, destacando-se a exígua representação de valores inferiores a 200m (7% da área total) e a importância espacial das classes hipsométricas superiores a 500m (Abreu et al., 2007, p. 79). A declividade morfológica assume-se, neste contexto, como uma das características mais marcantes do território em análise, que, considerando um declive médio de 67%, enquadra-se na classificação de paisagem íngreme (30%-60%) da FAO (2006, p. 12).

Figura 1 - Município de Câmara de Lobos

No território em análise, tendo em consideração estes pressupostos, a manifestação de processos de perigosidade com potencial destrutivo, apresenta, predominantemente, uma distribuição espaço-temporal circunscrita à ‘bacia de risco’ (de acordo com a conceptualização definida e proposta por Rebelo (1999, p. 8)) do Curral das Freiras (freguesia). Esta propensão resulta da existência de um conjunto de constrangimentos associados ao quadro geográfico, particularmente da diversidade de fatores biofísicos desencadeantes (por exemplo: morfologia, em que cerca de 61% da área apresenta uma altitude superior aos 500m; e declives, com uma inclinação média de 100%), e de distúrbios urbanísticos, que potenciam o agravamento da magnitude e severidade dos fenómenos. No seu conjunto, promovem a intensificação do grau de vulnerabilidade e exposição, bem como a diminuição da capacidade de resiliência da população.

A criação de uma ULPC na freguesia do Curral das Freiras, dotando-a de um conjunto de infraestruturas, equipamentos e formação, minimizaria a vulnerabilidade da população e teria um significativo potencial na identificação de riscos e ameaças, sensibilização das populações desta zona, dando um contributo essencial ao planeamento de emergência e à intervenção em caso de desastre, particularmente em caso de isolamento de determinadas áreas.

Fatores de Risco e Contextualização das Problemáticas

A propensão da freguesia do Curral das Freiras à ocorrência de fenómenos com potencial destrutivo é corroborada pela Carta Indicativa do Risco (Figura 1). De acordo com os resultados, cerca de 78,7% da área total da freguesia encontra-se classificada com um grau de risco indicativo elevado, o correspondente a 72% da área classificada para o concelho. A freguesia do Curral das Freiras representa um espaço de transição, em relação ao restante território, com a convergência e expressão espacial de diversas tipologias de processos de perigosidade associados à dinâmica hidrogeomorfológica (fluxos de detritos, hiperconcentrados, etc.), geomorfológica (movimentos de massa, erosão hídrica, etc.) e dendrocaustológica (incêndios florestais), onde os processos registam um menor período de retorno e determinam, consequentemente, uma maior probabilidade (frequência) de ocorrência de um fenómeno com potencial destrutivo de elevada magnitude e/ou severidade.

O estudo, análise ou avaliação dos fatores de risco permite, sobretudo, a identificação, inventariação e/ou delimitação espacial de pontos críticos ou componentes existentes no território que potenciam, direta ou indiretamente, a ocorrência de situações de risco que perpetuem danos e prejuízos na população. Neste contexto, a pressão urbanística sobre o uso, ocupação e transformação do solo, bem como a dinâmica correspondente à estrutura socioeconómica e aos movimentos pendulares, associada à existência de um único eixo de circulação (estrada regional n.º 107) e de acesso rodoviário (túnel) à freguesia, representam fatores de risco de extrema importância, que propiciam o acréscimo significativo do índice de perigosidade potencial, bem como do grau de vulnerabilidade e exposição da comunidade local.

Complementarmente, referencia-se a existência de diversos setores da estrada regional classificados com susceptibilidade à ocorrência de movimentos de massa, bem como de estruturas ou sistemas de passagem ao escoamento superficial subdimensionadas e/ou desajustadas ao contexto hidráulico/hidrológico local. Em ambos os casos, a manifestação de um processo de perigosidade poderá ocasionar o isolamento temporário da comunidade, repercutindo-se nas condições de segurança e proteção da população.

Conceptualização e Implementação da Unidade Local de Proteção Civil

Os objetivos da proteção civil incluem a prevenção e limitação dos efeitos dos riscos e acidentes graves ou de catástrofe deles resultantes, socorrer pessoas e bens e apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas em áreas afetadas por desastres. As suas atividades incluem a inventariação, previsão e avaliação de riscos, análise de vulnerabilidade, informação e sensibilização à população, inventariação de recursos e planeamento de atuação em caso de emergência, bem como planeamento de intervenção em caso de isolamento de áreas afetadas por riscos (Lei 27/2006 de 3 de Julho).

A existência de uma estrutura de proximidade implantada na freguesia, conhecedora profunda da realidade local, devidamente equipada e treinada concorrerá naturalmente para a persecução

destes objetivos e execução de atividades, numa lógica de subsidiariedade, quer aquando de ocorrências de pequena dimensão, quer prestando primeiro socorro em situações de maior severidade. A Lei de Bases da Proteção Civil prevê um primeiro nível de atuação particularmente próximo dos cidadãos ao prever a criação, de Unidades Locais de Proteção Civil (ULPC), ao nível da freguesia.

A proposta de criação da ULPC do Curral das Freiras, justifica-se pela dimensão e especificidades do território e acréscimo de eficiência e conhecimento sobre o mesmo, prevendo-se para a mesma um conjunto de objetivos como a identificação de riscos e ameaças, sensibilização das populações, inventário e a atualização dos registos dos meios e dos recursos existentes na freguesia com interesse para a proteção civil, o planeamento e o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro, o levantamento, organização e a gestão dos centros de alojamento a acionar em situação de emergência, colaborar com o SMPC_CL na elaboração e execução de treinos e simulacros, propor as medidas de segurança para neutralização e mitigação das anomalias encontradas e fomentar o voluntariado para a proteção civil. Nesse sentido definiu-se um conjunto de competências e atribuições a atribuir à ULPC e especificaram-se as atividades a implementar nas fases de emergência e recuperação.

No âmbito da criação da ULPC, em termos de infraestruturas de apoio, propõe-se conversão do edifício da antiga escola de 1º Ciclo de forma a receber quer o destacamento dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, quer as instalações da ULPC. O edifício, implantado numa localização privilegiada e segura, possui cozinha, sanitários, balneários, sala de refeições, estacionamento, arrecadação e salas independentes em quantidade que permitiria não apenas alojar os bombeiros e infraestrutura de comando descentralizado, mas também uma infraestrutura de alojamento temporário em caso de isolamento da freguesia. Adicionalmente, as instalações da “Associação Amigos da Freira” localizadas no sítio da Seara Velha, já preparadas para alojamento temporário de um número significativo de pessoas nesse extremo da freguesia, receberia pequenas intervenções de melhoria ao nível da sala de refeições, sanitários e balneários, para melhoria em termos de conforto e privacidade. Manter-se-ia, como estrutura de apoio para alojamento, a “Casa de Emergência” criada pela Casa do Povo.

Em termos de equipamento, distribuído pelas infraestruturas referidas, seria importante que fosse equipada com equipamentos ligeiros de socorro, de proteção individual, de sapador e de limpeza de vias. A operacionalidade desta estrutura exigiria também a formação contínua dos seus elementos, contando para tal com o Serviço Municipal de Proteção Civil, bombeiros e serviço de emergência médica regional.

Conclusão

A periodicidade cíclica associada à manifestação de fenómenos destrutivos na “bacia de risco” do Curral das Freiras, para além de representar um perigo potencial para a população, contribui para o acréscimo significativo do índice de vulnerabilidade e do nível de exposição da comunidade local. Estes eventos, de igual forma, determinam o condicionamento do traçado à circulação automóvel e apeada, contribuindo, consequentemente, para o isolamento da população e para o decréscimo da operacionalidade (procedimentos) associada ao planeamento e gestão da emergência (logística, abastecimento, realocação, socorro, etc.).

A criação da ULPC na freguesia do Curral das Freiras, dotando-a de um conjunto de infraestruturas, equipamentos e formação, minimizaria a vulnerabilidade da população. A ULPC colaboraria na identificação de riscos e ameaças, na sensibilização da população, inventário dos

recursos existentes com interesse para a proteção civil, no planeamento de emergência e intervenção em caso de desastre, particularmente em caso de isolamento de determinadas áreas, enquadrando-se na política de proteção e segurança assumida e definida nas competências e atribuições autárquicas.

Bibliografia

- Abreu, U.; Rodrigues, D. e Tavares, A. (2007) - Esboço geomorfológico do concelho de Câmara de Lobos (ilha da Madeira). Tipologia de movimentos de vertente. Publicações da Associação Portuguesa de Geomorfologia, vol. V, p. 75-92.
- CMCL (2011) - GEORISCO. Análise, Gestão e Operacionalização do Risco. Departamento de Gestão e Ordenamento do Território da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, 222 p.
- FAO (2006) - Guidelines for Soil Description. Food and Agricultural Organization of United Nations, Rome, ISBN 92-5-105521-1.
- DGT (2009) - Carta Administrativa Oficial de Portugal. Direção-Geral do Território, Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e Energia, Lisboa.
- INE (2011) - Censos 2011. Resultados definitivos-Região Autónoma da Madeira. XIV Recenseamento Geral da População e IV Recenseamento Geral da Habitação, Instituto Nacional de Estatística, Lisboa, ISBN 978-989-25-0180-2.
- Rebelo, F. (1999) - A teoria do risco analisada numa perspetiva geográfica. Cadernos de Geografia, 18, Coimbra, p. 3-13.
- Lei n.º 27/2006 de 3 de julho. Diário da República n.º 126 - I Série. Assembleia da República .

FENÓMENO ICEBERGUE: VÍTIMAS PSICOLÓGICAS DAS CATÁSTROFES NATURAIS (UM ESTUDO COM ADOLESCENTES NA RAM)

Cândida Jardim

Secretaria Regional de Educação e Recursos Humanos - Serviço de Psicologia
candidajardim@gmail.com

Ricardo Gomes

Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM
ricardo.gomes@procivmadeira.pt

Uriel Abreu

Câmara Municipal de Câmara de Lobos
protecaocivilmunicipal@cm-camaradelobos.pt

RESUMO

A ocorrência cíclica na Região Autónoma da Madeira (RAM) de manifestações de perigosidade de génese natural, motivou, no último quinquénio, uma maior sensibilização e consciencialização para a problemática do Risco.

Numa situação de desastre natural, as vítimas, além das consequências físicas, estão também sujeitas a efeitos psicológicos. Esta dicotomia entre sintomas físicos e consequências psicológicas remete, de acordo com o INEM, para o chamado “fenómeno icebergue”, já que as vítimas com sequelas físicas são apenas uma fração, a mais visível, do número total de vítimas a necessitar de cuidados, podendo ser menosprezadas as sequelas psicológicas, menos visíveis.

Considerando estes pressupostos, procedeu-se ao estudo dos efeitos psicológicos em alunos da RAM, provocados pela manifestação dos processos de perigosidade. Neste contexto, foram adotados os referenciais metodológicos associados ao Posttraumatic Stress Disorder - Checklist-Civilian Version de Weathers *et al* (1993).

Palavras-chave: Riscos Naturais; Perturbação Pós-Stress Traumático.

Introdução

A manifestação cíclica de processos de perigosidade com potencial destrutivo na RAM apresenta uma periodicidade acentuada, como resultado da conjugação de um conjunto de fatores (extrínsecos e intrínsecos desencadeantes) associados ao quadro geográfico, originando entre outros fenómenos, cheias rápidas (popularmente designadas de aluviões), inundações urbanas, tsunamis, incêndios florestais, fluxos de detritos.

A crescente importância das questões relacionadas com os riscos naturais e tecnológicos na atualidade, atribuídos pela sociedade civil e científica, contribuiu para a definição de novas estratégias de atuação, à escala local e regional, sobretudo na adoção de mecanismos de precaução e na aplicação de medidas (estruturais e não-estruturais) de prevenção, capazes de minimizar perdas e danos económicos e sociais diminuindo a vulnerabilidade social da população (Abreu, 2008).

Não obstante, apesar da investigação neste domínio ter privilegiado essencialmente as causas dos desastres naturais no sentido de os prever e dessa forma evitar a exposição aos mesmos (Diego, 2012), tem-se verificado nos últimos anos um aumento significativo da investigação ao nível das consequências, nomeadamente as psicossociais, onde se incluem as psicológicas, resultantes da exposição ao trauma.

A American Psychiatric Association (1994) define trauma como “(...) a experiência pessoal de um acontecimento que envolve a morte ou ameaça de morte ou ferimento grave, a ameaça à integridade física; ao testemunhar um acontecimento que envolve a morte, ferimento ou ameaça à integridade de outra pessoa; ou ter conhecimento de uma morte inesperada e violenta, ferimento grave ou ameaça de morte ou doença grave num familiar ou amigo próximo (...). A resposta da pessoa ao acontecimento tem de envolver medo intenso, impotência ou horror (...)”.

Tendo em consideração, a periodicidade cíclica de eventos com potencial destrutivo na RAM, procedeu-se à avaliação e análise das consequências emocionais decorrentes das vivências experienciadas por um evento potencialmente traumático, ao nível da perturbação pós-stress traumático, adiante designada por PPST, de uma população que, pela sua natureza, se encontra mais vulnerável - os jovens.

Perturbação Pós-Stress Traumático

De acordo com o DSM-IV (APA, 1996), o diagnóstico da PPST implica que o indivíduo tenha experienciado, observado ou sido confrontado com um acontecimento que envolva morte, ameaça de morte ou ferimento grave, ou outra ameaça à integridade física do próprio ou de outros, e que cumulativamente a resposta da pessoa tenha envolvido medo intenso, sentimento de desespero ou horror (**Critério A**); o acontecimento traumático seja reexperienciado de modo persistente (**Critério B**); haja um evitamento persistente dos estímulos associados com o trauma e embotamento da reatividade geral (**Critério C**); e a persistência de sintomas de ativação aumentada (**Critério D**). O diagnóstico clínico da PPST implica que a duração da sintomatologia seja superior a 1 mês.

Acontecimento Traumático

Neste estudo, consideramos como acontecimento potencialmente traumático os eventos provocados pela manifestação dos processos de perigosidade natural. Tendo em consideração a imprevisibilidade (na frequência, magnitude ou severidade dos fenómenos) associada à ocorrência destes processos, que envolvem experiências de perda e contribuem para a alteração profunda das rotinas quotidianas e para a disrupção da estrutura e mutabilidade socioeconómica da comunidade, estes podem levar ao desenvolvimento de diversas reações psicológicas, especialmente PPST. De acordo com o INEM (2012), “as catástrofes originam por cada vítima com danos físicos, quatro a dez vítimas com danos psicológicos”.

Numa situação de desastre natural, as vítimas, além das consequências físicas, estão também sujeitas a efeitos psicológicos. Esta dicotomia entre sintomas físicos e consequências psicológicas remete, de acordo com o INEM, para o chamado “fenómeno icebergue”, já que as vítimas com sequelas físicas são apenas uma fração, a mais visível, do número total de vítimas a necessitar de cuidados, podendo ser menosprezadas as sequelas psicológicas, menos visíveis.

Método

Procedimento

São vários os instrumentos que avaliam a PPST, no entanto, devido às suas características psicométricas - sensibilidade, validade factorial, fiabilidade e cotação (Marcelino & Gonçalves,

2012) - optou-se por utilizar a versão portuguesa da *Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) Checklist - civilian version* (PCL - C), traduzida e validada por Marcelino e Gonçalves (2012).

A PTSD Checklist - versão civil (PCL - C), desenvolvida por Weathers et al (1993), é uma medida de autopreenchimento, que consiste na aplicação de uma escala composta por 17 questões correspondentes aos 17 sintomas da PPST descritos nos critérios B (reexperienciar), C (evitamento), D (hiper-ativação) do DSM-IV-TR. (Marcelino e Gonçalves, 2012).

As respostas são dadas numa escala *Likert* de 5 pontos, em que 1 é “Nada” e 5 é “Extremamente”. Scores iguais ou superiores a 3 indicam a presença de sintoma de PPST. Complementarmente, na avaliação do critério A (DSM-IV), foi utilizada uma questão adaptada do *Traumatic Events Questionnaire* (Vrana e Lauterbach, 1994) avaliada numa escala de *Likert* de 10 pontos (em que 1 é “Nada” e 10 é “Extremamente”), nomeadamente: “Em que medida é que esse acontecimento foi traumático para si?”. Com o objetivo de avaliar a especificidade da perturbação - aguda ou crónica, e para identificar o início tardio dos sintomas, aplicou-se as seguintes questões: “Durante quanto tempo, após a ocorrência do acontecimento traumático, teve os sintomas acima descritos?” e “Quanto tempo depois do acontecimento traumático é que estes sintomas surgiram?”.

Amostra

O presente estudo incidiu sobre o universo dos alunos matriculados no ensino secundário da RAM e à amostra selecionada foi aplicado um questionário com duas componentes: a primeira referindo-se à caracterização da amostra e percepção de riscos; a segunda, destinada a ser preenchida apenas pelos inquiridos que experienciaram um evento que percecionaram como traumático, consistia numa escala de perturbação pós-stress traumático.

A amostra foi então constituída por 683 estudantes do ensino secundário das escolas da RAM. A maioria dos sujeitos era do sexo feminino (57%), sendo que o inquirido mais novo tinha 15 anos e o mais velho 21. Relativamente à distribuição espacial, por município, obteve-se uma representatividade regional, estando a maioria das respostas concentrada nos concelhos da Ribeira Brava (22%), Ponta do Sol (20%), Calheta (16%) e Machico (13%). No que concerne ao nível de escolaridade, 44% eram alunos do 10ºano, 24% do 11ºano e 32% do 12º ano.

Dos 683 alunos da amostra, apenas 253 indicaram ter presenciado um fenómeno natural que percecionaram como traumático e preencheram a check-list. Destes, 55% eram do sexo feminino e 45% do sexo masculino, com uma idade compreendida entre 15 e 21 anos, tendo a maioria dos inquiridos (26%) 17 anos.

À data da recolha dos dados, 54% dos alunos que preencheu a escala frequentava o 10º ano, 19% o 11ºano e 27% o 12ºano. A maioria dos inquiridos residia nos concelhos da Ribeira Brava (23%), Calheta (19%), Santa Cruz (14%) e Machico (11%).

Resultados e Discussão

O objetivo deste estudo consistiu na avaliação e análise das consequências emocionais, perpetuadas pela vivência de acontecimentos traumatizantes e/ou situações críticas, numa amostra de jovens do ensino secundário das escolas da RAM. De acordo com a escala utilizada, os resultados, apresentados na tabela I, permitiram verificar que 31 (12,3%) alunos desta amostra tem sintomas suficientes para receber o diagnóstico de perturbação pós-stress traumático.

Tabela I - Formas de cotação da escala PCL-C para a escala total		
	Variação	Amostra (n=253) M (DP)
Severidade de Sintomas	17-85	28,36 (13,77)
Critério A (avaliação do acontecimento traumático)	1-10	5,74 (2,78)
Critério B (reexperienciar)	1-5	2,03 (0,98)
Critério C (evitamento)	1-5	1,52 (0,82)
Critério D (hiper-ativação)	1-5	1,55 (0,89)
		Freq. (%)
Com sintomas para diagnóstico de PPST		31 (12,3%)

Depreende-se, de igual forma, que 25% dos 31 inquiridos desta amostra que apresentam sintomatologia de PPST, também apresentam sintomas compatíveis com perturbação aguda, outros 67% com perturbação crónica e 8,7% deste conjunto de alunos teve um início tardio dos sintomas. Cerca de 8% dos inquiridos não forneceram dados suficientes para tirar conclusões a respeito do tipo de perturbação (aguda ou crónica). No geral, todos os alunos desta amostra que preencheram a escala (253) percecionaram a vivência do acontecimento como traumático (M=5,74).

Conclusão

Numa situação de exceção, como é o caso dos desastres naturais, é fácil a atenção das equipas de socorro focar-se apenas nas condições físicas, ignorando os efeitos psicológicos nas vítimas. Estas, representam o chamado *fenómeno icebergue*, isto é, as vítimas físicas, apesar de mais visíveis, são apenas uma pequena fração do número total de vítimas a necessitar de cuidados (INEM, 2012).

Os resultados do presente estudo são esclarecedores, no que concerne ao impacto e às consequências emocionais (sobretudo ao nível da PPST). Assim, e porque uma cultura de prevenção é mais eficaz e menos dispendiosa que uma cultura de intervenção, é de extrema importância a adoção de políticas, mecanismos ou estratégias (de *coping*) que contribuam para a minimização e/ou atenuação traumática e que permitam o acréscimo da capacidade de resiliência.

Bibliografia

- Abreu, U. (2008) - *Riscos Naturais no Ordenamento do Território: Aplicação ao Município de Câmara de Lobos - Construção de um sistema de gestão ambiental em ambiente de SIG's*. Tese de Mestrado em Geociências, Universidade de Coimbra, Coimbra, p. 208.
- APA (1996). *Diagnostic and Statistical Manual of Disorders*. Washington: American Psychiatric Association. p. 434-440.
- Diego, C. (2012). Desastres Naturais - Algumas considerações: Vulnerabilidade, Risco e Resiliência. *Territorium*, Revista da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 19. Lousã, p. 5-14.
- INEM (2012). *Situações de Exceção - Manual TAS*. p.37.
- Marcelino, D. e Gonçalves, S. (2012) - Perturbação pós-stress traumático: características psicométricas da versão portuguesa da Posttraumatic Stress Disorder Checklist - Civilian Version (PCL-C). *Revista Portuguesa de Saúde Pública*. 30(1), Elsevier, p.71-75.
- Vrana, S. e Lauterbach, D. (1994) - Prevalence of traumatic events and post-traumatic psychological symptoms in a nonclinical sample of college students. *Journal of Traumatic Stress*, 7. Online edition, p. 289-302.

Weathers, F.; Litz, B.; Herman, D.; Huska, J. e Keane, T. - *The PTSD Checklist (PCL): reliability, validity and diagnostic utility*. In: 9th Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies, October 24-27, 1993, San Antonio, Texas Paper. San Antonio, TX: International Society for Traumatic Stress Studies; 1993.

PERCEÇÃO DE RISCO E CONFIANÇA INSTITUCIONAL ENTRE CRIANÇAS E JOVENS DO ENSINO BÁSICO NA RAM

Ricardo Gomes

Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM
ricardo.gomes@procivmadeira.pt

Rafael Brites

Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM
rafael.brites@procivmadeira.pt

RESUMO

A perceção que os indivíduos têm dos riscos a que estão expostos, bem como a sua confiança nas instituições, influencia os seus comportamentos e, consequentemente, repercute-se na sua vulnerabilidade. Na Região Autónoma da Madeira (RAM), registaram-se nos últimos anos eventos naturais extremos com consequências gravosas, às quais as crianças e jovens são um grupo particularmente vulnerável.

Assim, torna-se relevante conhecer a perceção que as crianças da RAM têm sobre os riscos naturais a que estão expostas, sobre a sua segurança e confiança nas instituições que a promovem, bem como comportamentos de autoproteção adotados.

Nesse sentido, foi implementado um questionário sobre perceção de risco, confiança institucional e comportamentos de autoproteção, cujo público-alvo foram os alunos do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico da RAM. Com os resultados deste questionário traça-se um perfil de aluno e relacionam-se as respostas sobre perceção, confiança institucional e autoproteção com diferentes variáveis.

Palavras-chave: Perceção de risco; Confiança Institucional; Cultura de Segurança.

Introdução

A perceção que os indivíduos têm dos riscos a que estão expostos, bem como a sua confiança nas instituições e medidas de autoproteção, influencia os seus comportamentos e, consequentemente, repercute-se na sua vulnerabilidade. No mesmo sentido, a educação para estas questões e a realização de treinos e simulacros concorrem para aumentar a resiliência (Diego, 2012).

De facto, a análise das questões do Risco Natural não se devem circunscrever apenas aos processos e seus fatores desencadeantes ou tão pouco à previsão dos mesmos. Os riscos manifestam-se relativamente à população, cujas características importa, portanto, conhecer (Brito Henriques e Queirós, 2009).

A análise da perceção dos riscos e da confiança nas instituições deve ter em consideração diferentes escalas de análise, mais local ou mais distal, bem como um conjunto de variáveis que as condicionam e onde se incluem questões relacionadas com informação e educação (Tavares *et al*, 2011).

Na Região Autónoma da Madeira (RAM), ocorrem ciclicamente manifestações de perigosidade às quais as crianças e jovens são um grupo particularmente vulnerável. Por outro lado, são um público preferencial da educação e sensibilização sobre riscos naturais e comportamentos de autoproteção. Nos últimos anos a colaboração de diferentes entidades, nomeadamente a Secretaria Regional de Educação e Recursos Humanos (SRE) e o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) resultou num conjunto de medidas direcionadas às crianças e jovens, destacando-se os projetos 'Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos' que integrou no currículo escolar regional uma disciplina sobre segurança, riscos e autoproteção e o projeto 'Segurança em Casa, na Rua e na Escola' que visa a sensibilização para a segurança, gestão do risco e

comportamentos de autoproteção, atuando nas escolas junto de alunos, professores, auxiliares e encarregados de educação.

Com este trabalho pretendeu-se avaliar a perceção que os alunos do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico da RAM têm sobre os riscos naturais a que estão expostos, sobre a sua segurança e confiança nas instituições que a promovem, bem como comportamentos de autoproteção adotados. Com a análise da informação recolhida pretende-se facilitar a reflexão sobre as medidas de educação e sensibilização mais adequadas para aumentar a resiliência das crianças e jovens e estabelecer um ponto de referência que permita, posteriormente, avaliar o impacto das medidas implementadas, nomeadamente pelo SRPC e pela SRE.

Método

Para este estudo foi concebido e implementado um questionário, aplicado a alunos do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico da RAM. Este universo é composto por cerca de 15 mil alunos tendo a amostra sido constituída por 10 mil inquiridos, estratificados por concelho de residência e por ciclo de ensino. Os questionários foram previamente testados com a colaboração de três escolas distintas, de forma a apurar a clareza das questões colocadas e ajustar tempo necessário ao preenchimento. Os questionários foram aplicados em contexto de sala de aula na presença de um docente, utilizando um formulário *on-line*, durante o segundo e terceiro período escolar de 2014. Os resultados foram tratados estatisticamente utilizando o software IBM SPSS 19.

Resultados

A amostra é composta por 51% de rapazes e 49% de raparigas, 39% do 2º Ciclo e 61% do 3º Ciclo. Quanto à distribuição da amostra por concelho de residência, os concelhos mais representados são Funchal (29%), Santa Cruz (19%), Camara de Lobos (14%), Machico (12%), Ribeira Brava (10%) e os restantes distribuídos pelos restantes 6 concelhos, uma distribuição muito semelhante à distribuição de alunos do 2º e 3º Ciclo por concelhos na RAM. A maioria dos inquiridos vive com o seu Encarregado de Educação (98%). Mais de 75% já participou num simulacro de evacuação de escola e 74% dos alunos acompanha regularmente os serviços noticiosos na comunicação social.

Questionados sobre o local em que se sentem mais seguros, 82% respondeu ser em sua casa. A maioria dos inquiridos (43%) indica serem os pais/família os principais responsáveis pela sua segurança. Apenas, 16% considera serem eles próprios e 14% a escola. Os bombeiros foram referidos por 10% dos alunos e 5% referiu o SRPC.

Nas questões acerca de percepção de riscos é pertinente considerar um âmbito mais distal, neste caso o nível regional, e um âmbito mais proximal, neste caso um nível mais próximo do local de residência (Tavares *et al*, 2011). Questionados sobre o receio sentido relativamente a desastres naturais, no que se refere ao nível mais local, o concelho de residência, numa escala de 1 a 4, a média de respostas é de 2,97. Já no que se refere ao nível regional a média é de 2,85. Mais significativo, relativamente ao âmbito local a resposta mais representada (38%) foi '4', o nível máximo da escala enquanto relativamente ao âmbito regional a resposta mais representada (39%) foi '3'.

A apreensão é portanto maior quanto aos desastres naturais que ocorrem no local onde vivem. Relativamente aos diferentes tipos de eventos, os que incutem maior receio são os tsunamis (3,2), sismos (3,1) seguidos por cheias/aluviões (3,1) e incêndios florestais (3,1). Também as erupções vulcânicas (2,9) e movimentos de vertente (2,9) obtiveram médias elevadas. Note-se,

neste conjunto de eventos que incutem maior receio, o contraste entre aqueles que, sendo potencialmente mais destruidores são menos frequentes (e recebem maior atenção no currículo escolar do Ensino Básico), e aqueles que, tendo geralmente impacto mais localizado, têm no entanto maior recorrência na RAM, incluindo em anos recentes.

Já no que se refere à probabilidade de um desastre natural efetivamente ocorrer (nos 10 anos seguintes), a probabilidade de um destes fenómenos ocorrer é em média considerada superior quando se referem ao âmbito regional (2,6) e inferior quando se referem ao local onde vivem (2,3). O nível máximo da escala de probabilidade representa 20% das respostas quanto ao nível regional e apenas 13% referindo-se ao nível local. Ainda que os alunos tenham mais um evento extremo no local onde vivem, consideram que a probabilidade de efetivamente ocorrer perto de casa é inferior.

Quer relativamente à região, quer relativamente ao local onde vivem, eventos como tsunamis, erupções e sismos são considerados pouco prováveis, enquanto eventos relacionados com precipitação intensa, incêndios florestais, agitação do mar, movimentos de vertente, cheias e fluxos aparecem como os que apresentam valores de probabilidade mais elevada.

Quanto à perceção dos eventos que habitualmente causam mais destruição, os mais referidos são os incêndios florestais, precipitação intensa, movimentos de vertente e, em menor grau, agitação do mar e cheias ou fluxos. Coincidentemente, nos últimos anos têm sido estes eventos a ter maior impacto e cobertura mediática na RAM.

Quando às fontes de informação sobre riscos naturais, as consideradas mais confiáveis são pais/família (3,6), bombeiros (3,4), polícia e profissionais de saúde (3,3). O SRPC e professores ocupam posição inferior (3,1). Os órgãos de governo regional e local, a Internet e as redes sociais ocupam os últimos lugares.

Já quanto a quem confiam para os ajudar em caso de desastre, são novamente pais/família (3,7), bombeiros (3,5), polícia (3,4) os mais bem cotados. O Serviço de Emergência Médica Regional (3,3) e o SRPC (3,1), os amigos (3,1), docentes e profissionais de saúde (3) ocupam posições inferiores. Os órgãos de governo local e regional são os que suscitam menor confiança.

Os alunos revelam sentir-se mais informados sobre os riscos a que estão expostos no seu âmbito local e menos informados quando se trata de riscos de âmbito regional. As respostas correspondentes ao nível mais elevado da escala correspondem a 14% no nível local e apenas 10% a nível regional. A maioria dos inquiridos sente-se informada sobre o que fazer em caso de desastre (65%) ou muito informada (15%). Valores semelhantes são referidos relativamente à informação sobre a quem pedir ajuda em caso de emergência. Refira-se que 87% indica conhecer o número de emergência.

Mais de metade dos alunos (53%) referiu já ter sido afetado por fenómenos de precipitação intensa, sendo este o tipo de evento mais referido. As situações de temperatura elevada, cheias ou fluxos e incêndios florestais são referidos por 27%, 26% e 24% dos alunos, respetivamente. Além disso, 21% indica ter sido afetado, pessoalmente ou através de alguém da família próxima, por estragos ou destruição da habitação. Os danos ou destruição de automóvel são referidos por 19% e 16% referem situações com feridos e 15% com óbitos na família próxima.

Relativamente às medidas de autoproteção adotadas pelas famílias um número elevado refere a existência de lista de contatos de família e amigos (80%), lista de contatos de serviços de emergência (77%), estojo de primeiros socorros (68%), lanternas (65) e rádio a pilhas (49%). Naturalmente, a motivação para alguns destes cuidados pode não ser autoproteção relativamente

a desastres naturais. Medidas mais específicas como combinar ponto de encontro familiar ou local de abrigo em caso de emergência (40%) ou ter plano familiar de emergência (36%) são bastante menos referidos.

Conclusão

A análise dos dados recolhidos evidenciou que existe nos alunos do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico uma perceção relativamente elevada da probabilidade de ocorrerem desastres naturais, que ainda assim varia com a escala de referência - é maior quando se referem ao âmbito regional e menor quando se referem ao âmbito local, mais perto do local onde vivem. Pelo contrário, em caso de ocorrência de desastre natural é maior o receio perante eventos que ocorram no âmbito mais local. Note-se que existe uma perceção que distingue entre eventos potencialmente muito destruidores mas pouco prováveis e eventos de maior recorrência mas de consequências mais limitadas.

Estas crianças consideram a família os primeiros responsáveis pela sua segurança e confiam sobretudo na família, bombeiros, polícia e profissionais de saúde para os informar sobre riscos naturais e para os proteger em caso de um evento extremo. Os órgãos de governo, internet e redes sociais suscitam bastante menos confiança.

Mais de metade dos inquiridos refere já ter sido afetado por situações de precipitação extrema. Um número significativo afirma ter estado exposto, diretamente ou através da família, a situações de danos ou perda de casa, ferimentos ou mesmo óbitos.

Existe uma significativa correlação entre a perceção de riscos e adopção de comportamentos de autoproteção e um conjunto de variáveis, como por exemplo a escala de análise, mais local ou mais distal, e a experiência prévia de eventos que tenham causado danos.

Bibliografia

- Brito Henriques, E. e Queirós, M. (2009). Verdadeiros medos e falsas confianças: percepção de risco numa região de elevada perigosidade natural. In XI Colóquio Ibérico de Geografia 'La Geografia ante los Nuevos Retos Ambientales' [CD-ROM, 15 pp]. Alcalá: Asociación de Geógrafos Españoles, Universidade de Alcalá e Associação Portuguesa de Geógrafos.
- Diego, C. (2012). Desastres Naturais - Algumas considerações: Vulnerabilidade, Risco e Resiliência. Territorium, Revista da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, 19. Lousã, p. 19.
- Tavares, A.; Mendes, J. e Basto, E. (2011) - Percepção dos riscos naturais e tecnológicos, confiança institucional e preparação para situações de emergência: O caso de Portugal continental. Revista Crítica de Ciências Sociais, 93 (2011). Coimbra, p. 187.

OS IMPACTOS PLUVIAIS E VEICULAÇÃO NO JORNAL O PANTANEIRO NA CIDADE DE AQUIDAUANA/MS/BRASIL

Flávio Cabreira dos Santos

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Câmpus de Aquidauana

ffcabreira@hotmail.com

Vicentina Socorro da Anunciação

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Câmpus de Aquidauana

vique56@hotmail.com

RESUMO

A abordagem homem/natureza na ciência geográfica tem configurado temática em estudos diversos, sendo que, entre esses, os de repercussão por meio de eventos climáticos extremos tem obtido seu destaque. A precipitação no ambiente urbano tem causado momentos avassaladores e prejuízos à população, mormente as residentes em áreas de risco ou sujeitas a inundações, devido à configuração antrópica e a ineficácia de planejamento; tal fato é ocasionado pela impermeabilização do solo e construções irregulares em local de área de risco. A cidade de Aquidauana tem sofrido com tal ato no decorrer de sua história, já que a mesma está localizada na planície pantaneira, e o convívio com o ritmo das águas tornou-se rotineiro a população local. A área citadina evolui-se entre os interflúvios dos córregos João Dias e Guanandy, e tais locais, também ocasiona a população residente nesses, nos períodos sazonais sujeitos a índices elevados de precipitação, flagelo, mesmo que de forma menos expressiva quando comparado às inundações do Rio Aquidauana. Utilizando-se da imprensa local, os impactos causados pelos índices elevados de precipitação, na área urbana, foram identificados, em um recorte temporal, compreendendo os anos de 1965 a 2011. A metodologia aplicada é o Sistema Clima Urbano (Monteiro, 1976), no subsistema hidrodinâmico, que envolve todo o processo da relação entre os impactos meteóricos e a área urbana. Os primeiros resultados apresentaram sensacionalismo jornalístico ao expor os eventos precipitativos na área urbana. Por fim, a análise revelou como a imprensa retrata de forma controversa a magnitude de episódios climáticos extremos, ao perpassar o planejamento eficaz e a aplicação de ações mitigadoras à população visando reverter o processo.

Palavras-chave: cidade; clima; inundação; imprensa.

Introdução

O espaço geográfico tem sido cada vez mais alterado antropicamente quando se trata da dimensão espaço/tempo. As alterações existentes no espaço, ocasionadas pela relação homem-natureza, têm ocorrido desde os tempos mais remotos. “As relações entre o homem e o meio físico que o cerca constituem um dos problemas suscitados pela análise do espaço geográfico” (DOLLFUS, 1979, p.42).

O ambiente socializado constitui um recinto com os mais diversos elementos: culturais, humanos, verticalizações, ruas, avenidas, praças e estabelecimentos comerciais. O ambiente urbanizado acarreta em sua linha temporal, problemas ora ocasionados por sua imposição, ora pela ação da natureza. “A cidade não pode ser pensada apenas como um quadro físico ou como um meio ambiente urbano, mas como ambos os casos, e não se pode ignorar o conteúdo da prática sócio-espacial, a qual lhe dá forma e conteúdo” (CARLOS, 2007, p.19).

A ação do homem sobre o ambiente natural tem sido abordada principalmente nas análises geográficas, em virtude da ocupação antrópica cada vez mais intensa, sobretudo em espaços, uma vez que a materialização dos “azards” no espaço tem apresentado grande repercussão diante de eventos climáticos extremos. Dessa forma, observa-se que a ação desses, com o

elemento climático precipitação, em áreas urbanas, tem chamado atenção, pois traz para a população, mormente as residentes em áreas de risco ou sujeitas a inundações, momentos avassaladores e prejuízos relacionados a tal fato.

Fundada no ano de 1892 - às margens do rio que leva o mesmo nome, e por ter altitude mais elevada, dentro da planície pantaneira, possibilitou assim, que as embarcações pudessem navegar, mesmo em períodos de cheias - a cidade de Aquidauana, que se localiza na Região do Pantanal, mais precisamente na porção Centro-Oeste e Noroeste do Estado de Mato Grosso do Sul (Figura 1), surge com o propósito de escoar as mercadorias transportadas na época, via fluvial, visando abastecer o comércio nas cidades mais próximas (NEVES, 2007). Com o passar dos anos a malha urbana se adensou e avançou em direção à planície pantaneira, mas, a área ribeirinha também foi ocupada, levando a população local a conviver com o ritmo das águas.

Malgrado pertencer a um local predisposto a cheias, construções residenciais, comerciais e públicas foram instaladas, ocasionando flagelo em períodos sazonais sujeitos à ação de eventos extremos climáticos. Partindo destes pressupostos explícitos e implícitos surgiu esta pesquisa com um olhar geográfico mediante os acontecimentos envolvendo os extremos climáticos de precipitação na cidade em questão.

Este estudo tem por objetivo traçar uma reflexão sobre a abordagem dada pela imprensa local do uso e ocupação do solo na cidade de Aquidauana-MS/Brasil que manifestou diante de eventos climáticos extremos. Especificamente foram identificados, por meio da mídia impressa local, os impactos causados pelas cheias na cidade, no período compreendido entre 1965 a 2013 que, possibilitou um mapeamento dos locais mais impactados proporcionando uma análise sobre sua influência na área urbana.

A metodologia aplicada é o Sistema Clima Urbano (Monteiro, 1976), no subsistema hidrodinâmico, que envolve todo o processo da relação entre os impactos meteóricos e a área urbana.

Por fim, os procedimentos metodológicos seguiram os seguintes passos: identificação, por meio do noticiário local, sendo este, o jornal “O Pantaneiro”, dos eventos de precipitação que resultaram em inundações e cheias; análise do tempo para verificar qual foi o sistema atmosférico atuante, por meio das cartas sinóticas disponibilizadas pela Marinha do Brasil; levantamento dos índices pluviométricos por meio de dados adquiridos pelo Sistema de Informações Hidrológicas (HidroWeb) - pertencente a Agência Nacional das Águas (ANA), Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) - órgão pertencente ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE); mapeamento dos locais mais afetados pelos eventos climáticos possibilitando espacializar como a cidade revela as ações materializadas no espaço.

Ações Ocasionadas Pelo Impacto Pluviométrico No Espaço

O presente estudo abordou uma análise dos eventos extremos de precipitação no espaço na cidade de Aquidauana. O jornalismo, diante de impactos meteóricos extremos, geralmente não procura informar a população sobre as anomalias climáticas; em sua maioria informam apenas os prejuízos ocasionados por essas, tal como se destaca a seguir.

Na edição de 03 de dezembro de 1965, a reportagem intitulada “Enchente do Rio Aquidauana Desabriga Centenas de Pessoas”, registrou uma cheia, considerada a maior, no período. Nessa, o editor expôs que o Rio Aquidauana flagelou dezenas de famílias e que os moradores das partes baixas de Aquidauana viram-se no flagelo, em apenas 24h. A massa atuante nesse período foi a Equatorial Continental (mEc), o qual trouxe para a localidade, chuvas torrenciais.

Figura1. Localização da cidade de Aquidauana-MS
Org.: SANTOS, 2014

Nos anos seguintes, o noticiário local retratou o impacto das cheias perante a população, a qual se tornou comum para a cidade. No ano de 1990, a cidade foi surpreendida com um quantitativo de águas recebidas pela calha fluvial do rio Aquidauana não observado ou retratado pela população aquidauanense até então. A cheia que atingiu a cidade no final do mês de abril e início do mês de maio do ano de 1990 foi superior expondo a cidade ao noticiário nacional, a mesma ficou isolada, sem entrada ou saída da população a não ser através dos barcos disponibilizados pelo exército que fazia a travessia necessária da população para a cidade vizinha, Anastácio. Neste período os dados de precipitação não puderam ser representados devido à falha na informação referente à este ano em específico. Diante das análises sinóticas, no período da ocorrência desta, instaurou-se uma ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) que abrangeu os Estados de MT, MS e SP. A “cheia de 90”, como é conhecida localmente, trouxe grandes prejuízos à população, pois além do impacto perante as construções existentes, visto que a área ribeirinha já possuía denso loteamento, houve registros de ocorrências de enfermidades, já que nos locais que a cheia atingiu houve retorno do esgoto sanitário, levando as pessoas ao contato, pós- cheia, podendo ser registrado contatos com bactérias que causam doenças de pele, diarreia, entre outras. A região alagadiça da cidade conhecida como Pirizal, recebeu descarga de lixo, transformando-se num espaço depositário de lixo pelas águas da cheia.

No ano de 2011, a cidade de Aquidauana, voltou a ter destaque na mídia nacional. As águas da calha do rio Aquidauana, chegaram a marcar cota de 10m, expondo a população a reviver os impactos do ano de 1990. Na reportagem local intitulada “Enchente do Rio Aquidauana é Destaque na Mídia”, traz a notícia de que esta cheia foi a mais devastadora dos últimos 21 anos. As chuvas se iniciaram em outubro, novembro e dezembro de 2010, com marcas de 141,8 mm,

185,8 mm e 132,2 mm, respectivamente, e ocasionaram, juntamente com as chuvas do início de 2011, sendo essas, em janeiro (351,4 mm), fevereiro (247,4mm) e março (260,8 mm) um aumento no volume de água, sem contar o fluxo descendente dos rios que deságuam em sua calha. Este episódio, segundo a síntese mensal do mês de março, do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos) esteve relacionado à atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) nos primeiros dias do mês, mas com a presença do Vórtice Ciclônico (VC), localizado entre a Bolívia e o oeste do Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, o mesmo intensificou as chuvas, ocasionando o acúmulo de 183 mm em apenas 24h. Estes fatores, associado ao uso e a ocupação na região ribeirinha causa inúmeros transtornos no espaço.

Contudo, vale dizer que a ocupação de ambientes sujeitos a inundações pelo homem, leva o mesmo a conviver com o ritmo das cheias, principalmente em locais predispostos a essas, tal como a região ribeirinha da cidade de Aquidauana. A urbanização por si só, não constitui nenhum problema. Ela é, antes de tudo, um processo decorrente da evolução humana, sob o ponto de vista da conquista do espaço o que introduz problemas à sociedade que se refletirão nos contextos urbanos e suas particularidades, aí é que se encontra o compromisso social dos gestores públicos no espaço urbano em buscar instrumentos que promovam a gestão e planejamento das cidades no presente.

Conclusão

A expansão territorial urbana e as modificações impostas pelos agentes e atores sociais, em relação ao uso e ocupação do espaço, causam consequências diante da repercussão dos eventos climáticos extremos. Com o processo de ocupação do meio urbano, tornou-se cada vez mais expressiva a degradação ambiental, marcando decisivamente o padrão das sociedades urbanas em se relacionarem com o espaço, posto que os impactos ambientais respondem e crescem na mesma proporção das alterações ocorridas. Cotidianamente as ações nas relações sociedade x natureza x sociedade no espaço tem se traduzido em ser objetiva e prática, evidenciando cada vez mais a retroalimentação do processo de ocupação, desordenada associada à concentração populacional e suporte de planejamento frágil, conflitos institucionais e tecnológicos pelo entendimento de que o poder de preservar, recuperar e degradar o espaço está repartido entre todos os agentes sociais. Neste caso, tornam-se fundamental o consenso social sobre a gênese, causas e efeitos de curto, médios e longos prazos e que isso não possui fronteiras geopolíticas. Seria uma possibilidade de tentar um desaceleramento dos impactos, vislumbrando melhorias na gestão do território. Com relação à imprensa por um lado procura informar e por outro lado enfatiza as condições do tempo e imprevisibilidade do clima como causadores de extremos climáticos, não enfatizando a irracionalidade no uso e ocupação do espaço pelos diversos atores sociais, fator via de regra causador de calamidades quando associado às adversidades climáticas.

Bibliografia

- Carlos, A.F.A. (2007) - *O Espaço Urbano: Novos Escritos Sobre a Cidade*. São Paulo: Labur Edições, 123 p.;
- Dollfus, O. (1972) - *O Espaço Geográfico*. São Paulo, Difusão Europeia do Livro, 121p.;
- Monteiro, C.A.F. (1976) - *Teoria e Clima Urbano*. São Paulo: IGEO/USP;
- Neves, J. (2007) - *Um Porto Para o Pantanal: A Fundação de Aquidauana, Civilização e Dependência*. Campo Grande, MS: Ed. UFGS.

A PRODUÇÃO DESIGUAL DO ESPAÇO COMO GERADORA DE TEMPERATURAS EXTREMAS EM CIDADES MÉDIAS TROPICAIS: O EXEMPLO DE SÃO CARLOS/SP BRASIL

Camila Riboli Rampazzo

Grupo de Pesquisa GAIA; FCT/UNESP Presidente Prudente
camila.rampazzo@hotmail.com

João Lima Sant'Anna Neto

Departamento de Geografia, Grupo de Pesquisa GAIA; FCT/UNESP Presidente Prudente.
jlsn57@uol.com.br

RESUMO

Em relação aos problemas ambientais urbanos, principalmente aqueles associados ao clima, é importante aprofundar o referencial para identificar a gênese dos processos que desencadeiam a distribuição desigual de calor em áreas urbanas tropicais tendo como ponto de partida a dinâmica de produção desigual dos espaços como geradora de temperaturas extremas nas cidades. Desta forma, o presente estudo objetiva analisar a dinâmica de produção do espaço de São Carlos/SP (uma cidade média tropical de altitude) para identificar processos que permitam considerar que o elemento natural clima também é um agente que pode reforçar ou atenuar as desigualdades. Para isso, além de uma análise geográfica, o trabalho identifica a ocorrência e distribuição espacial das diferenças de temperatura em espaços com distintos padrões de ocupação/edificação, vegetação e o espaço rural próximo. Os resultados mostram diferenças de até 5,3°C refletindo a relação entre a produção desigual do espaço na geração de temperaturas extremas.

Palavras-chave: produção do espaço, cidades médias, temperatura extrema, clima urbano, São Carlos/Brasil

Introdução

A forma com que os espaços urbanos têm sido produzidos (resultado de um complexo processo de atuação e intervenção dos agentes sociais sob uma paisagem em constante mutação) acaba por potencializar ou amenizar as dinâmicas de geração de condições mais ou menos adequadas ao conforto ambiental, importante indicador da qualidade de vida no espaço urbano.

As cidades, enquanto projeções construídas artificiais no espaço (MONTEIRO, 1997) passam a refletir essas alterações e condições de desconforto a partir do resultado cumulativo de modificações na cobertura do solo e substituição de objetos naturais por materiais construtivos inadequados, contribuindo para o armazenamento de calor e aumento extremo da temperatura do ar quando da sua liberação, ainda que na ausência da radiação solar (AMORIM, 2011, p.134); (LOPES, 2009, p.41). Desta forma, o objetivo do artigo é desenvolver uma análise do processo de produção desigual do espaço urbano de São Carlos/SP (uma cidade média do ambiente tropical) para identificar os processos e o contexto urbano de geração de temperaturas extremas que permitam considerar que o elemento natural clima também é um agente que pode reforçar ou atenuar as desigualdades sociais (SANT'ANNA NETO, 2012, p.220). Para isso, é identificada a ocorrência e a distribuição espacial das diferenças de temperatura em espaços com distintos padrões de ocupação/edificação, vegetação.

Clima e a produção desigual do espaço urbano: diferenciação socioespacial e a construção social do clima - especificidades de São Carlos/SP Brasil

A importância em estudar as dinâmicas climáticas, em qualquer dimensão do ambiente urbano é que tais estudos têm oferecido importantes subsídios ao planejamento e melhoria da qualidade do ambiente das cidades. Segundo Fernández García, Rasilla Álvarez (2008, p.513) *“La ciudad*

no es un espacio homogéneo y lo que denominamos genéricamente como clima urbano presenta gran cantidad de matices asociados a la morfología de los edificios, el trazado de las calles y la presencia de zonas verdes”.

A cidade de São Carlos, localizada nas coordenadas geográficas 21° 30' e 22° 30' de latitude Sul e 47° 30' e 48° 30' de longitude Oeste, a 856 m de altitude, segundo Lima (2007, p.87) passou por períodos intensos de expansão territorial desde 1857 cujo processo de produção do espaço também configurou situações de segregação socioespacial imposta a diferenciação socioespacial (CARLOS, 2007, p.48), territorializando morfologias urbanas distintas (VILAGRASA, 1991). A partir daí ampliaram-se os eixos de expansão junto à Rodovia Washington Luís já com traços de descontinuidade rumo à periferia e criação de loteamentos fechados e periféricos em relação à malha urbana com novos padrões urbanísticos irregulares carentes de infraestrutura, com tendência a verticalização e periferização, sobretudo em 1997.

Para esta análise, parte-se de dois recortes distintos. Um é o bairro Vila Elizabeth na área Norte criado em 1949, e que foi um dos principais destinos das famílias de alta renda que deixavam o centro da cidade devido ao aumento de estabelecimentos comerciais. Outro recorte é o bairro Cidade Aracy na área Sul criado em 1982, e segundo Plano Local de Habitação de Interesse Social de São Carlos (2010) é a região do município com maior concentração de situações de precariedade, pobreza, vulnerabilidade social e, além destas, situar-se em área de preservação permanente. Desta forma, segundo Sant’Anna Neto (2011) é preciso considerar que a maneira que o elemento natural clima impacta os diferentes segmentos sociais se dá de forma distinta de acordo com o lugar que ocupam na estrutura urbana.

Procedimentos metodológicos

Tendo por objetivo identificar a forma de ocorrência de diferenças de temperatura em cidades de diferentes portes, foi utilizada a metodologia dos transectos móveis a fim de identificar as características térmicas do clima urbano.

Figura 1. Trajetos A-B e C-D em São Carlos.

O transecto móvel consiste no registro da temperatura do ar em movimento contínuo. O levantamento foi feito nos bairros Vila Elizabeth e Cidade Aracy (Figura 1 acima), com sensores digitais em veículos a 1,5m do chão, nos horários das 15hrs e 18hrs no dia 13/12/2013 enquanto um dia típico de verão. Os dados foram articulados aos perfis longitudinais elaborados no software CorelDRAW®.

Resultados e discussão

Em relação aos aspectos geoambientais a Vila Elizabeth mostra homogeneidade nas funções e usos, predominantemente residencial com padrão construtivo médio/alto de edificações em lotes amplos e vegetação de médio e grande porte (Figura 2).

Figura 2: Vista parcial das características dos pontos do trajeto A-B Vila Elisabeth.

Com relação ao bairro Cidade Aracy (Figura 3) observa-se que a vegetação é predominante de pequeno porte ou ausente. O material construtivo é em sua maioria alvenaria com telhado do tipo fibrocimento, laje e cerâmica, uso residencial e comércio local. A dimensão dos lotes é pequena, edificações de sobrados, geminadas ou edículas.

Figura 3: Vista parcial das características dos pontos do trajeto C-D Cidade Aracy.

Com base nos dados de temperatura foram gerados os perfis longitudinais na Figura 4, e em medições diurnas a diferença máxima de temperatura foi 3,8°C. Observa-se que no mesmo horário a temperatura do ar no bairro Vila Elizabeth foi inferior. O ponto 1 na Vila Elizabeth apresentou menor temperatura (28,0°C), e o ponto 2 na Cidade Aracy apresentou 31,8°C.

Figura 4. Perfil longitudinal da temperatura do ar às 15hrs em São Carlos.

Estas diferenças se evidenciam no perfil longitudinal do horário noturno (Figura 5), visto que toda a radiação absorvida e armazenada durante o dia pelos materiais construtivos é refletida para o ar na forma de calor sensível durante a noite.

Figura 5. Perfil longitudinal da temperatura do ar às 18hrs em São Carlos.

O gradiente térmico foi de 5,3°C, sendo a mínima de 24,5°C nos pontos 1 e 3 na Vila Elizabeth e a máxima de 29,8°C (ponto 10) na Cidade Aracy.

Conclusão

Os resultados mostram uma forte relação entre estes extremos de temperatura e a forma de organização dos espaços na cidade média tropical de São Carlos, ditada grande parte pelos interesses extremamente desiguais dos agentes produtores do espaço, a partir da seletividade das áreas. Assim, também o clima passa a refletir nas diferenças térmicas e desconforto ambiental a importância do planejamento urbano e adequação dos espaços de vivência da

população não somente com vistas ao valor agregado do solo urbano. A perspectiva analítica do clima urbano é ampla, e atribuir-lhe um caráter social tal como propõe a Geografia do clima a partir da incorporação da produção desigual do espaço, vai além de sua dimensão da forma, atribuindo ao clima um caráter dialético.

Bibliografia

- Amorim, M.C.C.T. (2011) - *A Raia Divisória São Paulo - Paraná - Mato Grosso do Sul*. São Paulo, Ed.Outras Expressões, p.[133-165];
- Carlos, Ana Fani. A. (2007) - Diferenciação socioespacial. *Revista Cidades*, vol.(4, n.º 6). 2007, p.[45-60];
- Fernández García, F.; Rasilla Álvarez, D., (2008) - *Olas de calor e influencia urbana en Madrid y su área metropolitana*. Heat waves in urban and suburban Madrid. *Estudios Geográficos*, LXIX, 265, julio-diciembre, p.[495-518];
- Lima, Renata P. (2007) - O processo de (des) controle da expansão urbana de São Carlos. Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de São Carlos. São Carlos. [193 p].
- Lopes, António. (2009) - O sobreaquecimento das cidades causas e medidas para a mitigação da ilha de calor de Lisboa. *Revista Territorium*, Revista da Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança, vol.(n.º15). Lousã, p.[39-52];
- Monteiro, Ana. (1997) - *O clima urbano do Porto: contribuição para a definição das estratégias de planeamento e ordenamento do território*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian,[486 p].
- Sant'Anna Neto, J. L. (2011) - Por uma Geografia do Clima: antecedentes histórico, paradigmas contemporâneos e uma nova razão para um novo conhecimento. *Revista Terra Livre*. São Paulo, (n.º 20, 2º semestre), p.[49-62].
- Sant'Anna Neto, J. L., (2011/2012) - O clima como risco, as cidades como sistemas vulneráveis, a saúde como promoção da vida. *Cadernos de Geografia*. Coimbra, FLUC, n.º 30/31, [215-227].
- Sposito, Maria Encarnação Beltrão. (2004) - O chão em pedaços: urbanização, economia e cidades no Estado de São Paulo. Presidente Prudente. [508 p].
- Vilagrassa, Joan. (1991) - *Estudio de la Morfologia urbana: una aproximación*. *Revista Geocritica*, Barcelona, (n.º 92, mar), p.[1-24].

O TERRAMOTO NO HAITI (12 DE JANEIRO DE 2010). ANÁLISE NA PERSPETIVA DA MEDICINA DE CATÁSTROFE: DO IMPACTO À ATUALIDADE

Adriana Araújo

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
adrianaflipaaraujo@gmail.com

Paulo Campos

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
pacampos@netcabo.pt / paulocampos@inem.pt

Ana Mafalda Reis

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
docmaf@sapo.pt

Romero Bandeira

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
hmedcat@icbas.up.pt

RESUMO

A Medicina de Catástrofe é uma especialidade ou competência que preza pela sua atualidade, já que a ação humana avoluma a complexidade das condicionantes associadas aos fenómenos naturais, influenciando tanto a sua ocorrência como o seu poder destrutivo.

O terramoto de 12 de Janeiro de 2010 no Haiti assolou aquele que era já classificado como o país menos desenvolvido do hemisfério ocidental, tendo ocorrido num contexto de excecional vulnerabilidade. Por todas as suas particularidades, esta megacatástrofe suscitou inúmeros desafios novos aos interventores, tornando-se um inestimável exemplo para extrapolar ensinamentos e criar melhores planos de atuação. A abordagem do desastre é realizada na perspetiva da Medicina de Catástrofe através da revisão de bibliografia de referência na área, artigos científicos, relatórios e comunicados de imprensa, incluindo uma discussão da intervenção humanitária de França e Portugal, baseada em entrevistas a intervenientes, nomeadamente ao Coronel e Médico-chefe da Força de Intervenção Aeromóvel Francesa Michel Orcel, e ao Comandante Elisio Oliveira e Dr. José Cunha da Cruz, ambos pertencentes ao Destacamento Português de Ação Humanitária.

Esta dissertação deverá servir como alerta para a importância da Medicina Preventiva e Preditiva e da melhoria da preparação dos profissionais de saúde para este tipo de intervenção, sendo premente fortalecer a capacidade de resposta às catástrofes.

Palavras-chave: medicina de catástrofe, vulnerabilidade, riscos, terramoto, Haiti

Introdução

Conceitos e definições

A noção de Medicina de Catástrofe surge-nos como uma prioridade numa emanção dos tempos que correm. Trata-se de uma nova especialidade ou de uma competência se assim lhe quisermos chamar. Propriamente será uma ação pluridisciplinar em que os conhecimentos do foro médico se interpenetram com outros de índole profundamente diferente, quer sejam de carácter Meteorológico ou Espeleológico (Bandeira, 2014).

De acordo com Bandeira (2014), o conceito de catástrofe muito para além da sua definição baseia-se nos componentes: afluxo intenso de vítimas, destruições de ordem material, desproporcionalidade acentuada entre os meios humanos e materiais de socorro e as vítimas a socorrer, simultaneidade.

Catástrofes Naturais

Quando se fala em catástrofes naturais é necessário ter em conta a forte vertente antropocêntrica do conceito de catástrofe ou, de outra forma, tais eventos não passariam de fenómenos meteorológicos ou geológicos; considera-se, portanto, a sua interação sobre o Homem (Gunn, 1992; Braine, 2006; Bandeira, 2008; Herranz Araujo *et al.*, 2010).

De acordo com o CRED, o número de catástrofes naturais relatadas a nível mundial aumentou exponencialmente desde o ano 1900 até 2000, verificando-se ainda um aumento do impacto económico e humano destes eventos entre 1975 e 2011 (EM-DAT, s/data), sendo os terramotos das hecatombes mais devastadoras dos últimos anos (Braine, 2006).

Uma avaliação nacional dos riscos associada à criação de mapas dos mesmos fornece os dados essenciais para o desenvolvimento informado de capacidades e aprimoramento das atividades tanto de prevenção como de preparação. A avaliação e cartografia dos riscos são os componentes centrais de um processo mais genérico, a gestão dos riscos, que ademais identifica as capacidades e recursos disponíveis para reduzir os níveis de risco identificados ou os possíveis efeitos duma catástrofe (análise das capacidades) e considera o planeamento de medidas apropriadas de mitigação dos riscos (planificação das capacidades), a monitorização e revisão dos perigos, riscos e vulnerabilidades, assim como a consulta e comunicação dos achados e resultados (European Commission, 2010).

O terramoto no Haiti: 12 de Janeiro de 2010

Contextualização: o Haiti antes do terramoto

As catástrofes tocam fundamental e profundamente os países mais desprovidos e a sua amplitude é inversamente proporcional à riqueza e à organização, particularmente no domínio médico, da região atingida (Kouchner, 1983; Braine, 2006; Bandeira, 2008).

O Haiti, já antes do terramoto de 2010, era classificado como o país menos desenvolvido do hemisfério ocidental (United Nations, 2010); a sua vulnerabilidade ambiental e fatores sociais como pobreza, instabilidade política, urbanização rápida, concentração de população (39%) e recursos (66% do PIB) na capital e a natureza frágil do Estado exacerbam as consequências dos fenómenos naturais (United Nations, 2002; Goyet *et al.*, 2011), tendo sido neste contexto tão particular que ocorreu uma megacatástrofe de repercussões inéditas.

A toda esta vulnerabilidade acresce o facto de o país ser regularmente atingido por fenómenos naturais como inundações, deslizamentos de terra, tempestades, furacões, tsunamis e terramotos, refletindo-se numa tendência alarmante de catástrofes sucessivas (Rencoret *et al.*, 2010; United Nations, 2010; Goyet *et al.*, 2011).

Características do terramoto

No dia 12 de Janeiro de 2010, às 16h53 locais (21h53 UTC), um sismo de magnitude 7.0 assolou o Haiti. O seu hipocentro foi a 13 km de profundidade (USGS, 2010) e o epicentro a cerca de 25 km a sudoeste de Porto Príncipe, sobre a falha de Enriquillo- Plantain Garden (DesRoches *et al.*, 2011).

Impacto imediato

A extensão dos danos e perdas provocados por este sismo reflete a vulnerabilidade particularmente alta do Haiti. Embora a USGS tenha registado 22 terramotos de magnitude igual ou superior a

7.0 em 2010, a quase totalidade das fatalidades foram devidas ao terremoto de 12 de Janeiro no Haiti: este foi responsável por mais de 98% das mortes derivadas de terremotos nesse ano (Goyet *et al.*, 2011; USGS, 2011).

A resposta

Os intervenientes

Num contexto de catástrofe natural as autoridades nacionais estão encarregues de coordenar a resposta, o que foi especialmente problemático no Haiti, uma vez que o próprio governo se encontrava numa situação extremamente difícil (Grünewald *et al.*, 2010).

Fases da resposta

As Nações Unidas consideram um ciclo de gestão de catástrofe, no âmbito do qual definem as suas atividades de resposta, e que se divide em três grandes categorias - fase de pré-emergência, fase de emergência e fase pós-emergência (United Nations, 2002).

Intervenção humanitária em duas perspetivas: o papel de França e de Portugal

Comparação e discussão dos resultados

Através dos testemunhos do Coronel e Médico-chefe da Força de Intervenção Aeromóvel Francesa Michel Orcel, do Comandante Elísio Oliveira - chefe da missão portuguesa no Haiti, e do Dr. José Cunha da Cruz - médico e chefe do Núcleo de Segurança e Saúde da Autoridade Nacional de Protecção Civil, extrai-se que, logo pelas dissimilaridades nos seus objetivos, as intervenções humanitárias dos dois países em questão foram francamente distintas.

Quanto aos resultados, conclui-se que a intervenção humanitária francesa teve um considerável impacto sanitário, com grande sucesso nas várias áreas de atuação. Embora os dados quantitativos da intervenção humanitária portuguesa sejam escassos, infere-se que pelo seu rápido acionamento e capacidade técnica foi um importante contributo para o alojamento e apoio de centenas de deslocados.

O Haiti depois do terremoto: situação atual

Dois anos depois do terremoto a ONU ressaltou que, apesar de ser importante priorizar o desenvolvimento a longo termo, a crise humanitária no Haiti não tinha terminado: mais de 500,000 pessoas estavam a habitar em campos provisórios, com a epidemia da cólera ainda a provocar mortes (OCHA, 2012).

Reflexões finais

A megacatástrofe ocorrida no Haiti em Janeiro de 2010 demonstrou à humanidade os efeitos devastadores que os fenómenos naturais podem ter, alertando para as consequências de uma má gestão dos riscos.

Muito além dos seus aspetos negativos, as catástrofes devem ser encaradas como fontes de aprendizagem. O seu estudo permite reforçar o conhecimento na área, contribuindo para uma evolução científica e tecnológica que, em última instância, beneficia as populações.

O caso do Haiti, pela sua singularidade, foi alvo de inúmeras diligências.

Da comparação efetuada entre duas intervenções humanitárias concretas, pode-se eduzir que França teve um papel mais preponderante, prestando significativo apoio sanitário, enquanto Portugal teve um papel essencialmente social, podendo-se considerar ambas as intervenções bem-sucedidas.

É crucial aplicar as lições extrapoladas tanto na melhoria da prevenção como de intervenções futuras.

Finalmente, não deve ser olvidado o efeito devastador duma segunda catástrofe, sendo a situação atual do Haiti, 4 anos após o impacto, ilustrativa das dificuldades de recuperação.

Bibliografia

- Allègre, C. (1993) - *As Fúrias da Terra*. Sousa, F. (trad) Lisboa, Relógio D'Água Editores
- Bandeira, R. (2008) - *Medicina de Catástrofe: Da Exemplificação Histórica à Iatroética*. Porto, Universidade do Porto
- Bandeira, R. (2014) - *Medicina de Catástrofe - Sua Emergência e Especificidade como Medicina de Exceção*. Sumário da Lição de Agregação, ICBAS/UP, Universidade do Porto
- Braine, T. (2006) - Was 2005 the Year of Natural Disasters? *Bulletin of the World Health Organization* 84 (1): 1-80. Disponível em: <http://www.who.int/bulletin/volumes/84/1/news10106/en/>
- DesRoches, R.; Comerio, M.; Eberhard, M.; Mooney, W.; Rix, G.J. (2011) - Overview of the 2010 Haiti Earthquake. *Earthquake Spectra*, 27 (S1): S1-S21
- EM-DAT - Emergency Events Database (s/data) - Natural Disasters Trends. Disponível em: <http://www.emdat.be/natural-disasters-trends>
- European Comission (2010) - Risk Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management. Brussels, European Comission
- Goyet, C.deV.de; Sarmiento, JP.; Grünewald, F. (2011) - Health Response to the Earthquake in Haiti: January 2010. Washington D.C., Pan American Health Organization
- Grünewald, F.; Renaudin, B. (2010) - Real-Time Evaluation of the Response to the Haiti Earthquake of 12 January 2010. Groupe URD
- Gunn, S.A. (1992) - Le Médecin et les Catastrophes. *Revue de l'Amelisap* 13: 20-23
- Herranz Araujo, P.; Gutiérrez Marco, J.C. (2010) - Desastres Naturales: Una Visión Crítica Sobre su Entendimiento y Gestión. *Dendra Médica: Revista de Humanidades* 9 (2): 162-175
- Kouchner, B. (1983) - Epidemiologie. In: Médecins sans frontières (eds) *Soins Urgents en Situations de Catastrophe*. Paris, Hermann
- OCHA - Office for Coordination of Humanitarian Affairs (2012) - Emergency Relief Coordinator's Key Messages on Haiti. Issue Number 22. United Nations
- Rencoret, N.; Stoddard, A.; Haver, K.; Taylor, G.; Harvey, P. (2010) - Haiti Earthquake Response: Context Analysis. Active Learning Network for Accountability and Performance in humanitarian action (ALNAP); United Nations Evaluation Group (UNEG); Development Assistance Committee (DAC)-Network on Development Evaluation
- United Nations (2002) - United Nations Response to Natural Disasters: Mandates, Roles and Mechanisms of UN Entities in the Disaster Management Cycle
- United Nations (18 February 2010) - Revised UN Humanitarian Appeal
- USGS - United States Geologic Survey (2010) - PAGER - M 7.0 - HAITI REGION, Alert Version 1. Disponível em: <http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/pager/events/us/2010rja6/onepager.pdf>
- USGS - United States Geologic Survey (11 January 2011) - Haiti Dominates Earthquake Fatalities in 2010. USGS Newsroom. Disponível em: http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=2679#_U2y25_ldXng

SEGURANÇA AMBIENTAL E TRILOGIA DE RISCOS: ESTUDO DE CASO EM JUIZ DE FORA, MG

Geraldo César Rocha

Departamento de Geociências/Universidade Federal de Juiz de Fora, MG, Brasil
geraldro.rocka@ufjf.edu.br

RESUMO:

No Brasil, quando se fala em segurança, normalmente se entende a chamada segurança pública, ligada somente aos riscos sociais. Nessa pesquisa foram mapeados e hierarquizados os principais riscos da área urbana de Juiz de Fora, Minas Gerais. Foi utilizado o sistema de informação geográfica SAGA (Sistema de Análise Geoambiental/UFRJ). Para se obter o cartograma de risco a movimentos de massa usou-se os cartogramas de geologia, solos de alteração, relevo, intensidade de lineamentos estruturais, cobertura vegetal e padrões de ocupação urbana. Para o cartograma de riscos tecnológicos as informações vieram de depósitos de combustíveis e produtos perigosos, corredores de risco e gasodutos. Já para o risco social (roubo em residências) foram espacializadas, em termos de intensidade, as ocorrências policiais. O risco foi hierarquizado em termos de altíssimo, alto, médio, baixo e baixíssimo risco. Os resultados mostram um quadro ambiental preocupante para a área central de Juiz de Fora; Assim, o centro da cidade e seus bairros mais próximos concentram os níveis mais alarmantes de risco a escorregamentos. Já os riscos tecnológicos também mostram os maiores níveis nas áreas centrais da cidade, onde se concentram postos de combustíveis, avenidas e ferrovias de tráfego intenso. E com relação ao risco de roubos a residências, observou-se que, além da área central, bairros periféricos onde a exclusão social é mais explícita, mostram altos níveis de risco.

Palavras-chave: riscos ambientais; trilogia de riscos; riscos em Juiz de Fora.

Introdução

A questão da segurança no Brasil somente tem enfocando a segurança pública, que envolve problemáticas sociais (Rocha, 2013). Entretanto, deve-se levar em conta que as comunidades também precisam de outras tipologias de segurança (Slovic, 2009, p. 32; Lupton, 2009, p. 17). Aqui torna-se importante enfatizar que segurança é o inverso do risco: quanto maior a segurança, menor o risco, e vice-versa (Rocha, 2005, p. 25; Veyret, 2007, p. 63). Consequentemente, pode-se falar em segurança geoambiental, segurança tecnológica e segurança social (ou segurança pública). Desse modo, a abordagem correta sobre segurança ambiental deve levar em conta uma trilogia, a trilogia dos riscos ambientais (Rocha, 2009, p. 12), a qual poderia também ser chamada de trilogia da segurança ambiental. O objetivo dessa pesquisa foi mapear e hierarquizar os principais riscos da área urbana de Juiz de Fora, em Minas Gerais, reunindo-os em uma trilogia, a trilogia dos riscos ambientais da cidade.

Material e Metodologia

Para esse trabalho foi utilizado o sistema de informação geográfica SAGA (Sistema de Análise Geoambiental/UFRJ, Xavier da Silva, 2001). Para se obter o cartograma de risco a movimentos de massa foram trabalhados os cartogramas de geologia, solos de alteração, relevo, intensidade de lineamentos estruturais, cobertura vegetal e padrões de ocupação urbana, cruzados dois a dois segundo árvore de decisão estabelecida (Rocha, 2005, p. 62). Para o cartograma de riscos tecnológicos foram usadas informações sobre depósitos de combustíveis e produtos perigosos, corredores de risco e gasodutos/oleodutos. Já para o risco social (roubo em residências) foram espacializadas as ocorrências policiais obtidas junto à Polícia Militar de Minas Gerais. Nos três

cartogramas finais o risco foi hierarquizado em termos de altíssimo, alto, médio, baixo e baixíssimo risco. Para alguns foram obtidas as assinaturas ambientais, estabelecendo percentuais de níveis de risco para cada tipologia avaliada.

Resultados e Discussão

É sabido que os maiores riscos correspondem à menor segurança. O primeiro cartograma (figura 1) exhibe os níveis de risco a escorregamentos na área urbana. As localizadas nos níveis de risco alto e altíssimo situam-se nas regiões sul/sudeste e centro oeste da malha urbana. O agravante é que a maior densidade populacional da cidade, o seu centro localiza-se exatamente nesses níveis. É assustador se constatar que esses dois níveis de risco cobrem área de 4194 hectares na cidade, sendo que 1 hectare equivale aproximadamente a 1 campo de futebol. A figura 2 ilustra a assinatura ambiental efetivada, onde observa-se de maneira geral que a maior parte da população (75,02%) está dispersa (< de 50 habitantes por hectare) nesse nível de risco; entretanto, nota-se que em torno de 20 hectares sob alto risco está densamente habitado (acima de 200 habitantes/ha).

Figura 1. Níveis de Risco a Movimentos de Massa em Juiz de Fora, MG (Rocha, 2005)

Figura 2. Densidade populacional em áreas de alto risco a escorregamentos (Rocha, 2005).

A figura 3 ilustra os níveis de risco tecnológico de uma área piloto central da cidade.

Figura 3. Níveis de risco tecnológico em área piloto central de Juiz de Fora (Rocha, 2005)

Observam-se níveis preocupantes de riscos tecnológicos na área central da mancha urbana, potencializados pelos corredores de risco (avenidas e ferrovias com tráfego intenso), postos e

depósitos de materiais inflamáveis, assim como presença de gasodutos e oleodutos que cruzam a cidade sem planejamento estratégico e/ou ambiental. Na figura 4 está a assinatura ambiental dos níveis de risco, indicando que, somando-se os níveis alto e altíssimo chega-se a um total de 114 hectares na área central da cidade, expondo a população a eventos tecnológicos indesejáveis. Já na figura 5 pode-se avaliar parte da problemática social da cidade, onde se têm os níveis de risco a roubo a residências na cidade. Percebe-se que a área central da cidade, com alta densidade demográfica, é a mais vulnerável a esse tipo de delito; além do centro, constata-se que nos bairros periféricos, onde a exclusão social é mais explícita, também se observa um alto índice dessa tipologia criminal.

Figura 4. Assinatura ambiental dos níveis de risco tecnológico (Rocha, 2005)

Figura 5. Níveis de risco de roubo a residências em Juiz de Fora (Rocha, 2005).

Por outro lado, é interessante assinalar que em bairros onde a concentração demográfica é menor e o poder aquisitivo de seus moradores é maior, o número de ocorrências é menor, devido provavelmente ao maior acesso a mecanismos de segurança dessa população privilegiada.

Conclusão

Os resultados mostram um quadro ambiental preocupante para a possibilidade de ocorrência de eventos indesejáveis do ponto de vista geoambiental, tecnológico e social na área central de Juiz de Fora. É urgente a implementação de políticas públicas pelos governantes, visando o aumento da segurança ambiental na cidade, já que é impossível zerar o risco. A conscientização e ações concretas por parte da população também se mostra como decisiva para a melhoria de sua qualidade de vida. A confecção de uma mapa de riscos múltiplos para a cidade se descortina como um próximo passo dessa pesquisa.

Bibliografia

- FERNANDES, Bruno Jesus. **Riscos geológicos: avaliação da estabilidade de um bloco rochoso no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, MG.** Juiz de Fora. Monografia de Bacharelado em Geografia / UFJF. 2008. 120 p.
- LUPTON, Deborah. **Risk.** New York. Routledge. 2009.
- ROCHA, Geraldo César. Segurança pública e riscos ambientais. **Diário Regional.** Juiz de Fora, 30/5 a 01/6/2013. Opinião, pg.2.
- ROCHA, Geraldo César. **Riscos ambientais: análise e mapeamento em Minas Gerais.** Juiz de Fora. Editora da UFJF. 2005.
- ROCHA, Geraldo César. Gestão de riscos e cultura de segurança ambiental. In: ROCHA, Geraldo César; MACEDO, Jorge.A.Barros (organizadores.). **O perigo mora ao lado.** Belo Horizonte. MJR Editora. 2009.
- ROCHA, Geraldo César; CARMO, Lúcio Ferreira. Vulnerabilidade populacional a desastres tecnológicos na área urbana de Juiz de Fora, MG. In: Simpósio de Geografia Física Aplicada, 10., 2003. Rio de Janeiro. **Anais...**Rio de Janeiro: UERJ. 2003.
- SLOVIC, Paul. **The perception of risk.** London. Earthscan Publications. 2009.
- VEYRET, Yves. **Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente.** São Paulo. Editora Contexto. 2007.
- XAVIER da SILVA, Jorge. **Geoprocessamento para análise ambiental.** Rio de Janeiro. Edição do autor. 2001.

PREVENÇÃO DE RISCOS COM A COMUNIDADE LOCAL NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO RIO AQUIDAUANA NA CIDADE DE AQUIDAUANA MS/BRASIL

Vicentina Socorro da Anunciação

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Câmpus Aquidauana.

vique56@hotmail.com

João Lima Sant`Anna Neto

Departamento de Geografia, Grupo de Pesquisa GAIA; FCT/UNESP Presidente Prudente.

jlsn57@uol.com.br

RESUMO

A bacia do rio Aquidauana abrange uma área de aproximadamente 21.373,85 Km² envolvendo 16 municípios no Estado de Mato Grosso do Sul-Brasil. Destaca-se no contexto nacional e no Estado por apresentar três importantes unidades fisiográficas: o Planalto Maracaju-Campo Grande, a Depressão Pantaneira e a Planície do Pantanal Sul-Mato-Grossense, abrangendo parte dos biomas Cerrado e Pantanal. A área vêm passando por um processo de transformação, redefinindo a produção e a função do espaço local, sedimentando na região o agronegócio, a pecuária e a atividade turística, o que gradativamente tem contribuído para o avanço da vulnerabilidade ambiental, a maior repercussão socioespacial dos eventos, sobretudo os decorrentes do extremo climático se processa no espaço urbano da cidade de Aquidauana. Faz-se necessário compreender como se dá a relação da sociedade com os aspectos que compõem seu nicho, relacionando as práticas na produção do espaço, a geografia, a escola e práxis sociambientais.

Palavras chave: Risco. Espaço. Repercussões. Sociedade.

Introdução

A bacia hidrográfica do rio Aquidauana abrange dezesseis municípios e divide-se em duas áreas dissidentes: ao norte é drenada pelo curso superior do rio Aquidauana, recoberto de areias quartzosas talante a atrição, ao passo que na porção sul recebe a vazão dos canais que suplantam solos com textura silto-argilosa. As atividades econômicas agricultura, produção de carne bovina, atividade turística e industrial (laticínios, frigoríficos) preponderam-se na área. Além disso, o recurso hídrico é disposto para o abastecimento público de água na cidade de Aquidauana, à jusante da bacia. O rio Aquidauana tem sua cabeça de drenagem na Serra de Maracaju-Campo Grande no município de São Gabriel do Oeste ao norte do estado de Mato Grosso do Sul. Suas águas vêm na superfície de declive seguindo na direção central do Estado, banhando os municípios que compõe sua bacia, quando abruptamente muda o seu curso na orientação centro-oeste e noroeste adentrando o município de Aquidauana no encetamento da planície pantaneira desaguando no rio Miranda.

Neste trajeto, o rio possui um arranjo de drenagem do tipo meandrante, onde apresenta voltas que, rompidas, são abandonadas originando grandes baías, em formato de círculos, às vezes com leito linear.

Ao adentrar a área urbana sede do município, a seção transversal do canal, além de sofrer uma significativa redução, recebe o volume de água superficial dos córregos Guanandy, Sangradouro da Lagoa Comprida e João Dias, oriundo das descargas pluviais que, por efeito da gravidade, se desloca dos pontos mais altos da cidade em direção ao rio Aquidauana e desencadeia um quadro da problemática socioambiental para a cidade representado, principalmente, nos aspectos do extremo climático, uma vez que a expansão urbana se deu em áreas ribeirinhas com baixa

altimetria, gradativamente intensificada, contribuindo para o aumento da vulnerabilidade socioespacial.

Figura 1: Localização da área

A expansão territorial urbana da cidade de Aquidauana, o planejamento ineficiente e as intervenções, sobretudo a partir da década de 1950, estiveram em descompasso com o desenvolvimento local. Observa-se que a ação dos diversos agentes sociais produtores do espaço contribuiu e contribui para a ocupação de áreas de risco potencializando a ocupação de um local inapropriado para uso, principalmente residencial. Cria-se, dessa forma, um espaço vulnerável a episódios de inundações.

Assim, torna-se necessário entender a dinâmica natureza-sociedade neste espaço, pois é a partir dela que se constroem as diversas paisagens e se nota como as ações dos atores sociais vem as modificando. De acordo com Kaercher (2003, p. 12), é preciso entender como e por que os seres humanos modificam os espaços que habitam, conforme as relações que estabelecem entre si. Partindo da reflexão sobre a natureza e a produção do espaço, o presente excerto lança um olhar na apropriação deste pela sociedade, dos impactos socioambientais, das implicações socio espaciais e com o pensar e fazer geográfico na universidade, na escola e na sociedade.

Segundo Callai (2003, p. 58) “A Geografia que o aluno estuda deve permitir que ele se perceba como participante do espaço que estuda, onde os fenômenos que ali ocorrem são resultados da vida e do trabalho dos homens e estão inseridos num processo de desenvolvimento.” (CALLAI, 2003, p. 58).

Dessa forma, partiu-se do princípio dialógico por meio da pesquisa-ação Tripp (2005) visto a necessidade de discutir de forma participativa a produção de conhecimento mediada pela participação e empoderamento dos sujeitos direta e indiretamente envolvidos com os episódios e na construção do saber, possibilitando aos participantes a reflexão coletiva de forma crítica sobre suas próprias práticas, conduzindo-os à mudanças de atitude. A interação com os atores sociais é necessária para poder discutir e avaliar conjuntamente as experiências e abordagens planejadas e produzir de forma conjunta o percurso formativo. Assim despertar o interesse dos mesmos para questões que minimizem as consequências dos desastres naturais a qual a população da cidade de Aquidauana está exposta e auxiliar no processo de recuperação após calamidades como no caso das inundações, modelando uma nova representação sócio-espacial no baixo curso do rio Aquidauana e identificar mudanças de atitudes, comportamentos com o lugar de vivência cotidiana.

Representação tridimensional da área de risco com estudantes na cidade de Aquidauana-MS

Buscando refletir sobre ações que potencializam os impactos negativos no espaço estudado, conclamando a responsabilidade social e quebrar a hegemonia predominante, experiência vivenciada por acadêmicos, alunos, professores da rede pública de ensino no Curso de graduação em Geografia na cidade de Aquidauana instigou a compreensão dos participantes como sujeitos ativos, percebendo sua inserção nos diferentes espaços, possibilitando reivindicações de prioridade essencial na implementação das políticas públicas, fator de preservação da ética humana e de coesão social com o ambiente de vivência cotidiana. Num primeiro momento acadêmicos fizeram um reconhecimento, reflexão sobre o espaço vulnerável ao risco. Depois com auxílio do professor e dos alunos caminharam, refletiram e cartografaram o chão com posterior representação tridimensional da área.

Figura 2. Reconhecimento da área

Analisando a terceira dimensão do referido espaço a partir do mapa, representando o relevo através da altimetria, o grupo participante da atividade, visualizou as formas topográficas e hidrográficas do Rio Aquidauana na área de risco, indo de forma concreta do natural ao social e às ocorrências das águas que ensinam no espaço geográfico. O amparo para a construção das atividades e reflexões teóricas metodológicas do risco, está na Climatologia Geográfica e em sua conceituação de Geografia do Clima (Santana Neto, 2008).

A base cartográfica que orientou o trabalho deu-se através da utilização do mapa cadastral planialtimétrico da planície de inundação da cidade de Aquidauana na escala de 1:10.000 e plotado na escala 1:2.000 para realização da maquete. Para a construção da maquete houve o recorte do mapa gerado em que se delimitou a área de risco da cidade.

Para a representação geomorfológica da área, foram retiradas as curvas de nível por classes de valores equidistantes de 1m em 1m de altitude em virtude da baixa altimetria, que apresenta variabilidade entre 136,00m a 143,00m, o que torna a área estudada extremamente plana. Numa segunda fase, foi realizada a transposição individual das curvas de nível para as placas de isopor de acordo com a equidistância. Para desenhar o traçado das curvas no isopor, foi intercalado entre este e o mapa com a curva uma folha de papel carbono, passando sob o contorno desta a caneta, deixando-a demarcada na placa.

Figura 3 - Cotas altimétricas da área de risco da cidade de Aquidauana

Para recortar as curvas, foi utilizado cortador de isopor e em seguida, realizou-se a sobreposição e colagem das placas, iniciando-se pela cota mais baixa. Para dar a ideia da continuidade do relevo, os intervalos entre as diferença de degraus das placas foram preenchidos com massa

Figura 4: Construção da maquete das áreas de risco da cidade de Aquidauana

corrida, unindo a borda do degrau superior ao inferior na base. Após a secagem completa do material de recobrimento, foi utilizada lixa d'água, suavemente para dar uniformidade ao acabamento e a pintura foi realizada com tinta a base de água.

Conclusão

Observou-se a consolidação da cultura individual de cada agente social envolvido no processo, numa busca insistente na compreensão da dinâmica do espaço. Torna-se necessário mudanças substantivas no quadro institucional universidade x escola. A universidade deve avançar além da condensação de grupos em algumas especificidades, temas e conjugar de fato pesquisa e ensino. Não estar apenas com práticas amadorísticas de métodos e procedimentos complexos originando resultados inexpressivos de cunho científico. Mas vincular-se a disciplina Geografia no ensino básico, superando o distanciamento em relação aos problemas práticos lá vivido por esta e a percepção imaginada e teórica da universidade sobre o ensino. Associar cada vez mais o caráter teórico e prático das pesquisas em educação geográfica e superar a dicotomia de trabalho entre universidade e escola mas, promovendo uma integração, além de contribuir com a oportunidade de desacorrentar o que a rotina aprisiona o corpo e a mente e estreita os horizontes pessoais de professores universitários com projetos de pesquisa excessivamente individualizados, apresentando descontinuidade na produção e nenhuma influência na educação geográfica no ensino básico.

Então que universidade, escola, professores, gestores e alunos possam avançar no processo sem se contagiar com o surto da pós-modernidade: avalanches marqueteiros midiático do inchaço do currículo, a valorização do papel da competitividade pela produtividade estatística quantitativa de publicações, mas..... dar uma resposta concreta à sociedade da situação de penúria a que se encontra grande parcela da humanidade e o meio ambiente, vulneráveis a materialização dos desastres.

Recomenda-se que as áreas com susceptibilidade elevada a inundações sejam destinadas ao lazer e recuperação ambiental, e não para ocupação permanente como ocorre atualmente. Ademais, sugere-se que sejam realizadas fiscalizações e interdições de novas construções nas áreas de maior susceptibilidade, bem como seja promovida a educação ambiental ou educação para o risco, com o envolvimento de todos os segmentos da sociedade. Além disso, abordagem de métodos e técnicas em consonância com as dimensões, a diversidade, as formas, e a dinâmica dos diversos componentes do espaço estudado, em interação social entremeado de diálogos, ações e compromissos.

Bibliografia

- CALLAI, H. C. O Ensino de Geografia: Recortes Espaciais para Análise. In: CASTROGIOVANI, Carlos. [et all.]. (orgs). **Geografia em Sala de Aula: Práticas e Reflexões**. 4. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003.
- KAERCHER, Nestor André. A Geografia é o Nosso Dia-a-dia. In: CASTROGIOVANI, Carlos. [et all.]. (orgs). **Geografia em Sala de Aula: Práticas e Reflexões**. 4. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003.
- SANT'ANNA NETO, J. Da climatologia geográfica à geografia do clima: gênese, paradigmas e aplicações do clima como fenômeno geográfico. in: **Revista da Anpege**, 4. São Paulo, 2008.
- TRIPP, D. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. **Educação e Pesquisa**, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-466, set./dez. 2005.

RESPONSABILIDADE DOS CIENTISTAS NA COMUNICAÇÃO DO RISCO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA. O CASO DA SENTENÇA DE L' AQUILA

António Betâmio de Almeida

CEHIDRO, Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa

betamio.almeida@ist.utl.pt

RESUMO

A responsabilidade ética de especialistas na comunicação de riscos públicos e no apoio a decisões em situações de emergência é uma questão pertinente. Salientam-se as intervenções associadas a potenciais eventos naturais (cheias, ciclones, secas...) ou acidentes tecnológicos (poluição, rotura de barragem...). A sentença e o processo de L' Aquila (Itália) suscitam a reflexão sobre este assunto. Em 2012, sete cientistas italianos foram condenados a pesadas penas de prisão por terem sido considerados responsáveis pela morte de pessoas no sismo que ocorreu na cidade de L' Aquila, em Abril de 2009. A acusação considerou que a comunicação ao público relativa ao risco sísmico, alguns dias antes do sismo, foi incompleta, imprecisa e contraditória tendo contribuído decisivamente para modificar a percepção de perigo das vítimas e para alterar os respectivos procedimentos de protecção. O presente artigo tem o objectivo principal de apresentar uma análise muito sumária do processo e o respectivo impacto na relação entre cientistas, a protecção civil e o público, em situações de crise.

Palavras-chave: comunicação, responsabilidade, risco, processo de L' Aquila.

Introdução

Integrado num órgão da Protecção Civil, um consultor, cientista ou especialista, emite, através de um canal de televisão, uma recomendação para o público desvalorizando ou negando a possibilidade de ocorrência iminente de um acontecimento perigoso. Uma parte da população segue essa indicação e não aplica as medidas de protecção usuais nessas circunstâncias. O evento ocorre e há vítimas. Qual é a responsabilidade do referido consultor?

Este é o problema em análise.

No processo de gestão do risco público, a comunicação é um dos componentes mais delicados e com efeitos incertos e potencialmente graves. No contexto de uma crise, a comunicação pode tornar-se crítica. É o caso de situações de difícil controlo nas quais as medidas de protecção podem envolver uma grande perturbação social, nomeadamente quando exigem a evacuação de populações em áreas extensas como é o caso da ameaça de eventual ocorrência de um sismo ou de um tsunami ...

O nível de incerteza epistémica pode ser elevado e impedir uma opinião científica conclusiva. É, então, frequente que as autoridades responsáveis pela protecção civil e os órgãos de comunicação social solicitem a cientistas e técnicos especialistas que emitam publicamente opiniões sobre o assunto.

A sentença proferida por um tribunal relativamente à comunicação do risco nas vésperas do sismo que atingiu, em 2009, a cidade italiana de L' Aquila veio suscitar a necessidade de uma reflexão ponderada sobre esta matéria. Uma descrição detalhada do caso pode encontrar-se em Almeida e Oliveira (2014).

A incerteza e a liberdade científicas têm justificado que o acerto das opiniões emitidas e os respectivos impactos não sejam objecto de qualquer responsabilização legal: a autonomia e a colaboração dos cientistas assim o aconselham. Contudo, afigura-se ser oportuna uma reflexão

sobre os melhores procedimentos a seguir em situações semelhantes nomeadamente quando há uma situação de emergência com elevado impacto potencial, incerteza na previsão e grande repercussão social das mensagens emitidas por especialistas.

O processo de L'Aquila

Em Outubro de 2012, um tribunal italiano condenou sete cientistas a seis anos de prisão por terem sido considerados responsáveis por morte e ferimentos de pessoas no sismo que ocorreu no dia 6 de Abril de 2009. Recorda-se que este sismo provocou a morte de 309 pessoas e ferimentos a cerca de 1500 pessoas, e 67500 deslocados para além de avultados prejuízos materiais. A sentença do tribunal fixou a referida pena de prisão acrescida de outras medidas (e.g. nove milhões de euros de indemnizações). A defesa pediu recurso pelo que se aguarda a conclusão do processo. O estudo do processo foi feito com base no documento "Requisitória Scritta del Pubblico Ministero" (do Procurador Público da República) de 25 de Setembro de 2012 (509 p.) e na audição da gravação das sessões do tribunal.

Os acusados eram membros de uma Comissão Nacional para a previsão e prevenção dos riscos relevantes, a "Commissione sui Grandi Rischi", que fazia parte do sistema de protecção civil italiano. Foram acusados de culpa, na forma de negligência, imprudência e incompetência, pelo seu comportamento associado à reunião extraordinária da Comissão que teve lugar no dia 31 de Março de 2009, com "...o objectivo de... fazer um exame cuidadoso dos aspectos científicos e de protecção civil relativos à sequência sísmica... na província de L'Aquila". Na realidade, a população e as autoridades tinham uma preocupação dominante: a persistente ocorrência de abalos sísmicos. De acordo com o Procurador, as declarações a órgãos da comunicação social foram incompletas, imprecisas e contraditórias (e até levianas) tendo modificado a percepção dos cidadãos e das autoridades locais sobre o risco sísmico: as vítimas teriam alterado o modo habitual de protecção em resultado das declarações da referida Comissão.

No tribunal foi defendido que os responsáveis pela comunicação de riscos estariam sujeitos a uma responsabilização social e judicial pelas recomendações ao público, numa situação de crise. A sentença provocou uma reacção muito forte por parte de organizações científicas internacionais. Com efeito, considerou-se, incorrectamente, que os cientistas teriam sido acusados por terem falhado a previsão do terramoto. Esta interpretação, na opinião do autor, não é fundamentada mas influenciou muitos dos protestos. O Procurador salientou que a acusação não se dirigia à actividade científica dos acusados no domínio da previsão de sismos mas sim à comunicação sobre os riscos que deveria ter sido mais explícita por forma a permitir aos cidadãos fazer opções adequadas.

A sentença parece ser muito desproporcionada e injusta. Com efeito, não parece ser possível demonstrar que, se a comunicação da Comissão tivesse sido menos ambígua, as vítimas em causa no processo teriam tido outra sorte. Os acusados merecem, nesta perspectiva, as manifestações de solidariedade.

Uma reflexão que se justifica

A sentença e o processo de L'Aquila suscitam a reflexão sobre algumas questões relevantes para uma gestão de emergências mais eficaz e sobre as potenciais responsabilidades dos intervenientes na comunicação com o público exposto ao risco.

O Governo de Itália, consciente da importância de alguns aspectos associados ao sismo de 2009, promoveu (Maio de 2009) a constituição de um grupo internacional de 10 especialistas em

sismologia (Comissão Internacional de Previsão de Terramotos para a Protecção Civil - ICEF). Este grupo tinha como missão a avaliação do conhecimento científico actual relativo à previsão de curto-prazo de sismos tectónicos e a elaboração de recomendações para orientação da protecção civil. O relatório final, publicado em 2011, apresenta um conjunto de recomendações práticas: a comissão de especialistas deveria reportar directamente às autoridades (e não directamente à comunicação social); a comunicação deveria ser baseada em princípios da ciência social e em previsões probabilísticas.

A American Geophysical Union realizou, em Dezembro de 2012, uma sessão especial na qual foram apresentados e discutidos os desafios colocados por este caso: AGU Fall Meeting, 3-7 Dezembro de 2012, São Francisco (E.U.A.), Sessão Especial sobre L'Aquila ("Communicating Geohazard Risk Assessments: Lessons Learned From the Verdicts in the L'Aquila Earthquake Case") na qual foram oradores Thomas Jordan, Max Wyss e Stephen Sparks (existe um vídeo da sessão na Internet).

Nesta reunião foram considerados relevantes os aspectos científicos e técnicos, relativos à previsão a curto prazo de acontecimentos sísmicos, os aspectos operacionais associados à comunicação do risco em situação de crise, os aspectos jurídicos associados à eventual responsabilização penal dos cientistas ou especialistas por afirmações associadas à previsão e comunicação de riscos, e os aspectos éticos e políticos associados à actuação de cientistas, na qualidade de especialistas, em grupos de trabalho ou comissões oficiais de apoio a autoridades.

Uma comunicação para o público baseada nas incertezas científicas de carácter aleatório (utilizando probabilidades ou terminologia equivalente) ou de carácter epistémica (eventualmente através de probabilidades construídas ou por outros meios) implica técnicas especiais de comunicação por forma a evitar ambiguidades. Como se sabe, a caracterização probabilística, na quase totalidade dos casos, não é assertiva e não afasta definitivamente as alternativas em causa: mesmo uma probabilidade de 90% que não ocorra, nos próximos dias, um evento não é contraditória com essa ocorrência.

Diz a experiência que esta particularidade tende a afastar a descrição probabilística da comunicação: em determinadas situações, nomeadamente quando são entrevistados em directo, muitos especialistas são provocados a emitirem afirmações definitivas, por vezes precipitadas. Diga-se, em abono da verdade, que uma certa vertigem para a simplificação ou para uma demonstração de sabedoria sem incertezas é frequente em algumas afirmações de cientistas em órgãos de comunicação social (comportamento que muitas vezes está associado a um elevado orgulho pessoal ou mesmo a vaidade). Em L'Aquila parece que tal ocorreu. Os órgãos de comunicação tendem a apreciar essas afirmações sem dúvidas.

Acresce que o prestígio da ciência junto da opinião pública é muito elevado em resultado dos muitos sucessos conhecidos nos mais variados domínios. Daqui resulta que uma orientação dada por um especialista, investigador ou professor universitário, pode ter uma credibilidade muito grande. Admite-se que os responsáveis de serviços de protecção civil dos diferentes países também assim o possam considerar. Nesta conformidade, é muito natural que um consultor independente, e não enquadrado numa organização oficial da protecção civil, seja chamado a prestar, numa situação de crise, declarações importantes à comunicação social que podem ter efeitos não controláveis ou motivar decisões erradas ou precipitadas por parte de cidadãos.

Conclusões

A análise e a reflexão suscitadas pelo processo de L'Áquila colocam, assim, alguns desafios à comunidade científica e aos serviços de protecção civil:

- Em situação de crise, quais são os modos aconselháveis de comunicar situações de risco associadas a uma forte incerteza científica? Quando é que é pertinente e aconselhável utilizar um discurso baseado em probabilidades e de que modo essa informação deve ser elaborada para ser entendida por leigos e proporcionar uma percepção mais correcta da situação?
- Que tipo de “protocolo” deve ser seguido em situações de crise para proporcionar uma comunicação mais eficaz e segura para o público? Que tipo de precaução deve ser transmitida ao público para que este tenha consciência das incertezas envolvidas?
- Quais são as recomendações genéricas aos especialistas e técnicos no que respeita a responsabilidade (pessoal, civil e institucional) resultante de afirmações públicas no contexto da comunicação do risco e de medidas de protecção pessoais?
- Como deveremos encarar a responsabilidade social e política de comissões consultivas de especialistas, de apoio a autoridades políticas ou administrativas, em particular num contexto de riscos públicos e de situações de crise?

O apoio dos cientistas é fundamental, mas a relação comunicacional com o público (sobretudo em momentos cruciais) deve ser mediada por uma entidade apropriada ou sujeita a uma preparação muito cuidada. Há que evitar que, face ao receio de ser constituído arguido, os consultores da protecção civil evitem emitir opiniões ou sejam excessivamente prudentes.

No caso do processo de L'Áquila, há a referir que os cientistas podem ter sido (foram) vítimas do sucesso da Ciência, do prestígio social adquirido e do reconhecimento deste estatuto por parte da sociedade e dos políticos: uma mensagem transmitida pessoalmente por um cientista especialista na situação é muito mais convincente do que por um funcionário ou por um político local ou nacional, em particular quando essa mensagem sugere a “não-acção”.

Salienta-se que o processo de L'Áquila tem particular importância em países como Portugal que têm zonas de alto risco sísmico incluindo áreas urbanas antigas e muito populosas. Assim, este processo judicial deve merecer a melhor atenção por parte das entidades nacionais competentes e pela comunidade científica.

Bibliografia

Almeida, A. B. e Oliveira, C.S. (2014) -“O Caso da Sentença de L'Áquila. Responsabilidade na Comunicação do Risco”, Revista PROCIV (ANPC), Nº 73, Abril, Lisboa, pp.6-10.

IMPORTÂNCIA DA MEDICINA LEGAL EM SITUAÇÃO DE CATÁSTROFE - A QUEDA DA PONTE HINTZE RIBEIRO

Sara Gandra

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
saragandra@gmail.com

Paulo Campos

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
pacampos@netcabo.pt / paulocampos@inem.pt

Ana Mafalda Reis

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
docmaf@sapo.pt

Romero Bandeira

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto
hmedcat@icbas.up.pt

RESUMO

Como processo de ruptura e desarmonia entre o ambiente natural e o sistema social, a catástrofe é um acontecimento súbito e quase sempre imprevisível. De carácter natural ou fruto da inventiva humana é responsável por provocar inúmeras vítimas bem como danos materiais avultados. Tem a capacidade de abalar gravemente o indivíduo como ser holístico, bem como a vida das populações e o tecido social e económico da zona onde surge.

As catástrofes podem ser definidas e conceptualizadas das mais variadas formas, dependendo das suas próprias características e do autor que as classifica.

A conceptualização da catástrofe tem que ver com a desproporcionalidade entre recursos humanos e materiais de socorro e o número de vítimas a socorrer.

A análise do domínio de acção das forças de socorro e segurança permite ressaltar a importância do contacto entre as equipas intervenientes e a articulação e funcionamento das diversas entidades para que os recursos disponíveis possam ser optimizados, por forma a prestar socorro célere e eficaz.

É imperativo o estabelecimento de acções de planeamento, prevenção e exercício, com base no levantamento de vulnerabilidades e no estabelecimento de mapas de risco, de forma a exercitar e testar equipas, instituições e organismos intervenientes, à luz do que se tem feito a nível internacional.

A Medicina Legal e o seu extenso raio de influência, quer seja no estabelecimento da causa e mecanismo de morte e da extinção da personalidade através da realização das autópsias médico-legais, devolvendo por fim os corpos às famílias, quer através da organização e coordenação das equipas médico-legais face à ocorrência da situação de catástrofe propondo medidas de cooperação, ligação, assistência e propagação da informação entre serviços e entidades que prestem assistência e socorro bem como a elaboração de planos e medidas preventivas de protecção de pessoas e bens, com base no estudo do quadro traumatológico que as vítimas apresentam, tornam-na indissociável da Medicina de Catástrofe. Desta forma,

1. Através da reconstituição de uma situação catastrófica ocorrida no nosso tecido territorial foi possível reflectir e analisar uma situação real e estabelecer um paralelismo entre o ocorrido e as medidas tomadas bem como recursos humanos e técnicos utilizados numa situação de tal envergadura.

2. A Medicina de Catástrofe, como teia situacional que é, articula-se em pleno com a Medicina Legal, sendo que esta é a aplicação do conhecimento científico e biomédico às questões do direito.

3. Através dos capítulos em que a Medicina Legal desenvolve a sua actuação se prova a necessidade de uma equipa multidisciplinar, especialista e experiente.

Palavras-chave: Catástrofe, Medicina de Catástrofe, Medicina Legal, socorro a Multivítimas

Introdução

A Medicina de Catástrofe, como especialidade com acção pluridisciplinar, nasce da necessidade de minimizar a desproporcionalidade entre vítimas que necessitam de assistência e apoio e os recursos humanos e técnicos disponíveis.

É a medicina dos “desastres de massas”, dos cataclismos e das perdas incommensuráveis. É a medicina da urgência individual transformada em colectiva, com acção multifacetada, que encerra em si todos os conhecimentos de índole médica e do domínio científico, bem como todos os conhecimentos da mais diversa ordem que em sinergismo visam devolver o equilíbrio àqueles que foram vítimas do acontecimento catastrófico.

O Mundo tem vindo a ser assolado pelos mais variados acidentes catastróficos decorrentes dos constantes avanços tecnológicos, dos condicionalismos sócio-culturais, do desequilíbrio social, do avanço desmedido dos grandes complexos industriais e habitacionais. A convivência humana em grandes edificações, as migrações, o melhoramento das vias de circulação de tráfego, o aumento dos actos terroristas e de acções bélicas a par da ausência de meios de prevenção e predição são factores que se nos afiguram como propiciadores de catástrofes da mais diversa etiologia.

O profundo interesse nesta área deve-se ao facto de ser um ramo da Medicina ainda pouco explorado e sobre o qual pouco se tem dito, escrito e feito no nosso país, que pelas suas condições geográficas, meteorológicas, estruturais e estratégicas tem todas as características para que possa ser assolado por uma catástrofe *major* que afecte e assole a sua integridade.

A dificuldade maior de actuação prende-se com o carácter não programável, dificilmente preditível e com um poder de aniquilação incommensurável sendo que na maioria das vezes pelas suas características *sui generis* não pode ser extrapolada para outras situações catastróficas.

Através da reconstituição da queda da Ponte Hintze Ribeiro e consequente socorro foi possível reflectir e analisar uma situação real e estabelecer um paralelismo entre o ocorrido e as medidas tomadas, bem como recursos humanos e técnicos utilizados numa situação de tal envergadura. Às 21 horas e 10 minutos do dia 4 de Março de 2001, domingo, numa noite de Inverno precedida e antecedida por tantas outras igualmente chuvosas, a parte central do tabuleiro da ponte Hintze Ribeiro caiu, arrastando um autocarro de passageiros e dois automóveis para as águas do Rio Douro. Uma excursão às amendoeiras em flor, em Trás-os-Montes, terminou em tragédia, à porta de casa.

Grande parte das vítimas da derrocada da ponte que ligava Entre-os-Rios a Castelo de Paiva residia na freguesia de Raiva.

São 17 000 os habitantes do concelho com pouco mais de 100 Km quadrados e nove freguesias, 6 das quais ribeirinhas.

A Medicina de Catástrofe, como teia situacional que é, articula-se em pleno com a Medicina Legal, sendo que esta é a aplicação do conhecimento científico e biomédico às questões do direito. Através dos capítulos em que a Medicina Legal desenvolve a sua actuação se prova a necessidade de uma equipa multidisciplinar, especialista e experiente.

Indubitavelmente, as situações de catástrofe surgem e evoluem a par da aniquilação de vidas e bens, pelo que além da necessidade óbvia de um socorro célere e efectivo é imperioso solucionar uma pluralidade de questões médico-legais, identificação dos mortos e do estabelecimento da causa e mecanismo da morte, uma vez que através da análise de algumas situações de catástrofe, se pode constatar que o número de vítimas decorrentes das catástrofes naturais entre 1947 e 1970, a nível mundial, foi calculado em cerca de 1.200.000. (Bandeira 2008).

Toda esta mudança, encarada segundo um modelo antropocêntrico e sociocêntrico relaciona-se profundamente com a Medicina Legal, como uma ciência complexa que encerra em si múltiplos ramos do saber e como “ponte que é entre a medicina e o direito, cabe-lhe a análise científica das questões para proporcionar um equilíbrio desejável entre ambos, com mira na dignidade do Homem como ser superior” (J.E. Pinto da Costa 2004)

O relacionamento entre ambas é potenciado aquando do surgimento da situação catastrófica. Com o intuito de tornar esta ligação mais visível, foi abordada uma situação acontecida e amplamente difundida no nosso país - a queda da ponte Hintze Ribeiro - que se traduziu por profundas repercussões quer a nível regional, quer a nível nacional afectando a integridade do país no seu plano sócio-político, cultural e médico-legal.

Conclusão

A ocorrência de uma catástrofe encerra em si uma pluralidade de efeitos nefastos e repercussões a diversos níveis. Tem a capacidade de afectar o indivíduo e a sociedade em todas as suas dimensões e ser de uma complexidade tal que a solução dos efeitos produzidos passa pela articulação dos serviços disponíveis a nível local, municipal, nacional ou sectorial para que se proceda ao melhor aproveitamento possível dos recursos.

As inúmeras relações que a Medicina de Catástrofe e a Medicina Legal estabelecem com outros ramos da ciência e o seu extenso raio de influência tornam-nas indissociáveis;

Os acidentes catastróficos de índole natural ou fruto da inventiva humana condicionam o surgimento de um sem número de vítimas pelo que todo o processo médico-legal identificativo pressupõe a existência de uma equipa multidisciplinar e especializada, fundamental num cenário de catástrofe;

Relativamente à sociedade, a Medicina Legal tem como competências a resolução de questões relacionadas com indemnizações, heranças, determinação do estado civil do cônjuge sobrevivente, atribuição de prémios de apólices e obtenção de benefícios sociais, bem como a identificação antropológica das vítimas, a identificação cronológica do acidente e determinação cronológica da morte e o estabelecimento do mecanismo e causa de morte, comprovando a extinção da personalidade através da realização das autópsias médico-legais, devolvendo por fim os corpos às famílias é seu papel preponderante.

A Medicina de Catástrofe, como teia situacional que é, articula-se em pleno com a Medicina Legal, sendo que esta é a aplicação do conhecimento científico e biomédico às questões do direito.

Bibliografia

- ANGELINI F (1989) La Ètica en La Medicina de Desastres. *Dolentium Hominum* 11: 62- 64
- BANDEIRA R (1995) Medicina de Catástrofe - da exemplificação histórica à latroética: Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar - Universidade do Porto, Dissertação de Doutoramento
- CALDAS I; AFONSO A; MAGALHÃES T (2002) Identificação humana com recurso a técnicas de identificação dentárias em situação de catástrofe, *Revista Portuguesa de Estomatologia, Medicina Dentária e Cirurgia Maxilo- Facial* 3: 16- 19
- CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS Y PERDIDOS (1988) *El comportamiento de las personas en situaciones de emergencia*- Cepreven Editora - Asociación de investigación para la seguridad de vidas e bienes, Madrid
- COURBILL J; BUFFAT J; CHABANNE JP; CHEVALIER F; DORNE R; NOTO R; PAILLER J L; VIDELAINE J (1987) *Medicine en Situation de Catastrophe*, Massan, Paris

- DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE ESPAÑA - Cruz Roja (2001) Recomendaciones para situaciones de emergencia colectiva, Madrid
- EMMANUELLI J; EMMANUELLI X (1995) Au secours de la vie - La Médecine d' Urgence, Découvertes Gallimard Sciences, Paris
- EQUIPA MÉDICO- LEGAL DE INTERVENÇÃO EM DESASTRES DE MASSA (2002), Instituto Nacional de Medicina Legal
- EZEQUIELA; VIEIRA (2002) Missão em Castelo de Paiva - Relato de um participante nas operações de resgate, 2ª ed., Editorial Caminha, Lisboa
- FAVRE R (1992) L'Homme et les Catastrophes, 2ª ed., Vol. I, Éditions France- Sélection, Paris
- FERNANDES R (2003) Procedimentos no Plano de Emergência, Revista da Escola Nacional de Bombeiros, 25: 38- 41
- FRANÇA G (2004) Medicina Legal, 7ª ed, Guanabara Koogan, Rio de Janeiro
- GOIRICELAYA E (1998) Desastres y medios de comunicación, Asociacion Profesional de Tecnicos de Bomberos, Emergência 112, Gallarta
- GUNN S (1992) Le Medecin et les catastrophes, Revue de L'Amelisap 13 :20- 23
- LARCAN A (1988) La Medicine de Catastrophes. La Revue du Practicien 38, 11: 645- 647
- REBELO F (2003) Revista de Geografia Física Aplicada no Ordenamento do Território e Gestão de Riscos Naturais e Territoriais, Minerva, Coimbra
- REBELO F (2003) Riscos naturais e acção antrópica - estudos e reflexões, 2ª ed., Imprensa da Universidade, Coimbra
- RIBEIRO P (2003) Os Centros de Coordenação de Socorros, Revista da Escola Nacional de Bombeiros, 25: 10- 12
- ROCHA F (2003) O papel da sociedade no planeamento de emergência, Revista da Escola Nacional de Bombeiros 25: 28- 30
- SALAZAR-GALHARDO A (2002) A Ponte caiu-me em cima - a tragédia de Entre-os-Rios, 1ª ed., Notícias Editorial, Lisboa
- STONE D; ARMSTRONG R; MACRINA D; PANKAU J (1999) Introdução à Epidemiologia, Mac Graw-Hill, Brasil.

RISCOS NATURAIS E TECNOLÓGICOS NO CONCELHO DE MIRANDA DO CORVO

Cláudio Pereira

XLGEO - Sistemas de Informação e Geociências, Lda.

claudiojoaoopereira@gmail.com

Alexandre Oliveira Tavares

Centro de Estudos Sociais e Dep. de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra

atavares@ci.uc.pt

RESUMO

O estudo faz o levantamento e caracterização dos processos naturais e tecnológicos de perigo no município de Miranda do Corvo. Para suportar esta análise recorreu-se a quatro bases de dados distintas: Bombeiros de Miranda do Corvo, CDOS Coimbra, AFN e da ANSR. De seguida fez-se um exaustivo levantamento de campo com identificação dos locais reportados, num total de 2242 ocorrências. Os resultados salientaram os incêndios florestais e os acidentes rodoviários, como os processos que apresentam maior número de ocorrências no concelho, seguidos das quedas de árvores, inundações, incêndios urbanos, os movimentos de massa e dos acidentes tecnológicos. Realizou-se a análise do grau de relevância dos riscos identificados, recorrendo a duas metodologias de avaliação: a primeira resultante da junção ANPC/OHS, e a segunda utilizada pela FEMA e designada de OEM. Os resultados fazem realçar os riscos associados aos incêndios florestais e acidentes rodoviários em Miranda do Corvo. Mostra-se assim a importância de uma avaliação multirrisco à escala municipal, assim como a necessidade de ações ou planos específicos ou especiais de emergência.

Palavras-chave: Miranda do Corvo, Base de Dados, Ocorrências, Análise do Risco

Introdução

Portugal tem um longo historial de desastres de origem natural e tecnológica, onde a gestão do risco assenta fundamentalmente na dotação e gestão de recursos para a resposta operacional, suportada pelo voluntariado para fazer face às diferentes crises, num quadro que tem privilegiado as fases de emergência e de pós-emergência. Só recentemente se assiste à mobilização de recursos e meios para a prevenção e redução dos riscos, a par da construção de alguns referenciais normativos e regimes jurídicos específicos (Tavares, 2010). No Plano Regional de Ordenamento do Território - Centro (CCDRC, 2011), no qual se enquadra a área de estudo, é apresentado o quadro de referência dos riscos naturais, ambientais e tecnológicos, salientando-se para além dos perigos, a importância da vulnerabilidade territorial, e dos referenciais de prevenção e mitigação dos riscos. De acordo com Tavares (2013) a escala municipal possibilita a boa integração nos modelos de gestão, quer da avaliação do risco, das medidas de prevenção e mitigação, quer das ações rápidas dirigidas a processos intensivos de risco.

Enquadramento da área de estudo

A área do estudo localiza-se na NUT II do Centro de Portugal, e pertence à NUT III, Pinhal Interior Norte (Figura 1). O concelho possui uma área de 126,4Km², estando dividido por 5 freguesias, apresentado uma população residente de 13 864 pessoas, segundo os censos de 2011 (INE, 2011). De acordo com Soares *et al.* (1989) estão representadas quatro principais unidades paisagísticas com fundamento geológico: Maciço Marginal; Depressão Marginal; Xistos do Maciço Hespérico; e Bacia de Miranda do Corvo e envolvente.

Figura 1 - Localização e enquadramento do concelho de Miranda do Corvo

Uma elevada percentagem do concelho tem uma ocupação florestal (68%), distribuída pelas várias freguesias, estando a ocupação urbana predominantemente associada à freguesia sede, Miranda do Corvo, e à freguesia de Semide com significativas áreas sociais. As áreas agrícolas estão associadas aos menores declives e aos depósitos aluvionares do rio Dueça e da ribeira do Alhedra, com uma representação de 13%.

Metodologia

A metodologia utilizada baseou-se na recolha, análise e processamento da informação obtida a partir de pesquisa bibliográfica; da análise de bases de dados sobre o histórico; e de trabalho de campo. A análise do histórico teve por base o levantamento das ocorrências provenientes dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo (BVMC) e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), da Autoridade Florestal Nacional e da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, no período entre 2000 e 2009, perfazendo 10 anos de amostragem, e correspondendo a 2242 ocorrências (Pereira, 2012). O trabalho de campo permitiu recolher elementos e georreferenciar locais onde estavam presentes evidências de processos ou acções perigosas ou de impactos.

Para a análise do risco, recorrendo à aplicação de matrizes de avaliação. Uma primeira análise resultou da aplicação conjunta da metodologia utilizada pela ANPC e da Universidade de Western Sydney designada de OHS, e a segunda análise baseou-se na matriz utilizada pela FEMA e designada de OEM (Oregon Emergency Management).

Riscos Naturais e Tecnológicos no Concelho de Miranda do Corvo

A compilação dos registos das ocorrências, permitiu elaborar uma base de dados que serviu para a análise dos perigos. Na tabela I é possível verificar a forma como as 2242 ocorrências se distribuem pelo período de tempo analisado e pelo tipo de ocorrências. Destacam-se os valores para os acidentes rodoviários, nomeadamente na EN 17, junto a localidade de Segade, e na estrada N17-1, em Semide, assim como os incêndios florestais e as quedas de árvores.

Tabela I - Distribuição das ocorrências referente ao período entre 2000 e 2009

Tipo de ocorrências	Anos										Totais
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Incêndios florestais	89	78	59	45	38	93	56	25	51	73	607
Incêndios urbanos	20	17	5	13	22	14	24	12	18	30	175
Acidentes rodoviários	94	65	68	85	70	55	42	67	60	53	659
Atropelamentos	6	5	5	6	5	4	6	8	6	2	53
Queda de árvores	70	71	26	18	29	15	40	46	46	57	418
Movimentos de massa	24	32	7	15	7	3	12	11	11	12	134
Inundações	24	29	13	6	3	5	16	6	9	5	116
Acidentes tecnológicos	7	11	5	15	4	5	8	6	6	9	76
Outros acidentes com veículos	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4

Análise de Risco

Na Tabela II aparecem os resultados para a análise do risco segundo a junção das metodologias ANPC/OHS. Na Tabela III transparecem os resultados da aplicação da matriz FEMA/OEM.

As duas metodologias, ANPC/OHS e FEMA/OEM revelam resultados concordantes na hierarquização da maioria dos riscos considerados. Os incêndios florestais e os acidentes rodoviários são os riscos que obtêm valores mais elevados ao nível municipal de acordo com a probabilidade e consequências dos eventos. Os atropelamentos e quedas de árvores surgem em ambas metodologias, em posições muito similares.

Contudo, no caso das inundações e movimentos de massa, os resultados obtidos pela aplicação das metodologias revelam diferenças na hierarquização destes riscos. A diferença visível no risco de inundações deve-se essencialmente à maior ponderação da variável histórica na metodologia FEMA/OEM. Em relação aos movimentos deve-se ao facto da inclusão das variáveis vulnerabilidade e pior cenário na metodologia FEMA/OEM, que não determinam uma pontuação mais elevada.

Tabela II - Análise dos riscos segundo a metodologia ANPC/OHS

Riscos	Probabilidade	Impacto	Classificação Pxl	Grau de Risco
Incêndios Florestais	Elevada	Elevado	20	Extremo
	5	4		
Incêndios Urbanos	Elevado	Baixo	10	Moderado
	5	2		
Acidentes Rodoviários	Elevado	Elevado	20	Extremo
	5	4		
Atropelamentos	Média-Alta	Insignificante	4	Baixo
	4	1		
Queda de árvores	Média-Alta	Moderado	12	Moderado
	4	3		
Movimentos de massa	Média-Alta	Baixo	8	Moderado
	4	2		
Inundações	Média-Alta	Baixo	8	Moderado
	4	2		
Acidentes Tecnológicos	Média	Insignificante	3	Baixo
	3	1		
Outros acidentes com outros veículos	Baixa	Insignificante	1	Muito Baixo
	1	1		

Tabela III - Análise dos riscos seguindo a metodologia FEMA/OEM

Riscos		Histórico FP = 2	Vulnerabilidade FP = 5	Pior Cenário FP = 10	Probabilidade FP = 7	Total
Incêndios Florestais	Severidade	10	7	3	10	155
	Subtotal	20	35	30	70	
Incêndios Urbanos	Severidade	9	3	1	6	85
	Subtotal	18	15	10	42	
Acidentes Rodoviários	Severidade	10	3	2	10	125
	Subtotal	20	15	20	70	
Atropelamentos	Severidade	7	2	2	3	65
	Subtotal	14	10	20	21	
Queda de árvores	Severidade	10	2	1	8	96
	Subtotal	20	10	10	56	
Movimentos de massa	Severidade	9	2	1	6	80
	Subtotal	18	10	10	42	
Inundações	Severidade	9	3	3	7	112
	Subtotal	18	15	30	49	
Acidentes Tecnológicos	Severidade	8	3	3	4	89
	Subtotal	16	15	30	28	
Outros acidentes com veículos	Severidade	2	2	2	3	55
	Subtotal	4	10	20	21	

Conclusão

Com a elaboração deste estudo foi possível identificar os principais riscos para o concelho de Miranda do Corvo: incêndios florestais, acidentes rodoviários, queda de árvores, movimentos de massa, incêndios urbanos, inundações, atropelamentos, acidentes tecnológicos (fugas de gás, incêndios em veículos, incêndios em postes de electricidade, colapso de estruturas, incêndios industriais) e outros acidentes com veículos (acidentes ferroviários e acidentes aéreos). Com a ajuda de trabalho de campo e a consulta das fontes de dados, foi possível projectar um conjunto de 1635 ocorrências repartidas por 10 anos, e cartografar alguns dos locais no concelho onde existe maior histórico de ocorrências. A avaliação de riscos fez ressaltar, independentemente da metodologia, os incêndios florestais e os acidentes rodoviários, como os riscos com maiores impactos no concelho de Miranda do Corvo, os quais devem ser complementados por planos especiais de emergência. Ressaltam ainda um conjunto de riscos, como queda de árvores, inundações, movimentos de massa, incêndios urbanos e acidentes tecnológicos, que em função da gravidade ou probabilidade devem ser objectos de acções de prevenção, redução ou mitigação. De acordo com os resultados obtidos é ainda possível estruturar a capacidade de resposta em emergência em função do histórico de ocorrências.

Bibliografia

- CCDR (2011). *Proposta do PROT-Centro*. Acedido em 24.09.2014 file:///C:/Users/Gestor/Downloads/proposta_prot-centro_final_maio-2011.pdf
- INE (2011) - *Censos de Portugal de 2011*, INE, Lisboa.
- PEREIRA, C. (2012). Riscos Naturais e Tecnológicos no Concelho de Miranda do Corvo. Dissertação Mestrado DSRNT na Universidade de Coimbra.
- SOARES, A.; MARQUES, J. e ROCHA, R. (col. CUNHA, P. e DUARTE, L.) (2005). *Levantamento na Orla Meso-Cenozóica, Carta Geológica de Portugal, Folha 19-D, Coimbra-Lousã. Escala 1:50 000*. Lisboa, MEI - INETI. - Departamento de Geologia.
- TAVARES, A.O. (2010). Riscos Naturais e Ordenamento do Território - Modelos, práticas e políticas públicas a partir de uma reflexão para a região centro de Portugal. *Prospectiva e Planeamento*, 17, DPPRT, Coimbra.

TAVARES, A.O. (2013). Referenciais e modelos de governação dos riscos, in Luciano Fernandes Lourenço e Manuel Alberto Mateus (org.). *Riscos naturais, antrópicos e mistos. Hom. Prof. Doutor Fernando Rebelo*. Coimbra, Dep. de Geografia. Fac. de Letras, 63-80.

SATISFAÇÃO NO TRABALHO DOS BOMBEIROS: A INFLUÊNCIA DAS EMOÇÕES E DO COPING

Natália Vara

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto; Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Bragança
vara.natalia@gmail.com

Sónia P. Gonçalves

Instituto Piaget
sonia.goncalves@almada.ipiaget.pt

Cristina Queirós

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto
cqueiros@fpce.up.pt

RESUMO

Os bombeiros estão diariamente expostos a situações stressantes e a uma variedade de emoções que têm de gerir. Estudos reconhecem que as emoções negativas prejudicam a capacidade de trabalho (Galloucis et al., 2000) e o stress laboral, a não satisfação com o trabalho e estratégias de coping pobres, parecem fazer-se acompanhar de um desconforto emocional significativo (Martins, 2004). Este estudo tem como objectivo compreender a influência das emoções expressas no trabalho sobre a satisfação e perceber se esta é mediada pelas estratégias de coping. Os resultados revelaram que a combinação das emoções expressas no trabalho com as estratégias de coping pode aumentar a satisfação profissional e pode conduzir a uma melhor gestão das situações stressantes no trabalho (Folkman & Lazarus, 1991).

Palavras-chave: Emoções, coping, satisfação, bombeiros

Introdução

A atividade profissional pode proporcionar emoções positivas, realização pessoal e profissional, mas também pode ser uma fonte de stress que gradualmente desgasta. Eleito pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho como tema para 2014, o stress, é algo sempre presente na atividade dos bombeiros, nomeadamente, lidar com circunstâncias físicas desagradáveis, vítimas problemáticas, pressão temporal, expectativas dos outros e de si próprios.

Em muitas profissões, incluindo a dos bombeiros, é esperado que os profissionais realizem as tarefas e exerçam esforço físico e mental, mas também lhes é exigida a gestão das suas próprias emoções no contexto de trabalho. Assim, enquanto prestadores de cuidados/serviços se estes profissionais cumprirem com êxito a exigência para exhibir e sentir emoções, isso vai ter efeitos positivos, contribuindo para o sentimento de autoeficácia ou realização pessoal (Zapf et al., 2001). Acredita-se que lidar com outras pessoas satisfaz necessidades de afiliação, status e reconhecimento, comuns a um comportamento altruísta característico dos bombeiros, no qual o trabalho emocional desempenha um papel importante como stressor que afeta os profissionais de várias formas. Zapf e colegas (2001) definiram o trabalho emocional como os processos psicológicos necessários para regular as emoções desejadas/impostas pela organização como parte do trabalho ou função. Côté e Morgan (2002) demonstraram que amplificando ou exagerando as emoções positivas no trabalho estas podem ter um efeito positivo sobre a satisfação no trabalho. Além disso, outros estudos verificaram que a expressão de emoções positivas e requisitos de sensibilidade estavam positivamente relacionadas com a realização pessoal e satisfação no trabalho (Zapf et al., 2001). Estudos salientam que as emoções interferem com a saúde mental, e, nomeadamente o stress laboral, a vulnerabilidade ao stress, a insatisfação com o trabalho, a fadiga crónica, a ansiedade

e estratégias de coping pobres, parecem acompanhar-se de um desconforto emocional significativo, contribuindo para o aumento da probabilidade dos profissionais desenvolverem problemas de comportamento (Martins, 2004). Outros autores (Chiavenato, 2010) destacam que a qualidade de vida no trabalho é determinada pelas aspirações da pessoa em relação ao seu bem-estar e satisfação do trabalho, bem como com os interesses da organização e os seus efeitos nos objetivos organizacionais. Parece então existir uma interação entre as características individuais (necessidades, valores, crenças e expectativas) e as organizacionais (estrutura organizacional, recursos, sistemas de recompensas). Assim, se a qualidade de vida no trabalho for pobre, pode originar insatisfação do trabalho e comportamentos desajustados tais como erros de desempenho, absentismo, etc.

A satisfação no trabalho pode ser perspectivada como um estado emocional positivo que resulta da forma como o indivíduo percebe o seu trabalho (Chiavenato, 2010). A manifestação de um elevado nível de satisfação costuma refletir a existência de um elevado nível de adaptação à tarefa, variando contudo de acordo com a percepção individual de cada trabalhador. No entanto, raramente a avaliação dos resultados e da eficácia organizacional tem em conta as consequências que o trabalho tem para as pessoas que o desempenham (Martins, 2004), apesar de o tipo de trabalho, as relações interpessoais, os papéis desempenhados, os sistemas de progressão na carreira e o estilo de liderança/chefia serem elementos determinantes do bem-estar, da saúde e da satisfação laboral (Bakker & Demerouti, 2014).

Na literatura tem sido salientado o papel da emoção no processo de stress e coping. Folkman e Lazarus (1991) definiram as emoções como reações psicofisiológicas complexas e organizadas que resultam de avaliações cognitivas, operando como uma unidade que reflete a qualidade e a intensidade da emoção. Defendem que a emoção e o coping se influenciam mutuamente numa relação dinâmica e recíproca, pois a emoção facilita e interfere com o coping (o qual não é apenas uma resposta à emoção, sendo também influenciado pela avaliação) e, numa perspetiva temporal, o coping pode afetar a reação emocional. A avaliação e o coping são, também, entendidos como mediadores da resposta emocional, e, tendo por base a perspetiva que o coping influencia a relação da pessoa-meio e a resposta emocional, pensa-se que o impacto das emoções expressas no trabalho sobre a satisfação laboral pode ser mediado pelo coping. Este estudo tem como objetivo compreender a influência das emoções expressas no trabalho sobre a satisfação e perceber se esta é mediada pelas estratégias de coping.

Método

Os dados foram recolhidos numa amostra não-probabilística de 505 bombeiros de diferentes zonas do país, tendo uma média de idades de 33 anos ($DP= 8,5$), experiência profissional de 11,4 anos ($DP= 7,9$), sendo maioritariamente do sexo masculino (87%). Relativamente à situação profissional, 53% são profissionais (assalariados, sapadores, municipais) e 47% são voluntários. Foi utilizado um questionário de auto-preenchimento, anónimo e confidencial e os dados foram analisados usando o SPSS 19. O instrumento era composto por uma parte sócio-demográfica que avaliou as características individuais e profissionais, incluindo ainda o Brief COPE (Carver et al, 1989; versão traduzida por Pais-Ribeiro & Rodrigues, 2004) para avaliar as estratégias de coping, o QST - Questionário de satisfação com o trabalho (Pais-Ribeiro, 2008) e a FEWS - Frankfurt Emotion Work Scales (Zapf et al., 1999; versão traduzida por Vara & Queirós, 2012) para avaliar as emoções expressas no trabalho.

Resultados

Foram encontrados (Tabela I) valores elevados na expressão de emoções positivas, no coping focado no problema e em todas as dimensões da satisfação com o trabalho. Existem correlações positivas significativas entre o expressar emoções positivas e o coping focado no problema e todas as dimensões da satisfação, verificando-se uma correlação negativa entre o expressar emoções negativas e as dimensões da satisfação. Observaram-se ainda correlações positivas significativas entre as emoções negativas e as estratégias de coping focadas nas emoções e no evitamento, sendo também estas últimas as que apresentam mais correlações negativas com as dimensões da satisfação.

Tabela I. Média, Desvio padrão e Correlações entre as dimensões da satisfação, as emoções expressas no trabalho e estratégias de coping

	Média	DP	1	2	3	4	5
1. Expressar Emoções Positivas	3,73	,66					
2. Expressar Emoções Negativas	1,70	,53					
3. Coping focado no problema	1,70	,67	,159**	,075			
4. Coping focado nas emoções	1,32	,75	,045	,109*			
5. Coping de evitamento	0,79	,60	,004	,333**			
6. Segurança c/ futuro da profissão	3,91	1,03	,176**	-,055	,108*	,038	,028
7. Apoio da hierarquia	4,15	1,12	,181**	-,100*	,067	-,013	,020
8. Reconhecimento pelos outros do trabalho realizado	4,41	,80	,208**	-,181**	,117*	-,009	-,123**
9. Condições físicas do trabalho	4,27	1,09	,124**	-,109*	,078	-,023	-,086
10. Relações com colegas	5,02	,82	,131**	-,341**	-,023	-,116*	-,316**
11. Satisfação com a profissão	3,75	,76	,201**	-,129**	,042	-,014	-,135**

* $p < 0,05$ ** $p < 0,010$ (valores mínimos e máximos das escalas: emoções 1-5; coping 0-3; satisfação 1-6)

Através de análises de regressão linear pelo método *enter* procurou-se perceber o impacto das emoções e das estratégias de coping na satisfação no trabalho, bem como verificar se as estratégias de coping mediavam a relação das emoções com a satisfação laboral. Verificou-se (Figura 1), que as estratégias de coping não medeiam o impacto das emoções positivas na satisfação no trabalho, sendo também baixo o valor preditor das emoções positivas (apenas explicam 5,2%) na satisfação e nas estratégias de coping focadas no problema (2,5%). Verificou-se que o coping de evitamento é preditor de uma baixa satisfação no trabalho, pois o valor de Beta é negativo e prediz apenas 2% da satisfação.

Figura 1. Análise de regressão para os efeitos das emoções positivas sobre a satisfação no trabalho, com mediação das estratégias de coping

Verificou-se que as emoções negativas são preditoras do uso de estratégias de coping focado nas emoções e do coping de evitamento (explicam 1,2% e 11% respetivamente), sendo também preditoras de baixa satisfação no trabalho (Figura 2). O coping focado no problema surge relacionado com a satisfação no trabalho mas numa percentagem pouco relevante (1%).

Figura 2. Análise de regressão para os efeitos das emoções negativas sobre a satisfação no trabalho, com mediação das estratégias de coping

Conclusão

Este estudo abordou as emoções no local de trabalho, o coping e a sua relação com a satisfação, tendo verificado que as emoções positivas vividas no ambiente de trabalho parecem ser preditoras da satisfação e do uso das estratégias de coping focadas no problema. No entanto, não se observou o efeito mediador do coping no impacto das emoções sobre a satisfação no trabalho, apesar de Folkman e Lazarus (1991) defenderem uma relação dinâmica e recíproca de influência entre emoção e coping. Estes resultados alertam ainda para, do ponto de vista prático, se ter em consideração o papel das respostas afetivas na gestão de problemas em várias profissões. Assim, é importante pensar sobre os efeitos do ambiente de trabalho no qual os bombeiros operam, e onde, especialmente as emoções podem surgir e influenciar a satisfação, o stress e o desempenho. Estudos anteriores em que se testou a supressão de emoções revelaram que esta supressão aumentava o stress (Butler et al., 2003), enquanto a amplificação ou exagero de emoções positivas no trabalho parece ter um efeito positivo sobre a satisfação no trabalho (Côté & Morgan, 2002) e para a o uso de estratégias de coping adequadas para gerir o stress (Millen, 2009). Poderá ser importante incluir na formação dos bombeiros conteúdos sobre gestão do stress e regulação das emoções, bem como criar nos corpos de bombeiros equipas de suporte de pares (ex: modelo CISM) que previnam o trauma, a insatisfação com o trabalho e o stress, num ano em que os riscos psicossociais no trabalho são valorizados.

Bibliografia

- Bakker, A.B., & Demerouti, E. (2014). Job demands-resources theory. In C. Cooper & P. Chen (Eds.). *Wellbeing: A Complete Reference Guide* (pp.37-64). Chichester, UK: Wiley-Blackwell.
- Butler, E.A., Egloff, B., Wilhelm, F.H., Smith, N.C., Erickson, E.A., & Gross, J. (2003). The Social consequences of expressive suppression. *Emotions*, 3, Washington, p.48-67.

- Chiavenato, I. (2010). *Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações*. 3ªed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 579 p.
- Côté, S., & Morgan, L. (2002). A longitudinal analysis o the association between emotion regulation, job satisfaction, and intentions to quit. *Journal of Organizational Behavior*, 23, Chichester, p.947-962.
- Galloucis, M., Silverman, M., & Francek, H. (2000). The impact of trauma exposure on the cognitive schemas of a sample of paramedics. *International Journal of Emergency Health*, 2, Illinois, p. 5-18
- Folkman, S., & Lazarus, R. (1991). Coping and Emotion,. In A. Monat, R. S. Lazarus (Eds.), *Stress and Coping, an Antology* (pp.207-227). New York, Colombia University Press
- Martins, M.C. (2004) - Factores de Risco Psicossociais para a Saúde Mental. *Millenium - Educação, Ciência e Tecnologia, Revista do ISPV*, 29, Viseu, p.255-268.
- Millen, D. (2009). The Ability of Firefighting Personnel to Cope With Stress. *Journal of Social Change*, 3, Minneapolis, p.38-56
- Zapf, D., Seifert, C., Schmutte, B., Mertini, H., & Holz, M. (2001) - Emotion Work and Job Stressors and their effects on burnout. *Psychology and Health*, 16, London, p.527-545.

pelo clima mediterrânico, sob a influência direta do anticiclone dos Açores (Sepúlveda, 2011), por se situar numa região subtropical tem um clima ameno, com micro-climas, no verão e no inverno, exceto nas zonas mais elevadas onde se registam temperaturas mais baixas (temperatura média anual: nas áreas mais elevadas oscila entre 9 e 12°C; e nas áreas mais baixas oscila entre 18 e 19°C). A ilha da Madeira possui uma orografia bastante acidentada e montanhosa (Fig. 1), o seu centro é dominado por relevos de grande altitude, como o Pico Ruivo (1862m), o Pico do Areeiro (1818m) e o planalto do Paul da Serra (1400m), separadas por vales muito encaixados e estreitos (Prada, 2000 e Couto, Salgado e Costa, 2012). O relevo da ilha de Porto Santo (Fig. 2) é muito inferior, o pico com maior altitude é o Pico do Facho (517m).

Os riscos naturais na Região Autónoma da Madeira (RAM) não só estão ligados à suscetibilidade dos mesmos, devido às suas características físicas, mas também estão ligados à vulnerabilidade do sistema social e económico sob impacto, resultado da intervenção do ser humano sobre o meio.

Neste trabalho, o objetivo geral consistiu em analisar os riscos naturais de maior incidência na Região Autónoma da Madeira. Mas para tal, estabeleceu-se objetivos intermédios: identificar e caracterizar os riscos naturais de maior incidência na RAM; elaborar uma matriz de risco; e apresentar medidas de prevenção e de autoproteção.

A recolha e análise do histórico de ocorrências permitiu identificar e caracterizar os riscos de maior incidência (Quadro I) e elaborar a matriz de risco, de modo, a obter o grau de risco para cada um dos fenómenos em questão. O seu conhecimento permite ajudar a estabelecer medidas de prevenção e de autoproteção.

Histórico de ocorrências

Na Madeira, existem descrições e relatos da ocorrência de fenómenos naturais extremos que originam catástrofes desde o tempo dos primeiros colonizadores mas, as descrições mais precisas começam somente a partir do século XVII. O evento mais antigo de que há registos de 1467 e o maior foi, uma aluvião, registado a 9 de Outubro de 1803 no Funchal, segundo os relatos da época, julga-se que terão morrido, neste desastre natural, entre 600 e 1000 pessoas.

Caracterização dos riscos de maior incidência

“As aluviões das ribeiras da Madeira são, em geral, grosseiras, torrenciais e instáveis, em virtude da extrema imaturidade dos seus vales. Nas zonas planálticas, as aluviões são constituídas por materiais finos, sendo pouco espessas em virtude de se tratar das cabeceiras das ribeiras. Passada a zona planáltica, as ribeiras adquirem rapidamente elevado pendor, transmitindo alta energia às águas que passam a arrastar materiais mais grosseiros” (Prada, 2000:70).

Quadro I - Riscos de maior incidência - Séc. XVII a 2012

Riscos	Nº de ocorrências (I)
Aluviões	39
Sismos	31
Movimentos de massa em vertentes	7
Tsunamis	4
Inundações	3

Os sismos no arquipélago da Madeira são, na maioria dos casos, devido a reflexos dos sismos que ocorrem no arquipélago dos Açores e no Continente Português, cuja origem se conecta

principalmente à falha Açores - Gibraltar. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera ocorreram quatro macro sismos (magnitudes de 8.5, 8.7, 8.2, 8.1), entre 63AC e 1975, na região da Madeira e área adjacente (1000km de raio aproximadamente).

Os movimentos de massa em vertentes, mais propriamente os deslizamentos, ocorrem na Madeira devido a chuvas intensas, a título de exemplo temos o temporal de 20 de fevereiro de 2010 e devido à intervenção antrópica. Os deslizamentos de grande dimensão ocorrem nos vales, formando os deslizamentos-barragem (*landslide dam*) e os que se verificam na faixa costeira e escorregam até ao mar. Os desabamentos são dos movimentos de massa em vertentes mais frequentes e ocorrem um pouco por toda a ilha da Madeira, em taludes naturais ou de influência antrópica (construção de edifícios, estradas, etc.). Os desabamentos de grande dimensão ocorrem principalmente nos taludes na faixa costeira, ou nas encostas dos vales, particularmente nos mais encaixados (Rodrigues, Tavares, e Abreu, 2010).

Dos riscos naturais de maior incidência mas que por sua vez são menos frequentes temos os *tsunamis* e as inundações. Três dos quatro *tsunamis* ocorridos na região foram devido a movimentos de massa costeiros e não devido a sismos. A massa deslizada ao embater na água provoca uma onda gigante, atingindo áreas adjacentes da ilha. As inundações, propriamente ditas, ocorreram sem estar conjugadas com outros fenómenos naturais, como por exemplo as aluviões.

Neste trabalho incluiu-se o risco de incêndios em floresta e em mato, que embora não seja um risco natural, é bastante responsável pela destruição da vegetação, acentuando e agravando a erosão, os movimentos de massa em vertentes e a torrencialidade das ribeiras, quando se dão chuvas intensas.

Avaliação e estimativa do grau de risco

Para avaliar e estimar o grau de risco, foi realizada uma matriz de risco (Quadro II), de acordo com os procedimentos metodológicos contidos no *Guia para a Caracterização de Risco no Âmbito da Elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil* (ANPC, 2009). O risco obteve-se pela interceção entre a probabilidade de ocorrência do evento perigoso e o grau de gravidade dos danos que o mesmo pode produzir.

Quadro II - Matriz de risco - Grau de risco

Categoria do Perigo (i)	Gravidade				Probabilidade	Risco
	População	Socioeconómica	Ambiente	Total		
Aluviões	Crítica	Acentuada	Moderada	Crítica	Elevada	Extremo
Sismos	Moderada	Moderada	Residual	Moderada	Média-Baixa	Moderado
Movimentos de massa em vertentes (ii)	Acentuada	Moderada	Moderada	Acentuada	Média-Alta	Elevado
Incêndios em floresta e em mato	Moderada	Moderada	Crítica	Crítica	Elevada	Extremo

(i) Não foram avaliados nem estimados o grau de risco para os *tsunamis* e as inundações devido a baixa frequência de ocorrência dos mesmos.

(ii) Deslizamentos e desabamentos de grandes dimensões.

Medidas de prevenção e de autoproteção

Com base no grau de risco estabeleceu-se um leque de medidas de prevenção e de autoproteção, no Quadro III estão contempladas algumas dessas medidas, as restantes podem ser consultadas em *Riscos Naturais na Região Autónoma da Madeira: Análise dos Riscos Naturais de Maior Incidência* (Abreu, 2014).

Quadro III - Medidas de prevenção e autoproteção

Risco	Medidas Estruturais	Medidas não estruturais	Medidas de autoproteção
Aluviões	<ul style="list-style-type: none"> - Retenção do material sólido através do coberto vegetal e da reflorestação; - Controlo e análise cuidada da colocação de aterros; - Ajustado dimensionamento hidráulico das obras de engenharia; - Controlo da exposição ao risco. 	<ul style="list-style-type: none"> - Observações meteorológicas e avisos à população; - Elaboração de cartas de ordenamento do território; - Elaboração de cartas de risco. 	<ul style="list-style-type: none"> - Informar e sensibilizar os cidadãos da maneira a agir num evento de perigo:
Sismos	<ul style="list-style-type: none"> - Cumprimento das regras de construção dos edifícios e das estruturas, de modo a resistirem melhor aos abalos sísmicos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboração de planos de emergência. 	<ul style="list-style-type: none"> - Antes, Durante e Depois
Movimentos de massa em vertentes	<ul style="list-style-type: none"> - Remoção ou contenção dos materiais geológicos que possam constituir perigo; - Não cortar as vertentes; - Controlar a drenagem das águas; - Evitar colocar cargas pesadas em vertentes; - Ocupar corretamente as encostas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estudo das características geológicas e geomorfológicas de um local, para avaliar o potencial de ocorrência do movimento de massa; - Elaboração de cartas de risco. 	
Incêndios em floresta e em mato	<ul style="list-style-type: none"> - Gestão do material combustível; - Vigilância; - Rede de pontos de água. 	<ul style="list-style-type: none"> - Planos, de política de defesa da floresta contra incêndios. 	

Conclusão

A principal dificuldade neste trabalho foi obter o histórico de ocorrências devido à lacuna de dados, nomeadamente os eventos ocorridos e suas consequências. Ultrapassada esta dificuldade, pôde-se cumprir os objetivos intermédios do trabalho, permitindo, assim, identificar, caracterizar e obter do grau de risco, dos riscos de maior incidência. Deste modo e mediante a obtenção do grau de risco, obteve-se os riscos que apresentam maior perigosidade para a sociedade e apresentou-se um leque de medidas de prevenção e de autoproteção.

Destaca-se, que devido à diversidade do trabalho este é mais um contributo para o conhecimento e avaliação dos riscos na RAM. E pretende-se, sobretudo, que venha a ter utilidade na gestão do risco e no planeamento do território.

Bibliografia

- ANPC (2009) - *Guia de Caracterização de Risco no Âmbito da Elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil*. Caderno Técnico do PROCIV 9;
- COUTO, F.T., SALGADO R., e Costa M.J. (2012) - *Analysis of intense rainfall events on Madeira Island During the 2009/2010 winter*. Natural Hazards and Earth System Sciences;
- KOBIYAMA, M. et al. (2006) - *Prevenção de desastres naturais. Conceitos básicos*. Curitiba: Organic Trading. ISBN 85-87755-03-X;
- PRADA, (2000) - *Geologia e Recursos Hídricos subterrâneos da Ilha da Madeira*. Dissertação apresentada à Universidade da Madeira para obtenção do grau de Doutor em Geologia. Funchal;
- RIBEIRO, M. Luisa e RAMALHO, Miguel (2007) - *Uma visita geológica ao arquipélago da Madeira: principais Locais GEO-turísticos*. DRCIERAM/INETI;
- RODRIGUES, D., TAVARES, A., e ABREU, U. (2010) - *Movimentos de vertente na ilha da Madeira. Eventos de Dezembro 2009 e de Fevereiro de 2010*. Revista Eletrónica de Ciências da Terra Geosciences On-line Journal, vol. 9 (n.º 7) <http://metododirecto.pt/CNG2010/index.php/vol/article/view/473/206>. Acedido a 30/11/2012;
- SEPÚLYEDA, S. (2011) - *Avaliação da precipitação extrema da Ilha da Madeira*. Dissertação apresentada ao Instituto Superior Técnico para obtenção do grau de Mestre em Engenharia do Ambiente. Lisboa.

Apoios:

Universidade de Coimbra
Faculdade de Geografia

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CÂMARA
MUNICIPAL DE
GUIMARÃES